


HFO.3.

Taa
B 65

JP



DEPOSITED AT THE
RETURNED TO J. HARVARD FOREST
MARCH, 1967. 1942

~~HFO.3.~~

Neues
allgemein praktisches
Wörterbuch
der
Jagdwissenschaft
für
Jäger, Jagdliebhaber Forstmänner
und Gutsbesitzer.

Nach eigener Erfahrung bearbeitet.
von
Karl Adam Heinrich von Bosc,
herausgegeben, berichtigt und vervollkommnet
von
Friedrich Gottlob Leonhardi,
ordentlichen Professor der Oekonomie.

II^{ter} Theil
mit Kupfern.

Leipzig, 1809.
bei D. C. Hinrichs.

Jan. 1908
17448

~~17448~~

~~17448~~

N e u e s

allgemein praktisches

W ö r t e r b u c h

der

J a g d w i s s e n s c h a f t.

Z w e y t e r B a n d.

2 — 3.

Vorerinnerung.

Von dem allgemeinen Forst-, Jagd- und Fischlexicon ist dies der zweite Theil, welcher das Jagdwörterbuch enthält. Der Gemeinnützigkeit wegen ist jedoch die Einrichtung getroffen, daß er als ein für sich bestehendes Ganze unter einem besondern Titel auch apart verkauft wird. Liebhaber

also, welche weder das Forst-, noch das Fischlexicon zu haben wünschen, können dies Jagdwörterbuch allein erhalten; wodurch hoffentlich so manchem Jäger und Jagdliebhaber der leichtere Ankauf willkommen seyn wird.

Dabei hätte ich freilich gewünscht, daß ich alle zur Jagd und zum Jagdwesen gehörigen Materialien, eben so wie bei dem Forstwörterbuche, in einen Band hätte bringen können. Weil jedoch bei der Reichhaltigkeit des Inhalts, und, um nichts Wesentliches wegzulassen, darin

eine Unbequemlichkeit entstanden wäre: so fand ich für rathsamer, dieß Wörterbuch in zwei Bänden erscheinen zu lassen. Manchem ist dieß vielleicht nicht ganz erwünscht; doch glaube ich, daß deren mehrere seyn werden, welchen diese Einrichtung angenehm ist und seyn wird. Viel trug dazu die Aufnahme aller Jagdgesetze und Gerechtsamen bei, die man in ähnlichen ältern Wörterbüchern nicht findet, und welche gleichwohl jedem Jäger und Jagdlustigen zur Vermeidung entstehender Irrungen und anderer übeln Folgen so nöthig sind.

In Betreff des Fischlexicons hoffe ich diese
Bemerkung nicht wiederholen zu dürfen, da ich
dies in einem Bande zu liefern gedenke.

Der Verfasser.

Laden heißt, sein Gewehr zum Schusse zubereiten, und mit Pulver und Blei versehen.

L ä h m e n ist ein Geschäft bey der Fasanerie, da man nämlich den jungen Fasanen, die man im Garten behalten will, wenn sie Federn am Halse bekommen, das vorderste Glied eines Flügels mit einem scharfen Messer ablösset, und dann mit Baumöl und Butter bestreicht, wobei man sie im Fasanenhause fleißig füttert, und sonst gut abwartet. Bey gutem Wetter kann man sie heraus lassen, doch nicht zu weit, damit sie sich die Flügel nicht aufs neue verwunden. Unterdessen füttert man die alten Bruthühner gut, damit sie die Jungen unter sich nehmen. Wenn sie heil werden, kann man sie, jedoch unter beständiger Aufsicht, im Garten herum, auch auf Acker und Wiesen treiben.

Lauffer, Vorläufer, heißt man bey dem Vogelfange eine Art von Lockvögeln, die man außer dem Käfige bloß auf dem Vogelheerde ansetzt (ansillet), damit sie auf dem Heerde herumlaufen können, und die andern Vögel, in der Meynung, daß sie dort sind, desto eher einfallen.

Man nimmt zu großen Läufern Schnarren, Drosseln und Amseln, und zu kleinen Finken, Gimpel etc. Den größern wird jedem ein kleiner Trog mit Milch und Hirsekleyen angefüllt, und auf dem Heerde in die Erde gegraben; den kleinern aber nur ein Sauggeschirr auf den Heerd gestellt, und das Futter hingestreut.

Lager heißt die Stelle, wo ein Bär, Wolf, Luchs oder Haas, gewesen hat, bey dem größern Wildes heißt es Bette.

Lanciren ist, wenn bey dem Ansfange einer Parforcejagd oder der Anjagd der angegebene Hirsch aus seinem Stande gejagt und so lange verfolgt wird, bis man über einen Weg oder eine Allee kommt, die Lancierhunde alsdenn stopfet, und daselbst den Hirsch verbricht.

Langfessel und Kurzfessel sind zwey hirschlederne Riemen, die man den Falken und Habichten, bey dem Abrichten, um die Klauen legt.

Lappländischer Fink (F. Laponica Linn.), gehört als besondere Art in die Gattung Finken, und zwar in die vierte Familie mit einem an den Kinn-

Neues
allgemein praktisches
Wörterbuch
der
Jagdwissenschaft
für
Jäger, Jagdliebhaber Forstmänner
und Gutsbesitzer.

Nach eigener Erfahrung bearbeitet.
von
Karl Adam Heinrich von Bosc,
herausgegeben, berichtigt und vervollkommnet
von
Friedrich Gottlob Leonhardi,
ordentlichen Professor der Oekonomie.

II^{ter} Theil
mit Kupfern.

Leipzig, 1809.
bei V. C. Hinrichs.

Jan. 1908
17448

~~17448~~

~~17448~~

N e u e s

allgemein praktisches

W ö r t e r b u c h

der

J a g d w i s s e n s c h a f t.

Zweyter Band.

L — 3.

Vorerinnerung.

Von dem allgemeinen Forst-, Jagd- und Fischlexicon ist dies der zweite Theil, welcher das Jagdwörterbuch enthält. Der Gemeinnützigkeit wegen ist jedoch die Einrichtung getroffen, daß er als ein für sich bestehendes Ganze unter einem besondern Titel auch apart verkauft wird. Liebhaber

also, welche weder das Forst-, noch das Fischlexicon zu haben wünschen, können dies Jagdwörterbuch allein erhalten; wodurch hoffentlich so manchem Jäger und Jagdliebhaber der leichtere Ankauf willkommen seyn wird.

Dabei hätte ich freilich gewünscht, daß ich alle zur Jagd und zum Jagdwesen gehörigen Materialien, eben so wie bei dem Forstwörterbuche, in einen Band hätte bringen können. Weil jedoch bei der Reichhaltigkeit des Inhalts, und, um nichts Wesentliches wegzulassen, darin

eine Unbequemlichkeit entstanden wäre: so fand ich für rathsamer, dieß Wörterbuch in zwei Bänden erscheinen zu lassen. Manchem ist dieß vielleicht nicht ganz erwünscht; doch glaube ich, daß deren mehrere seyn werden, welchen diese Einrichtung angenehm ist und seyn wird. Viel trug dazu die Aufnahme aller Jagdgesetze und Gerechtsamen bei, die man in ähnlichen ältern Wörterbüchern nicht findet, und welche gleichwohl jedem Jäger und Jagdlustigen zur Vermeidung entstehender Irrungen und anderer übeln so nöthig sind.

In Betreff des Fischlexicons hoffe ich diese
Bemerkung nicht wiederholen zu dürfen, da ich
dies in einem Bande zu liefern gedenke.

Der Verfasser.

Raden heißt, sein Gewehr zum Schusse zubereiten, und mit Pulver und Blei versehen.

Rähmen ist ein Geschäft bey der Fasanerie, da man nämlich den jungen Fasanen, die man im Garten behalten will, wenn sie Federn am Halse bekommen, das vorderste Glied eines Flügels mit einem scharfen Messer ablösset, und dann mit Baumöl und Butter bestreicht, wobey man sie im Fasanenhause fleißig füttert, und sonst gut abwartet. Bey gutem Wetter kann man sie heraus lassen, doch nicht zu weit, damit sie sich die Flügel nicht aufs neue verwunden. Unterdessen füttert man die alten Bruthühner gut, damit sie die Jungen unter sich nehmen. Wenn sie heil werden, kann man sie, jedoch unter beständiger Aufsicht, im Garten herum, auch auf Aecker und Wiesen treiben.

Raufer, Vorläufer, neht man bey dem Vogelfange eine Art von Lockvögeln, die man außer dem Käfige bloß auf dem Vogelheerde anseßet (ansillet), damit sie auf dem Heerde herum laufen können, und die andern Vögel, in der Meynung, daß sie frey sind, desto eher einfallen,

Man nimmt zu großen Räufern Schnertzen, Drosseln und Amseln, und zu kleinen Finken, Gimpel etc. Den größern wird jedem ein kleiner Trog mit Milch und Hirssekloyen angefüllt, und auf dem Heerde in die Erde gegraben; den kleinern aber nur ein Sauggeschirr auf den Heerd gestellt, und das Futter hingestreuet.

Rager heißt die Stelle, wo ein Bär, Wolf, Luchs oder Haas, gesehen hat, bey dem größern Wilde heißt es Bette.

Ranciren ist, wenn bey dem Anfange einer Parforcejagd oder der Anjagd der angegebene Hirsch aus seinem Stande gejagt und so lange verfolgt wird, bis man über einen Weg oder eine Allee kommt, die Rancierhunde alsdenn stopfet, und daselbst den Hirsch verbricht.

Ranasekel und Kurzsekel sind zwey hirschlederne Riemen, die man den Falken und Habichten, bey dem Abrichten, um die Klauen leget.

Rappländischer Fink (F. Laponica Linn.), gehört als besondere Art in die Gattung Fink, und zwar in die vierte Familie mit einem an den Rinn-

laben = Rändern merklich eingezogenen, scharf zugespitzten Schnabel, und einer langen geraden Hinterkralle. Der Rücken ist braun, mit Rostfarbe untermischt; über den Augen ein weißer Strich; an den beyden äußern Schwanzfedern ein keilsförmiger weißer Fleck, das Männchen mit einem schwarzen Scheitel, $6\frac{1}{2}$ Zoll lang. Durch den kleinen Zahn am Gaumen macht er den Uebergang zu den Ammern, und durch den Lerchensporn und die Stellung des Bindeglieds zwischen Lerchen und Finken. Er wählt sich zum Wohnort den Norden von Europa, Asien und Amerika; auf seinen Wanderungen im Herbst, Winter und Frühjahr sieht man ihn zuweilen in Deutschland. Man fängt ihn dann gewöhnlich unter den Feldlerchen. Die Nahrung besteht in Sämereyen, Hafer und Insekten. Man findet das Nest auf sumpfigen Hügeln mit 5 bis 6 lehmgelben, etwas braungewölkten Eiern. Dieser Vogel hat auch noch die Nahmen: Lerchenfink, großer Bergfink, gespornter Fink, Spornfink, lappländischer Distelfink, schwarzköpfiger Goldammer.

Lappreißer sind $\frac{1}{4}$ Ellen lange Stöcke, woran beym verlappen die Federlappen gehängt werden.

Lappstätt heißt ein mit Feder- oder Tuchlappen zugestelltes Jagen, wobey die Lappen auf

Freye kommen, damit sie gut zu sehen sind.

Lauer, Lausche heißt ein versteckter Ort, wohin die Jäger auf den Anstand zu gehen pflegen.

Lauf ist ein lichter, mit hohen Tüchern eingestellter Platz, wohin man der Herrschaft das Wild vorjaget, damit sie es im Vorbeylaufen schießen, hezen, oder fangen können. Er fängt an einem Ende des Jagens, bey dem Quere- oder Laufstuche an, wird auf beyden Seiten mit Tüchern eingestellt, und am Ende mit einem Bogen, den man die kleine Rundung nennet, wie ein halber Mond geschlossen. Der Laufplatz ist nach Beschaffenheit des Jagens, ohngefähr 300 Schritte, oder auch mehr oder weniger lang, und vor dem Querstuche etwa 120 Schritte breit. Mitten auf dem Laufste, oder wenn er zu lang ist, näher nach dem Jagen zu, wird der Schirm gestellt, zur Sauhage muß man die Tücher inwendig mit großen Netzen aufgespannt, auf die Forkeln legen, und weil die Herrschaft gewöhnlich auf das Wild nach den Krummruthen schießt, muß man grüne Reiser auf Stangen, als eine Warnung vor Gefahr, für die Zuschauer dahin stecken. Endlich richtet man noch im Laufe ober- und unterhalb des Schirmes, die Uebersprünge, d. h. niedrige Geländer, mit Reiffen umwunden, auf, worüber das Wild im Vorbeylaufen springen muß.

Lauf =

Laufbohren oder **Laufschlingen**, **Erddoehren**, **Erdszeug**, werden wie andere **Dohren** gemacht, und vorzüglich beim **Schnepfensfange** gebraucht.

Lauffen auf Reizen heißt, wenn der Jäger sich in ein Dickicht stellt, wo Füchse sind, um dieselben, durch das Nachmachen der Stimme eines gefangenen Vogels oder gegriffenen Hasen, zum Schuß an sich zu locken, weil die Füchse gern dergleichen Laute folgen.

Läuferplatz heißen die an jedem Orte oder Ende und bisweilen auch in der Mitte angelegten grünen Rasenplätze, worauf die sogenannten **Läufervögel** gesetzt und besetzt werden, welche nichts anders, als Lockvögel sind.

Läuferzug heißen die bey den lebernen Riemen und Schnürchen nebst dem Drahtringe und dem Wirbel, um die **Läufervögel** damit an den Flügeln anzubinden.

Lauffaden sind die Zwirnfaden, womit ein spiegelichtes Garn mit einem Innargne oder Busen eingebunden wird, damit der Busen an denselben sich hin- und herziehen kann.

Laufplatz ist der, zum Laufseil einer Jagd, bestimmte Platz, der mit Regen umstellt wird.

Lauffchüße heißt so viel als in Flugschüße.

Lauf nennet man ein Weiden jedes Wildprets.

Laufstuch, **Kollstuch**, **Quercertuch** ist das Tuch, das zwischen dem Jagen und dem Laufe vorn übersteht, und wenn das Wild auf den Lauf gejagt wird, auf- und wieder zusammen gezogen wird. Es ist im Stellen eben so hoch und lang und mit dem nemlichen Zubehör versehen, wie die andern hohen Tücher, nur, daß es wie ein Vorhang auf- und zugezogen wird, s. Jagdruch. So lange das Jagen noch neu ist, steht es gleich einem andern hohen Tuche da, wo der Lauf hinkommen soll. Man kann auch eines von den hohen Tüchern dazu anwenden, wenn man es allezeit von 40 zu 40 Ellen von oben bis unten durchschneiden läßt, und das selbst Wechsel mit Knebeln macht, so werden vier ganze, und an jedem Ende ein halber Wechsel, wo aber allezeit das Nöthige über einander gehen und versäumt werden muß. Das dadurch an der Länge abgehende, wird mit neuen Forkeln, und eben so viel Windleinen eingetheilt.

Laufschnee, **Laufschengarn**, **Lückennetz** ist, wenn man es gewöhnliche auf die Wechsel stellt, zum Hasenfange sehr bequem, wird aber nicht mit unter das gehörige Jagdzeug, sondern unter die Hasenjagerey gerechnet, und kann allensfalls bloß von einem Ritterguthsbefitzer, der nicht viel Bröhrer hat, geführt werden.

Laut ist 1) der Jäger von Horn und Hals, wenn er gut schreien und blasen kann. 2) die Hunde, wenn sie beim Jagen des Wildes anschlagen, 3) ein Horn, wenn es sich gut blasen läßt, und einen hellen Ton von sich giebt.

Lebendige Wehre heißt, wenn beim Jagen aus Mangel an Zeuge Deffnungen bleiben, in welche man alsdenn Menschen stellen muß, die das Wild vom Entfliehen abhalten müssen.

Lecken, Lecklein sagt man vom Hirsche, wenn er mit dem Hinterlaufe etwas zurückbleibt, und die Erde nicht sehr wegschiebet, aber doch vorne wegzwenget, daß es wie ein kleines Loch wird.

Leibhas sagt man, wenn ein großer Herr, der der Hage reitend oder fahrend bewohnt, einen Hahhund bey sich herführen läßt.

Leibhund nennt man auch die Blindlinge.

Leibjäger nennet man, im Gegensatz eines Revierjägers, einen in Diensten eines vornehmen Herrn stehenden und Livrée tragenden gelernten Jäger, der aber kein eigentliches Revier unter sich hat, sondern von seinem Herrn mehr zur Bedienung, als zur Jagd und Holzaufsicht gebraucht wird.

Leibschütze, Büchsenspanner ist ein Jagdbedienter eines

großen Herrn, der dessen Gewehr stets in Ordnung und Reinlichkeit zu erhalten hat, auch bey einer Jagd allezeit hinter ihm stehen, das abgeschossene Gewehr ausziehen, laden und beständig geladenes Gewehr für seinen Herrn in Bereitschaft halten, überhaupt aber alles, was zum Gewehr und dessen Behandlung gehöret, verstehen muß.

Leimbank, Leimgestelle, ist ein zum Vogelfange nöthiges Werkzeug, es besteht aus einem Brete einer Elle lang, worin ein Locher gebohret werden, um die Leimruthen, zum bequemen Forttragen hineinstecken zu können. Unten wird es mit Füßen versehen, damit man es hinsetzen könne, wohin man will. An der Seite soll ein Bretchen seyn, damit man beim Tragen der Leimbank nicht an die Leimruthen stoße. Man richtet eine solche Leimbank am besten folgender Gestalt ein: Es werden Bäume 12 Ellen hoch, und 1½ Elle im Umfange eingesetzt. An diese bringet man eine lange, aber in eisernen Bolzen gehende, Stange an, an welches man oben den Quirl zu den Leimspindeln anmacht, dieser besteht aus Spizen von einer starken Stange, welche etliche aufwärts stehende Arm starke Nester haben. In diese bohret man die Leimspindeln so ein, daß zwey und zwey Löcher einer Querschand breit über einander kommen. Hier von bringet man an jedem Quirl zwey oder drey Paar an. Hierzu macht man die Leimruthen an.

am besten von aspenen oder haselnen Holze, 6 Zoll lang und nicht völlig fingersdick, und spizet sie an einem Ende etwas zu. Auch macht man Ruhebänke, worauf die Leimstangen ruhen können; wenn sie heruntergelassen werden. Um sie anzubringen, suchet man einen freyen Platz im Holze aus, wo keine hohen Bäume zu nahe stehen, und erbauet daselbst eine kleine Hütte. Wenn man nun auf den Fang gehen will, tunket man früh vor Tage die Leimspindeln in den Leim, dann nimmt man in jede Hand eine und drehet immer eine um die andere herum, damit sich der Leim bis ganz herunter ziehe, wo sie eingesteckt werden, und so steckt man sie neben einander auf das Leimbänken. Sodann gehet man mit Tagesanbruch hinaus, hängt die Leimbank an den Hals, läßt die Böcke herunter, steckt die Leimspindeln ein, ziehet die Böcke wieder in die Höhe, und sehet die Lockvögel unter und vor den Leimstangen herum.

Leimheerd ist ein zum kleinen Vogelfange, z. B. Meisen, bestimmter, aus lauter Leimruthen und den mit Vogelkeim bestrichenen Reisern angelegter Vogelheerd.

Leimspindel, Leimspitze. Leimruche, Leimbinde ist eine von schwanken Birken, Auen oder Haseln geschnittene Ruche, die man mit Vogelkeim be richen, auf die Leimstange oder in dem Feldbaum zum Vogelfange

steckt. Zum Fange der Krammets- oder anderer größerer Vögel nimmt man stärkere, die auch wohl $\frac{3}{4}$, oder eine ganze Elle lang sind; zu Meisen, Finken und andern kleinen Vögeln brauchen sie nur $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ Elle lang zu seyn. Jede Ruche muß entweder mit einem zugespizten Drathe versehen seyn, um sie in den Baum zu stecken, oder man bohret Löcher in dieselben, und steckt die Spindeln hinein.

Leimstange ist eine lange starke schlanke Stange, an welcher man die Leimruthen einsteckt. Man streift die Rinde und Rinde sauber ab, streicht die Stange mit grüner Oelfarbe an, damit die Vögel sich nicht scheuen, und macht unten einen eisernen Stachel daran, um sie damit in die Erde zu stoßen. Mit dieser gehet der Vogelsteller in den Wald, und an den Büschen herum, wenn er nun Vögel höret, so befestiget er die Leimruthen auf der Stange, steckt diese an einem gelegenen Orte in die Erde, und macht nicht weit davon eine Gule oder ein Käuzchen auf einem Baume fest, bey welchem sich die Vögel versammeln, und die, welche sich auf die Leimstange setzen, gefangen werden.

Leimtasche ist eine lederne Tasche, worinnen der Vogelsteller seine Leimruthen trägt, damit er sich die Hände oder Kleidung nicht verunreinige. Sie ist nach der Länge der Leimruthen geschnitten, bergestalt, daß solche oben

oben etwas herausgehen. In diese steckt man so viel Ruthen, als man zum Fange nehmen will, gießt den zerlassenen Leim darüber, rührt die Ruthen darin herum, und wenn sie aufgesteckt werden, drehet man sie nach und nach heraus, ziehet sie aber nicht gerade heraus, weil man sonst wenig Vögel fangen würde.

Leinen heißen auch Arhen und man versteht darunter alle und jede Seile und Stricke, die bey der Jagd zu den Luchern, Luchlappen und Garnen gebraucht worden.

Leinenanbinden, Knüpfen, Schäften, Spießen, sind Geschäfte, worauf bey dem Stellen, Loslaffen und Aufheben des Zeuges viel ankommt. Wenn eine Oberleine an den Luchern angebunden wird, so wird dieselbe um einen Baum oder Fessel, das Ende aber unten weg herumgezogen, damit sie kreuzweis zu liegen kommen. Dann ziehen die Anzieher zugleich an, der Jäger aber, der das Netz stellet, ziehet an seinem Ende nach, hält aber, wenn die Anzieher einen Ruck gethan, sein Untertheil aufwärts, daß es dicke, und gleichsam etwas gezwungen an das Obertheil treffe. Wenn sie nun Kraff genug angezogen ist, so nimmt er das Unterende geschwind über dem Obern weg, und wieder rückwärts, ganz um den Baum herum, und steckt sein Ende über dem andern, und durch seinen

herumgebrachten Theil doppelt durch, ziehet aber das letzte Ende nicht ganz durch, daß es wie eine Schleife werde; alsdenn steckt er geschwind die Schleife noch ein- oder zweymahl um die angezogene Leine durch. Zersprungene Leinen werden auf folgende Art gespießet: 1) Man drehet die vier Schäfte von jedem Ende herein etwa $\frac{3}{4}$ Elle aus einander, doch so, daß jeder Schaft noch bey einander bleibe; dann schabet man jeden Schaft mit dem Messer nach dem Ende hinaus spitzig zu, und sezet von beyden Enden der Leinen die vier Schäfte in einander, wie die in einander geschlossenen Finger beyden Hände. Dann flechtet man einen Schaft von einer Leine gegen und in der andern Leine zwischen zwey Schäfte fest hinein, so lang es ist, und steckt die Spitze quer durch die festen Leinen, nachdem man vorher mit einem spitzigen runden Eisen vorgebohret hat. Hierauf nimmt man den andern Schaft übers Kreuz, flechtet ihn auch so der Leine entgegen hinein, und steckt das spitzige Ende ebenfalls durch, und so verfähret man mit jedem Schäfte.

Leithund, Lancierhund, Spürhund ist der vornehmste Hund zum Aufspüren des Rothwildpreys, und hat seinen Namen vom Hängefeil (s. d. Wort) woran er während seines Gebrauchs geleitet wird. Damit sein Geruch nicht verborben werde, muß er beständig an einem trocknen Orte an der Kette liegen.

gen. Er soll eine mittelmäßige Größe, einen zierlichen Kopf, weite Nasenlöcher, große Lappen um das Maul, ein Spannen langes Behänge, starke Brust, und Kreuz, einen langen Hals, starke Läufe, woran die vordern kürzer als die hintern sind, eine abhängende Ruthe, und überhaupt die Bildung eines niedrigen Mitteljagdhundes haben. Die Farbe ist mehrentheils gelblich. Er wird von Jugend auf an die menschliche Gesellschaft und angebunden zu seyn gewöhnet, ihm auch das Anschlagen nicht zugelassen. In der Jugend sind sie blöde und furchtsam, man muß sie also nicht schlagen, oder von andern Hunden beißen lassen, sondern man muß sie oft streichen, (lieben) und ihnen freundlich begegnen. Ihr Fraß besteht bloß aus Brod mit Milch oder guter Brühe von zahmen Fleische, aber von keinem Wildpret, außer wenn man Gelegenheit hat, ihnen Hirschschweiß zu geben. Man muß sie von Jugend auf, auf Feldern und Wiesen gewöhnen, sich vor sich her führen zu lassen, jedoch für allen Färthen von Haasen und Füchsen sorgfältig verwahren. Um ihren Geruch zu schärfen, muß man ihnen die Nasenlöcher oft mit altem Käse reiben. Im Winter bey großer Kälte, muß man sie im Zwinger frey herumlaufen lassen, aber vom Anfang des Winters an muß er beständig an eine Kette bleiben. Im May und Junius wird die Arbeit vorgenommen, denn späterhin ist das Jagd schon zu hoch und stellen

sich auch Winde ein, die der Spuhr des Hundes zuwider sind. Wie die Arbeit damit zu bestelligen, s. arbeitenden Leithund. Ob? und wenn er Genuß bekommen muß, davon s. Genuß. Wenn eine alte Leithündin wölft, giebt man ihr so viel möglich in ihren ordentlichen Fraß warmen Schweiß von aufgebrochenem Wildpret, läßt auch den jungen Hund, wenn er einige Wochen alt ist, so oft als möglich ein frisch aufgebrochenes Rothwildpret beriechen, bezupfen, den Schweiß ablecken, auch hinein kriechen. Wenn der Hund fressen kann, muß man des Morgens ein Stück warmes Brod eine kleine Strecke weit schleppen, am Ende der Schleppe aber ein Stück kaltes Brod legen lassen, und so den Hund durch den stärkern Geruch des warmen Brodes auf der Erde zu suchen, gewöhnen, ihn aber kein warmes Brod fressen lassen, weil dadurch leicht die Tollwuth entsteht. Wenn er ein Jahr alt ist, muß man ihn fleißig auf Viehtriften herumführen, aber allezeit bestrafen, so oft er eine Viehfärthe annimmt. Dadurch lernt er die Hirschfärthe auch mitten durch das Vieh wegsuchen.

Leerke, *Alauda*, ist wegen seines wohlschmeckenden Fleisches ein eben so nutzbarer, als wegen seines schönen Gesangs ein angenehmer zur Gattung Singvögel gehörender Vogel, s. Feldlerke.

Leer.

Perchenfang ist ein Aus-
druck, der nicht nur die verschie-
benen Arten, Perchen zu fangen,
sondern auch die rechte Zeit da-
zu bezeichnet.

Perchenhaube, besteht aus
einem Biegel von Draht mit ei-
nem doppelten Spiegel und einem
klaren Inngarne versehen, und
wird zum Perchenfange an eine
lange dünne Stange gebunden.

Perchenheerd. 1) S. Vo-
gelheerd, 2) nennet man auch so,
einen sehr kostbaren Perchenfang,
der wie ein Vogelheerd gestellt
wird, nur daß bey diesem alles
mit Draht, statt mit Leinen ver-
bunden ist, und mit Schloßern
losgeschlagen wird. Er hat 6—800
bis 1000 Ellen im Umfange, wird
an die Stelle der Klebeneze gestellt,
die Perchen werden auf die ge-
wöhnliche Art hinein getrieben,
und wenn sie in dem Bezirke des
Heerdes sind, wird ein Abzug
losgedruckt, wodurch zugleich sämt-
liche am Zeuge befindliche Schloß-
fer und Schneller losgezogen wer-
den, daß die Wände mit Pfeilschnel-
ler Geschwindigkeit zusammenfal-
len und fast alle, in der Stel-
lung befindlichen Perchen, gefan-
gen werden. Da jedoch die Ein-
richtung dieses Heerdes äußerst
kostspielig ist, so ist er nur einem
großen Herrn zu empfehlen, der
ein Vergnügen daran findet, eine
ungewöhnliche Menge von Per-
chen auf einmal zu berücken;
oder einem Manne, der mit einem
ansehnlichen Capitale zu Bestrei-
tung der Kosten versehen, den Per-
chenfang sein einziges Gewerbe

des Herbstes seyn läßt: da er ge-
wiß in einem, oder zwey Jah-
ren die Kosten der Anlage wie-
der bekommt, weil auf diese Art
gewiß zehnmal so viel Perchen
auf einmal gefangen werden, als
bey jeder andern Fangart.

Perchennez, Perchengarn
nennet man solche Netze, die man
zum Perchenfange gebrauchet.
Man hat deren zweyerley: Ta-
geneze und Nachtneze. Tage-
neze, Klebeneze, Tagegar-
ne, Klebegarne sind solche
Netze, die man bey Tag mit For-
keln aufstellt, und in der Abends-
dämmerung die Perchen hinein-
treibet. Sie sind ohngefähr 4½
Elle hoch, 18 bis 20 Ellen lang,
und werden von starkem unge-
zwirtem und ungebleichtem Garne,
ganz fein gestrickt, damit sie desto
besser fangen. Die Maschen sind
so weit, als nöthig ist, eine Per-
che mit angeschlossenen Flügeln
durchstecken zu können; denn ihres
ausgebreiteten Flügel halber blei-
ben sie dann am besten darin
hängen. Oben sind an den Net-
zen lederne Ringe etwa sechs
Zoll von einander angenehet mit
welchen man sie bey dem Stel-
len an den Leinen auf- und bey
dem Abnehmen wieder zusammen-
schieben kann. Von ihren Ge-
brauch s. Perchenstreichen. No. 2.
Nachtneze, Nachtgarn s. d.
Wort und Perchenstreichen. No. 1.
Nächst diesen gebrauchet man auch
zum Perchenfange eine Art nie-
driger Netze, die man Tyraß
nennet, s. d. Wort; nicht weniger
hat man auch Tageneze wie auf
Vogelheerden, deren Gebrauch man
theils

theils unter dem Worte Lerchen-
heerd, theils unter dem Worte
Lerchenstreichen findet. Auch hat
man Deckneze, von welchen allen
das Wort Lerchenstreichen nachzu-
sehen ist.

Lerchen Spiegel - f. Lerchen-
streichen No. 3.

Lerchenstreichen, Ler-
chenstrich nennet man eigent-
lich das Geschäft des Lerchenfan-
ges, das auf verschiedene Arten
betrieben wird, wovon wir hier
die vornehmsten anführen wollen.
1) Mit dem Nachtneze. Die-
ses ist ein noch einmal so brei-
tes Netz, als seine Länge aus-
trägt, in welches seiner Länge
nach, auf jeder Seite eine Stan-
ge gezogen ist, welche bey'm Strei-
chen ein Mann an einem Tra-
geriemen über seine Achseln so
tief trägt, daß das Netz fast auf
den Stoppeln des Sommerge-
traides, wo dieser Gang betrie-
ben werden muß, aufkriecht.
Hinten gehet ein dritter Mann,
der einen, an das Hintertheil
des Netzes gebundenen Strick in
in der Hand trägt, und damit
das Netz hinten etwas in die
Höhe hebt. Doch kann auch die-
ser dritte Mann erspart werden,
wenn man an das Hintertheil
des Netzes einen Strohwisch be-
festiget, der das Netz etwas in
die Höhe hält. So überstreicht
man damit des Nachts in mög-
lichster Stille die Stoppeln des
Sommergetraides, auf welchen
die den Tag über ziehenden Ler-
chen, des Nachts gewöhnlich still
liegen. Wenn nun einer der

Lerchensänger eine aufstehende Ler-
che pfeifen höret, giebt er sogleich
ein Zeichen, worauf alsbald die
Träger das Netz fallen lassen,
und auf dasselbe gehen um die
gefangenen Lerchen zu töbten und
auszunehmen. Dann wird wei-
ter gezogen. Bisweilen bedeckt
man auch wohl ein Volk Neb-
hüner, oder, jedoch seltener, ei-
nen Hasen; da man denn, sehr
geschwind zu Werke gehen muß,
weil diese das Netz gewöhnlich
sehr leicht zerreißen, der Haase sich
auch nicht selten gar durchkriecht.
Man muß aber hiezu dunkle
Nächte wählen, denn bey mond-
hellen Nächten liegen die Lerchen
nicht stille, sondern ziehen fort.
2) Mit Tage- oder Klebe-
netzen, da man auf der Mor-
genseite einer Fläche Hafer- und
Gerstenstoppeln einige Wände
Neze auf hohe Forkeln stellet.
Diese Wände stehen hinter ein-
ander, so daß die vorderste am
niedrigsten, und fast auf der Erde
aufstehet, die zweyte muß höhere
Forkeln haben, und also auch hö-
her stehen, als die erste, und so
immerfort, daß die hinterste am
höchsten steht. Jede Wand be-
stehet aus mehreren Netzen und
einer Forkel mehr als Neze sind,
so daß das erste Netz an die erste
und zweyte, das andere an die
zweyte und dritte, und so fort
jedes Netz an die zweyte Forkel
des vorhergehenden Netzes ange-
bunden ist, und daß alle diese
in einer Linie stehenden Neze
zusammen die Gestalt einer Wand
haben, und auch eine Wand
genennet werden. An beyden En-
den der ersten Wand steht eine
Win-

Winde, worauf einige hundert Ellen Leine gewickelt sind; diese wickelt man ab, spannet an das eine Ende ein Pferd, und dann müssen eine, der Länge und Stärke der Leine angemessene Anzahl Menschen dabey seyn, welche von 50 zu 50 Schritte einzeln eingetheilt, diese Leine ziehen helfen. Mit diesen, von beyden Winden abgewundenen Leinen, umziehet man den ganzen, vor den Netzen liegenden Bezirk von Sommerstopeln, so daß die Leinen am weitesten Ende gegen Abend zusammen kommen, daselbst bindet man sie zusammen, bringet die Pferde wieder herein an die innern Enden beyder Leinen, spannet sie daselbst an, und treibet so ganz langsam auf die Netze zu, bis die Eintreibzeit kommt, da man denn rasch eintreibt, die Linien auseinander macht und wieder aufwindet; die gefangenen Lerchen tödtet und aus der Netze auch nebst den Leinen abnimmt, und nach Hause bringet. Bey diesem Fange, der jedoch unter den bisherigen, gewöhnlichen Fangarten, der ergiebigste ist, kann ein wenig Wind den ganzen Fang vereiteln, wenn er nemlich Abends bey dem Eintreiben wehet, und die Wände, welche gerade herunter hängen sollen, in die Höhe treibet, daß alle Lerchen darunter wegfliegen. Ein Umstand, der sich sehr oft ereignet, wenn man bey dem stillsten Nachmittage gestellt hat, und sich nun bey dem Eintreiben der Wind erhebet, daß man dann in Vergleich des gemachten Aufwandes, wenig oder nichts fängt. Oder wenn im

Gegentheil auf einen sehr windigen Nachmittag, durch den man sich, in der Vermuthung, daß der Abend auch so ausfallen werde, vom Stellen abhalten ließ, ein ganz stiller Abend folgt. Durch beydes wird man in nicht geringe Verlegenheit gesetzt, der man aber dadurch begegnen kann, wenn man des Morgens vor Sonnenaufgang Achtung giebt, wie stark der Wind wehet; denn es ist eine, auf vieljährige Erfahrung gegründete Regel, daß, um diese Jahreszeit, der Wind Abends nach Sonnenuntergang gerade eben so stark und nicht stärker gehet, als er früh vor Sonnenaufgang gieng, dahingegen wehet er am Tage oft stark und legt sich gegen Abend, wenn er früh nicht gieng, und so umgekehrt. Man beobachte daher den Wind früh vor Sonnenaufgange, ist es dann stille, so stelle man, wenn auch des Nachmittags das Wetter ganz stürmisch wäre, ist es hingegen um diese Zeit windig, so stelle man nicht, wenn es auch den ganzen Tag stille wäre, denn Abends gehet der Wind eben so gewiß, als im umgekehrten Falle des Abends Windstille erfolgt. Der gute oder schlechte Fang beruhet auch auf der Art des Treibens und der Zeit des Eintreibens. Ein Fehler ist, die Lerchen vom Anfange des Treibens, bis zum Eintreiben zu übertreiben, da man viel zu schnell nicht sowohl treibet, als die Lerchen jaget, die treibenden Personen sich auch nicht still genug verhalten; gewöhnlich ist auch der Sammelplatz der Lerchen

hen vor den Wänden zu klein. Durch alle diese Umstände werden die Lerchen unruhig gemacht, und viele gehen zurück. Nun beschleuniget man das Eintreiben, und die Lerchen, welche, weil es noch zu hell ist, die Wände sehen, gehen darüber weg. Andere lassen zu spät eintreiben und fangen eben so wenig, weil die Lerchen, wenn es zu dunkel ist, sobald sie aufgejagt werden, gerade in die Höhe steigen. Die Zeit des Eintreibens läßt sich eben so wenig durch die Erscheinung des sogenannten Abendsternes, als nach einer gewissen Anzahl von Minuten nach Sonnenuntergang bestimmen, denn eine Wolke kann die Erscheinung des Sternes verzögern, und trüber Himmel das Dunkelwerden beschleunigen. Der rechte Zeitpunkt zum Eintreiben läßt sich daher nur aus selbst gemachten Erfahrungen lernen, doch ist so viel gewiß, daß es besser ist, ein paar Minuten zu früh, als zu spät einzutreiben. Die rechte Art des Treibens geschieht auf folgende Art: die Wände stehen, wie bereits gesagt, gegen Morgen, und das Treiben gehet von Abend gegen Morgen, damit die Lerche im Treiben nicht zu weit vor sich gehe, weil ihr eigentlicher Zug von Morgen gegen Abend gehet, und sie also nicht gern gegen Morgen zurück gehet. Treibet man nun langsam und stille, und hält man, so oft die Lerchen aufsteigen, ein wenig an, so lassen sie sich nach Sonnenuntergang ganz gemächlich an den Ort ihrer Bestimmung vor den Wänden zusammentreiben.

Wenn man ziemlich nahe an die Wände gekommen ist, läßt man die Lerchen ein Weilchen ruhen, dann treibet man ganz kurz vorher, ehe es Zeit zum Eintreiben ist, bis auf den letzten Punkt, läßt sie noch einen Augenblick ruhen, und treibet sodann alsbald ein; und zwar mit schnellen Schritten, aber still und ohne Geräusch, bis zuletzt, wenn die Lerchen verwirrt und für denen, bereits in den Netzen hängenden, scheu werden, da man wohl thut einigen Lärm durch Schreien zu machen, noch besser aber, wenn um diese Zeit von jedem Flügel mit einer Armbrust ein Fuchschwanz oder Fledermisch schräg durch die Lerchen in die Luft geschossen wird, daß die steigenden Lerchen aus Furcht in die Tiefe zurück und viele davon in die Wände fliegen. 3) Mit dem Lerchenspiegel. Man schlägt eine Spindel bis auf zwei Zoll hoch in die Erde, auf diese setzt man einen Spiegel von hellem reinem Glase, woran ein eiserner Haken ist. Nun macht man eine Schlagwand, 380 Maschen lang an einen Bindfaden gereiher, und 180 breit, jede Masche $1\frac{1}{2}$ Zoll ins Gevierte, und mit feinem Bindfaden rund umher vermaschet. Die Oberleinen müssen von ausgehecktem Hanse 50 Ellen lang und Fingers stark, die Unterleinen aber halb so stark und 40 Ellen lang seyn. Nun wird noch eine andere Rückleine und eine andere Leine am Haken des Spiegels befestiget, welche beyde der Lerchensteller in eine in einiger Entfernung davon

der Erde gemachte Grube ver-
steckt, zu sich nimmt. Die Wand
wird hinter den Spiegel gestellt,
und der Spiegel so gerichtet, daß
die Sonne hinein scheint, denn
der Fang muß allezeit bey hellem
Sonnenscheine geschehen. Wenn
nun Lerchen vorkommen, so wird
der Spiegel immer mittelst
der Leine gedreht. Wenn dann
eine Lerche den Spiegel und sich
darinnen siehet, so sicht sie dar-
auf und der ganze Schwarm folgt
ihr nach. Sobald diese nun auf
den Spiegel fallen, so rückt man
die Ruckleine und fängt den gan-
zen Schwarm. 4) Mit dem Ler-
chenfalken. Man nimmt nem-
lich einen lebendigen Baumsfal-
ken (s. Falk Lit. K.) oder einen
lebendigen Mittelgeper (s. Geyer
No. 8.) auf die Hand, gehet da-
mit auf die Felder und treibt
ihn an, die Flügel auszusperren.
Die Lerchen derer größter Feind
er ist, drücken sich aus Furcht
für ihn, so fest in die Erde, daß
man sie mit einem, in der an-
dern Hand haltenden, am lan-
gen Stocke befestigten, und in
Gestalt eines Fischhaamens ge-
strickten Deckneze zudecken, und
fangen kann. Die beste Zeit zu
diesem Fange ist zu Ende des
Augusts und Anfange des Sep-
tembers, wenn die Lerchen in der
Mause sind. 5) Mit dem Ty-
razz s. d. Wort. 6) Auf dem
Lerchenheerde, s. Lerchenheerd.
7) Mit dem Lerchenwagen.
Dieses ist ein, von dem Kan-
tor Lent in Bschorla bey Schnee-
berg erfundener Wagen, der den
Lerchenfang ungemein erleichtert.
Zwey Personen können ihn mit

der größten Bequemlichkeit die
ganze Nacht fortbewegen, und
bedienen sich dessen, wie eines
Nachtnezes. Er schleicht ganz
geräuschlos einher, und das daran
befindliche Netz, fällt auf einen
Zug herab, und wird eben so
schnell wieder an dem Wagen be-
festiget. Er deckt 24 bis 30 El-
ten. Modelle dazu sind, das Stück
für 10 Thlr. — — bey dem Pa-
stor M. Rosenfeld in gedachtem
Bschorla zu bekommen. Nach den
Chursächs. Gesetzen soll es mit
dem Lerchenfange wie mit an-
dern Niederjagdwerk gehalten wer-
den, und sich keiner auf des andern
Grund und Boden betreten las-
sen; sie hätten denn Koppels-
jagd mit einander. Bürger in
Städten sind auf ihren Weich-
bilde und Fluren, wo sie nicht ver-
heegt sind, dessen befugt, der Chur-
fürstl. Gehege aber sollen sie sich
insgesammt enthalten, es geschehe
denn mit Vorberuht, Gunst und
Bewilligung der Aemter. Die
Bauerschaft, Mäsiggänger und
ander gemein Volk ohne Unter-
schied sollen sich nicht unterstehen,
mit dem Nachtneze zu strei-
chen, sondern es ist ihnen sol-
ches bey nachthafter Strafe ver-
boten, s. Rescr. gr. v. 20. April
1612. Tit. Rentsachen §. 30.
C. A. I. S. 190.

Leyer ist beym Meisenfan-
ge eine Walze, in welche die
Leimruthen gesteckt werden. An
derselben ist eine doppelte Leine,
wenn man eine davon an sich
ziehet, so wickelt sich die andere
auf.

Lieben heißt, den Leithund, wenn er bey'm Anhalten richtig auf der Fährte steht, freundlich zusprechen, mit dem eichenen Bruche um die Nagen streichen und sonst lieblosen, um ihm zu zeigen, daß er seine Sachen gut gemacht habe, und man mit ihm zufrieden sey.

Lock, Locken, nennet man bey'm Vogelfange alle Erfindungen, wodurch man die Vögel auf den Heerd, oder sonst zu einem Fange, zu bringen sucht. Es geschieht entweder durch besonders dazu verfertigte Pfeifen, oder durch dazu abgerichtete Vögel, s. Lockvogel, endlich auch durch Lockspeisen.

Lockente ist eine gezähmte, und andere wilde Enten anzulocken abgerichtete wilde Ente. Man läßt sie aus wilden Enteneyern durch zahme Enten oder Hühner ausbrüten, und macht ihnen in der Jugend gewisse Kennzeichen, durch Abziehen der Haut vom Schnabel oder den Beinen, damit man sie von andern wilden Enten unterscheiden könne. Man wirft ihnen täglich Hafer im Rohre oder Schilfe vor, damit sie hinein gehen lernen, auch müssen sie darinnen über sechs Wochen zur Abrichtung sitzen. Es wird von allen Seiten gehörig vermaht, und sie werden darinnen mit allerley Getraide, Kräutern, Hülsenfrüchten, auch andern klein geschnittenen Früchten, ingleichen mit Träbern gefüttert; wobey derjenige, der den Fang mit ihnen zu verrichten

hat, sie selbst füttern, auch seine Stimme und Pfeife dabey fleißig hören lassen, auch die Hunde, die er bey'm Fange gebrauchen will, bey sich haben muß, damit sie sich an diese und an ihn gewöhnen. Wenn sie nun an alles dieses vollkommen gewöhnt sind, läßt man sie los, und ihnen die Freiheit, des Nachts selbst auf die Fütterung zu fliegen. giebt ihnen aber dennoch den Tag über vollkommen satt zu fressen, und wartet sie gehörig ab, damit sie gern wiederkommen und auf den Zeichen seyn, um andere durch ihre Geschrey anzulocken. Sind sie nun ins Rohre gewöhnt, so bricht man ihnen nach und nach am Futter ab, und füttert sie nur früh, Mittags und Nachmittags, so gehen sie von selbst auf die Fütterung. Das erste Jahr muß man sie gegen Ende des Sommers einsperren und so lange inne halten, bis der Entenzug im Herbst vorbey ist und sie recht eingewohnt sind; so werden sie nicht leicht wegziehen. So lange im Winter die Gewässer zugefroren sind, sperrt man sie in einen warmen Stall und füttert sie darinnen, damit sie nicht Schaden nehmen.

Lockpfeife ist bey'm Vogelfange eine auf so eine Art gebauete Pfeife, daß sie, wenn man sich ihrer bedienet, die Stimme derjenigen Vogelgattung, für welche sie bestimmt ist, nachahmet, daher man zu jeder Art von Vogelfang besondere Lockpfeifen hat, als Wachtelpfeifen, Meisenpfeifen u.

Lock,

Lockspeise, Lock, Lockung, Luder ist allerley Futter oder Fraß, womit man Vögel oder Thiere anlocket und fixirt, um sie zu fangen, oder zu schicken. Sie muß, wie natürlich, die Lieblingsnahrung der Thiere oder Vogelgattung seyn, für welche sie bestimmt ist.

Lockvogel, Lock, Gelock ist ein Vogel, der in seinem Käfige auf einen Vogelheerd, oder zu einer Leimstange gestellt wird, um andere Vögel seiner Gattung durch seinen Ruf herbey zu locken. Man hat deren verschiedene Arten, nemlich 1) große singende, als der Schnerrer, die Zippe und die Umsel. 2) kleine singende als: der Fink, der Stieglitz, der Hänfling, der Zeisig und alle Arten von Lerchen. 3) große schreyende, als: der Ziemer, die Roth- und Weindroßel; 4) kleine schreyende, als der Buchfink, der Kernbeißer, der Grönig, der Gimpel, der Grönling, die Meise, der Emmerling und die Wachstel. Verhaltene Lockvögel nennet man die, welche man bis kurz vor dem Anfange des Vogelfanges im Finstern gehalten, und dadurch in ihrem Gesange gehindert hat, damit sie ihn außer der Zeit, wenn man seiner auf dem Heerde bedarf, hören lassen. Will man wachsamen Vögel zur Lock verhalten, so nimmt man im Herbst die benötigte Anzahl von Wildfängen, thut sie in ihre Käfige, die man um und um, ausgenommen da, wo das Futter ist, mit einem leinenen

Tuche vermachet, weil sie sich sonst bald die Köpfe einstößen würden; anfänglich bindet man ihnen auch die Flügel mit Fäden, damit sie sich nicht zu sehr verflattern; alsdenn schüttet man ihnen ihr Futter, wie es ihnen am angemessensten und bei jeder Gattung gesagt ist, in den Freßtrog, und stellet sie, sobald sie daran gewöhnt sind, an einen stillen und finstern Ort, wo sie weder das Tageslicht sehen, noch das Geschrey anderer Vögel hören können, und läßt sie so bis zu Ende des Julius stehen, und dieses sind eben die nur gedachten verhaltenen Vögel. Wenn nun die Zeit des Vogelfanges herannahet, so bringet man sie zwey oder drey Wochen vorher auf den Heerd, damit sie desselben gewohnt werden; da sie dann in kurzer Zeit ihre Stimme hören lassen. Die Krämmers- und andere dergleichen Vögel, als Lerchen, Wachstel u. dgl., kann man auch den Winter über in einem dunkeln Zimmer herumlaufen lassen. Im Monath May giebt man ihnen zu purgiren ein; zuvörderst giebt man ihnen Mangoldsaft mit reinem Wasser vermischt zu saufen, den andern Tag giebt man ihnen ein Mangoldblatt zu freßen, den dritten Tag setzt man sie mit ihrem Käfig auf die Erde, läßt ihnen zehn Tage ihr gewöhnliches Futter freßen, und bringet sie nach und nach aus dem Hellen ins Dunkle, und aus dem Dunkeln ins Finstere. Nach diesen zehn Tagen giebt man ihnen wieder Mangold zu freßen; und wenn man sie füttert und trän-

ket,

zet; läßt man ihnen nur wenig Licht sehen, wechselt auch bey den kleinen Vögeln von Woche zu Woche mit-Hanf und Mangoldblättern ab, und giebt ihnen allezeit über den fünften Tag Mangoldsaft in das Trinkwasser, vorzüglich den Finken, die gern blind werden. Dabey reiniget man ihre Käfige, Eß- und Trinkgeschirre täglich, und so fährt man fort bis gegen die Mitte August, da man sie noch einmal wie anfänglich purgiret, und von Tag zu Tage an einen lichtern Ort bringet, daß sie des Lichtes nach und nach gewohnt werden, damit es ihren Augen nicht schade. Während man die Sangvögel auf dem Heerde braucht, muß man ihnen allezeit den dritten Tag etwas hart gesottene, klein gehackte Eyer, klein gestoßenen Zucker, klein gehackte Pinien &c., und öfters von dem Kraute geben, das man Mausgedärme oder Hünere Darm nennet. Auch noch Petersilie, Mangold, Rübsaamen und fünf bis sechs Senfförner. Unter solchem Futter lernen sie recht stark singen. Wenn die Vögel blind werden wollen, rühret man in einem Topfe Rühkoth und Schellkraut mit Wasser recht durcheinander, und wenn sich diese Dinge gesetzt haben, gießt man das Wasser ab, und giebt es ihnen zu saufen. Auch sind venetianische Seife, ingleichen Mangoldsaft, unter das Trinken, nicht weniger einige Tage nacheinander Melonenkerne unter das Futter gemenet, gute Augenmittel. Löffel nennet man die Thoren des Haasen.

Löffelente. *Anas Clypeata*, gehört mit der Kriekenie zu einer Familie und führt auch noch folgende Namen: Gemeine Löffelente, Schild-, Spatel-, Stock-, Schell- und Schallente, Leppelschnute, Breitschnabel, Taschenmaul, Deutscher Pelikan, Seefasan, Lepelgans; aufgeworfener Breitschnäbler, Rüssenkopf, Breitschnabelkopf, breitschnäbliche wilde Ente, Löffelente mit rothgelbem Bauche, Löffelente mit weißem Bauche, Rüsschen, Moos-Fliegen-Mor-Mur-Mücken- und Muggente. Sie unterscheidet sich durch nachstehende Kennzeichen der Art: der Schnabel ist an der Spitze breit und abgerundet, mit einem krummen Nagel, von Farbe schwarz; die Füße orangeroth. Sie hat ohngesähr die Größe der wilden Ente, ist zwanzig und einen halben Zoll lang, zwey und drey Viertel Fuß breit und die Flügelspitzen legen sich über der Mitte des Schwanzes, welcher drey Zoll lang ist, zusammen. Das Gewicht ist ein und ein halb bis zwey Pfund. Der Schnabel ist fast drey Zoll lang, breitet sich gegen die Spitze zu löffelförmig und bauchig aus, hat einen krummen haakenförmigen Nagel und ist schwarz; der Augenstern gelbroth; die Füße sind orangeroth; die Schienbeine einen und drey Viertel Zoll hoch, und die Klauen grau. Kopf und Hals sind entenhässig, d. h. schwarzglänzend, ins violette spielend; der Rücken dunkelbraun mit graulicher Einfassung der Federn; der

un.

untere Theil des Halses und die Brust weiß, letztere gewöhnlich mit einigen wenigen halbmondförmigen dunkelbraunen Flecken; der übrige Unterleib rost- oder kastanienbraun; der After schwarz; die Schulterfedern lang und weiß, an den Spitzen schwarz oder braun gewässert; die kleinen Deckfedern der Flügel hellblau; die größern dunkelbraun mit weißen Spitzen und dieß bildet ein Band auf den Flügeln hin; die Schwungfedern braun mit weißen Schäften; die mittlern grün gerändert, wodurch ein grüner Spiegel entsteht; von den hintern einige hellblau und die letztern lang, schwarz mit einem breiten weißen Streifen längs dem Schafte hin; der keilförmige Schwanz graubraun, nach außen zu immer mehr weiß gerändert, die äußersten Federn ganz weiß. Das Weibchen ist kleiner; die Flügel sind eben so gezeichnet, aber nicht so lebhaft, das übrige Gefieder ist fast wie an der wilden Ente, aber braun mit röthlichen Federrändern, unten braun und fahl gefleckt; der Spiegel mit zwey weißen Linien eingefast. Im ersten Jahre sind auch die Flügel wie der übrige Körper. Beide Geschlechter variiren zuweilen in der Farbe, so daß man Löffelenten mit ganzweißem Bauche antrifft. Diese Ente zeichnet sich vorzüglich durch ihren löffelartigen Schnabel aus, daher auch ihr Name. Sie ist außerordentlich scheu, und läßt nicht leicht jemanden so nahe kommen, daß er sie mit einem Flintenschusse erreichen könnte. Ihr Flug ist wegen ihres un-

förmlichen Schnabels schwerfällig, und sie giebt einen außerordentlich starken und pfeisenden Ton mit ihren Flügeln von sich, so daß man sie des Nachts sehr weit hören kann. Ihre Stimme ist schnarrendes Quacken. Sie ist in ganz Europa, dem nördlichen Amerika und in Asia bis ans Caspische Meer herab verbreitet. Sie scheint vorzüglich in süßen Wassern sich aufzuhalten, daher man sie auf den Landseen und großen Teichen, und in den ausgetretenen Flüssen antrifft. Sie streicht vom September an, geht aber erst im November in kleinen Gesellschaften als Zugvogel weiter nach Süden und kommt im April erst wieder zurück. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich in Insekten, die sie im Wasser aufsucht, und aus der Luft wegschnappt, in kleinen Krebsen, Fischen und Wasserkräutern. Man findet das Nest in Deutschland im Schilf, und unter dem Gebüsch am Ufer. Es ist aus Schilf und Grashalme gebaut, und mit Federn ausgefüllt. Das Weibchen legt 12—14 Eier, die den Eiern der wilden Ente in allen Stücken gleich und ähnlich sind. Sie hat eben die Feinde und die verschiedenen Arten des Fanges und der Erlegung, wie die wilde Ente. Sie ist aber weit scheuer als diese, daher man ihr nicht leicht ohne Schießpferd und Wisch bekommen kann. Das Wildpret ist nicht so wohlschmeckend wie von andern Entarten. Die weichen Federn sind so gut als Gänsefedern zu gebrauchen.

Löffler — *Platalea* — macht in der Ordnung der Sumpfvögel — *Grallae*, — eine aus mehreren Arten bestehende Gattung mit folgenden Kennzeichen aus: Schnabel, lang, dünn, am Ende kreisrund und platt erweitert. Nasenlöcher: Klein, und an der Schnabelwurzel. Zunge: Kurz und zugespitzt. Füße: Die vordern Zehen am Grunde mit einer Haut verbunden. Aus dieser Gattung kommt in Deutschland nur vor der weiße Löffler *P. Leucordia* — oder Löffelgans, gemeiner Löffelreier, Pelikan, Leppler, Schafler, und Schufler. An demselben ist der Körper weiß: die Kehle schwarz; der Hinterkopf mit einem kleinen Federbusch, $2\frac{1}{2}$ Fuß lang. Er kommt selten an den Rhein, den Main, die Elbe, und die Donau — zieht weg, Er wählt sich zu seiner Nahrung, Fische, Frösche, Würmer, Insekten, Wasserpflanzen. Zu seiner Fortpflanzung wird das Nest auf hohen Bäumen gebaut, und das Weibchen legt 3 bis 4 weiße röthlich gefleckte Eyer.

Loßbrechen nennen die Jäger, wenn mit den Jagdleuten aus einem Dickicht des Wild abgetrieben wird und der Rudel Hirsche, Wildpret oder Sauen dadurch aus ihrem Lager müssen.

Lösen nennet man beim Wildpret, wenn es seine Nothdurft verrichtet.

Lösung ist so viel als Losung.

Lorve ist ein Stück Holz am Strauche des Vogelheerdes. Es wird dazu ein 4 Zoll breiter und 5 Zoll starker Hestel viereckigt geschnitten, $2\frac{1}{2}$ Zoll von oben herunter wird ein Loch hineingebohret, wodurch man einen eisernen Bolzen, eines kleinen Fingers stark, stecken kann. Die Lorven werden so eingeschlagen, daß sie auf jeder Seite sechs Zoll von einander stehen. Wenn die Hestel eingeschlagen sind, werden sie gerade in der Mitten gespalten, und ein Korn so tief hineingeschlagen, daß er unter das Loch komme. Hierzu werden die Schlagstäbe gesetzt, und unten mit eisernen Hülfsen, worinnen unten Löcher sind, versehen. Diese bringet man in die Lorve, und steckt den eisernen Bolzen durch die Lorve und die Hülse des Schlagstabes, daß sie leicht davon auf und niedergehen.

Loßbinden, Loßkuppeln, Loßlassen, lösen nennet man, die Hunde von den Kuppeln losmachen und frey lassen, um das Wild verfolgen zu können.

Loßlassen bey der Falknercy, s. Werfen.

Loßtreiben sagt man vom Jagdzeuge, wenn ein Haupt, oder Treibejagen ins Enge kommt, daß Lappen und Tuche übrig und solche wieder aufgehoben worden sind.

**Losung, Lösung, Ge-
loos**, nennet man die Excremente des Wildes, woraus in
B Wet.

Verbindung mit der Färthe, die Jäger die Gattung, das Geschlecht und die Beschaffenheit des Thieres, dem sie gehört, erkennen. Tageslosung nennet man die, welche das Thier am Tage fallen läßt, und besser verneuet ist, als die Nachtlosung, die es bey Nacht verlieret. Die Losung der vornehmsten Thiere ist bey jeder Thierart beschrieben.

Luchs — *Felis lynx* — ist ein zur Kaugattung gehöriges Räubthier, das den Wildbahnen äußerst nachtheilig ist und auch folgende Nahmen führt: gemeiner Luchs, Rothluchs, Hirschluchs, Wolfsluchs, Hirschwolf, Kagenluchs und Luchskage. Von den übrigen Arten dieser Gattung wird er durch nachstehende Kennzeichen unterschieden: Die Farbe ist bräunlich mit dunklen mehr oder minder deutlichen Flecken hie und da besetzt; die Ohren sind zugespitzt und haben einen schwarzen aufrechtstehenden Haarbüschel an der Spitze; der Schwanz ist kurz und in die Quere gestreift. Dieß einzig getiegete Säugethier der kalten Zone hat im Außern sehr viel mit seiner Gattungsverwandtin, der Kage, gemein, nur daß es größer, stärker, höhlbauchiger und kurzschwänziger ist. Die Größe ist ohngefähr wie ein mittelmäßiger Hühnerhund; der Körper ist etwas über drey Fuß lang, der Schwanz sieben Zoll und die Höhe etwa zwey Fuß. Das Gewicht 45 bis 55

Pfund. Der Kopf ist rund, wie an der Kage, die Schnauze aber gestreckter, welches vorzüglich die weit hinten stehenden Augen verursachen; die Augen sind groß, rund, mit grünlich gelben Stern, und unter der Pupille scheint rothe Farbe untergelegt zu seyn, so sehr bligen sie im Dunkeln; die Ohren sind weit, mittelmäßig lang, dreyeckig, zugespitzt und an der Spitze mit zwey Zoll langen steifen, oben sich etwas spreizenden Haarbüscheln besetzt, die Eckzähne sind ausgezeichnet lang und scharf; der Hals stark; der Leib dick und gerade auslaufend; der Schwanz kurz, abgestumpft, gleich dick und wird etwas in die Höhe gekrümmt getragen; die Läufe hoch und stark; die Füße plump, 3 Zoll breit, mit fast einen halben Zoll langen, scharfen, in einer Scheide verborgenen weißen Krallen bewaffnet. Der ganze Balg ist langhaarig, dicht und weich anzufühlen, doch hat der Unterleib besonders feine und lange Haare. Das Gesicht ist rothbraun und nach dem Halse laufen auf dem Oberkopfe hin undeutliche schwarzbraune Streifen; die Backen sind hellkastanienbraun, und über dieselben von Mund und Augen an drey, wie ein liegendes W gestaltete, bald mehr, bald minder deutliche, glänzend schwarze Streifen und vereinigen sich unter den Ohren in einen großen Fleck; die Schnauze ist schwarz und auf drey Reihen Wärtzchen der Oberlippe sitzen weiße Bartthaare; hinter den Ohren bis zum Kinnbacken steht ein großer, das Ge-

Gesicht einfassender, Backenbart, der oben rothbraun und unten weißgelb ist; die Ohren sind in der Mitte weißgrau mit einem breiten glänzenschwarzen Rande, der eine hochbraune Kante hat; zwischen den schwarzen Ohrenbüschelhaaren stehen auch einige weiße; vom Kopfe bis zur Hälfte des Schwanzes ist der ganze Oberleib rothbraun, der obere Rückenstreif am dunkelsten, weil hier der Länge nach abgebrochene dunkelbraune schmale, schwärzliche Streifen hinlaufen; die Stachelhaare des ganzen Oberleibs haben weiße oder schwarze Spitzen, nach den Seiten herab läuft die Rückenfarbe in Weiß aus, und braun und weiß bilden undeutliche Flecken und Streifen, die sich, wie bey den wilden Ragen, nach dem Unterleibe schlängeln; die gleichfarbigen Weichen und Hintersehenkel haben reihenweise schwarze und dunkelbraune Punkte, der übrige Hinterlauf ist aber fuchsroth mit weiß überlaufen; die Vorderläufe sind fuchsrothlich und mit weiß belaufen, und haben unordentlich gestellte schwarzbraune Punkte, die nach den Beinen zu immer kleiner werden; die Kehle ist weißgelb; Brust und untere Seite der Läufe ist weiß und gelb gewässert mit schwarzen Flecken, welche sich an den Vorderläufen in der Gegend des Ellenbogens und der Kniekehle in zwey glänzend-schwarze Streifen verwandeln; der übrige Unterleib ist weiß mit großen schwarzbraunen Flecken; der Schwanz hat auf gelblichem Grunde undeutliche rothbraune Ringel und

eine schwarze Spitze. Dieß ist die Farbe, die unsere deutschen Luchse und besonders alle die, welche in Thüringen im Jahr 1773, 88, 89 und 96 erlegt worden sind, hatten, nur daß an einigen die Farbe etwas dunkler, bey andern heller war, bey einigen die Flecken deutlicher, bey andern undeutlicher, ja oft gar verloschen waren, und die Sommerfarbe allzeit heller, ohngefähr wie beym Fuchs, nur nicht so glänzend ist. Das Weibchen unterscheidet sich, wie bey der Hauskatze, durch einen schmälern Kopf, kleinern Körper, und wie es Hr. Bechstein vorgekommen ist, durch einen nicht so schön gezeichneten Balg, indem die Flecken und Streifen mehr vertrieben sind und in einander laufen, und endlich durch ihre acht Säugwarzen. Gewöhnlich beschreibt man die Farbe des Luchses so: Er ist aschfarb bräunlichgelb gefärbt und mit dunkeln Flecken gezeichnet, die bald mehr, bald weniger sichtbar sind; die Ohren in der Mitte weiß, unten und am Rücken schwarz; der weiße Schwanz mit einer schwarzen Spitze. Raubsucht, Kühnheit, Grausamkeit und besonders Blutdürstigkeit zeichnen den Luchs vorzüglich aus. Er hat dabey ein feines Gehör, und ein noch schärferes Gesicht; aber nicht den Geruch anderer Raubthiere. Ob er gleich auch nicht die Schnelligkeit des Fuchses besitzt, so ist er dafür desto gewandter, kann größere Sprünge thun und vorzüglich gut klettern. Von dem sechs und vierzigsten Grade der

B 2

Breit-

Breite an, geht der Luchs durch ganz Europa und in Asien bis an das Caspische Meer, selbst bis nach Japan, und man trifft ihn auch in Nordamerika an. In Deutschland sind sie fast ausgerottet, dennoch trifft man sie in einigen Gegenden z. B. in Thüringen nicht so selten als den Wolf an, und sie pflanzen sich in Obersachsen, Böhmen, Niederösterreich, Steyermark und mehreren deutschen Gegenden fort. Man trifft sie in den dicksten und einsamsten Wäldern an, wo sie in bergigen Gegenden in Steinklüften und Felsenritzen und in ebenen Gegenden in Brüchen ihre Wohnung aufschlagen. Sie sollen sich auch selbst Höhlen in die Erde graben, welches ich aber kaum glaube; da ihre Lebensart sie zur Schonung der Krallen zwingt, die dadurch nothwendig abgestumpft werden müßten. Ich glaube, vielmehr, daß man sie bloß in verlassenem oder abgejagtem Dachs- und Fuchsbauen angetroffen hat. Luchs und Luchsin sollen sich immer zusammenhalten und am Tage auf den Felsenspitzen oder abgestumpften Baumästen sitzen und sich sonnen. Nur bey den heftigsten Verfolgungen und bey ihren Spielereyen besteigen sie raue und schiefstehende Bäume, und können sich dann der Länge nach, wie die Katzen auf einen Ast hinlegen, daß man sie kaum bemerkt. In Thüringen bemerkt man sie vorzüglich im Winter und sie scheinen aus Böhmen zu kommen, denn sie durchstreifen

von Osten nach Westen unsern Thüringerwald, und wohnen in Felsenritzen, alten Bergstollen, Fuchs- und Dachsbauen. Es ist im Gothaischen bey Lambach eine Felsenhöhle, welche gewöhnlich alle besuchen, die durch Thüringen wandern, oder sich da aufhalten. Die Luchse sind den Nachstellungen des Jägers so sehr wie der Wolf ausgesetzt, da sie dem Roth-, Dam- und Rehwild so großen Schaden thun. Sie lauern dem Wilde auf einem Baumstücke, hinter einem Busche, im Geröhrig und hohem Grase, auf dem Bauche liegend, an den Wechseln, die sie genau wissen, auf, und springen demselben mit drey bis vier Sprüngen, wenn ihnen dasselbe nahe genug ist, auf den Rücken, halten sich mit den Krallen fest und zerbeißen mit ihren scharfen Zähnen die Halsfleisch, daß es bald todt zur Erde niederstürzt. Sie saugen ihrem Raube gewöhnlich das Blut gleich aus, und fressen drey bis vier Pfund von den edlern Eingeweiden, dem Halse, Wammen und Keulen, schleppen, wo sie nicht immer frische Nahrung zu haben glauben, das übrige an einen verborgenen Ort, oder verscharren es auf der Stelle unter das Moos. Thun sie des übrigen Tages keinen neuen Fang, so besuchen sie den Platz wieder und fressen sich mehrmals satt; nach drey Tagen aber ist ihnen dieser Raub nicht mehr frisch genug, und sie thun dann dar- über eine Reise von etlichen Meilen, um sich von frischer Beute zu sättigen, die außer obigen auch

auch in Hasen, Auer- Vork. und Haselhühnern und ausgenommenen Schneupvögeln besteht. Der Luchs soll auch wilde Schweine fangen, allein von diesen zuweilen wieder in dickem Gebüsch abgestrichen werden. Daß er auch in die Schafhorden, wie der Wolf, fällt, davon hat man in Thüringen selbst ein Beispiel gehabt. Auch Ziegen und Kälber soll er auf der Wiese anfallen, und sich sogar in Walddörfern in die Ställe graben. Füchse, Marder und andere kleine Raubthiere folgen ihm gerne nach, weil sie von seinem Raube immer noch etwas finden. Die Begattung geschieht zu Ende des Januars und zu Anfange des Februars. Die Luchsin trägt neun Wochen, bringt am liebsten in einer Felsenhöhle, sonst auch in einem Fuchs- und Dachsbau, auch in dickem Gebüsch auf einem von Moos und Genist weichen Lager, zwey bis vier Junge, die vierzehn Tage blind sind und eine weißliche Farbe haben. Die Mutter lehrt sie gewöhnlich an lebendigem Geflügel rauben und tödten. In der Tatarey giebt es schöne weiße Luchse mit schwarzen Flecken, deren Pelzwerk sehr kostbar ist, von diesen zieht man die Jungen auf, und richtet sie, wie die Hunde, zur Jagd ab. Man weiß vom Luchse folgende Jägerbeobachtungen: 1) Wo das Rothwild auf einem Reviere unflüchtig ist, da hält sich gewöhnlich ein Wolf oder Luchs auf. 2) Der Jäger spürt auch sein Daseyn an den vielen von den Hunden gefundenen Wild-

pret, daß er genau unterscheiden muß, damit er diese Erscheinung nicht etwa für eine Krankheit unter dem Rothwild erklärt. 3) Der Luchs jagd seinen Raub nicht müde, wie der Wolf, sondern erlauert ihn, und sucht ihn durch einige unversehene Sprünge zu erlangen. Gelingen diese nicht, so verfolgt er ihn nicht weiter, sondern versteckt sich auf neue an den Wildgängen in den Hinterhalt. 4) Er läßt sich eher und besser einkreisen als der Wolf, weil er nicht den feinen Geruch hat, und sich gern lange an einem bestimmten Ort aufhält. 5) Man heßt nicht gerne Hunde auf ihn, da er sie sehr schändlich zurichtet, und Verwundungen von seinen Zähnen und Krallen nicht gerne heilen. 6) Die Eisen, die man ihm legt, braucht man nicht zu verwittern, da er weiter sieht als riecht. 7) Wenn er schmerzlich verwundet ist, greift er auch den Jäger an. Die Fährte des Luchses hat gerade die Gestalt der Ragenfährte, ist auch eben so leicht geschränkt, nur von der Größe einer Jagdhundespur. Wenn man ihn eingekreist hat, so umstellt man gern den Ort mit dem kleinen Zeuche, Reh- und Wolfsgarne, und treibt ihn alsdann mit Lärm in die Neze, oder man umstellt auch den Platz mit Schützen, und läßt ihn sich zutreiben. Ist er zu sehr in Gefahr, so bäumt er auch, und kann alsdann leicht von Bäumen herabgeschossen werden. Man legt ihn auch an Ketten befestigte Tellereisen um seinen vergrabenen Raub. In die

die Gegend seines Aufenthaltes bringt man auch, so wie vor seine Höhle, Luchsfallen an, welches große hölzerne Schnellfallen sind, an deren Zunge man ein frisches Stück Fleisch bindet. Man soll ihn auch durch Nachahmung des Schreyens der Hasen und Drosseln, wie den Fuchs, zum Schusse reizen können. In einigen nördlichen Ländern wird das Fleisch gegessen. Der Balg gehört unter die schönen und kostbaren Pelzwerke; Schade, daß das Haar so brüchig ist. Aus Archangel kommen die meisten. Den Krallen und den Stein, der sich zuweilen in der Blase findet, schrieb man sonst aus Aberglauben heilende Kräfte zu. Der Schaden, den er stiftet, ist aus seiner Nahrung abzunehmen. Noch ist zu bemerken, daß er in bergigen Gegenden, wo die Kühe in den Wald auf die Weide gehen, sich an sie schleicht, und ihnen die Euter abreißt, welches sein Leckerbissen ist. In der Jägersprache sagt man vom Luchse: Der Luchs schleicht, trabet, thut weite Sprünge und bäumet. Er hat ein Lager. Er frist vom Raube oder Riß. Er begehrt, ranzet, brunftet. Die Luchsin bringt Junge. Der Luchs hat ein Gefäng und keine Zähne. Er wird scharf gewahr. Er hat eine Ruthe. Er hat einen Balg; Waffen oder Krallen statt Nägel. Er wird gefreist.

Luchsfalle s. vorgehende Beschreibung.

Luder nennt man 1) bey der Jägerey das Fleisch eines todtten Thieres, welches man anwendet, um Raubthiere damit einzuförnen, oder zu ludern s. auch Nas, Lock. 2) Bey der Falknerey s. Vorloos.

Ludern heißt 1) entweder durch todttes Nas oder andere stark riechende Sachen, z. B. einen gebratenen Hering, oder Brod in Schweinfett geröstet, ein Raubthier zum Schusse oder Fange auf einen Platz bringen. 2) Bey der Falknerey den Falken durch Vorwerfen des Vorlooses oder Schwingen des Handschuhes, an sich locken.

Luderplatz, Luderhütte ist eine Grube auf einer Anhöhe, wohin man die Füchse und andere Raubthiere durch hingeworfenes Nas ludert, und aus einer dabey erbaueten Hütte todt schießt.

Lückennez s. Lauschnetz.

Lunze, Geräusche wird bey dem Roth- und Schwarzwildpret die Lunge und Leber genennet, die man bey andern Thieren, das Geschlinke heißt.

Lux s. Luchs.

M.

Mach feste wird denenjenigen zugerufen, die bey der Stellung der hohen Zeuge nachbinden, die Leine anbinden und befestigen, wenn der Zeugreiß genug angezogen oder gestreckt worden ist.

Männchen machen sagt man vom Haasen, wenn er sich auf die Hinterläufe stellet, und die vordern in die Höhe hält. Auch sagt man es vom Bären, wenn er sich in die Höhe bäumet.

Mandelkrähe oder gemeine Rabe. — *Coracias Garrula* — macht unter den krähenartigen Vögeln in der Gattung Rabe mit geraden kegelförmigen und meißelförmigen an der Spitze etwas unterwärts gekrümmten starken Schnabel, mit unbedeckten Nasenlöchern und knorpelichter gespaltenen Zunge, eine eigene Art aus, die auch folgende Nahmen führt: blauer Rabe, Haidenelster, Kugelsteller, Kriechelster, blaue Krähe, Garbenkrähe, wilde Goldkrähe, Straßburgerkrähe, Grünkrähe, blaue Holzkrahne, Galgenrekel, Halkregel, Gelbregel, Halsregel, Racker, Racher, Rake, Raake, Rakervogel, Plauderracker, vogel, deutscher Papagay, Wirthhöher, Meerheher, Koller, Blaurack, Blabrack, Blaurock, leberfarbiger Wirthheher und Europäische Racker. Die Kennzeichen der Art sind: Er ist grün-

lichblau, mit hellrothfarbenem Rücken und einem nackten Flecke hinter jedem Auge. Es ist einer der schönsten Europäischen Vögel. Er hat die Größe eines Holzhebers und die Länge ist zwölf und einen halben Zoll, wovon der Schnabel ein und ein Viertel Zoll und der Schwanz vier und einen halben Zoll wegnimmt. Die Flügel bedecken zwey Drittheile des Leibern. Der Schnabel ist gerade, schwarz, nur an der Spitze gekrümmt; der Augenstern ist grau; die Füße sind schmutziggelb; die Fußwurzel etwas über einen Zoll hoch; die Klauen hornfarbig. Kopf, Hals, Brust und Bauch sind hellblaulich grün, der Rücken und die Schultern leberfarben; die Deckfedern am Rande der Flügel sehr schön blau, unter denselben hellgrün; der obere Theil und die Spitzen der Schwungfedern dunkelfarben; der untere Theil schön dunkelblau; der Steiß eben so; der Schwanz hellblau, die äußerste Feder an ihrer Spitze von oben schwarz, von unten dunkelblau, und dieß ist auch der Fall bey jenem Theile der Schwungfedern, die oben schwarz sind, die übrigen Schwangfedern mattgrün. Am Weibchen ist Kopf, Brust und Bauch röthlichgrau, grünblau überlaufen; der Rücken und die hintersten Schwungfedern sind hellgraubraun; der Steiß grün, indigblau überlaufen; der Schwanz schwärzlichgrün und blau überlaufen.

laufen. Das übrige wie beim Männchen. Die Mandelkrähe ist ein scheuer und flüchtiger Vogel, der wie eine Taube schnell fliegt. Er schreut unangenehm, fast wie ein Laubfrosch, und wiederholt dieß Geschrey beständig, wenn er mit seinen Kameraden spielt oder zankt. So läche sein Leben im Freyen ist, da er nach dem empfindlichsten Schutze noch mehrere Stunden lebt, so zärtlich ist er in der Stube, so daß er kaum den andern Tag erlebt, ob man ihn gleich die angemessensten Nahrungsmittel giebt. Nur jung läßt er sich zum Stubenvogel machen. Von Norwegen bis in die Barberey hält er sich in den ebenen Kiefer-Fichten-Birken- und Eichenwaldungen auf. Im Sommer ist er nicht in allen Gegenden von Deutschland anzutreffen, am häufigsten in den Brandenburgischen und Lüneburgischen Waldungen. Im August und September sieht man ihn aber allenthalben einzeln auf seinem Zuge, wo er sich auf den einzeln stehenden Feldbäumen und auf den Getraidemandeln (daher der Name Mandelkrähe) aufhält. Im September geht er ganz weg, und zu Anfange des Mais ist er erst wieder da. Ihre Nahrung sind Insecten, Insectenlarven, besonders Mai-Kafer und Erbkäfer, Maulwurfsgrillen, Grasshüpfer, Regenwürmer, Schnecken, Frösche, Pflanzenwurzeln, Eicheln, Bucheln, Waldbereern und Getraidetörner. Die Mandelkrähe nistet in hohlen Bäumen, wo das Nest aus dün-

nen trockenen Reisern, Grassengeln, Moos, Federn und Thierhaaren besteht, in welches das Weibchen 4 bis 7 glänzend weiße Eier legt, die in 14 bis 16 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen sehen bis zum zweiten Jahre nicht bläulichgrün aus, sondern sind am Kopfe, Halse und Brust noch mit Grauweiß überzogen, erlangen aber ihre vollkommene Schönheit im dritten Jahre. Die Baummarber, Iltisse und Wiesel zerstören die Brut und in den Eingeweiden wählen Band- und Magenwürmer. Die alten Vögel sind sehr schwer zu schießen; aber desto leichter die jungen, wenn die alten nicht in der Nähe sind. Große Herren baigen sie mit Falken. Ihr Fleisch schmeckt im Herbst, wenn sie, wie man sagt, Getraide fressen, sehr gut, und der Jungen ihres wie von Turteltauben. Der Schaden, welchen sie an liegendem Getraide thun, ist so beträchtlich nicht, als man vorgiebt.

M a n t e l m e v e — *Larus marinus* — macht in der Mevengattung eine besondere Art aus und heiße auch: Seemeve, große Seemeve, schwarze räckige Meve, Fischmeve, und größte bunte Meve. Der Körper ist weiß mit schwarzen Rücken und Flügeln; die Füße sind vierzählig und die Länge beträgt 28 Zoll. Nach Latham sollen folgende Vögel Altersverschiedenheiten seyn: a) die gefleckte Meve — *L. naevius* — welche dunkelbraun, asch.

aschgrau und weißbunt ist; b) die Silbermeve — L. argen-
ratus — hingegen hat einen
weißen Kopf und Hals mit ab-
wärts laufenden, aschgrauen Stri-
chen, einen weißgrauen Oberleib
und einen weißen Unterleib.
Dieß scheint aber kein sehr alter
Vogel zu seyn, sondern eine in
Deutschland noch nicht genug be-
kannte besondere Art. Die Man-
telmeve hält sich an den deut-
schen Küsten, auf großen Seen
und Flüssen, in Schlessien und
Sachsen auf, und nährt sich von
Fröschen, schwimmenden Insekten
u. und nistet auf Felsen, wo das
Weibchen drey dunkel olivengrü-
ne am breiten Ende schwarze
Eyer legt, die auch noch spar-
sam dunkelbraun gefleckt sind.

Marder ist der Name ei-
niger kleineren Raubthiere aus
der Wiesetzgattung s. Baum-
marder, Steinmarder.

Marderkalle ist ein Be-
hältniß, um Marder darinnen
zu fangen. Man hat deren
zweyerley Arten, die einfache
und die doppelte. Die einfa-
che bestehet aus drey Pfosten,
jede $1\frac{1}{2}$ bis 2 Ellen lang, 9 bis
10 Zoll breit, und drey Zoll
stark. Diese drey Stücke sü-
get man nach Fig. 7. A. B. C.
D. dergestalt zusammen, daß ei-
ne das Bodenbret, die andern
beyden aber Seitenbreter aus-
machen, hinten ist ein 9 oder
10 Zoll ins Gevierte und drey
Zoll starkes Stück Pfoste A. C.
E. F. Oben darauf kommt eine
andere Pfoste von gleicher Stär-

ke, aber nur 12 bis 16 Zoll
lang. A. F. G. H. Der übrige
Theil wird ebenfalls mit einem
Brette von der gehörigen Größe,
das man auf- und zumachen
kann, G. H. I. K. bedeckt.
Sodann wird am Rande beyder
Seitenbreter in G. und H. ein
Loch gehohlet und zwey Nägel
dergestalt hindurch geschlagen, daß
sie das oberste Pfostenstück fassen,
und als Bolzen zum Auf- und
Niederlassen des beweglichen Stü-
cks dienen. An dieses nagelt
man in I. K. ein anderes Stück
Pfoste von gleicher Größe, wie
A. C. E. F. damit die Kalle
zugemacht, einen Kasten gleiche.
Dann nimmt man zwey Stücke
Holz, jedes einer Elle lang L.
M. durch welches oben Löcher ge-
bohret werden, so groß als ein
kleiner Finger stark, diese befe-
stiget man in der Mitte der Sei-
tenbreter einander gegen über,
nachdem man ein, einen Zoll
starkes und an beyden Enden,
wie eine Achse abgerundetes Holz,
dergestalt, daß es geläufig her-
um gehe, eingesteckt, in der Mitte
aber ein Loch gemacht hat, in
welches man einen schweren Ste-
cken O. N. stecken, und so be-
festigen kann, daß er auf dem
beweglichen Oberbrette G. H. I.
K. wenn es niedersfällt, von selbst
stelle und stehen bleibe, damit
der gefangene Marder dasselbe
nicht aufheben könne. Ehe die
Pfosten zusammen genagelt wer-
den, muß man in das Seiten-
stück A. B. C. D. unten in X.
ein zwey Zoll hohes und $\frac{1}{2}$ Zoll
weites Loch einschneiden, und ge-
rade gegenüber in das andere
Sei.

Seitenbret ein kleines Loch bohren, um eine Schnur hindurch ziehen, und den etwa kleinen Fingers starken Sprengel P. daran befestigen zu können. Dieser wird auf der andern Seite mit der andern Spitze festgemacht, und durch das Loch gesteckt, doch so, daß er frey auf- und abgelassen werden kann, auch muß er 2 bis 3 Zoll über das Loch gehen, und in P. einen Einschnitt haben. An diesen bindet man mitten in der Falle etwas gedacktes Obst, eine todte Henne, oder ein stinkendes Ey, als Lockspeise. Nun bindet man einen starken Bindfaden mit einem Ende in der Mitte des beweglichen Oberbretes bey Y mit dem andern aber an ein kleines $1\frac{1}{2}$ Zoll langes, halben Fingers dickes, und an beyden Enden feilförmig zugespitztes Hölzchen S. bergestalt an, daß wenn das Oberbret sechs Zoll aufgehoben, und der Bindfaden über die Achse des Steckens O. N. und über das bey Q. an einem ausgerichteten Säulchen bewegliche Röllgen gezogen worden, das kleinere Hölzchen mit dem einen Ende in des Sprengels Kerbe P. und mit dem andern an dem Rande des Loches X. aufstehe. Der Sprengel darf nicht mehr als $\frac{1}{4}$ Zoll hoch über den Boden der Falle stehen. Wenn nun der Marder nach der Lockspeise in die Falle gehet, und sie nur berührt, so weicht das Hölzchen aus dem Sprengel und die Falle schlägt zu. Die doppelte Falle Fig. 8. unterscheidet sich von jener bloß dadurch, daß sie zwey

Fallthüren, und in der Mitten einen Unterschied hat; ist aber ohnerachtet sie etwas unbequem ist, doch viel sicherer, weil der Marder eine freyere Oeffnung und durch dieselbe auch die Lockspeise besser siehet. Wer die einfache Falle kennt, kann die doppelte leicht verfertigen.

Marderfang ist die Art und Weise, sich der Marder zu bemächtigen. Da wir zweyerley Arten von Marder haben, so ist auch der Fang derselben zweyerley, nemlich der Fang der Baummarder und der Fang der Steinmarder. Der Baummarderfang wird auf folgende Weise betrieben. Am besten ist der Baummarder im Winter, da auch der Pelz am besten ist, durch Kreisen auszumachen, dabey aber ist zu merken, daß er nicht leicht auf dem Baume bleibt, wo er aufgebauet hat (aufgestiegen ist) sondern er bäumet (springt) von einem Baume zum andern oft sehr weit, ehe er sich in einem hohlen Baume oder alten Horste steckt; daher muß man den Baum, wo er aufgebäumet hat, ziemlich weit kreisen, und wenn man ihn nicht wieder herunterspüret, die Bäume des Bezirks genau untersuchen, und wo man einen hohlen Baum, den er mehr liebt als einen Horst, weil er sich besser darinnen verstecken kann, auch durch das Geschrey von Krähen, Elstern und Holzschreyer nicht so leicht verrathen wird, findet, muß man hinaufsteigen, ihn auch wohl mit Schwämme durchträuchern, ehe

er herausfähret, thut er dieses, so läuft er an einem Aste hinan, da man ihn am besten mit einem Tesching (kleinen Kugelbüchse deren Bley nur einer Erbsen groß ist) herunterschießen kann, denn durch Schroth wird der Balg zu sehr verdorben. Nächstdem muß ein Hund bey der Hand seyn, der ihn im Herunterfallen abwürget, wenn er noch nicht todt ist, denn sonst könnte er doch noch entweichen. Aus alten Horsten bringet man ihn durch blindes Beschießen derselben, und verfährt dann auf gleiche Weise. In Nadelholzwäldern, wo die Bäume auch im Winter belaubt sind, würde man ihn nicht zu sehen bekommen, folglich kann man ihm auch da nur, wie alenthalben, am besten mit dem Schwanenhalse, oder wer damit nicht umzugehen weiß, mit dem Schlagbaume (s. d. Wort) fangen. Der Bau eines solchen Schlagbaumes ist sehr einfach und kann von jedem ganz leicht zu fertigen und zu stellen gelernt werden. Auch kann man den guten Marder im Fuchseisen (großen Schwanenhalse) fangen, welcher den Baummar-der selten überschlägt, denn man hat oft Beispiele, daß er sich darinnen gefangen hat, wenn er auf den Fuchs gestellt war. Für den Baummar-der schleppet man mit einem Haasengescheide, und wirft einzelne Brocken von Schweinefleisch in Gänsefett gebraten, oder einzelne Beinchen von verspeisen Hünern. Auch kann man ihn mit dem Selbstschuße tödten, wenn man den am Selbstschuße

befestigten Drath, etwa 10 bis 12 Schritte davon an einen Baum bindet, und zu beyden Seiten desselben Brocken wirft. Wenn er nun zu denselben über den Drath will, so stößt er daran, und erschießt sich selbst. Der Steinmar-derfang geschieht im Freyen auf gleiche Weise, wie beim Baummar-der, auch kann man bisweilen einen umbringen, wenn man ihn auf den Schnee auf einem Gehäue, unter einem Holzhaufen, wo er sich etwa, wenn ihn der Morgen überailet, versteckt hat, spüret und den Holzhaufen umwirft, schießen, oder in einem Netze, womit man den Haufen umstellt hat, fangen. Der Hauptfang aber geschieht in Höfen und Gebäuden, wo sie sich am meisten aufhalten, und auch den meisten Unfug anstiften. Die meisten Mar-derfänger haben gehört, daß man die Mar-der mit dem Tellereisen fängt, wer es aber verwittert, mit einem Brocken auf ein Gebäude leget, der wird nur selten einen andern als etwa im zeitigen Herbst einen jungen, der noch nicht schlau genug ist, erwischen. Manche wählen zu diesem Fange den kleinen Schwanenhals, und verwittern ihn mit einer Witterung, welche die Katzen auch lieben, daher fangen sie aber auch weit mehr Katzen, als Mar-der. Der Fang mit dem Tellereisen kann nur dann mit Nutzen betrieben werden, wenn man die Wechsel beobachtet, wo sie von einem Gebäude auf das andere springen; und wo die Gelegen-heit da nicht gut ist, so kann

kann man es mit Fleiß darauf anlegen, und sie gewöhnen, von der andern Seite auf einen kleinen Platz der Wand zu springen, um in das, ihnen gemächliche Gebäude zu kriechen; wenn nun auf diesen Platz ein Teller Eisen ohne alle Witterung gelegt wird, so ist der Fang gewiß, weil sie ihre einmal angenommenen Wechsel so pünktlich halten, daß sie kein dahin kommender Marder verfehlet, und diese kann ein aufmerksamer Mardersänger so gut errathen, als die Fuchswchsel in den Hölzern. Doch muß der Platz, wo das Eisen liegt, allezeit tiefer seyn, als der, von dem der Marder abspringet, denn er thut seinen ersten Sprung gewiß mitten auf den Platz, um einen sichern Stanbort zu haben. Legt man nun das Eisen mitten auf den Platz, und verdeckt man es gehörig, daß es der Marder vor dem Sprunge nicht siehet, so springet er ohne Fehlbar auf den Teller. Da hingegen, wenn er vor unten auf das Eisen springen müßte, er es oft verfehlen; oder doch nur den Bügel treffen würde, denn er müßte in einer zirkelförmigen Richtung springen: trift er den Bügel, so wird er das Eisen gewahr, und dann ist der ganze Fang auf lange Zeit vereitelt, denn er kommt sobald nicht wieder auf den Platz. Eben so sicher, und eben so wenig gefährlich für die Ragen, ist der Fang mit dem Schwannenhalse, wenn man nachstehende Vortheile dabey beobachtet, denn nach der bisherigen

Fangart mit der Witterung werden immer noch mehr Ragen als Marder gefangen, und wenn der Platz auch noch so gut für den Ragen verwahrt, und der Marder ganz sicher durch Brocken auf den Platz gewöhnet worden, so wird man doch selten etwas fangen, vielmehr aber der Marder ganz vom Platze bleiben. Man wird selten einen Marder mit dem Schwannenhalse fangen, wenn er nicht in einem Winkel des Gebäudes liegt, denn wenn er, wie leicht geschehen kann, über die Feder kommt, so merket er alsbald Unrath, kehret ganz behutsam zurück und kommt sobald nicht wieder. Doch ist der Mardersfang gewisser als der Fuchsfang, wenn er nicht durch Witterung verpönet worden, er geht leichter ins Eisen, als der Fuchs; auch ist man auf einem, für der Witterung geschützten Gebäude allen den Unannehmlichkeiten nicht ausgesetzt, die im Freyen daher entstehen, wenn durch plötzlichen Regen, Thauwetter u. d. das Eisen entblößt wird. Der Marder landet sehr leise zu, und wenn der Bißen nicht gleich los ist, oder vielmehr, wenn das Eisen nicht gleich losgehet, und gut springet, daß es den Marder am Leibe hinter den Vorderläufen fängt, so gehet er nicht nur da ab, sondern auch nie wieder auf diesen Platz, oder an einen solchen Bißen. Diesem Uebel kann man am besten dadurch abhelfen, wenn man das Schloß das gewöhnlich vermöge seiner Bauart so fest steht, daß es der Marder nicht sogleich los ziehen

son-

sondern abgeht, oder so leise steht, daß es von selbst losgeht, mit einem Schneller, wie an einer Kugelbüchse, der das unerwartete Losgehen des Schloßes eben so sehr, als das zu Feststehen, verhindert, versichert. Damit der Marder nicht über die Feder in den Schwanenhalse gehe, muß man den Platz dazu entweder in einem Winkel anbringen, oder wenn sich dieses nicht thun läßt, ihn mit Brettern und Steinen so umlegen, daß der Marder, wenn das Eisen liegt, nicht anders zu dem Wißen, als von vorn durch die Feder kommen kann, auch muß man ihn gleich anfänglich so zubereiten, wie er aussehen soll, wenn das Eisen gelegt ist. Der Marder ist darinnen äußerst mißtrauisch, und wenn er das verwitterte Eisen riechet, pflegt er gewöhnlich den Bügel aufzukrahen, scheuet sich aber dafür und kommt gewiß unter 8 bis 10 Tagen nicht wieder, binnen welcher Zeit schlechterdings nichts daran verändert, oder der aufgekrahte Bügel wieder zugedeckt werden darf, weil es sonst den Platz auf immer verläßt, sich aber bey seiner Wiederkunft gewiß fängt, wenn er alles genau in dem Zustande wieder findet, wie er es verlassen hat. Nächstdem hat der Marder noch den Gebrauch, bey allen Eisen, Fallten, oder wo er sonst etwa Ursache zum Mißtrauen zu haben glaubt, seine Lösung zu lassen, und nun dann erst an die Netzung zu gehen, wenn er bey seiner Wiederkunft an den Ort dieselbe

noch unverrückt findet. Man hüte sich daher sorgfältig, diese auch nur im geringsten zu berühren, oder zu verrücken. Eine Hauptregel bey dem Marderfangen ist, denselben ohne alle Witterung zu betreiben, das Eisen bloß ganz rein zu putzen, und mit einem, mit bloßen reinem Wasser, ohne Seife gewaschenen Tuche abzureiben, dasselbe auch überhaupt nicht mit bloßen Händen anzurühren, sondern sich dabey dünner Handschuhe zu bedienen. So seht noch manche Jäger für eine Witterung eingenommen sind, so sehr bitte ich alle, die glücklich im Marderfange seyn wollen, sich sorgfältigst davor zu hüten. Denn es ist den Gesetzen der Natur ganz zuwider, daß der äußerst mißtrauische Marder, starkriechende, ihm ganz ungewohnte Dinge, annehmen sollte. Nächstdem sind in den Witterungen Marum verum, und andere Sachen, welche die Ragen lieben, und eine natürliche Folge davon ist, daß man unfehlbar alle Ragen, die dahin kommen, fängt. Der beste Wißen zum Abzuge ist ein Ey, denn dieses wird weder von Ragen noch von Mäusen und Ratten angenommen, dahin gegen erstere alles Fleischwerk und Knochen, letztere hingegen das gebackene Obst mit Begierde annehmen, und den Fang oft vereiteln. Wenn auch das Ey frieret, und Sprünge hat, so schadet es nichts, denn der Marder geht doch daran und zieht das Eisen ab. Man thut am besten, die Marder schon im Sommer auf

auf den Platz zu gewöhnen, wo man sie im Winter fangen will, dieses bewirkt man dadurch, daß man ihnen beständig etwas von frischem oder getrocknetem Obste, als Kirschen, Pflaumen u. an dem Ort legt, damit sie immer etwas finden, so oft sie kommen; dann kann man auch gewiß seyn, daß sie im Winter hinkommen, wenn das Eisen gelegt ist. Die Gänge der Bälge tritt bey dem Marder etwas eher ein, als beym Fuchse. Hierzu muß man solche Plätze wählen, wo keine Katzen hinkommen, denn vor diesen pflügen die Marder gern zu weichen. Die besten Plätze sind unbewohnte Gebäude, die den Besuch der Menschen, Katzen und Mäuse nicht sehr ausgefegt sind. Zum Ausfüllern der Hügel nehme man Gerstenspreu, keine Kornspreu, noch weniger Haferspreu und am allerwenigsten Erde, Mist, Laub u. denn davon rostet das Eisen bey feuchter Witterung leicht. Man drückt die Gerstenspreu an den Seiten fest ein, damit alles hart werde, die Hügel und das Gewirre hingegen bestreuet man nur recht damit. Auch muß man hinten unter die Federn ein Stückchen Dachziegel legen, damit dieselbe etwas höher zu liegen komme, und desto besser springe. Und damit man sie nicht zu dick mit Spreu zu bedecken brauche, so werfe man etwas Stroh darauf, überstreue solches dünne mit Spreu, und binde an den Vorstecker einen Faden, der allezeit unbedeckt bleibt, damit man ihn herausziehen könne, wenn man mit

Auffallen fertig ist. Weil man aber, wenn kein Schnee liegt, in Gebäuden oft ungewiß ist, ob ein Marder oder Iltis den Brocken angenommen hat, so lege man in dessen Nähe ein paar Eyer, diese frist der Iltis auf der Stelle, der Marder aber trägt sie erst weg. Im Freyen aber hilft dieses um deswillen nichts, weil sie von Holzschrepern auch ausgefressen werden, und man also nicht wissen kann, ob es von diesen oder vom Iltis geschehen. Im Herbst und überhaupt bey gelindem Wetter wird man mit dem Marderfange wenig ausgerichten, wenn es viel Feldmäuse giebt, denen die Marder so nachgehen, daß sie nicht leicht eine Schlappe, vielweniger einen Biß annehmen, welches letztere sie auch in der Kollzeit selten thun. Man muß daher in solchen Jahren, da es wenig Mäuse giebt, den Marderfang um so eifriger betreiben, je ununterbrochener solches von Martini bis zur Kollzeit geschehen kann.

Marder garn, Mardernetz ist ein kleines, mit engen Maschen gestricktes Netz, zum Marderfange bestimmt. Es ist einem Hasennetze ähnlich, nur daß die Maschen enger sind, weil der Marder kleiner ist, als der Haase. Wenn man auf dem Schnee einen Marder spüret, stellet man ein, oder ein paar solcher Netze um seinen Aufenthalt, und stört den Marder heraus, so wird er gefangen.

Ma:

Mäſche heißen die Löcher in den Garnen oder Netzen von einem Knoten zum andern, und ſie ſind nach Verſchiedenheit des Fanges von verſchiedener Größe.

Mauſe, Mauſen iſt bey den Vögeln, die jährlich einmal eintretende Zeit, in welchen ſie ihre alten Federn verlieren, und dagegen neue anſehen. Während derſelben bedarf kein Vogel ſo viel Wartung, als die zur Waiſe abgerichteten Raubvögel. Man thut zu dem Ende die Habichte und Sperber zu Ende des Februars, als dem Anfange ihrer Mauſe, jedes Geſchlecht in ein beſonderes Zimmer, an welchem von außen am Fenſter zwey große vergitterte Käſige angebracht ſind, einen gegen Morgen, den andern gegen Abend. Im Zimmer iſt ein erhöhtes ſauberes Bret, mit ledernen Neſteln, um ihr Gefäße damit zu binden, auch werden etliche Sitzſtangen hineingebracht, etwas Sand hinein geſtreuet, und täglich frisches Waſſer gegeben. In dieſer Zeit muß man ſie gut füttern, und wenn man ihnen Tauben giebt, ſolche rupfen, und ihnen die Köpfe und Füße abſchneiden. Wenn ſie alle Federn geworfen haben, wäſcht man ihnen das Gefäße, um ihnen mehr Freßluſt zu machen, damit man ſie um deſto eher wieder herausnehmen kann; ehe dieſes aber geſchiehet, giebt man ihnen ein gelindes Abführungsmittel. So hält man es auch mit den, jung aus dem Neſte aufgezogenen, Falken, nur fängt die Mauſe bey

dieſen erſt gegen Ende des März an. Dieſen giebt man vor der Mauſe Schaaſſleiſch in Baumöl geneht, und in friſchem Waſſer etwas abgeſchlagen. Man muß ſie alle Tage drey bis viermal beſuchen, es ihnen nie am Fraße fehlen laſſen, ſie ganz rein halten, ihre Kammern oft reinigen, auch Achtung geben, welches Futter ſie am beſten verdauchen. So oft ſie friſche Nahrung bekommen, müſſen die Ueberbleibſel der alten weggeſchafft werden. Die Falken, vorzüglich aber der Gerfalk, verlangen einen dunklen, ſtilken, aber warmen und trocknen Ort, wenig Luſt, und ſowol auf, als unter dem Tiſche viel Sand. Sie müſſen wöchentlich zweymal frisches Waſſer bekommen, um ſich baden zu können, öfter aber nicht, ſonſt werden ihre Federn vom Baden weich. Vom Röhrwaſſer mauſen ſie eher ab, als vom andern. Das Gefchirr, worinnen ſie es bekommen, muß etwas breit und tief ſeyn; doch ſo, daß der Vogel den Boden deſſelben mit den Füßen ertasten könne. Wenn ein Vogel alte böſe Federn mit in die Mauſe gebracht hätte, und ſolche nicht fallen wollen, ſo kann man ſie ausziehen, man muß ſich aber dabey vorſehen, daß man ſie gerade ausziehe, und nicht drehe, ſonſt verderbet man den Vogel. Außer dieſen muß man aber keinem Raubvogel, am wenigſten aber dem Falken, etwa in der Meynung, um eher zu vermauſen, Federn ausziehen, denn dadurch werden ſie zum Fliegen untüchtig. Solche Vögel, die in
Zim.

mern, unter menschlicher Aufsicht, sich mausen, bekommen viel stärkere und vollkommnere Federn, als die solches in der Wildniß thun, denn diese müssen zugleich brüten und ihre Jungen erziehen, und werden durch alle diese Geschäfte zu gleicher Zeit zu sehr entkräftet. Man muß die Vögel nicht eher aus der Mause nehmen, bis die Schwing- und langen Federn stark genug sind, sonst kommt das zur Nahrung der neuen Federn bestimmte und noch in den Adern befindliche Blut nicht in die Riele, sondern trocknet ein, und verursacht eine Geschwulst der Flügel. Würde einer in der Mause krank, so muß man ihn besichtigen. Alle in kalten Ländern und auf hohen Bergen aufgezogene Raubvögel vermausen sich eher, als die aus warmen Ländern und tiefen Gegenden. Man muß keinen Raubvogel, den man erst aus der Mause genommen, fliegen, sondern ihn vorher etwas magerer werden lassen, und um des willen ihm zwanzig Tage zuvor nicht mehr als zwey Drittel ihrer ordentlichen Fütterung, und zehn Tage in ihrer Mause ihr Gewölle geben.

Mausen (sich mausen) heißt die nur beschriebene Naturveränderung bey den Vögeln.

Mausen, Vermausen ist eine Redensart, die man vom Falken braucht. Man sagt es auch vom Hirsche, wenn sie ihr altes Gehörne abgeworfen und ein neues aufgesetzt haben.

Meerelster — *Haematopus* — macht in der Ordnung der Sumpfvögel eine eigene Gattung aus, mit einem mittelmäßig langen, an der Seite platt gedrückten und vorne keilförmig zugespitzten Schnabel; mit schmalen Nasenlöchern, mit starken und entenförmigen Leibe, und mit nicht hohen dreyzähligen Füßen. Aus dieser Gattung kommt bey uns nur eine Art vor, die geschädte Meerelster — *Haem. ostralegus* — oder Austerfischer, Austersammler, Austermann, Austerdieb, Austerfreßer, Strand-Wasser- und Seeelster, Strandheilster, Strandhäster, schwarze und weiße Schnepfe hat einen schwarzen Oberleib und einen weißen Unterleib; der Schwanz ist an der Wurzel weiß und an der Spitze schwarz. Sie wohnt an der Ostsee, und kommt bloß im Herbst und Frühjahr an andere deutsche Seen, Teiche und Flüße. Sie nährt sich von Insecten und Würmern, besonders von Schnecken aller Art und zwar Austern am liebsten. Das Nest macht sie bloß auf den Sand und legt drey bis fünf gelbbraune, ganz und zwar in der Mitte am meisten braun und schwarzbraun gefleckte Eyer. Das Fleisch ist wohlschmeckend, besonders nach abgezogener Haut.

Meerhuhn — *Gallinula* — ist eine aus mehreren Arten und Familien bestehende Sumpfvögelgattung mit einem kurzen an den Seiten gedrückten Schnabel, die Wurzel der obern Kinnlade weit in

n die Stirn hineingehend und deutlich oder undeutlich gehäutet, vor der Spitze des Unterkiefers etwas hervorragend, von der obern und untern abschüssig zugespitzt; mit länglichenrunden in einer Furche liegenden Nasenlöchern; mit Füßen, die an den Seiten etwas platt gedrückt sind, und lange getrennte Zähne mit einem schmalhäutigen Rande haben; und mit einem sehr gedrückten Reibe. Sie setzen sich auf die Büsche und ruhen aus, laufen über die Wasserpflanzen der Teiche und schwimmen auch sehr gut. Die beiden Familien unterscheiden sich dadurch, daß die erste eine undeutlich gehäutete Stirne, die zweite aber eine deutliche Stirnhaut hat. Zu jener gehören das punktirte Meerhuhn, und das kleine Meerhuhn, und zu dieser das grünfüßige Meerhuhn, das braune Meerhuhn, das gefleckte Meerhuhn, und das Blutmeerhuhn. 1) Punktirtes Meerhuhn, G. Pozana Latham, s. Rallus Porzana Lin.: Schnabel gelbgrün, mit olivenbrauner Spitze; Ober- und Unterleib weiß gefleckt; die zwey mittlern Schwanzfedern weiß gerändert; am Männchen Scheitel und Kehle aschgrau, $8\frac{1}{2}$ Zoll lang. Es variiert nach Alter und Geschlecht; denn das Weibchen hat keine rothe Schnabelwurzel, wie das Männchen im Frühjahr, ist an den Seiten nicht schwarz, sondern braun gestreift, und überhaupt wie die Jungen im Ganzen heller.

Sein Wohnort ist der Norden der Welt, in Deutschland einzeln an Ufern der Flüsse, Seen und Teiche, die viel Schilf und Geröhrig haben — zieht einzeln weg. Die Nahrung besteht in Insekten, Schnecken, Sumpfschnecken und Samereyen. Man findet das Nest im Schilf und Sumpf auf kleinen Hügeln mit 9 bis 12 röthlichgelben, rothebraun und graubraun gesprenkelten und gefleckten Eiern. Dieser Vogel führt auch noch die Namen: Mittlere und kleinere Wasserralle, kleine Europäische Wasserralle, Winkernell, Winkernell, Grauhuhn, gesprenkeltes, oder kleines gesprenkeltes Wasserhuhn, Wiesenschnarre. 2) Kleines Meerhuhn, oder auch kleine Wasserralle, Sumpfschnecke, Taurische Ralle, und kleines Wasserhühnchen, — G. pusillus, Lath.: Der Schnabel gelbgrün; an der Wurzel roth; der Unterleib aschblau; der Oberleib rostbraun mit schwarzen und einzelnen weißen Flecken, 7 Zoll lang. Auch dieses variiert etwas in der Farbe; denn die Weibchen sind nach dem Mausern so wie die Jungen heller, an der Brust weiß und rostbraun überlaufen. Es hat seinen Wohnort in den meisten Gegenden Deutschlands, an abgetretenen Flüssen, Seen und in röhrigen und schilfigen Teichen einzeln — zieht einzeln weg. Die Nahrung ist wie bey den Vorhergehenden und das Nest im Schilf und Geröhr. 3) Geflecktes

tes Meerhuhn, (*G. maculata*, Lath: Schnabel und Stirn gelb; der Oberleib rothbraun, mit weißen und schwarzen Flecken besprenkt, 11 Zoll lang. Dieser Vogel scheint nach den verschiedenen Beschreibungen, bald ein junges grünfüßiges Meerhuhn, bald ein junger Wiesenknarter, bald ein punkirtes Meerhuhn zu seyn, und hat seinen Wohnort in Deutschland. Man giebt ihm auch noch die Namen: Geflecktes Meer- oder Wasserhuhn, Rheinvogel, Matkern, Matknelzel, kleiner Brachvogel, rothes Wasserhuhn. Die übrigen Arten suche unter den angeführten Namen.

Meerschwalbe — *Sterna* — macht unter der Schwimmvögelordnung eine weitläufige aus mehreren Arten bestehende besondere Gattung aus, mit ziemlich geradem, pfriemenförmigen etwas zusammen gedrückten und spitzigen Schnabel, mit schmalen Nasenlöchern, an der Wurzel des Schnabels mit einer dünnen und spitzigen Zunge; mit Füßen, schwach und vierzehig, die Vorderzehen durch eine Schwimmhaut verbunden, mit einem meist gabelförmigen Schwanz und sehr langen Flügeln. Sie bewohnen häufiger die See, als die Meven-Arten, und fliegen mehr, und zwar schwalbenschnell, als daß sie schwimmen, über die Oberfläche des Wassers. Die hieher gehörigen Arten sind: 1) Caspische Meerschwalbe, *St. caspia*, Gmelin Linn.:

Der gabelsförmige Schwanz kurz; die Schwimmhaut voll und nicht ausgeschnitten; der Schnabel scharlachroth; Scheitel und Füße schwarz; Oberleib weißgrau; Unterleib und Schwanz weiß, 12 Fuß lang. Variirt in der Farbe; denn die Jungen sind am Oberleibe schwarz und grau gefleckt, und bis zum dritten Jahre ist der Kopf schwarz und weiß gefleckt. Sie ist unter den deutschen Meerschwalben die größte. Ihr Wohnort ist in Deutschland auf den deutschen Inseln der Ostsee, auch mitten in Deutschland auf den Seen und Teichen — zieht einzeln weg. Ihre Nahrung sind Fische. Sie macht das Nest im Sande oder auf Felsen ohne Unterlage mit 2 bis 3 weißen, sparsam dunkelbraun und schwarz gefleckten Eiern, und hat auch die Namen: Wimmermeve, Kreißmeve, große Stübbersche Kirke. 2) Stübbersche Meerschwalbe, *St. stubberica*: Schnabel, Füße und Scheitel schwarz; Stirn und Unterleib weiß; Rücken und Flügel aschgrau; der Schwanz ein wenig gespalten. Variirt in der Farbe; denn die Jungen sind mehr oder weniger schwarz, grau und braun gefleckt. Sie hält in Rücksicht der Größe das Mittel zwischen der Vorhergehenden und Gemeinen. Herr Professor Otto zu Frankfurt an der Oder hat sie zuerst auf der Insel Stübber entdeckt; man trifft sie aber auch in andern Gegenden Deutschlands auf den Seen, wenn sie streicht, an. Sie hat die Nahrung

tung wie die Vorhergehende und legt in das Nest 3 olivenbraune purpurblau gefleckte Eier auf den bloßen Sand. Sie heißt auch: Taubenförmiger Fischevogel, Kentische und Kamtschatkische Meerschwalbe. 3) Gefleckte Meerschwalbe, St. Naevia Linn.: Der Schnabel schwärzlich; die Füße grau; der Oberleib dunkelbraun mit hellen, meist röhlichen Federrändern; hinter den Augen ein schwarzer halber Mond; Hinterkopf und Nacken schwarz; mit hellen Federrändern; der Schwanz leicht gabelförmig und schwärzlich, mit äußerster halbweißer Feder, 11 Zoll lang. Herr Latham giebt sie (Allgem. Uebers. von Bechstein III: 2. S. 315.) für eine Altersvarietät der Vorhergehenden aus; allein dagegen scheint die geringere Größe, wornach sie vielmehr zur gemeinen zu rechnen ist, so wie der Umstand zu streiten, daß man sie nicht in Gesellschaft von jenen auf ihrem Zuge antrifft. Herr G. Becker schreibt, daß, obgleich dieser Vogel Aehnlichkeit mit der jungen gemeinen Meerschwalbe habe, er doch außer seiner Kleinheit noch merklich verschieden sey, wenn man beyde gegeneinander halte. Es sey also eine wirklich verschiedene Species. Man findet sie häufig im Herzogthume Bremen und im Frühjahr auf ihrem Zuge in mehreren Gegenden Deutschlands auf Flüssen, Seen und Teichen. Ihre Nahrung ist die gewöhnliche. Sie macht das Nest am Ufer mit 3 schmutzig-

grünen Eiern, und heißt auch bunte Meerschwalbe, Kirrmeve, Girmöve, Scheerle, Mevenförmige Kalle, Halbmeve. 4) Gemeine Meerschwalbe, St. Hirundo, Linn.: große Meerschwalbe, gemeine Schwalbenmeve, Spirer, Schnirring, und aschgraue schwarzköpfige Seeschwalbe, schlechtweg Seeschwalbe, europäische Meerschwalbe, Schwarzkopf, kleine Meve, Rohrmeve, Rohrschwalbe, große Seeschwalbe mit gespaltenem Schwanz, europäische Seeschwalbe, schwarzplättige Schwalbenmeve, kleine Fischmeve, Fischmeise, grauer Fischer und Länner. Sie unterscheidet sich von den übrigen Arten durch folgende Kennzeichen: Der Schwanz ist stark gabelförmig und weiß, die äußerste und die zwey folgenden Federn an der äußern Hälfte schwarz, der Oberkopf schwarz und der Unterleib weiß. Sie gleicht an Größe der Feldtaube, ist aber weit schlanker gebaut; die Länge beträgt vierzehn Zoll, der Schnabel $2\frac{1}{2}$ Zoll und der Schwanz $5\frac{1}{2}$ Zoll, die Breite aber dreißig Zoll und die Flügel reichen über den Schwanz hinaus. Das Gewicht vier Unzen. Der Schnabel ist dünn und sehr spizig, karmoisinroth, an der Spitze schwarz; der Nacken roth; der Augenfleck dunkelbraun; die Füße karmoisinroth; die Nagel schwarz; die Fußwurzel neun Linien hoch. Stirn, Wangen,

C 2

Kehle

Kehle und der ganze Unterleib sind rein weiß, der Scheitel mit Einschuß der Augen und des Genicks schwarz, hinten läuft diese schwarze Farbe in eine Spitze aus; der Rücken und die Flügel schön blaß- aschgrau; die Schwungfedern graulich weiß, die sieben äußern auf der innern Fahne dunkel aschgrau, und mit weißen Schäften; der Schwanz stark gabelförmig und weiß, der äußere Rand der ersten, zweyten auch wohl dritten äußersten Feder schwarz oder schwärzlich. Am Weibchen sind diese äußern Federränder des Schwanzes mehr grau als schwarz. Dieser Vogel zeigt alle Sitten über dem Wasser, welche die Schwalbe über dem festen Lande zeigt. Da ihre Füße klein, ohngeachtet die Flügel desto länger sind, so fliegt sie wie alle ihre Gattungsverwandten mehr als sie schwimmt. Sie streift daher beständig über der Oberfläche des Wassers in schlangen- und bogenförmigen Kreisen, und setzt sich nur selten an das Ufer oder auf einen Pfahl hin. Ihr Flug ist schnell, sanft und schön und ihr Gesicht sehr scharf. Diese Meer-
schwalbe wird in Deutschland allenthalben auf den Landseen, auch auf Klüffen und großen Teichen angetroffen. Am liebsten wohnt sie auf den kleinen Inseln in der Mitte der Flüsse. Sie hält sich aber auch an dem Seestrande auf und ist ein Bewohner von Europa, Asien und Amerika. Als Zugvogel geht sie in der ersten Hälfte des Septembers aus den kältern Ge-

genden nach wärmern, und kommt zu Anfang des Aprils wieder an. Im Sommer sind Männchen und Weibchen unzertrennt beisammen und im Herbst bilden die verschiedenen Familien große Gesellschaften, die sich an Teichen und Seen niederlassen. Ihre Nahrung scheint aus Insecten und Fischen zu bestehen. Sie nehmen die Insecten besonders von der Oberfläche des Wassers ab, und wenn sie einen Fisch gewahr werden, so schießen sie gleich mit angelegten Flügeln wie ein Pfeil unter das Wasser, packen ihn mit ihrem großen Schnabel und kommen gleich auf der Stelle wieder heraus, wo sie untergetaucht sind. Sie nehmen sich aber gar wohl in Acht, daß sie nur in tiefe und nicht in seichte Wasser stoßen, damit sie sich durch Heftigkeit des Herabschießens nicht Schnabel und Kopf zerbrechen; deshalb fangen sie auch keinen Fisch auf dem Grunde. Das Weibchen legt ins Gras oder Moos, oder auch in eine kleine Höhle an den Ufern, die sie mit etwas Genist und Laub ausfüttert, drey bis vier olivenfarbige Eyer, die nach dem dicken Ende hin mit unregelmäßigen schwarzen Flecken bezeichnet sind, zwischen welchen sich wieder kleinere hellere finden. Die Jungen, welche oben hellgrau und unten weiß sind, werden von den Eltern sechs Wochen lang sorgfältig gepflegt und genährt. Ihre Feinde sind wie bey der gemeinen Meve; doch sind die Vögel viel dreuster, so daß sie dem Menschen, der sich ihrem

ihrem Neste nähert, bis auf den Kopf herab fliegen, und ihm oft den Hut berühren. Sie sind scheu und daher schwer zu schießen. Es muß blos im Fluge geschehen. Der Nutzen im Haushalte der Natur ergiebt sich aus der Nahrung. Ihr Schaden an Fischen wird nicht besonders geachtet. Fleisch und Eier sind schwachhaft und werden gegessen. In den nördlichsten Gegenden vertreiben sie die Kolk-raben und Rabenkrähen u. s. w. aus der Nachbarschaft der Eibergans. 5) Schwarze Meerschwalbe — St. Lissi-pes heißt auch Brandvogel, Maivogel, Maivogelein, schwarze Meve, kleine schwarze Seeschwalbe, schwarze Schwalbrenner, Kleinmexhen, spaltfüßige Meerschwalbe, Spaltfuß, Amfelmeye, kleinste Meve und klein Mübelkin. Man hat folgende Kennzeichen der Art: Die Füße sind dunkelroth und die Haut, welche die Behen verbindet, tief gespalten; die Hauptfarbe rußschwarz; der Rücken dunkelashfarben. Sie hat ungefähr die Größe einer Schwarzbrossel. Die Länge beträgt neun und einen halben Zoll, wovon der gabelförmige Schwanz etwas über drey Zoll und der Schnabel einen Zoll wegnimmt; die Breite fast zwey Fuß; die Flügel reichen zwey Zoll über die Schwanzspitze hinaus; das Gewicht ist zwey Unzen. Der Schnabel ist sehr zusammengebrückt, spitzig und schwarz; der

Augenstern graubraun; die Füße sind schmutzig dunkelroth d. h. roth mit schwarz überlaufend; die Schwimmhaut der Behen halbmondförmig ausgehöhlt; die Füße acht Linien hoch. Der Kopf ist schwarz; Hals, Brust, Seiten und Bauch rußschwarz; unter dem Kinn (oft) ein weißer Fleck; der After weiß; der Rücken und die Flügel dunkelashfarben; der Steiß und Schwanz schön silberfarben, an letztern die äußerste Feder, so wie die Deckfedern der Unterflügel weiß. Dem Weibchen fehlt gewöhnlich der weiße Kinnsfleck; doch findet man auch Männchen ohne denselben; und letztere scheinen immer schwärzlicher zu seyn, als erstere. In ihrem Betragen gleicht diese Meerschwalbe der vorhergehenden, nur scheint sie noch etwas schneller zu seyn. Da, wo sie sich schaarenweise aufhalten, beleben sie durch ihr stetes Herumschwärmen und ihre helle Stimme: Gi, Gi! die ganze Gegend. Man trifft sie in Europa, Asien und Amerika, vorzüglich in den nördlichen Theilen desselben an. Sie bewohnt nicht nur den Meeresstrand sondern auch die Landseen, Flüsse und großen Teiche; daher man sie im Sommer auch in Deutschland antrifft; so wie im September und April als Zugvogel auf ihrem Striche und Widerstriche. Sie nährt sich mehr von Wasserinsecten als von kleinen Fischen, daher man auch fast allezeit nur Käfer, Insecten und Larven in ihren Magen findet. Das Nest steht im Rohre, Schilfe, oder auf Moräsen und andern

bern sumpfigen Stellen und enthält drei bis vier schmutzigrüne, mit schwarzen Flecken und in der Mitte mit einem schwarzen Ringe eingefasste Eier. Sie hat mit der gemeinen Meerschwalbe gemeinschaftliche Feinde, Fang- und Erlegungsarten. Ihr Fleisch ist essbar und sie stiften durch ihre Lebensart und Nahrungsmittel mehr Nutzen als Schaden.

6) Schwarzkehlige Meerschwalbe, *St. nigra* Linn.: Der Oberleib aschgrau; Unterleib weiß; Schnabel, Kopf und Kehle schwarz; Füße roth; Schwanz etwas gabelförmig, 9½ Zoll lang. Sie wird von Mehreren für eine Varietät der Vorhergehenden gehalten; scheint es aber nicht zu seyn. Gehörte sie dahin, so müßte sie, nach der Analogie bey'm Farbenwechsel der Meerschwalbe zu schließen, ein alter Vogel der Vorhergehenden in seiner größten Vollkommenheit seyn. Ihr Wohnort ist im südlichen Deutschland auf Flüssen, Seen und Teichen mehr als im mittlern und nördlichen — zieht weg und die Nahrung wie die der vorherigen. Man findet ihr Nest am Ufer mit 2 bis fünf dunkelgrünen, grauschwarz gefleckten Eiern und nennt sie auch graue und schwarze Meerschwalbe, Brandvogel, Mayvogel, schwarzköpfiger Fischvogel. 7) Kleine Meerschwalbe, *St. minuta* Linn.: Der Schnabel länger, an der Spitze abgestumpft und so wie die Füße sind, orangegelb; Stirn und Augenbraunen weiß; Augenstern braun; Hinterkopf, Na-

fen und ein Streif durch die Augen schwarz; der Rücken und die Flügel hellgrau; der weiße Schwanz sehr gabelförmig; die Schwimmhaut stark ausgeschnitten, 8½ Zoll lang. Variirt in der Farbe; denn an Jungen ist der Kopf und Nacken rostgrau, schwarz in die Quere gestreift, und der Oberleib rostgrau schwärzlich braun geschuppt, an etwas ältern aber fahler: die braune Schuppfarbe des Oberleibes und des Kopfs hat mehr weiß, obgleich noch keinen einfärbigen Schwanz; bey allen ist nur der Unterschnabel gelb, und der Ober-schnabel braun. Diese Meerschwalbe ist in der Farbe der gemeinen sehr ähnlich. Sie hat zum Wohnort das Baltische Meer und viele Seen und Flüsse Deutschlands — zieht paar- und familienweise bald weg, und kommt spät wieder. Sie wählet zur Nahrung mehr Insekten als Fische. Das Nest im Gras und Schilf findet man mit drei bis vier schmutzig gelbbraunen, röthlich gefleckten Eiern. Man giebt ihr auch die Namen: kleine Meer-schwalbe, kleine Schwalbenmeve, kleiner Fischer, kleinste Fischmeve, Fischerlein, kleines Fischerlein, zweyfärbige Meve.

Meerstrandläufer — *Tringa Cinclus* Meerlerche, Steinpücker, blauer, bunter, grauer, mittler Sandläufer, Haarschnepfe, und Lyfklücker mit schwarzgrauem Schnabel, dunkelbraunen grün-

grünlichgrau überlaufenen Füßen, weißer Linie über den Augen, durch dieselben eine dunkelbraune Ader mit dunkelgrauen olivengrün glänzenden Oberleibe, dessen Federn schwärzliche gezackte Wellenlinien und hellrothfarbene Ranten haben und mit weißer dunkelbraun gestrichelter Brust. Die Länge beträgt 6 $\frac{1}{2}$ Zoll. Er wählt sich den Wohnort am Meere, an Teichen und Seen, die Büsche haben, einzeln; und im Herbst bloß in Familien an sandigen Teichen, Seen und Flüssen auf dem Zuge. Die Nahrung besteht in Insekten und er wendet beym Auffuchen alle Steine um. Das Nest findet man in Uferbüchern, im Grase und unterm Gebüsch mit 4 bis 5 röthlichgrünen blaß und dunkelbraun gefleckten Eiern.

Mehrbraten nennet man beym Roth- und Schwarzwildpret die beyden am Rückgrate, über den Nieren liegenden Stücken Wildpret.

Meiße, Parus, ist eine zahlreiche Vogelgattung, deren Kennzeichen bey den einzelnen Arten z. B. Blaumeiße, auch Haubemeiße, Kohlmeiße etc. angegeben worden sind.

Meißenfang ist die Art und Weise, Meisen in seine Gewalt zu bekommen. Er geschieht auf folgende Arten: 1) mit dem Kloben, s. d. Wort. Man muß zum Behuf dieses Fanges bereits vor Tage früh die Kloben aufspannen, und zu den Lö-

chern an der Hütte bis an die Hülse herausstecken. Auswendig an der Hütte unter den Kloben müssen die Käfige mit den Lockweissen hängen. Vor die Kloben jedoch etwas niedriger, als diese liegen, steckt man einen Stock, der oben eine Gabel hat, an deren Spitzen man eine krummgebogene Stachnadel bindet, dann macht man am Stocke einen Bindfaden fest, und ziehet ihn in die Hütte, an diesen bringet man die Ruhevögel an. Um nun diese, die man anfänglich nicht hat, zu bekommen, bindet man einen Fuchsschwanz an einen Stock, pfeiset auf der Meisenpfeife, und wenn sie bey die Hütte kommen, fährt man jähling mit dem Fuchsschwanz zur Thüre der Hütte heraus und sogleich wieder hinein. Nun setzen sich die Meisen aus Neugierde auf den Kloben, und werden berückt. Hat man einmal Lockvögel, dann gehet der Fang desto besser, denn sie lassen ihre Stimme hören, so bald sie andere Meisen sehen, da man denn zugleich von der Pfeife Gebrauch machen muß. Wenn nun welche kommen, so rühret man die am Rohr hängenden, lebendigen oder tohten Meisen, die fremden wollen diesen loshelfen und setzen sich auf die Kloben, da sie denn anfangen zu schreyen, worauf immer mehrere hinzu kommen und gefangen werden. 2) Mit dem Meisenfange, dieser bestehet aus vier oben mit Gabeln versehenen Stangen, jede 2 $\frac{1}{4}$ Elle lang, diese steckt man zwölf Schritt von der Hütte, im

Wier

Wierd in die Erde, belegt drey Seiten mit dünnen Strängeln, läßt aber die vierte nach der Hütte zu offen; an diese Strängeln, hängt man Sprentel, dergestalt, daß das Klippholz des einen auswendig, des andern aber inwendig komme. In die Mitten zwischen diese Sprentel steckt man einen langen Stock, der oben eine Gabel hat, an welcher man zwei Meisen zum Nüßren befestiget. Früh vor Tage stellet man die Sprentel, setzt die Lockmeisen an die Hütte und auf den Meisenfang, wenn nun die Lockmeisen rufen, so kommen viele fremde, nun rühret man an der Ruthe, so kommen dorer noch mehr herbey, gehen theils in die Sprentel, theils in die Kloden, und werden gefangen. Man muß sich dabey nur mit einem gehörigen Vorrathe von Klippholzern versehen, damit man die Sprentel immer von neuem wieder aufstellen kann. 3) Auf der Leyer. Es werden zwey Pfähle, jeder drey Ellen lang, vier Ellen auseinander eingeschlagen, durch diese werden oben große Löcher gebohrt. Alsdann wird eine Walze, eines guten Armes stark, mit Zapfen an beyden Enden gemacht, diese Zapfen müssen in die Löcher der Pfähle dergestalt paßen, daß man die Walze drehen kann. Nun bohret man Löcher, acht Zoll weit auseinander, allezeit 2 und 2 übers Kreuz, in welche ungeschälte häßelne Stöcke, jeder 1½ Elle lang gesteckt werden können. In diese bohret man zwey Paar kleine Löcher, zwey Zoll weit aus-

einander, so daß ein Paar etwas darunter dem andern gegen über steht; in diese Löcher steckt man Leimruthen, neun Zoll lang und so stark, wie ein Tabackspfeifenstiel. In die Walze schlägt man einen hölzernen Nagel, woran eine doppelte Leimruthen dergestalt befestiget wird, daß beym Umbrehen der Walze, die eine sich auf, und die andere abwindet. Wenn man nun die Walze drehet, dabey die Ruhevögel rühret, und auf der Meisenpfeife pfeifet, so fallen die Meisen aus Neugierde auf die Leyer und fangen sich. Unten um die Leyer herum, muß das Gras weggegrast, auch ein kleiner Zaun gemacht werden, damit die gefangenen, und mit den Leimruthen herabgefallenen Meisen nicht weiter sich verlaufen. 4) Mit dem Rauche und der Leimstange. Man sucht einen lebendigen Rauch zu bekommen, welches durch Schlingen oder Leimruthen, in die Gegend seines Aufenthaltes gelegt, leicht geschehen kann. Diesen bindet man mit den Füßen auf eine, auf einer Stange befestigte runde kleine Scheibe. Dann nimmt man eine lange glatte Stange, und bohret in dieselbe Löcher, zum Einführen der Leimruthen. Diese beyden Stangen steckt man an einem bequemen Orte nahe zusammen; wenn nun die Meisen den Rauch sehen, so stechen sie nach ihm, und sehen sich dabey häufig auf die Leimruthen der nahen Stange. Dieser Fang muß nicht imsondern in einer kleinen Entfernung vom Holze, angebracht werden.

den. 5) Mit der Weisensprache. Man bringet nemlich eine Menge Leimruthen auf die Nester eines einzelnen, im freyen Felde stehenden Baumes, und hängt die Lockmeisen in Bauern dazu. Wenn nun ein Flug Meisen kömmt, und die Lockmeisen sehen und hören, so fallen sie auf den Baum, setzen sich auf die Leimruthen und bleiben kleben. Sollten sie hoch fliegen, und nicht auf den Baum fallen zu wollen scheinen, so schießt man mit einer Armbrust einen Fuchs- oder Pferdeshwanz gerade in die Höhe auf sie zu, da sie denn aus Furcht, dafür im Baume Schutz suchen, und auf die Leimruthen fallen. Die beste Zeit zu allen diesen vorgeschriebenen Meisenfängen ist gegen und auch einige Zeit nach Michael, so lange der Strich dauert, denn die Meisen, obschon manche im Winter hier bleiben, halten doch im Herbst ihren Zug. Die besten Stunden dazu sind die Morgenstunden.

Meisenkästen, Meisen-schlag ist ein kleiner Vogelbauer in Gestalt eines Kästchens, dessen Decke aufgemacht, und durch ein, an einem Stellholze befestigtes Stäbchen offen erhalten wird. In den Kästen streuet man Körbiskerne, oder kleine Stückchen geschälter Nüsse. Nach diesen gehen die Meisen in den Kästen, springen auf das Stellholz, wodurch der Deckel abgedrückt wird, zufällt und die Meise gefangen wird.

Meisenpfeife wird aus dem Flügelknochen der Gänse und aus Hasenläufen gemacht von 2—3 Zoll Länge und zum Locken der Meisen gebraucht.

Melden, sich melden, schmählen, bellen, schröcken, abschrecken heißt der laute Ruf, den ein alter Hirsch zur Warnung für seinen Trupp hören läßt, wenn er einen Menschen, oder sonst Unrath merket.

Menée ist ein Kunstwort bey der Parforce-Jagd, und bezeichnet den geraden Lauf eines fliehenden Hirschens, da hingegen man von einem Wilde, das, wenn es lange verfolgt worden, sich ganz nahe auf den Leib kommen läßt, den Ausdruck Mal-menée, brauchet.

Meute nennet man einen Trupp zu einer Jagd gehörigen Hunde.

Meve — Larus — ist eine aus vielen Arten bestehende Schwimmvögel-Gattung mit geradem zusammengebrücktem Schnabel, der eine etwas hakenförmige Spitze hat, und woran die untere Kinnlade vor der Spitze mit einer Hervorragung versehen ist; mit schmahlen Nasenlöchern, die vorwärts breiter, in der Mitte des Schnabels und an manchen mit einer Wachs Haut bedeckt sind; mit einer etwas gespaltenen Zunge, und mit über die Fers etwas nackten Füßen, deren vier Zähne vorne durch eine Haut verbunden sind, und woran die hintere manchmal abgestumpft ist. Diese Vögel wechseln wegen ihrer lan-

langen Flügel im Fliegen über dem Wasser und im Schwimmen. Sie leben gesellschaftlich und verändern in der Jugend, wie die Meerschwalben, unheimlich in der Farbe, daher man erst durch die Bemühungen des Hrn. Nauman in seiner Naturgesch. der Land- und Wasservögel B. III. S. 163. über die deutschen Mevenarten in Ordnung gekommen ist. Die hierher gehörigen acht Arten sind in zwei Familien, als a) ohne Wachshaut, die schwarzköpfige oder gemeine Meve, die Heeringmeve, die Mantelmeve, die grauliche Meve, die brenzähige Meve, die Sturmmeve, die weißschwinge Meve; und b) mit einer Wachshaut, nemlich die Struntmeve abgetheilt worden. a) Ohne Wachshaut. 1) Schwarzköpfige Meve, *L. ridibundus*, Linn.: Schnabel und Füße sind blutroth, ersterer oben gezähnt, und unten mit einer mittelmäßigen Hervorragung; letztere vierzehig; der Oberleib hell aschgrau; der Unterleib weiß; der Kopf am Männchen schwarz; am Weibchen schwarzbraun, 16 Zoll lang. Nach Herrn Naumann hat man nach häufiger Beobachtung nun herausgebracht, daß die gemeine Meve, *Larus canus* Linn. diese schwarzköpfige im ersten Sommer ist, welche auch für sich in großen Heerden wegziehen. Der Schnabel ist fleischfarben, an der Spitze schwarz; Hauptfarbe weiß; Rücken und

Flügel hellgrau, einzeln gelbbraun gefleckt, auch auf den Wangen sieht ein dergleichen Fleck; der äußere Rand der vier ersten und die Spitze der fünf ersten Schwungfedern schwarz, die übrigen fast alle mit weißen Enden; der Schwanz ganz weiß oder weiß mit schwarzer Endbinde und gelblichweißer Spitze. Sehr selten trifft man im Frühjahr eine vorjährige Meve dieser Art mit weißem Kopfe an; alle haben, wenn sie von der Winterreise zurück kommen, einen braunschwarzen Kopf. Herr Latham macht folgende zu Altersverschiedenheiten, die noch nicht ihre vollkommene Farbe haben. a) Aschgraue Meve, *L. cinerarius* Linné. Sie ist weiß; der Rücken aschgrau; hinter jedem Auge ein dunkelbrauner Fleck. Odemann rechnet sie (neue Schwedische Abhandl. 4ter B. S. 113.) zu der Wintermeve nach dem ersten Jahre, welches sie aber der deutlichen Hinterzehe halber nicht seyn kann. b) Rothfüßige Meve, *L. erythropus* Linne. Sie ist weißlich; der Kopf dunkelbraun mit weißen Flecken; der Rücken grau; die zehn mittlern Schwangfedern mit einer schwarzen Binde. — Diese letztere ist Herrn Bechsteins grauliche Meve, N. 4. Sie wählt sich zum Wohnort die Landseen in Deutschland — zieht in Gesellschaft weg, und hat zur Nahrung Würm, Insekten und Getraide. Das Nest findet man am Ufer mit 2 bis 3 olivengrünen, dunkelbraun und aschgrau gefleckt.

Flecken. Eyern. Sie hat auch
 die N a h m e n: Lachmeve,
 rothfüßige, braunköpfige
 und große Lachmeve, graue
 Meve mit dem Mohrenkopfe,
 See Krähe, Braunkopf,
 Rothbein, rothköpfiger
 Seeschwalm — gemeine, ge-
 meine graue, weißgraue,
 Fischmeve, Seemeve, große
 See Krähe, aschfarbene
 Fischmeve. 2) Heering-
 meve s. oben. 3) Mantel-
 meve s. oben. 4) Grauliche
 Meve, *L. canescens* Bechst.:
 Schnabel und Füße blutroth, er-
 sterer dünn und mit einer klei-
 nen Hervorragung am Unterkie-
 fer versehen; weiß; Rücken und
 Flügel hellaschgrau; auf den Deck-
 federn der Flügel dunkelbraune
 Flecken; die großen Schwung-
 federn weiß mit schwärzlichen brei-
 ten Rändern und Endspitzen; der
 weiße Schwanz am Ende mit ei-
 ner breiten schwärzlichen Binde;
 Füße vierzehig und blutroth; 13½
 Zoll lang. Sie variirt etw. 6
 in der Farbe; am Kopfe mehr
 oder weniger gefleckt, und die
 dunkle Farbe am Flügel und
 Schwanze bald mehr dunkelbraun,
 bald ganz schwarz. Ihr Wohn-
 ort sind die nordische Meere —
 die deutschen Küsten und Land-
 seen besucht sie nur im August
 und September, und im April
 und Anfang des Mayes ein-
 zeln in kleinen Truppen. Die
 Nahrung sind Insekten, auch Re-
 genwürmer, die sie am Lande
 aufsucht. Sie hat auch die Na-
 men: Kleine, kleine bun-
 te, graue, gemeine graue,
 kleine graue, weißgraue

und kleinere Meve, Fisch-
 meve, Seemeve und Fischer.
 Diese Meve hat so viel Ähnlich-
 keit mit der sogenannten gemei-
 nen Meve, *Larus canus*,
 Linn., welches die junge
 schwarzköpfige ist, daß man
 sie leicht mit ihr verwechseln
 kann, welches denn auch gesche-
 hen ist (z. B. *Larus cinereus*
minor Aldrovandus orn. 3.
 p. 73. t. 75. etc.). Sie unter-
 scheidet sich aber gar sehr durch
 ihre Kleinheit, und dadurch, daß
 im Frühjahr Männchen und
 Weibchen, wie oben angegeben,
 aussehen, da sich hingegen jene
 dann in schwarzköpfige ver-
 wandelt haben. 5) Dreizeh-
 ge Meve, *L. tritactylus* Linn.:
 Hauptfarbe weiß; der Schnabel
 stark, weniger zusammengebrückt
 mit einer starken Hervorragung
 am Unterkiefer und von Farbe
 grünlich; der Rücken und die
 Flügel hellaschgrau; die Hinter-
 zehe unvollkommen, 15 Zoll lang.
 Auch diese variirt in der Farbe:
 Die gewöhnlichen, die man sieht,
 haben im Frühjahr einen dun-
 kelaschgrauen Fleck auf den Wan-
 gen; andere einen dergleichen hal-
 ben Mond im Nacken. Wenn
 sie noch jünger sind (Herbstvogel),
 so ist die Schwanzspitze schwarz
 und über die Flügel läuft ein
 schwärzlicher Streifen am Rücken
 herab. *Larus tritactylus*, Linn.
 Im Frühjahr ist der Schnabel
 gelbgrün, im Herbst schwarzgrün.
 Wo der dunkelgraue Fleck auf
 den Wangen fehlt, die sollten
 nach Dehmann (neue Schwed-
 dische Abhandl. 4ter B. S. 114.)
 rechte alte ausgefärbte Vögel seyn.

Jfr

Ihr Wohnort ist an den Meeresküsten, auch auf nördlichen Landseen; auf ihrem Zuge in Deutschland an Flüßen, Seen und Teichen sind sie oft in Menge, auch mitten im Winter, wo ihrer viele Hungers sterben. Die Nahrung besteht in Insekten, Fischen und schwimmendem Aas. Das Nest findet man an Ufern mit 2 bis 3 grünlichen, braungestrichelten Eiern. Sie hat auch die Nahmen: Wintermeve, Tarroß, weiße Meve, Hafmeve, dreyfingerige, Schwedische, Isländische Meve, Seefischer, Seeschwalbe, Fischarmeve. 6) Sturmeve, *L. procellosus*, Bechst. — Der Schnabel ist stark gekrümmt, unten mit einer sehr deutlichen Hervorragung, von Farbe gelblich; die Füße mit einer deutlichen Hinterzehe; der Oberleib aschgrau; der Unterleib weiß; 16½ Zoll lang. Sie variiert in der Farbe: a) Der Schnabel gelb mit schwarzer Spitze; der Oberleib mit bräunlichen Federn vermischt; die Schwanzspitze dunkelbraun (Herbstvogel). *Nauann*, a. a. D. b). Der Schnabel gelbgrün; der Oberleib wie aschgrau, hinter den Ohren ein dunkler Fleck (vollkommener Vogel). Ihr Wohnort sind die nordischen Meere und Seen — im Herbst an der Ost- und Nordsee und im Spätherbst zieht sie durch Deutschland, und wenn im Winter in den letzten Tagen des Jäners starkes stürmisches Wetter einfällt, so kommt sie oft in Menge auf

die Teiche und Flüße, entweder aus dem Norden verschlagen, oder aus Süden auf dem Rückzuge hierher geworfen; es sterben dann viele Hungers. Die Nahrung sind Insekten, Fische, Aas. Sie hat auch die Nahmen: Aschgrau, graue, große graue, und nordische Meve, Sturm- vogel, Stromvogel, grönländische Seeschwalbe. Es scheint dieß kein anderer Vogel, als *Larus cinerarius*, Linn. zu seyn. Unter diesem Nahmen kommt er auch bey den meisten Schriftstellern nebenbey mit vor. 7) Weißschwinge Meve, *L. glaucus* Gmelin Linn. Der Schnabel dick, merklich gekrümmt, und unten mit einer starken Hervorragung, von Farbe gelb, mit einem orangefarbenen Fleck am Ende; die Füße vierzehig; der Mantel hellaschgrau; das übrige Gefieder, Schwingen und Schwanz weiß, 29 Zoll lang. Sie variiert in der Farbe, denn am jungen Vogel ist nur die Spizenhälfte der Schwungfedern weiß, das Uebrige ist entweder schwarz oder dunkelbraun; gewöhnlich aber laufen sie bey alten nur nach der Wurzelhälfte grau aus. Sie hat zum Wohnort den Norden von Europa — im Herbst an der Nord und Ostsee; einzeln auf deutschen Seen. Ihre Nahrung besteht in Fischen, Seesäuern von Wallfischen und Robben und jungen Vögeln. Ihr Nest ist im Norden auf Klippen mit 3 grünlichen Eiern, die 6 bis 8 unregelmäßige, schwarze Flecken haben. Man hat ihr noch die Nahmen: Bürgermeier, Ker,

Net, grauliche Meve, große Seemeve, große nordische und weiße Meve, Tauchermeye gegeben. 3) Mit einer Wachshaut. 8) Struntmeve, *L. parasiticus*, Linn.: Der Schnabel kurz, stark gekrümmt, unten und oben eine deutliche Hervorragung; die zwey mittelsten Schwanzfedern länger; Männchen oben schwärzlich, unten weiß, mit einem schwarzen Scheitel und aschblaulichem Band über die Brust; Weibchen ganz braun, die untere Seite am hellsten, 20 Zoll lang. Die Jungen sehen dem Weibchen ähnlich; das Band am Unterhalse ist undeutlich und bräunlich aschgrau; der Oberleib dunkelbraun mit röthlich weißen Federkanten; der Bauch weiß mit graubraunen Querstreifen. Sie wählt sich zum Wohnort zuweilen die Küsten und Inseln der Ostsee — auf dem Strich im Herbst sieht man sie seltener. Ihre Nahrung besteht in Fischen, die sie vorzüglich andern Meven und Meeresschwalben abjagt. Man findet das Nest auf Hügeln mit 2 aschgrauen, schwarzgefleckten Eiern. Sie hat auch die Namen: Struntjäger, Strantjäger, Schwarzer Möve, Mövenbüttel, Polarmöve, Polmöve, Arktische Möve, Scheißfalte, Nordvogel.

Milane — Milvi — nennt man die zweyte Familie von Raubvögeln in der Falkengattung, s. Adler, welche mit schwarzem, an der Wurzel gerä-

den Schnabel, kurzen unter den so genannten Knieen etwas befiederten Füßen, oder Fußwurzeln und einem gabelsförmigen Schwanz versehen sind. Dazunter gehören: 1) Der rothe Milan — *Falco Milvus* — gemeine Milan, Weyhe, Milane, gemeine, bunte Weyhe, Mülane, Gabelweyhe, Königsweyhe, Hühnergeyer, Weichfalte, Gabelschwanz, Gabler, Gabelgeyer, Scheerschwänzel, Schwalbenschwanz, Hühnerdieb, Stoßvogel, röthliche Weyhe, rother Milan, Steingeyer, Stoßgeyer, Hühneraar, Haahr, Weichmilane, Kettelweyhe, Wy, Wuv, Turvy, Schwimmer und Grimmer. Als Kennzeichen der Art sind bekannt: Die Wachshaut ist gelb; die halb befiederten kurzen Füße sind auch gelb; der Schwanz ist scheerenförmig und rostfarben. Die Länge dieses bekannten Raubvogels beträgt zwey Fuß drey Zoll, wovon der Schnabel ein und einen halben Zoll und der Schwanz einen Fuß wegnimmt; die Breite ist fünf Fuß zwey Zoll; die Flügelspitzen reichen bis auf das Ende des Schwanzes. Das Männchen ist fast um ein Viertel kleiner. Der Schnabel ist von der Wurzel bis zur Mitte gerade, an der Spitze aber sehr gekrümmt, mit wenig ausgebogenem Zahn, die Wachshaut, so wie der Rachen und die ganze hintere Hälfte des Schna-

Schnabel gelb, die vordere schwarz; der Augenstern strohgelb; der Augensiederand gelb; die kurzen halbbesiedelten Füße zwey Zoll hoch, und mit den langen Zehen gelb; die scharfen, wenig gekrümmten Nägel schwarz. Der kleine Kopf ist weiß, an den Seiten klar schwarzbraun gestrichelt, in der Mitte des Scheitels aber rothbraun gefleckt und schwarzbraun gestrichelt; der Hals rostfarben, jede Feder in der Mitte mit einem schwarzen Fleck und einer gelblichweißen Spitze; der Rücken rostbraun, schwarzbraun gefleckt; der Hals rostbraun, an den Deckfedern des Schwanzes hellrostfarbig auslaufend; die Kehle weiß, klar schwarz gestrichelt; der übrige Unterleib dunkelrostfarbig, schwarzbraun gestreift und gelblichweiß gefleckt; der After und der Schenkel hellrostfarbig; die vordern Deckfedern der Flügel schwarzbraun mit rostfarbigen Spitzen, die hintern hellrostfarben und schwarzbraun gefleckt; die fünf vordern scharf zugespitzten Schwungfedern bis auf die weiße Wurzel und Spitze schwarz, die sechs folgenden rostfarbig, dunkelbraun bandirt, und an den Spitzen und der inwendigen Fahne röthlichweiß eingefasst, die neun folgenden dunkelbraun mit schwarzbraunen undeutlichen Bändern und weißlichen Spitzen, die letztern hellrostfarbig mit unvollkommenen Querbändern; der lange Schwanz stark gabelförmig und blaß rostfarbig; die längern Seitenfedern von der Mitte an schwarzbraun auslaufend, die übrigen vor-dem

Ende mit einer unvollkommenen schwarzbraunen Querbinde, dergleichen Flecken auf der Mitte des Schaftes herab und weißliche Spitzen; die Deckfedern der Unterflügel rostbraun und schwarz gefleckt; die Unterschwinger am Anfange schwarz, in der Mitte weiß und einzeln bräunlichbraun bandirt, am Ende aschgrau mit dergleichen Wellenlinien; der Unterschwanz röthlichweiß, an den Spitzen schwarzbraun bandirt. Der ganze Leib ist dicht mit Dunen besetzt. Das Weibchen ist nicht so merklich größer, wie bey andern Raubvögeln, hat auch dieselbe Farbe, außer daß der Kopf weißer, oder hellaschgrau, die mittlern Schwungfedern mehr aschgrau als weiß, und der Unterleib mehr getiebert ist. Man findet Milane, die einen fast ganz gelblichweißen Kopf haben; andere sind mehr rostbraun, als rostfarbig; bey noch andern zieht sich die Rostfarbe etwas ins Dunkelbraune, und bey den Jungen ist die Rostfarbe stark mit Weiß gemischt. Der Flug dieser Vögel, woben die langen Flügel oben am Rande herum bogenförmig erscheinen, ist schwimmend und außerordentlich schön; besonders zur Zeit der Paarung, wo Männchen und Weibchen hoch und tief in der Luft die schönsten Schwenkungen gegen einander machen. Wenn sie sich setzen, so lieben sie mehr die Steine und Erdklöße, als die Häuser. Sie schreyen hoch und dumpf Grah! So munter und beherzt sind sie nicht, wie andere Raub-

Raubvögel, die ihnen in der Größe gleichen. Dieser Vogel ist über die ganze alte Welt verbreitet, und in Deutschland gemein. Er liebt vorzüglich die in der Nähe der Felder liegenden Vorberge, besonders wenn sie auf einer Seite kahl und auf der andern mit Holz bewachsen sind. Wo die Gegend so ist, da trifft man in einem kleinen Bezirke viele Paare an, die hier horsten. Wenn die Winter gelinde sind, so sieht man ihn den ganzen Winter durch in Deutschland. Im October aber scheint er aus den nördlichen Gegenden zu ziehen, denn alsdann trifft man ihn in Sachsen häufig in den Feldern an. Einheimische gehen zu Ende des Octobers, von Kälte und Schnee gedrungen, weg, sind aber im März wieder da. Ihre Nahrung besteht in Maulwürfen, Feldmäusen, Fröschen, Schlangen, Nat-tern, Blindschleichen, Eidechsen, Regenwürmern, Schnecken, Insekten und Aas, in jungen Gän- sen, Brut- und Haushühnern, Enten, Rebhühnern, Lerchen auch jungen Hasen. Vorzüglich stößt er auch nach den Wasserhühnern, wo er sehr viele Junge wegfängt. Man sagt auch, er stoße auf Fi- sche, allein dieß habe ich selbst noch niemals bemerkt. So viel ist gegründet, daß er die abge- standnen Fische von der Ober- fläche des Wassers wegnimmt. Der Horst steht auf alten Eichen, Buchen, Fichten und Tannen, und ist aus Reisern, Moos, Stroh, Heu, und Wolle verfer- tigt. Er enthält gewöhnlich drey

weiße mit blaßgelben und röth- lichbraunen Flecken auch Punk- ten und Strichelchen hin und wieder bezeichnete Eyer, die in drey Wochen ausgebrütet wer- den. Die Jungen machen im Neste ein gräßliches Geschrey und man kann sie leicht entde- cken. Alte Vögel machen des Jahrs zwey Geheide. Mehrere Falkenarten verfolgen sie und jagen ihnen den Raub ab, dieß thun sogar die Rabenträhen und Aalkrähen. Auf ihnen findet man Läuse, und in ihnen Bandwürmer, Spulwür- mer und Egelwürmer. Man schießt sie sowohl im Fluge, als durch Anschleichen, wenn sie sitzen. Sie sind nicht so schau, als an- dere Raubvögel. Man schießt sie auch beym Aas und auf der Krähenhütte, und baigt sie mit Falken. Ihr Fang ge- schieht auch, wie bey obigen Raub- vögeln, in Haarschleifen auf dem Bocke und Sattel. Wenn man eine kleine eiserne Tel- lerfalle, wie man sie vor die Hausmäuse hat, nimmt, und einen Maulwurf darauf bindet, so kann man sie da, wo sie herum fliegen, leicht fangen. Sie gehen dann eher auf eine solche Falle, worauf ein Maul- wurf befestigt ist, als auf eine andere, wo man eine Ler- che oder Wachtel aufgebunden hat. Bey der Vogelbeize läßt man Falken auf sie los, und sie ge- währen ein herrliches Schauspiel. Sie vertilgen viele schädliche Säu- gethiere, Amphibien und Insek- ten. In Aegypten werden sie deshalb gesetzt. In der Nähe der

Woh-

nen Leben: Gemeine Pfuhlschnepfe, Puhlschnepfe, Sumpfschnepfe, Doppelschnepfe, große Pfuhlschnepfe, Moosschnepfe, Wasserterschnepfe, Riedschnepfe, Moorschnepfe, große und langbeinige Schnepfe, größere Bruchschnepfe, große Sibirische Schnepfe und Sticup. Als Kennzeichen der Art sind anzusehen: Der Schnabel ist lang, vorn kolbig und ausgehöhlt punktirt; der Oberkopf durch drey rostgelbe und zwey schwarzbraune Längsstreifen getheilt; der Bauch mit graubraunen Wellenlinien; die Füße grünlichgelb. Man hat schon oben bemerkt, daß diese Schnepfe seither ist erkannt worden, und zwar um deswillen hauptsächlich, weil sie mit der Heerschnepfe so große Aehnlichkeit hat; denn von dieser ist sie bloß durch die Größe, den kürzern Schnabel und den gewelltern Bauch verschieden. Sie steht in Rücksicht der Größe zwischen der Wald- und Heerschnepfe gerade in der Mitte, und ist etwas größer als eine Lachtaube oder gerade so groß als das Weibchen der Streitschnepfe; die Länge ist 10 Zoll, die des Schwanzes 1½ Zoll, die Breite aber 18—20 Zoll; die Flügel legen sich fast am Ende des Schwanzes zusammen und das Gewicht ist sechzehn Loth. Der Schnabel ist fast zwey Zoll lang, gerade, vorne kolbig und hohl, punktirt, zwey Drittheil von der Wurzel an gelblich, das übrige

dunkelbraun; der Augenstern kastanienbraun; die Schienbeine sind ein und drey Viertel Zoll hoch und mit den getrennten Beinen grünlichgelb, auch dunkelolivengrün (vielleicht bloß in Kabinetten schwarz, wie sie gewöhnlich angegeben werden). Der Kopf schmal, an den Seiten weiß, und schwärzlich punktirt; mitten über den Kopf läuft ein rostgelber Längsstreif bis in Nasen; zu beyden Seiten desselben zwey breitere schwarzbraune hellbraun punktirte, die über der Stirn schmal sind und zusammen laufen, in der Mitte aber breiter werden und sich erst im Nacken wieder zuspitzen; unter jedem schwarzbraunen Streifen geht über die Augen hin wieder ein rostgelber und vom Schnabel bis zu den Augen wieder ein schmälterer schwarzbrauner; so daß im Gesicht vorn vier schwarzbraune und drey rostgelbe Streifen erscheinen; die Kehle ist fast wie die Seiten des Kopfs graubraun und weißlich punktirt; der Hals und die Oberbrust gelblich und schwarzbraun melirt und gewellt; die Deckfedern der Flügel, der Rücken und die Schulterfedern dunkelbraun, hellbraun in die Quere gestreift und gefleckt, letztere auch mit einigen der Länge nach laufenden rostgelben Streifen; der übrige Unterleib gräulich weiß mit vielen graubraunen, an den Seiten schwarzbraunen Wellenlinien; die Schenkel- und Schwungfedern dunkelbraun, die erste mit einem weißen Schaft, die hintern mit weißen Säumen; die

Unterflügel, wie die Seiten, weiß mit schwarzbraunen Querverbinden; die Schwanzfedern an der Wurzel schwarz, die äußerste weiß, die folgende rostbraun mit einigen schwarzen Querverbinden, die mittelfte einfarbig rostbraun. Das Weibchen ist wenig verschieden, nur scheint es etwas heller an Farbe zu seyn. Sehr alte Vögel haben auch wohl ganz schwarze Streifen auf dem Kopfe; dieß ist aber selten. Diese Schnepfe ist, wie alle Arten dieser Gattung, ein scheuer Vogel, doch fliegt sie schwerer als die Heerschnepfe und auch gerade aus, so daß sie leichter geschossen werden kann; sie liegt auch fester. Ich habe sie noch nie einen Ton von sich geben hören. Man trifft sie in England, Deutschland, Sibirien und Nordamerika an. Sie brütet auch in Deutschland. Sie liebt Sümpfe und Brüche, doch im Ganzen die Rasse nicht so sehr, wie die folgende Heerschnepfe. Sie ist ein Zugvogel, der im Anfange des Augusts, wo sie nicht in Deutschland nistet, aus den nördlichen Gegenden ankömmt. Sie fällt alsdann in nasse Wiesen, wo das Grummet nicht zu kurz und nicht zu lang ist, sonst auf feuchte Riede, die Sümpfe und wasserhaltende Vertiefungen haben, auch an die feuchten See- und Flußufer. Ja man findet sie auch auf trocknen Wiesen. Wenn der erste Frost kömmt, so sieht man keine mehr. Im April ist der Wiederzug, wo sie sich aber nicht aufhalten, sondern nur durchwandern. Die Nah-

rung ist, wie bey allen Schnepfenarten, Gewürme, Insekten und Gras- und Sumpfwurzeln. Im Herbst werden sie oft so fett, daß sie kaum aufstehen können und wenn sie vom Schusse herabfallen, plagen. Sie brütet in den mit Sträuchen besetzten Brüchen und Sümpfen, macht das Nest auf einen trocknen Binsenhügel, oder in eine vom Wasser ausgespülte Erdhöhle. Es besteht bloß aus Grashalmen und etlichen Federn. Die drey bis fünf Eier, welche in drey Wochen ausgebrütet werden, sind olivenfarben mit dunkelbraunen großen und kleinen Flecken, die zuweilen rostgelbe Ränder haben, besetzt. Die Jungen laufen gleich mit der Mutter davon. Da sie sehr früh streichen, so machen sie nur ein Gehecke. Sie hat dieselben Feinde wie andere Schnepfen. Sie gehört zur niedern Jagd und werden ebenfalls wie die Heerschnepfe gefangen und geschossen. Hauptsächlich schießt man sie vor dem Hühnerhunde und zwar wie die Heer- und Haarschnepfen, mit Schrot Nr. 7, auch späterhin, wenn sie recht fett sind, mit Dinst. Sie gewähren unter allem Schnepfenschießen das meiste Vergnügen, da sie dem Hunde gut halten, außerordentlich fest liegen, gerade aus und nicht so schnell, wie die Heerschnepfen fliegen, und nach einer kurzen Entfernung wieder einfallen. Sie hat eine starke Bitterung und der Hund nimmt sie daher gut und gern an. Von dem zehnten August bis zum zehnten Sep-

September streichen sie in gewöhnlichen Jahren sam stärksten. Anfangs sind sie mager, sie werden aber bald sehr fett, und liegen dann immer fester. Das Wildpret ist sehr delikat. Im September ist es in denjenigen Gegenden, wo sie ihren Strich und gute Aesung haben, ein wahrer Fettklumpen.

Monchen nennet man die

nach jungen Geweihe der Hirsche. s. Hirsche.

Mönchente, *Anas Monacha* — ist wahrscheinlich eine Spielart der gemeinen zahmen Ente — *An. Boschas domestica* — nur etwas größer. Der Schnabel ist gelblich, mit schwarzem Nagel, der Körper schwarz und weißbunt; der Spiegel grau und violet glänzend.

N.

Nachbinden folgt auf das Vorbinden, dieses besteht darin, daß bey der Stellung des Zeuges bey einem Hauptjagen die obern und untern Leinen der Tücher an Hestel oder Bäume angebunden werden, und Nachbinden, wo die Leinen an dem andern Ende des Tuches wieder angebunden werden.

Nacheil, **Nachfolge**, **Folge**, **Jagdfolge** ist das, entweder durch Vergleich oder Verjährung, erlangte Recht, ein, auf eigenem Reviere angeschossenes Wild in ein fremdes zu verfolgen. Wenn es über die Grenze gehet, wird die Färthe und der Schweiß verbrochen, dann ziehet man weiter nach und löset den Hund. Wenn man das Wild gefangen oder getödtet hat, muß man es dem Gränznachbar melden, ihm auch den Ort und den Schweiß, allwo es über die Gränze gegangen ist, zeigen. Dann

kann man es mitnehmen; nach Jägergebrauch gehört dann demjenigen, in dessen Revier es gefangen wurde, ein Braten davon. Wer die Folge nicht hat, der muß da, wo das Wild über die Grenze gieng, die Färthe und den Schweiß verbreichen, und dem Gränznachbar anzeigen, der es sodann selbst sucht, und dem, auf dessen Revier es angeschossen worden, einen Braten von dem gefundenen Wilde abzugeben hat. Ein gleiches findet statt, wenn die Hunde ein angeschossenes Wild in ein fremdes Revier verfolgt, und es bereits gefangen haben, ehe die Meldung geschehen konnte. Der Landesherr hat allezeit die Folge in die Reviere der Vasallen, aber kein Vasall in die landesherrlichen Reviere. Bey der Parforcejagd, *Sau = ingl.* *Haasenhaze*, kann man die Hunde von Verfolgung des einmal angenommenen Wildes nicht abhalten; man meldet es daher eben.

ebenfalls, übrigens wird eben so damit verfahren, wie mit der Folge eines angeschossenen Wildes.

Nachhängen heißt so viel, als einem Hirsche mit dem Leithunde nachsuchen.

Nachlassen heißt, dem Leithunde das Hängeseil etwas länger, und ihm dadurch mehr Freiheit lassen, dem Wilde nachzuspüren.

Nachspüren s. Spüren.

Nachstellen heißt, ein Holz mit dem Zeuge umstellen, damit das Wild, wenn es vom Felde zu Holze gehet, nicht in dasselbe gehen könne; sondern in ein anderes gehen muß.

Nachtgarn ist eben so viel als **Nachtnetz**.

Nachtigall, ein Singvogel aus der Gattung der Sänger — *Sylvia* — und daher — *Sylvia Luscinia*, gemeine Nachtigall u. s. oben unter **Grasmücke**.

Nachtnetz, **Nachtgarn**, **Perchennetz**, **Streichnetz** ist ein, zum Perchenstreichen bey Nacht, eingerichtetes Netz, 12 bis 18 Ellen lang, und 30 bis 36 Ellen breit. Es wird folgender gestalt gestrickt: Man fängt mit einer Masche an, und giebt so lange auf beyden Seiten zu, bis es die gehörige Länge hat. Dann nimmt man auf einer Seite

ab, und giebt auf der andern eine halbe Masche zu, bis es auch die verlangte Breite hat. Dann nimmt man von beyden Seiten ab, damit das angefangene Dreieck beendet werde, und das Netz mit einer Masche wieder aufhöre, wie es angefangen worden. Nun ziehet man es, um ihm die gehörigen vier Ecken zu geben. Die Maschen dürfen nicht zu klein seyn, damit man die getödteten Perchen durchziehen könne. An jeder der kurzen Seite wird eine lange Stange befestiget, und dann verfahren, wie bey dem Worte **Perchenstreichen** Nr. 1. gesagt worden.

Nachtreihher — *A. Nycticorax* — gehört zur Gattung Reiher unter den Sumpfvögeln als eine besondere Art, und heißt auch grauer und schwarzer Reiher, Focke, Nachtrabe, Schildreihher, Quadreihher, Nachtram, bunter Reiher, aschgrauer Reiher mit drey Nackensehern, Schildreger und Focker. Er gehört in die Familie B. der dickhalsigen Reiher, deren Schnabel kürzer, die obere Kinnlade kränzenartig gebauet und herabgebogen ist; kürzere, stämmigere und nicht hoch über der Ferse nackte Füße, so wie ein dicker mit langen Halsfedern versehener Hals, dessen Hinterseite sehr breit wollenartig bedeckt ist. Ihre Nahrung besteht mehr aus Insekten und Würmern als aus Fischen. Die Kennzeichen dieser Art bestehen in folgendem:
Der

Der Federbusch besteht aus
 reyn horizontalliegenden
 heißen feinen Federn; der
 Scheitel und Ober Rücken
 ist schwarz mit Glanze,
 und diese Farben sind am
 ersten im Genick spitz-
 winklicht zulaufend. An
 Größe gleicht dieser Reiher einer
 Nebelkrähe und unterscheidet sich
 von andern Reiherarten durch
 den stärkern Kopf, dickern Schna-
 bel und kürzern fettern Hals.
 Die Länge ist ein Fuß acht Zoll,
 wovon der Schnabel drey Zoll
 und der Schwanz vier Zoll weg-
 nimmt; die Breite drey Fuß
 wey Zoll; die gefalteten Flü-
 gel reichen bis zur Schwanz-
 spitze; der Schnabel ist stark,
 etwas zusammengebrückt, zuge-
 spitzt, schwarz, an der Wurzel
 gelblich; der Augenstern rothgelb;
 die vorn geschilderten und über
 den Zehen neßförmigen Füße
 gelblichgrün; die Nägel schwarz-
 lich; die Fußwurzel drey Zoll
 hoch; die Stirn und ein Strich
 über den Augen sind weiß; die
 Bügel und der Augenkreis roth
 und grünlich; der Scheitel mit
 einem bis ins Genick spitzig zu-
 laufenden Winkel schwarz grün-
 glänzend; am Hintertheile des
 Kopfes liegen drey sehr schmale
 weiße, (meist) an der Spitze
 schwarze, sechs bis neun Zoll
 lange Federn horizontal hin, und
 bilden einen schönen Federbusch;
 das Genick und die Seiten des
 Halses sind aschgrau; der Ober-
 rücken mit den langen und brei-
 ten Schulterfedern schwarzgrün
 (stahlgrün) glänzend; der Unter-
 rücken nebst den mittelmäßigen

Steiffedern, den Flügeln und
 dem Schwanze blaß aschgrau,
 die Flügelränder weiß; die Wan-
 gen, Kehle, der Hals, die Brust
 und die Schenkel weiß; der
 Bauch und die langen Afterse-
 dern gelblich. Das Weibchen
 dieses Vogels, worunter man
 gewöhnlich die jungen Vögel,
 die unter den Namen: grauer
 Reiher, *Ardea grisea*, auch
 wohl als eine besondere Art be-
 kannt sind, beschreibt, weicht
 wenig vom Männchen ab, wenn
 es sein gehöriges Alter erreicht
 hat. Es hat nur an den schwar-
 zen Theilen, nicht den hohen stahl-
 grünen Glanz, welchen das Männ-
 chen hat, es sind alle Theile
 blaß schwarz mit wenigem Schil-
 ler; der ganze Hals ist weiß,
 und nur im Nacken ein sehr
 schwacher aschgrauer Anflug; der
 ganze Unterleib rein weiß; der
 aus drey langen Federn beste-
 hende weiße Federbusch, wie beym
 Männchen, s. Uebers. von La-
 thams allgem. Uebers. a. a. D.
 Taf. 79b. Der schon oben er-
 wähnte so genannte graue Rei-
 her, *Ardea grisea* Gmelin
 Lin. 1. c. ist nach neuern Er-
 fahrungen, der junge Nachtrei-
 her im ersten, auch wohl beym
 Weibchen noch im zweyten Jah-
 re. Der Schnabel ist schwarz-
 lich an den Seiten grünlich;
 die Füße sind dunkelbraun mit
 grünem Anstriche; der Federbusch
 fehlt, doch erheben sich die dick-
 sten Scheitelfedern wulstig; der
 Kopf ist bis in den Nacken
 schwarzbraun grünglänzend; über
 die Augen ein weißer braunge-
 fleckter Strich; die Bügel blaß
 fleisch-

fleischfarben; der Oberleib dunkel aschgrau ins grünliche schillernd; der Steiß grau; das Kinn weiß; die Seiten des Halses rötlich grau mit blaß rostgelben Streifen; der Vorderhals und die Brust gelblichweiß mit graubraunen Streifen; der übrige Unterleib grau weiß, an den Seiten mit grauen Strichen; die Deckfedern der Flügel wie der Rücken, die obersten kleinen mit schönen rostgelben dreieckigen Flecken, die untern großen mit weißen Spizen; die Schwungfedern aschgrau, die vordern achtzehn bis ein und zwanzig mit weißen Spizen; die Schwanzfedern aschgrau, die äußern weiß gerändert. Ob gleich dieser Vogel dem gemeinen Reiher in der Gestalt nicht ähnlich ist, so ist er es doch im Fluge, wo er auch den Hals nicht ausstreckt, sondern wie jener zusammengelegt trägt. Er hält sich mehr auf dem Boden, als auf den Bäumen auf. Des Nachts läßt er ein starkes und unangenehmes Rabengeschrey, Coak! hören, woher er eben seinen Namen hat. Man trifft ihn in ganz Europa, nur nicht in den nördlichsten Gegenden an, in Asien ist er besonders in den nördlichen Gegenden an Flüssen und Seen häufig, auch findet man ihn im nördlichen Amerika. In Ungarn nistet er häufig. Wo in Deutschland Seen und Flüsse mit Sümpfen und Morästen sind, da ist er im Sommer einzeln, im August aber auf seinem Striche zahlreicher anzutreffen, alsdann sieht

man ihn auch auf den sumpfigen Teichufern. Er ist ein Zugvogel, der uns im September verläßt, und zu Anfange des Aprils wieder da ist. Seine Nahrung besteht aus Fischen, Fröschen und andern Amphibien, aus Insecten und Würmern. Er lebt in Monogamie, wie alle Reiherarten, und nistet auf freyen Wiesen, an Morästen, im hohen Grase und unter Gesträuch. Er legt drey bis vier bläulichweiße Eyer. Sonst gab man vor, daß er auf Bäume niste, wie der gemeine Reiher. Es stoßen mehrere Raubvögel nach ihnen. Er läßt sich leichter hinterschleichen als der gemeine Reiher. Sein Nutzen und Schaden ergibt sich hauptsächlich aus der Nahrung. Das Fleisch ist unschmackhaft, und da man in Deutschland fast keinen Nutzen für uns von ihnen zu nehmen weiß, so ist in manchen Gegenden das Sprichwort gebräuchlich: Du bist ein loser Focke, an dem nur drey gute Federn sind. Die drey langen weißen Federn dienen zu kostbaren Federbüschen, und sind in der Türkei zum Putz der Turbane sehr theuer.

Nachtschwalbe, — *Caprimulgus europaeus* — Europäische Nachtschwalbe, große Nachtschwalbe, Tageschläfer, Tageschlaf, Tageschlap, Tageschlaffe, Kuhfänger, Ziegenmelker, Ziegenfänger, gemeiner Geismelker, Milchfänger, Kinde melker, Geismelker, Nacht-

Nachtvogel, Nachtschatten, härdige Schwalbe, Nachtschade, Nachtwanderer, Nachtrabe, Nachtrabl, Nachtrählein, Mückenstecher, Pfaffen und Hexe macht nach Linne in der Singvögelordnung nach Latham unter den schwalbenartigen Vögeln eine eigene Gattung unter dem Rahmen Tagsschläfer oder Nachtschwalbe — Caprimulgus — aus, welche folgende Kennzeichen hat. Der Schnabel klein, spizig, etwas gekrümmt an der Wurzel niedergedrückt; die Mündöffnung sehr weit, mit langen Hartborsten besetzt; die Zunge ganz und spizig; an den Füßen die Seitenzähe mit der mittlern durch eine Haut verbunden; die Krallen der mittlern breit gerandet ober weißkammförmig. Sie ernähren sich und leben wie die Schwalben; nur daß sie in der Dämmerung ausfliegen und meistens nach Nachtfaltern und solchen Insekten schnappen, welche des Abends herum schwärmen. Unsere europäische Nachtschwalbe unterscheidet sich von den übrigen Arten durch folgende Kennzeichen: die Nasenlöcher sind etwas röhrig, der Schwanz ist aschgraulich mit dunkelbraunen Querverbinden, und schwarzen und andern Flecken; der Körper schwarz, aschgrau, dunkelbraun, rostfarben und weiß gefleckt. Sie gleicht an Gestalt dem Auk, nur ist sie kleiner und hat einen Schwalbenschabel. Dieser ist nämlich nur vier Linien

lang, dünn, platt, vorn etwas übergekrümmt, und öffnet sich bis weit hinter den Augen; die Ränder der obern Kinnlade sind mit dicken, steifen, schwarzen Borsten besetzt, und die Nasenlöcher sind trichterförmig erhaben. Die Länge ist zehn und drey Viertel Zoll; die Breite einen Fuß neun Zoll; der Schwanz hat nur zehn Federn und mißt fünf und einen Viertel Zoll und die Flügel bedecken ihn fast ganz. Der Kopf ist groß; die Augen sind groß und blau; die Füße sind, wie Taubenfüße, niedrig und fleischbraun, die Fußwurzel fünf Linien hoch und vorn herab etwas besiedert; die mittlere Zehe sehr lang und inwendig mit kammförmigen Schuppen versehen. Das Gefieder läßt sich nicht wohl beschreiben. Die Grundfarbe ist bey nahe schwarz, aber außerordentlich schön mit Aschgrau, dunkelbraun, rostroth, rostgelb und weiß auf verschiedene Art gestrichelt, bespritzt, in die Quere und Länge gestreift und gefleckt. Das Männchen hat einen eyrunden weißen Fleck an den innern Fahnen der drey ersten Schwungfedern und einen andern an den Endspitzen der zwey äußersten Schwangfedern, und sein Gefieder ist überhaupt lebhafter als am Weibchen. Es ist ein Nachtvogel, der in der Dämmerung des Morgens und Abends seinen Geschäften nachgeht, so lange es nicht äußerst finster ist; die übrige Zeit pflegt er der Ruhe. Daher gleichen seine Augen und Ohren diesen Theilen bey

Ihr Wohnort ist an den Meeresküsten, auch auf nördlichen Landseen; auf ihrem Zuge in Deutschland an Flüssen, Seen und Teichen sind sie oft in Menge, auch mitten im Winter, wo ihrer viele Hungers sterben. Die Nahrung besteht in Insekten, Fischen und schwimmendem Aas. Das Nest findet man an Ufern mit 2 bis 3 grünlichen, braungefleckten Eiern. Sie hat auch die Nahmen: Wintermeve, Tarro, weiße Meve, Hasmeve, dreypfingerige, Schwedische, Isländische Meve, Seefäher, Seeschwalbe, Fischarmeve. 6) Sturmmeye, *L. procellosus*, Bechst. — Der Schnabel ist stark gekrümmt, unten mit einer sehr deutlichen Hervorragung, von Farbe gelblich; die Füße mit einer deutlichen Hinterzehen; der Oberleib aschgrau; der Unterleib weiß; 16½ Zoll lang. Sie variiert in der Farbe: a) Der Schnabel gelb mit schwarzer Spitze; der Oberleib mit bräunlichen Federn vermischt; die Schwanzspitze dunkelbraun (Herbstvogel). *Nauann*, a. a. O. b). Der Schnabel gelbgrün; der Oberleib wie aschgrau, hinter den Ohren ein dunkler Fleck (vollkommener Vogel). Ihr Wohnort sind die nordischen Meere und Seen — im Herbst an der Ost- und Nordsee und im Spätherbst zieht sie durch Deutschland, und wenn im Winter in den letzten Tagen des Janners starker stürmischer Wetter einfällt, so kommt sie oft in Menge auf

die Teiche und Flüsse, entweder aus dem Norden verschlagen, oder aus Süden auf dem Rückzuge hierher geworfen; es sterben dann viele Hungers. Die Nahrung sind Insekten, Fische, Aas. Sie hat auch die Nahmen: Aschgrau, graue, große graue, und nordische Meve, Sturm-vogel, Stromvogel, grönländische Seeschwalbe. Es scheint dieß kein anderer Vogel, als *Larus cinerarius*, Linn. zu seyn. Unter diesem Nahmen kommt er auch bey den meisten Schriftstellern nebenbey mit vor. 7) Weißschwinge Meve, *L. glaucus*, Gmelin Linn. Der Schnabel dick, merklich gekrümmt, und unten mit einer starken Hervorragung, von Farbe gelb, mit einem orangefarbenen Fleck am Ende; die Füße vierzehig; der Mantel hellaschgrau; das übrige Gefieder, Schwingen und Schwanz weiß, 29 Zoll lang. Sie variiert in der Farbe, denn am jungen Vogel ist nur die Spizenhälfte der Schwungfedern weiß, das Uebrige ist entweder schwarz oder dunkelbraun; gewöhnlich aber laufen sie bey alten nur nach der Wurzelhälfte grau aus. Sie hat zum Wohnort den Norden von Europa — im Herbst an der Nord und Ostsee; einzeln auf deutschen Seen. Ihre Nahrung besteht in Fischen, Seefischn von Wallfischen und Robben und jungen Vögeln. Ihr Nest ist im Norden auf Klippen mit 3 grünlichen Eiern, die 6 bis 8 unregelmäßige, schwarze Flecken haben. Man hat ihr noch die Nahmen: Bürgermeier, Her,

ter, grauliche Meve, große Seemeve, große nordische und weiße Meve, Tauchermeye gegeben. 7) Mit einer Wachshaut. 8) Struntmeve, *L. parasiticus*, Linn.: Der Schnabel kurz, stark gekrümmt, unten und oben eine deutliche Hervorragung; die zwey mittelsten Schwanzfedern länger; Männchen oben schwärzlich, unten weiß, mit einem schwarzen Scheitel und aschblaulichem Band über die Brust; Weibchen ganz braun, die untere Seite am hellsten, 20 Zoll lang. Die Jungen sehen dem Weibchen ähnlich; das Band am Unterhalse ist undeutlich und bräunlich aschgrau; der Oberleib dunkelbraun mit röthlich weißen Federkanten; der Bauch weiß mit graubraunen Querstreifen. Sie wählt sich zum Wohnort zuweilen die Küsten und Inseln der Ostsee — auf dem Strich im Herbst sieht man sie selten. Ihre Nahrung besteht in Fischen, die sie vorzüglich andern Meven und Meerschwalben abjagt. Man findet das Nest auf Hügeln mit 2 aschgrauen, schwarzgeleckten Eiern. Sie hat auch die Namen: Struntjäger, Strantjäger, Schmarogermeve, Mövenbüttel, Polarmöve, Polmöve, Arktische Möve, Scheißfalte, Nordvogel.

Milane — Milvi — nennt man die zweyte Familie von Raubvögeln in der Falkengattung, s. Adler, welche mit schwarzem, an der Wurzel gera-

den Schnabel, kurzen unter den so genannten Knieen etwas befiederten Füßen, oder Fußwurzeln und einem gabelsförmigen Schwanz versehen sind. Dazunter gehören: 1) Der rothe Milan — *Falco Milvus* — gemeine Milan, Weyhe, Milane, gemeine, bunte Weyhe, Mülane, Gabelweyhe, Königsweyhe, Hühnergeyer, Weichfalte, Gabelschwanz, Gabler, Gabelgeyer, Scheerschwänzel, Schwalbenschwanz, Hühnerdieb, Stoßvogel, röthliche Weyhe, rother Milan, Steingeyer, Stoßgeyer, Hühneraar, Hauahr, Weichmilane, Mittelweyhe, Wy, Wuz, Turvy, Schwimmer und Grimmer. Als Kennzeichen der Art sind bekannt: Die Wachshaut ist gelb; die halb befiederten kurzen Füße sind auch gelb; der Schwanz ist scheerenförmig und rostfarben. Die Länge dieses bekannten Raubvogels beträgt zwey Fuß drey Zoll, wovon der Schnabel ein und einen halben Zoll und der Schwanz einen Fuß wegnimmt; die Breite ist fünf Fuß zwey Zoll; die Flügelspitzen reichen bis auf das Ende des Schwanzes. Das Männchen ist fast um ein Viertel kleiner. Der Schnabel ist von der Wurzel bis zur Mitte gerade, an der Spitze aber sehr gekrümmt, mit wenig ausgebogenem Zahn, die Wachshaut, so wie der Rachen und die ganze hintere Hälfte des Schna-

Schnabel gelb, die vordere schwarz; der Augenstern strohgelb; der Augenliederrand gelb; die kurzen halbbefiederten Füße zwey Zoll hoch, und mit den langen Zehen gelb; die scharfen, wenig gekrümmten Nägel schwarz. Der kleine Kopf ist weiß, an den Seiten klar schwarzbraun gestrichelt, in der Mitte des Scheitels aber rothbraun gefleckt und schwarzbraun gestrichelt; der Hals rostfarben, jede Feder in der Mitte mit einem schwarzen Fleck und einer gelblichweißen Spitze; der Rücken rostbraun, schwarzbraun gefleckt; der Rüssel rostbraun, an den Deckfedern des Schwanzes hellrostfarbig auslaufend; die Kehle weiß, klar schwarz gestrichelt; der übrige Unterleib dunkelrostfarbig, schwarzbraun gestreift und gelblichweiß gefleckt; der After und der Schenkel hellrostfarbig; die vordern Deckfedern der Flügel schwarzbraun mit rostfarbigen Spitzen, die hintern hellrostfarben und schwarzbraun gefleckt; die fünf vordern scharf zugespitzten Schwungfedern bis auf die weiße Wurzel und Spitze schwarz, die sechs folgenden rostfarbig, dunkelbraun bandirt, und an den Spitzen und der inwendigen Fahne röthlichweiß eingefasst, die neun folgenden dunkelbraun mit schwarzbraunen unbedeutlichen Bändern und weißlichen Spitzen, die letztern hellrostfarbig mit unvollkommenen Querbändern; der lange Schwanz stark gabelförmig und blaß rostfarbig; die längern Seitenfedern von der Mitte an schwarzbraun auslaufend, die übrigen vor dem

Ende mit einer unvollkommenen schwarzbraunen Querbände, dergleichen Flecken auf der Mitte des Schaftes herab und weißliche Spitzen; die Deckfedern der Unterflügel rostbraun und schwarz gefleckt; die Unterschwinger am Anfange schwarz, in der Mitte weiß und einzeln dunkelbraun bandirt, am Ende aschgrau mit dergleichen Wellenlinien; der Unterschwanz röthlichweiß, an den Spitzen schwarzbraun bandirt. Der ganze Leib ist dicht mit Dunen besetzt. Das Weibchen ist nicht so merklich größer, wie bey andern Raubvögeln, hat auch dieselbe Farbe, außer daß der Kopf weißer, oder hellaschgrau, die mittlern Schwungfedern mehr aschgrau als weiß, und der Unterleib mehr getiegt ist. Man findet Milane, die einen fast ganz gelblichweißen Kopf haben; andere sind mehr rostbraun, als rostfarbig; bey noch andern zieht sich die Rostfarbe etwas ins Dunkelbraune, und bey den Jungen ist die Rostfarbe stark mit Weiß gemischt. Der Flug dieser Vögel, wobey die langen Flügel oben am Rande herum bogenförmig erscheinen, ist schwimmend und außerordentlich schön; besonders zur Zeit der Paarung, wo Männchen und Weibchen hoch und tief in der Luft die schönsten Schwenkungen gegen einander machen. Wenn sie sich setzen, so lieben sie mehr die Steine und Erdklöße, als die Bäume. Sie schreyen hoch und dumpf Ouh! So munter und beherzt sind sie nicht, wie andere Raub-

Raubvögel, die ihnen in der Größe gleichen. Dieser Vogel ist über die ganze alte Welt verbreitet, und in Deutschland gemein. Er liebt vorzüglich die in der Nähe der Felder liegenden Vorberge, besonders wenn sie auf einer Seite kahl und auf der andern mit Holz bewachsen sind. Wo die Gegenb so ist, da trifft man in einem kleinen Bezirke viele Paare an, die hier horsten. Wenn die Winter gelinde sind, so sieht man ihn den ganzen Winter durch in Deutschland. Im October aber scheint er aus den nördlichen Gegenden zu ziehen, denn alsdann trifft man ihn in Sachsen häufig in den Feldern an. Einheimische gehen zu Ende des Octobers, von Kälte und Schnee gebrungen, weg, sind aber im März wieder da. Ihre Nahrung besteht in Maulwürfen, Feldmäusen, Fröschen, Schlangen, Ratten, Blindschleichen, Eydecksen, Regenwürmern, Schnecken, Insekten und Aas, in jungen Gänsen, Trut- und Haushühnern, Enten, Rebhühnern, Lerchen auch jungen Hasen. Vorzüglich stößt er auch nach den Wasserhühnern, wo er sehr viele Junge wegfängt. Man sagt auch, er stoße auf Fische, allein dieß habe ich selbst noch niemals bemerkt. So viel ist gegründet, daß er die abgestandnen Fische von der Oberfläche des Wassers wegnimmt. Der Horst steht auf alten Eichen, Buchen, Fichten und Tannen, und ist aus Reisern, Moos, Stroh, Heu, und Wolle verfertigt. Er enthält gewöhnlich drey

weiße mit blaßgelben und röthlichbraunen Flecken auch Punkten und Strichelchen hin und wieder bezeichnete Eyer, die in drey Wochen ausgebrütet werden. Die Jungen machen im Neste ein gräßliches Geschrey und man kann sie leicht entdecken. Alte Vögel machen des Jahrs zwey Gehefte. Mehrere Falkenarten verfolgen sie und jagen ihnen den Raub ab, dieß thun sogar die Rabenkrähen und Kollkraben. Auf ihnen findet man Läuse, und in ihnen Bandwürmer, Spulwürmer und Egelwürmer. Man schießt sie sowohl im Fluge, als durch Anschleichen, wenn sie sitzen. Sie sind nicht so scheu, als andere Raubvögel. Man schießt sie auch beym Aas und auf der Krähenhütte, und baizt sie mit Falken. Ihr Fang geschieht auch, wie bey obigen Raubvögeln, in Haarschleifen auf dem Bocke und Sattel. Wenn man eine kleine eiserne Tellerfalle, wie man sie vor die Hausmäuse hat, nimmt, und einen Maulwurf darauf bindet, so kann man sie da, wo sie herum fliegen, leicht fangen. Sie gehen dann eher auf eine solche Falle, worauf ein Maulwurf befestigt ist, als auf eine andere, wo man eine Lerche oder Wachtel aufgebunden hat. Bey der Vogelbeizt läßt man Falken auf sie los, und sie gewähren ein herrliches Schauspiel. Sie vertilgen viele schädliche Säugethiere, Amphibien und Insekten. In Aegypten werden sie deshalb gehegt, In der Nähe der
Woh-

Wohnungen werden sie dadurch, daß sie besonders zu der Zeit, wenn sie Junge haben, mehr junge Gänse, Enten und Küschelchen wegholen, schädlich. allein in der freien Natur stiften sie wahren Nutzen. Sie scheinen daher für uns gleich nützlich und gleich schädlich zu seyn. 2) Schwarzer Milan, *F. ater*: Mit schwarzbraunem Oberleibe, und nur etwas gabelförmigem, schmal schwarzgestreiftem Schwanz, 21 Zoll lang. Er wählt seinen Wohnort in großen Ebenen, die mit Holzungen umgebene Wasser haben und zieht weg und nährt sich wie der Vorhergehende. Man giebt ihm auch die Namen: Schwarzer Hühnerweyhe, schwarzer Falke, schwarzer Milan, schwarzer Gabelweyhe, Mäuseaar, Mäusefalle und brauner Waldgeyer. 3) Brauner Milan, *F. austriacus*, Gmelin Linné, heißt auch braune Weyhe, brauner Hühnerweyhe, brauner Geyer und österreichischer Milan. Die Hauptfarbe kastanienbraun; der Schwanz braun und gabelförmig mit schwärzlichen Binden. Ungefähr die Größe des rothen Milans. Vielleicht ist es bloß ein junger rother Milan. Denn Herr Becker in Darmstadt erhielt aus Salzburg einen braunen Milan, der mit der Beschreibung vollkommen übereinstraf, und es war doch weiter nichts als ein rother Milan. Er hält sich am häufigsten in den Oesterreichischen Wäldern auf

und nährt sich ebenfalls von Mäusen und Vögeln.

Mitjagd, Mitjagen, ist das Jagdrecht des Landesherrn, in den Jagdgehegen der Vasallen die Jagd zugleich mit auszuüben und von der Gesammtjagd der Vasallen untereinander verschieden.

Mittelschnepfe, *Scolapax major*, Lin. und Scol. Media, Frisch — ist einer von den Vögeln, die zu manchen Verwirrungen Anlaß gegeben haben. Die Jäger geben dieser Schnepfe den Namen Pfuhlschnepfe, und in den Büchern wird daher gesagt, daß diese Schnepfe die *Scolapax limosa* sey. Allein wenn man nachher Gestalt, Farbe und Lebensart vergleicht, so ergiebt sich, daß nicht von der im System genannten Pfuhlschnepfe, die sehr selten nach Deutschland kommt, die Rede seyn kann, sondern von dieser hier beschriebenen, weit gewöhnlicheren Mittelschnepfe. Selbst Herr Bechstein ist lange auch der Meinung gewesen, bis er sich durch den Augenschein und die Vergleichung vom Gegentheile völlig überzeugt hat. Die eigentliche Pfuhlschnepfe, wovon es die gemeine *Scolapax Angotephala* und kleine *Scol. limosa* giebt, und die gar kenntlich dadurch werden, daß sie einen kürzern Schnabel haben, kennen die Jäger gewöhnlich nicht. Unsere Schnepfe hat noch folgende Namen in Büchern und gemeinen

nen Leben: Gemeine Pfuhschnepfe, Puhlschnepfe, Sumpfschnepfe, Doppelschnepfe, große Pfuhschnepfe, Moosschnepfe, Wasserterschnepfe, Riebschnepfe, Moorschnepfe, große und langbeinige Schnepfe, größere Bruchschnepfe, große Sibirische Schnepfe und Sticup. Als Kennzeichen der Art sind anzusehen: Der Schnabel ist lang, vorn kolbig und ausgehöhlt punktirt; der Oberkopf durch drey rostgelbe und zwey schwarzbraune Längsstreifen getheilt; der Bauch mit graubraunen Wellenlinien; die Füße grünlichgelb. Man hat schon oben bemerkt, daß diese Schnepfe seither ist erkannt worden, und zwar um deswillen hauptsächlich, weil sie mit der Heerschnepfe so große Aehnlichkeit hat; denn von dieser ist sie bloß durch die Größe, den kürzern Schnabel und den gewellten Bauch verschieden. Sie steht in Rücksicht der Größe zwischen der Wald- und Heerschnepfe gerade in der Mitte, und ist etwas größer als eine Lachtaube oder gerade so groß als das Weibchen der Streitschnepfe; die Länge ist 10 Zoll, die des Schwanzes $1\frac{1}{2}$ Zoll, die Breite aber 18—20 Zoll; die Flügel legen sich fast am Ende des Schwanzes zusammen und das Gewicht ist sechzehn Loth. Der Schnabel ist fast zwey Zoll lang, gerade, vorne kolbig und hohl, punktirt, zwey Drittheil von der Wurzel an gelblich, das übrige

dunkelbraun; der Augenstern kastanienbraun; die Schienbeine sind ein und drey Viertel Zoll hoch und mit den getrennten Zehen grünlichgelb, auch dunkelolivengrün (vielleicht bloß in Kabinetten schwarz, wie sie gewöhnlich angegeben werden). Der Kopf schmal, an den Seiten weiß, und schwärzlich punktirt; mitten über den Kopf läuft ein rostgelber Längsstreif bis in Nacken; zu beyden Seiten desselben zwey breitere schwarzbraune hellbraun punktirte, die über der Stirn schmal sind und zusammen laufen, in der Mitte aber breiter werden und sich erst im Nacken wieder zuspitzen; unter jedem schwarzbraunen Streifen geht über die Augen hin wieder ein rostgelber und vom Schnabel bis zu den Augen wieder ein schmalerer schwarzbrauner; so daß im Gesicht vorn vier schwarzbraune und drey rostgelbe Streifen erscheinen; die Kehle ist fast wie die Seiten des Kopfs graubraun und weißlich punktirt; der Hals und die Oberbrust gelblich und schwarzbraun melirt und gewellt; die Deckfedern der Flügel, der Rücken und die Schulterfedern dunkelbraun, hellbraun in die Quere gestreift und gefleckt, letztere auch mit einigen der Länge nach laufenden rostgelben Streifen; der übrige Unterleib gräulich weiß mit vielen graubraunen, an den Seiten schwarzbraunen Wellenlinien; die Schenkelfedern grau, schwarz melirt; die Schwungfedern dunkelbraun, die erste mit einem weißen Schaft, die hintern mit weißen Säumen; die

Unterflügel, wie die Seiten, weiß mit schwarzbraunen Querbänden; die Schwanzfedern an der Wurzel schwarz, die äußerste weiß, die folgende rostbraun mit einigen schwarzen Querbänden, die mittelste einfarbig rostbraun. Das Weibchen ist wenig verschieden, nur scheint es etwas heller an Farbe zu seyn. Sehr alte Vögel haben auch wohl ganz schwarze Streifen auf dem Kopfe; dieß ist aber selten. Diese Schnepfe ist, wie alle Arten dieser Gattung, ein scheuer Vogel, doch fliegt sie schwerer als die Heerschnepfe und auch gerade aus, so daß sie leichter geschossen werden kann; sie liegt auch fester. Ich habe sie noch nie einen Ton von sich geben hören. Man trifft sie in England, Deutschland, Sibirien und Nordamerika an. Sie brütet auch in Deutschland. Sie liebt Sümpfe und Brüche, doch im Ganzen die Rasse nicht so sehr, wie die folgende Heerschnepfe. Sie ist ein Zugvogel, der im Anfange des Augusts, wo sie nicht in Deutschland nistet, aus den nördlichen Gegenden ankommt. Sie fällt alsdann in nasse Wiesen, wo das Grummet nicht zu kurz und nicht zu lang ist, sonst auf feuchte Riede, die Sümpfe und wasserhaltende Vertiefungen haben, auch an die feuchten See- und Flußufer. Ja man findet sie auch auf trocknen Wiesen. Wenn der erste Frost kommt, so sieht man keine mehr. Im April ist der Wiederzug, wo sie sich aber nicht aufhalten, sondern nur durchwandern. Die Nah-

rung ist, wie bey allen Schnepfenarten, Gewürme, Insekten und Gras- und Sumpfwurzeln. Im Herbst werden sie oft so fett, daß sie kaum aufstehen können, und wenn sie vom Schusse herabfallen, plagen. Sie brütet in den mit Sträuchen besetzten Brüchen und Sümpfen, macht das Nest auf einen trocknen Winsenhügel, oder in eine vom Wasser ausgespülte Erdböhle. Es besteht bloß aus Grasshalmen und etlichen Federn. Die drei bis fünf Eier, welche in drei Wochen ausgebrütet werden, sind olivenfarben mit dunkelbraunen großen und kleinen Flecken, die zuweilen rostgelbe Ränder haben, besetzt. Die Jungen laufen gleich mit der Mutter davon. Da sie sehr früh streichen, so machen sie nur ein Gehecke. Sie hat dieselben Feinde wie andere Schnepfen. Sie gehören zur niedern Jagd und werden ebenfalls wie die Heerschnepfe gefangen und geschossen. Hauptsächlich schießt man sie vor dem Hühnerhunde und zwar wie die Heer- und Haarschnepfen, mit Schrot Nr. 7, auch späterhin, wenn sie recht fett sind, mit Dinst. Sie gewähren unter allem Schnepfenschießen das meiste Vergnügen, da sie dem Hunde gut halten, außerordentlich fest liegen, gerade aus und nicht so schnell, wie die Heerschnepfen fliegen, und nach einer kurzen Entfernung wieder einfallen. Sie hat eine starke Witterung und der Hund nimmt sie daher gut und gern an. Von dem zehnten August bis zum zehnten Sep-

September streichen sie in gewöhnlichen Jahren jam stärksten. Anfangs sind sie mager, sie werden aber bald sehr fett, und liegen dann immer fester. Das Wildpret ist sehr delikates. Im September ist es in denjenigen Gegenden, wo sie ihren Strich und gute Nahrung haben, ein wahrer Fettklumpen.

Monchen nennet man die

nach jungen Geweihe der Hirsche. s. Hirsche.

Monchente, Anas Monacha — ist wahrscheinlich eine Spielart der gemeinen zahmen Ente — An. Boschas domestica — nur etwas größer. Der Schnabel ist gelblich, mit schwarzem Nagel, der Körper schwarz und weißbunt; der Spiegel grau und violett glänzend.

N.

Nachbinden folgt auf das Vorbinden, dieses besteht darin, daß bey der Stellung des Zeuges bey einem Hauptjagen die obern und untern Leinen der Tücher an Hefel oder Bäume angebunden werden, und Nachbinden, wo die Leinen an dem andern Ende des Tuches wieder angebunden werden.

Nacheil, Nachfolge, Folge, Jagdfolge ist das, entweder durch Vergleich oder Verjährung, erlangte Recht, ein, auf eigenem Reviere angeschossenes Wild in ein fremdes zu verfolgen. Wenn es über die Grenze gehet, wird die Färthe und der Schweiß verbrochen, dann ziehet man weiter nach und löset den Hund. Wenn man das Wild gefangen oder getödtet hat, muß man es dem Gränznachbar melden, ihm auch den Ort und den Schweiß, allwo es über die Gränze gegangen ist, zeigen. Dann

kann man es mitnehmen; nach Sägergebrauch gehört dann demjenigen, in dessen Revier es gefangen wurde, ein Braten davon. Wer die Folge nicht hat, der muß da, wo das Wild über die Grenze gieng, die Färthe und den Schweiß verbreichen, und dem Gränznachbar anzeigen, der es sodann selbst suchet, und dem, auf dessen Revier es angeschossen worden, einen Braten von dem gefundenen Wilde abzugeben hat. Ein gleiches findet statt, wenn die Hunde ein angeschossenes Wild in ein fremdes Revier verfolgt, und es bereits gefangen haben, ehe die Meldung geschehen konnte. Der Landesherr hat allezeit die Folge in die Reviere der Vasallen, aber kein Vasall in die landesherrlichen Reviere. Bey der Parforcejagd, Eau: ingl. Haasenhaze, kann man die Hunde von Verfolgung des einmal angenommenen Wildes nicht abhalten; man meldet es daher eben-

ebenfalls, übrigens wird eben so damit verfahren, wie mit der Folge eines angeschossenen Wildes.

Nachhängen heißt so viel, als einem Hirsche mit dem Leithunde nachsuchen.

Nachlassen heißt, dem Leithunde das Hängefeil etwas länger, und ihm dadurch mehr Freiheit lassen, dem Wilde nachzuspüren.

Nachspüren s. Spüren.

Nachstellen heißt, ein Holz mit dem Zeuge umstellen, damit das Wild, wenn es vom Felde zu Holze gehet, nicht in dasselbe gehen könne; sondern in ein anderes gehen muß.

Nachtgarn ist eben so viel als **Nachtneß**.

Nachtigall, ein Singvogel aus der Gattung der Sängler — *Sylvia* — und daher — *Sylvia Luscinia*, gemeine Nachtigall w. s. oben unter **Grasmücke**.

Nachtneß, **Nachtgarn**, **Perchenneß**, **Streichneß** ist ein, zum Perchenstreichen bey Nacht, eingerichtetes Neß, 12 bis 18 Ellen lang, und 30 bis 36 Ellen breit. Es wird folgender gestalt gestrickt: Man fängt mit einer Masche an, und giebt so lange auf beyden Seiten zu, bis es die gehörige Länge hat. Dann nimmt man auf einer Seite

ab, und giebt auf der andern eine halbe Masche zu, bis es auch die verlangte Breite hat. Dann nimmt man von beyden Seiten ab, damit das angefangene Dreieck beendiget werde, und das Neß mit einer Masche wieder aufhöre, wie es angefangen worden. Nun ziehet man es, um ihm die gehörigen vier Ecken zu geben. Die Maschen dürfen nicht zu klein seyn, damit man die getödteten Lerchen durchziehen könne. An jeder der kurzen Seite wird eine lange Stange befestiget, und dann verfahren, wie bey dem Worte **Perchenstreichen** Nr. 1. gesagt worden.

Nachtreihher — *A. Nycticorax* — gehört zur Gattung Reiher unter den Sumpfvögeln als eine besondere Art, und heißt auch grauer und schwarzer Reiher, Focke, Nachtrabe, Schildreihher, Quadreihher, Nachtram, bunter Reiher, aschgrauer Reiher mit drey Nackensehern, Schildreger und Focker. Er gehört in die Familie B. der dickhälsigen Reiher, deren Schnabel kürzer, die obere Kinnlade kränzenartig gebauet und herabgebogen ist; kürzere, stämmigere und nicht hoch über der Ferse nackte Füße, so wie ein dicker mit langen Halsfedern versehener Hals, dessen Hinterseite sehr breit wollenartig bedeckt ist. Ihre Nahrung besteht mehr aus Insekten und Würmern als aus Fischen. Die Kennzeichen dieser Art bestehen in folgendem: Der

Der Federbusch besteht aus drey horizontalliegenden weißen feinen Federn; der Scheitel und Ober Rücken ist schwarz mit Glanze, und diese Farben sind am ersten im Genick spitzwinklicht zulaufend. An Größe gleicht dieser Reiher einer Nebelkrähe und unterscheidet sich von andern Reiherarten durch den stärkern Kopf, dickern Schnabel und kürzern fettern Hals. Die Länge ist ein Fuß acht Zoll, wovon der Schnabel drey Zoll und der Schwanz vier Zoll wegnimmt; die Breite drey Fuß zwey Zoll; die gefalteten Flügel reichen bis zur Schwanzspitze; der Schnabel ist stark, etwas zusammengebrückt, zugespitzt, schwarz, an der Wurzel gelblich; der Augenstern rothgelb; die vorn geschilderten und über den Zehen neßförmigen Füße gelblichgrün; die Nägel schwarzlich; die Fußwurzel drey Zoll hoch; die Stirn und ein Strich über den Augen sind weiß; die Zügel und der Augenkreis nackt und grünlich; der Scheitel mit einem bis ins Genick spitzig zulaufenden Winkel schwarz grünglänzend; am Hintertheile des Kopfes liegen drey sehr schmale weiße, (meist) an der Spitze schwarze, sechs bis neun Zoll lange Federn horizontal hin, und bilden einen schönen Federbusch; das Genick und die Seiten des Halses sind aschgrau; der Ober Rücken mit den langen und breiten Schulterfedern schwarzgrün (stahlgrün) glänzend; der Unter Rücken nebst den mittelmäßigen

Steiffedern, den Flügeln und dem Schwanz blaß aschgrau, die Flügelränder weiß; die Wangen, Kehle, der Hals, die Brust und die Schenkel weiß; der Bauch und die langen Austerfedern gelblich. Das Weibchen dieses Vogels, worunter man gewöhnlich die jungen Vögel, die unter dem Namen: grauer Reiher, *Ardea grisea*, auch wohl als eine besondere Art bekannt sind, beschreibt, weicht wenig vom Männchen ab, wenn es sein gehöriges Alter erreicht hat. Es hat nur an den schwarzen Theilen, nicht den hohen stahlgrünen Glanz, welchen das Männchen hat, es sind alle Theile blaß schwarz mit wenigem Schiller; der ganze Hals ist weiß, und nur im Nacken ein sehr schwacher aschgrauer Anflug; der ganze Unterleib rein weiß; der aus drey langen Federn bestehende weiße Federbusch, wie bey dem Männchen, s. Uebers. von Lathams allgem. Uebers. a. a. D. Taf. 79b. Der schon oben erwähnte so genannte graue Reiher, *Ardea grisea* Gmelin Lin. 1. c. ist nach neuern Erfahrungen, der junge Nachtreiher im ersten, auch wohl bey dem Weibchen noch im zweyten Jahre. Der Schnabel ist schwarzlich an den Seiten grünlich; die Füße sind dunkelbraun mit grünem Anstriche; der Federbusch fehlt, doch erheben sich die dicken Scheitelfedern wulstig; der Kopf ist bis in den Nacken schwarzbraun grünglänzend; über die Augen ein weißer braungefleckter Strich; die Zügel blaß fleisch-

fleischfarben; der Oberleib dunkel-
 schlaggrau ins grünliche schil-
 lernd; der Steiß grau; das Kinn
 weiß; die Seiten des Halses
 röthlich grau mit blaß rostgel-
 ben Streifen; der Vorderhals
 und die Brust gelblichweiß mit
 graubraunen Streifen; der übrige
 Unterleib grau weiß, an den
 Seiten mit grauen Strichen; die
 Deckfedern der Flügel wie
 der Rücken, die obersten kleinen
 mit schönen rostgelben dreiecki-
 gen Flecken, die untern großen
 mit weißen Spizen; die Schwung-
 federn aschgrau, die vordern acht-
 zehn bis ein und zwanzig mit
 weißen Spizen; die Schwanz-
 federn aschgrau, die äußern weiß
 gerändert. Ob gleich dieser Vo-
 gel dem gemeinen Reiher in der
 Gestalt nicht ähnlich ist, so ist
 er es doch im Fluge, wo er
 auch den Hals nicht ausstreckt,
 sondern wie jener zusammenge-
 legt trägt. Er hält sich mehr
 auf dem Boden, als auf den
 Bäumen auf. Des Nachts läßt
 er ein starkes und unangeneh-
 mes Rabengeschrey, Coak! hö-
 ren, woher er eben seinen Na-
 men hat. Man trifft ihn in
 ganz Europa, nur nicht in
 den nördlichsten Gegenden an,
 in Asien ist er besonders in
 den nördlichen Gegenden an Flüs-
 sen und Seen häufig, auch fin-
 det man ihn im nördlichen
 Amerika. In Ungarn nistet
 er häufig. Wo in Deutschland
 Seen und Flüsse mit Sümpfen
 und Morästen sind, da ist er
 im Sommer einzeln, im August
 aber auf seinem Striche zahl-
 reicher anzutreffen, alsdann sieht

man ihn auch auf den sumpfi-
 gen Teichufern. Er ist ein Zug-
 vogel, der uns im September
 verläßt, und zu Anfange des
 Aprils wieder da ist. Seine
 Nahrung besteht aus Fischen,
 Fröschen und andern Amphibien,
 aus Insecten und Würmern.
 Er lebt in Monogamie, wie alle
 Reiherarten, und nistet auf freyen
 Wiesen, an Morästen, im ho-
 hen Grase und unter Gesträuch.
 Er legt drey bis vier bläulich-
 weiße Eyer. Sonst gab man
 vor, daß er auf Bäume niste,
 wie der gemeine Reiher. Es
 stoßen mehrere Raubvögel nach
 ihnen. Er läßt sich leichter hin-
 terschleichen als der gemeine
 Reiher. Sein Nutzen und
 Schaden ergiebt sich hauptsächlich
 aus der Nahrung. Das
 Fleisch ist unschmackhaft, und
 da man in Deutschland fast kei-
 nen Nutzen für uns von ihnen
 zu nehmen weiß, so ist in man-
 chen Gegenden das Sprichwort
 gebräuchlich: Du bist ein lo-
 ser Focke, an dem nur drey
 gute Federn sind. Die drey
 langen weißen Federn die-
 nen zu kostbaren Federbüscheln,
 und sind in der Türkei zum Putz
 der Turbane sehr theuer.

Nachtschwalbe, — *Caprimulgus europaeus* — Eu-
 ropäische Nachtschwalbe,
 große Nachtschwalbe, Tag-
 schläfer, Tagsschlaf, Tag-
 schlaf, Tagsschlaf, Ruh-
 sauger, Ziegenmelker, Zie-
 gensauger, gemeiner Weis-
 melker, Milchsauger, Kin-
 dermelker, Weis melker,
 Nacht-

Nachtvogel, Nachtschatten, hârdige Schwalbe, Nachtschade, Nachtwanderer, Nachtrabe, Nachtrabl, Nachtrâblein, Mückenstecher, Pfaffen und Here macht nach Linne in der Singvögelordnung nach Latham unter den schwalbenartigen Vögeln eine eigene Gattung unter dem Rahmen Tagsschlâfer oder Nachtschwalbe — *Caprimulgus* — aus, welche folgende Kennzeichen hat. Der Schnabel klein, spizig, etwas gekrümmt an der Wurzel niedergedrückt; die Mündöffnung sehr weit, mit langen Hartborsten besetzt; die Zunge ganz und spizig; an den Füßen die Seitenzähne mit der mittlern durch eine Haut verbunden; die Krallen der mittlern breit gerandet oder weisflammsförmig. Sie ernähren sich und leben wie die Schwalben; nur daß sie in der Dämmerung ausfliegen und meistens nach Nachtfaltern und solchen Insekten schnappen, welche des Abends herum schwärmen. Unsere europäische Nachtschwalbe unterscheidet sich von den übrigen Arten durch folgende Kennzeichen: die Nasenlöcher sind etwas röhrig, der Schwanz ist aschgraulich mit dunkelbraunen Querbinden, und schwarzen und andern Flecken; der Körper schwarz, aschgrau, dunkelbraun, rostfarben und weiß gefleckt. Sie gleicht an Gestalt dem Kuckuck, nur ist sie kleiner und hat einen Schwalbenschnabel. Dieser ist nämlich nur vier Linien

lang, dünn, platt, vorn etwas übergekrümmt, und öffnet sich bis weit hinter den Augen; die Ränder der obern Kinnlade sind mit dicken, steifen, schwarzen Borsten besetzt, und die Nasenlöcher sind trichterförmig erhaben. Die Länge ist zehn und drey Viertel Zoll; die Breite einen Fuß neun Zoll; der Schwanz hat nur zehn Federn und mißt fünf und einen Viertel Zoll und die Flügel bedecken ihn fast ganz. Der Kopf ist groß; die Augen sind groß und blau; die Füße sind, wie Taubenfüße, niedrig und fleischbraun, die Fußwurzel fünf Linien hoch und vorn herab etwas besiedert; die mittlere Zehe sehr lang und inwendig mit kammsförmigen Schuppen versehen. Das Gefieder läßt sich nicht wohl beschreiben. Die Grundfarbe ist beynähe schwarz, aber ausserordentlich schön mit Aschgrau, dunkelbraun, rostroth, rostgelb und weiß auf verschiedene Art gestrichelt, besprizt, in die Quere und Länge gestreift und gefleckt. Das Männchen hat einen eyrunden weißen Fleck an den innern Fahnen der drey ersten Schwungfedern und einen andern an den Endspitzen der zwey äußersten Schwangfedern, und sein Gefieder ist überhaupt lebhafter als am Weibchen. Es ist ein Nachtvogel, der in der Dämmerung des Morgens und Abends seinen Geschäften nachgeht, so lange es nicht äußerst finster ist; die übrige Zeit pflegt er der Ruhe. Daher gleichen seine Augen und Ohren diesen Theilen bey

bey der Nachteule. Er mußte nämlich deswegen so weite Ohren erhalten, damit ihm am Tage das geringste Geräusch aufwecke, und er entfliehen könne. Und dieß geschieht denn auch; denn so bald man sich ihm nähert, so fliegt er auf, niedrig an der Erde weg, und setzt sich bald wieder. Er fliegt wankend, wegen seines feinen weichen Gefieders so leise, aber schneller als die Eulen. Auf einem Baume sieht man ihn selten sitzen, lieber setzt er sich auf alte Baumstrünke, auf Erdhügel und in glatte ebene Wege und Gänge. Im Fluge und des Nachts läßt er ein Castagnattenartiges anhaltendes Geklapper oder eigentlich Schnurren, *Trrrrr, Urrrrr!* hören, das der gemeine Mann sonst für Unglück bedeutend erklärte, und das man in schönen May- und Juniusabenden im Thüringer Walde allenthalben hört, und wovon das *Trrrr* höher als das *Urrrr* klingt. Wo ihrer mehrere sitzen, so wechseln sie gleichsam mit diesem schnurrenden Gesange, und einer löst den andern ab, welches keine unangenehme Musik in einsamen Wäldern giebt. In der Angst aber, und wenn er aufgejagt wird, schreyt er hohl: *Bäää, Bäää, Bäää!* und zur Zeit der Begattung *I, I, Arr!* Wenn er schnurrt, so setzt er sich auf einen dürren Baumzweig mit dem Kopfe zur Erde gebückt, und zwar sitzt er nicht, wie andere Vögel, in die Quere des Astes, sondern nach der Länge desselben. Sie lebt in Europa,

auch in Asien, besonders in Sibirien, und, wie man sagt, auch in Afrika und Ostindien. In Europa hält sie sich in Wäldern, besonders in gebirgigen auf, in Sibirien soll sie auch auf offenen Plätzen zu finden seyn, wo sie Felsen und hohe Dämme zum Schutz hat. Herr Bechstein hat sie meist in gebirgigen Waldungen und zwar auf der Mittagsseite in leeren Haidenplätzen angetroffen. Sie kommt als Zugvogel wegen ihrer Nahrung erst zu Anfange des Mayes an, und geht zu Anfange des Septembers wieder weg. Die Nahrung besteht in fliegenden Insekten, als Maykäfern, Roßkäfern, Nacht- und Abendfaltern, Hasen, Schnaken u. s. w. Er geht ihr in der Abend- und Morgendämmerung und bey Mondenschein nach, und sucht sie nicht nur in Wäldern auf, sondern fliegt auch in die Felder und vorzüglich über den Schilfteichen herum. Da er bey trüber Witterung in Waldgegenden auch zuweilen auf die Höfe und nach den Viehställen fliegt, so ist die Fabel entstanden, daß er den Ziegen und Kühen die Milch aussaugt. Er fliegt auch seiner Nahrung halber über den Viehhorden herum. Man findet kein Nest, sondern im Junius und Julius legen sie in einer kleinen Vertiefung auf der bloßen Erde, auch wohl in einer Felsenritze zwey schmutzige, aschgrau und hellbraun marmorirte Eyer, die in 14 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen sehen bis zum Mausern fast

fast wie ein Wendehals aus. Die Feinde dieses Vogels sind Füchse, Marder, Iltisse, Wiesel u. c., die ihre Brut zerstören; und zuweilen die Alten am Tage im Schlafe erschleichen. Da die Farbe dieses Vogels der Erdfarbe gleicht, so sieht man ihn nicht leicht sitzen, sondern jagt ihn wegen seines leisen Gehörs, wenn er auch schläft, gewöhnlich auf. Man muß alsdann bemerken, wo er sich wieder niedersetzt und ihn mit Dunst erlegen; eben so kann man ihn auch des Abends vor den Hölzern und über den Teichen und Flüssen schwebend im Kluge schießen. Das Fleisch der Nachtschwalbe hat einen angenehmen Geschmack und sie ist auch ein vorzüglicher Vertilger der Maykäfer und derjenigen Nacht- und Dämmerungsfalter, welche den Forsten schädlich sind. Nur ist es Schade, daß man in Deutschland diesen Vogel nicht häufiger antrifft.

Nachtstelken heißt, wenn des Nachts mit Tuch- oder Federlappen vor einem Holze hergestellt wird, damit das Wildpret, welches des Abends daselbst herausgezogen ist, nicht wieder hinein kann, sondern in ein anderes verlangtes Holz laufen muß.

Nachtvogel nennet man überhaupt alle Vögel, die bey Nacht thätiger sind und ihre Stimme mehr hören lassen, als am Tage. Insbesondere aber

führt das Käuzchen diesen Namen, s. Eule.

Näschlein, Näßlein heißt bey der Hirschjätthe, wenn die Hinterschaale in die rechte Vorderschaale tritt, und etwas vom Erdboden, wie ein Blättchen, in die Höhe zwinget.

Näßen sagt man vom Rehe, wenn es sein Wasser läßt.

Nase nennen die Jäger den Geruch des Hundes, und wenn er die Jätthe leicht findet und gehörig verfolgt, sagen sie der Hund hat eine gute Nase.

Nebelkrähe, *Corvus Corvix* — Krähe, Kräge, Holzkrähe, Asikrähe, Naskrähe, Winterkrähe, gemeine Krähe, Schildkrähe; Sattelkrähe, bunte und graue Krähe, graubunte Krähe, Mantelkrähe, grauer Krabe, grauer Krährabe, Mehkrabe, Graurücken, Kranveitl, Nabelkraye und Winterkrähe. Sie gehört mit dem Kollkraben in eine Gattung als besondere Art, deren Kennzeichen sind: Sie ist hellaschgrau; Kopf, Kehle, Flügel und Schwanz schwarz. Sie ist etwas größer und stärker als die Saatkrähe, sonst ihr in Gestalt und Lebensart sehr ähnlich. Ihre Länge ist ein Fuß acht Zoll; die Breite drey Fuß; der Schnabel etwas über zwey Zoll lang; der Schwanz sieben Zoll; die Flügel bis fast ans Ende des Leptern reichend. Der Schnabel

bel ist stark, vorn herunterwärts gebogen und schwarz; der Augenstern graulich; die Füße schwarz; die geschilderte Fußwurzel zwey Zoll hoch. Kopf, Kehle, Gurgel, Flügel und der zugerundete Schwanz sind schwarz, mit violettem und grünem Widerschein; die Farbe der übrigen Theile ist hellaschgrau, bey jüngern Vögeln dunkler, bey alten heller. Das Weibchen ist etwas kleiner, und die schwarze Farbe läuft nicht weit nach der Brust zu. Varietäten: 1) Die weiße Nebelkrähe. Entweder ganz weiß, oder da, wo sie schwarz seyn sollte, aschgrau, und an den aschgrauen Theilen weiß. 2) Die bunte Nebelkrähe. Schwarz, weiß und graubunt; est mit schwarzbraunem Kopfe, aschgrauen Flügeln und Schwanz und einem weißen Rumpfe. 3) Die Nebelkrähe mit grauem Kopfe. 4) Die Nebelkrähe mit einem dreyeckigen grauen Flecke auf dem Rücken — sonst schwarz. 5) Die Nebelkrähe mit dem Halsbande. Vom Genick an läuft um die Brust herum ein aschgraues Halsband, wie ein Kragen; sonst schwarz. 6) Die schwarze Nebelkrähe. Entweder ganz schwarz, oder da, wo die graue Farbe seyn sollte, etwas heller, zuweilen rufarben. In der Lebensart und den Sitten ist die Nebelkrähe der Rabenkrähe gleich; doch scheint sie nicht so scheu und furchtsam zu seyn. Sie hat eine unangenehme heifere Stimme und ihr Groat, Groat; muß ihr sehr

sauer werden, weil sie dabey mit Kopf und Hals eine gar tiefe ängstliche Verbeugung macht. Man trifft sie in ganz Europa und im nördlichen Asien an. In Deutschland ist sie in den nördlichen Gegenden den Sommer über häufiger, als in den mittlern und südlichen. Des Sommers über leben sie in ebenen Gegenden in Felshölzern und Gärten, die ans Feld stoßen; in andern Gegenden sollen sie auch das mittlere Gebirge bewohnen. Sie sind Zieh- Strich- und Standvögel zugleich; erstere beydes da, wo sie nicht hinlängliche Nahrung zu finden glauben, und in Menge wohnen, letzteres, wo jenes beydes nicht statt hat. Zu Anfang des Octobers kommen sie aus den nördlichen Gegenden in großen Schaa- ren in Thüringen an, und verlassen es im März wieder. Sie ziehen entweder allein, oder in Gesellschaft der Rabenkrähen und Dohlen. In einem Bezirke von etlichen Stunden zerstreuet sich im Winter eine Heerde auf die Felder und Landstraßen, und sammelt sich alle Abend in der Dämmerung entweder in einem Garten auf etlichen großen Bäumen, oder in Städten und Dörfern, auf den Schließern, Kir- chen oder Dächern großer und hoher Häuser. Wenn die Kälte groß ist, kommen sie auch un- gescheut in die Städte und Dör- fer, und laufen in den Gassen und in den Höfen herum. Hier suchen sie Knochen, Kartoffeln, Ueberreste von Kraut und Rü- ben, Kuh- und Pferdemiß auf, fress-

fressen mit den Schweinen, wissen die Gartlücken: Wirthshaus- und Schloßhöfe, wo immer aus den Küchen etwas für sie herausgeworfen wird, sehr gut zu finden, zupfen die Aehren, die auf den Dorfern aus den Scheunen unter dem Dache hervorragen, ab, fressen überhaupt alles, wovon sich Menschen und Thiere nähren, und sind die gefräßigsten und unfehllichsten unter allen Vögeln ihrer Gattung. Die übrige Jahreszeit gehen sie dem Pfluge nach, und lesen die schädlichen Insekten, Larven und Gewürme auf, welche ausgeackert werden. Die Raupen, Heuschrecken, Frösche, Mäuse, Muscheln und Schnecken haben an ihnen Feinde, aber auch die jungen Fische, jungen Hühner, Enten, Fasanen, Rebhühner, Wacheln, Lerchen und andere junge Vögel, und die Eier, woraus sie entstehen. Im Herbst gehen sie auch die Weinbeeren, Birnen und Wallnüsse an, fassen letztere zwischen die Füße und hacken sie mit ihrem starken Schnabel auf. Nas und abgestandene oder erdorne Fische sind ihre Lieblingegerichte. Der Saat thun sie eben keinen beträchtlichen Schaden, ob sie gleich die unter der Erde erweichten Körner von aller Art zuweilen nicht verachten. Sie verfolgen die Falken und Wephen, um ihnen ihren Raub abzujaßen, oder das Uebriggelassene zu bekommen. Sie jagen auf schwachverwundete Vögel und müde gehetzte Haasen, ja fallen einen von letztern wohl selbst in Gesellschaft von allen

Seiten an, so daß er nicht weiß wohin er laufen soll, und sich ergeben muß. Sie nisten gern in lebendigen Hölzern, auch in Gärten, gewöhnlich des Jahres zweymal. Ihr Nest steht nicht allemal hoch auf Obst- und Waldbäumen, ist aus kleinen Zweigen und Reisern fest zusammengebaut, und inwendig mit Wolle und Haaren ausgefüttert. Es steht einzeln, und die eine baut hier, die andere dorthin. Vier bis sechs längliche, hellgrüne, mit feinen braunen Strichen und Flecken versehene Eier liegen in demselben, die achtzehn Tage gebrütet werden. Die Alten schleppen ihren Jungen im May und Junius zuweilen kleine junge Hühner und Enten ins Nest, und versorgen sie reichlich mit Gewürmen, Mäusen, Fischen, Muscheln und Schnecken. Wo sie an Flüßen, Seen und Meeren wohnen, sind sie daher immer am Ufer, und suchen für sich und ihre Jungen Nahrung. Wenn die Jungen ausgeflogen sind, so halten sie sich noch einige Zeit auf dem Felde zu den Alten, und lassen sich so lange füttern, als diese es nur immer thun wollen; die von der ersten Brut aber werden immer eher sich selbst überlassen, als die von der zweiten. Es giebt Paare, die mehrere Jahre hinter einander nichts als weiße Jungen ausbrüten, welche man gern als Seltenheiten aufzieht und zum Aus- und Einfliegen gewöhnt. Sie haben eben die Feinde, wie die Rabenkrähe; und die verschiedenen Arten des Fanges und der

Erst,

Erlegung, so wie der Nutzen und Schaden sind, wie bey eben detselben.

Nest, Vogelnest, ist ein Gewebe, das die Vögel von Reifern, Moos, Bast, Gras, Laub, Stroh oder Erde verfertigen, und mit Federn, Haaren, Wolle, Moos u. ausfüttern und gebrauchen, um ihre Eyer hinein zu legen, die Jungen darinnen auszubrüten, und aufzufüttern. Ein solches Nest bauet jeder Vogel nach seiner Art, im Frühjahr. Ein Vogelnest. Die Nester der Raubvögel nennet man Horste.

Nestling nennen die Falkeniere, einen, jung aus dem Neste genommenen, Raubvogel, um ihn zur Baike abzurichten. Ein solcher Nestling wird nie so schön, stark, rasch und fähig, als ein, von seinen Eltern in der Freyheit erzogener Vogel, oder Wildfang, den man erst fängt, wenn er bereits abgestrichen ist. Wer einen Nestling erziehen will, muß ihn nicht eher aus dem Horste nehmen, bis ihm wenigstens der Schwanz oder die Hälfte der Decke gewachsen ist, er auch vollkommene, ob schon weiche und kurze Federn hat. Einen solchen sperrt man in ein Gemach, das weder zu kalt noch zu warm ist, und wo er die Luft und die Sonne genießen kann; hier giebt man ihm täglich frisches Fleisch von Tauben und Vögeln, welches nicht über einen Tag alt seyn darf; so muß man ihm 9 Monat abwarten, aber nicht überladen.

Nach Verfluß dieser Zeit kann man ihn zum Aufsitzen gewöhnen, welches man ihm erst auf Stangen und Nesten lernet. Dann gewöhnet man ihn die Haube zu tragen, und zwar durch Wachen, wodurch er zahm und kirre wird. In der Folge nimmt man ihn mit aufs Feld und gewöhnet ihn aufs Luder und zur Baike. S. Habicht.

Netz, Garn ist ein Gestrickte von hanfenen Leinchen, stärkern oder schwächern Bindfaden, oder Zwirn, mit weiten, oder engen Maschen gemacht, um darinnen allerley wilde Thiere, Vögel oder auch Fische zu fangen. So hat man Hirsch-Sauhaasennetze, Dachehauben, Rebhühnerzeug, Tyraße, Schneehauben, Stecknetze, Nachtnetze, Klebeneze, Vogelwände, und viel andere Arten von Netzen mehr, die an gehörigen Orten beschrieben sind. Damit die Netze sich weder zu weit ausdehnen, noch zu enge zusammen ziehen, muß man sie oft auf einem großen Plaze ausbreiten, und mit Lohwasser besprengen und wieder ordentlich abtrocknen lassen. Um sie lange Zeit gut zu erhalten, muß man sie im Sommer besonders bey großer Hitze, niemals über eine Nacht unabgetrocknet im Wasser liegen lassen, weil sie sonst verstocken; wenn es hingegen kühl ist, oder im Winter, wenn es nur nicht gefriert, kann man sie zwei Nächte und einen Tag, im Wasser liegen lassen, dann aber muß man sie an keine Wand, sondern mit-

ten

ten im Behältniße auf Stangen oder Leinen aufhängen, um sie für den Mäusen und Vorköcken zu verwahren. Vorher aber müssen sie nach jedesmaligem Gebrauche durchgesehen, und, wenn es nöthig, ausgebessert werden. Die Netze für Federwildpret färbt man grün braun, oder gelb. Grün, indem man grünes Korn zu Saft stößt, das Garn damit bestreicht, und es nebst dem Saft 24 Stunden in eine Wanne thut. Braun, durch Gerberlohe, oder die Rinde von Rußbaumwurzeln, die man zerhackt, eine Stunde im Wasser kochen läßt, und sodann das Netz 24 Stunden lang hineinlegt. Gelb, dadurch, daß man das Netz naß gemacht, stark mit Schöllkraut, wie mit Seife reibt, und eintrocknen läßt.

Netzjagd, Netzjagen, ist eine, schon seit sehr langen Zeiten übliche Art zu jagen, und geschieht mit Netzen, ohne Lächer. Erstlich spüret man das Wildpret, durch Suchen mit dem Leithunde auf dem Reife oder Thauschlage, Schnee, weichen Wegen ic., greift ihm vor, und freißt es ein. Sodann bindet man die Netze, dem Winde entgegen an, führet sie von beyden Flügeln ab, und stellet sie rund umher zu, doch so, daß die Forsteln an der inwendigen Seite der Netze, nach dem Jagen zu, stehen, damit sie abfallen und fangen können. Hierauf stellet man einige Netze auf einen Quersflügel durch, damit die Jagd zwey Abtheilungen bekomme,

In deren einer man sodann die Hunde löset, und zum Jagen antreibt, da denn das, was flüchtig wird, in die Netze läuft, und entweder lebendig gefangen, oder mit dem Genickfange abgefangen wird. Nachher wird der Quersflügel umgeforstelt und auch die andere Abtheilung abgejaget. Sodann aber die Hunde angeluppelt, das Wild aufgebrochen, und die Netze aufgehoben. So verfährt man bey Hirsch-Sau-Netz- und Hasenjagden, mit denen, zu jeder dieser Wildpretarten gehörigen, Netzen. Nur mit dem Unterschiede, daß man die großen fährt und die kleinen trägt. Bey letztern stellet man die Netze so viel als möglich fangisch, damit sie abfallen, und das Wildpret verwickeln. Nach der Anzahl der Dindige können in einem Walde mehr oder weniger Stallungen angebracht werden, in welchem man nun etwas spüret, die umstellt man, und fängt das darinnen befindliche Wildpret. Die Netze müssen mit ihren Schlagleinen in gleicher Linie gestellt werden.

Neues, sagt der Jäger, wenn ein neuer Schnee gefallen ist, so daß die alten Fährten und Spuren alle ausgefüllt und verschwunden sind; dergleichen auch, wenn der alte Schnee durch Thauwetter geebnet und alles neu ist, und frisch gespüht werden kann.

Neunböcker — oder Würger — Lanius — macht in der Ordnung der krähenartigen Vögel eine aus mehreren Arten bestehende

stehende Gattung aus, mit geradem Schnabel, an der Seite sehr gedrückt, an der Spitze hakenförmig und vor derselben mit einem zurücktretenden Winkel; die Nasenlöcher sind mit Borstensefbern bedeckt; die Zunge ist gespalten. Diese Gattung macht einen Uebergang auf der einen Seite zu den Raubvögeln und auf der andern zu den Singvögeln. Unter den verschiedenen Arten sind bey uns folgende einheimisch: 1) Gemeiner Neuntöbter oder Bürger — L. Excubitor — Kriekelster, Bergelster, großer grauer Bürger, aschfarbiger Bürger, großer blauer Bürger, großer Europäischer Neuntöbter, aschfarbiger Neuntöbter, größter Neuntöbter, Bürgengel, Wackengel, Gebüschfalke, Buschfalke, wilde Elster, Speralster, Griegelalster, wachsender Bürgvogel, grauer großer Aterfalke, Buschelster, Strauchelster, Kruckelster, Krauselster, Wildelster, Wächter, Thornkräcker, Thornkräser, Walathee, Neunmörder, Wildwald, blaulicher Ottervogel, Warvogel, großer Dornbreher, Wan-Krengel, War-Krengel, Bürgengel, Walbherr und Walbheher. Die Kennzeichen der Art sind: Der Schwanz ist lang, keilförmig, an den Seiten weiß; der Rücken aschgrau, an der Stirn ins weißliche übergehend; die Flügel sind schwarz mit

zwey weißen Flecken. Er übertrifft an Größe noch eine Rothdrossel. Die Länge ist acht Zoll, wovon der Schnabel acht Linien und der keilförmige Schwanz vier Zoll wegnimmt; die Breite einen Fuß ein und einen halben Zoll; die Flügel bedecken nur den dritten Theil des Schwanzes. Der Schnabel ist an den Seiten sehr gedrückt, mit scharfen Haken und Zahn, an Farbe schwarz, an der Wurzel des Unterkiefers gelblich weiß; die erundten Nasenlöcher sind mit Borstenhaaren bedeckt; der Augenstern schwarzbraun; die Füße und Klauen bleifarben schwarz; die geschilderte Fußwurzel einen Zoll hoch. Der ganze Oberleib ist schön hellaschblau, an den Steißsefbern, über den Augen, an der Stirn und den Schultern ins weißliche übergehend: von den Nasenlöchern läuft durch die Augen ein starker schwarzer Streifen, der sich von den weißen Wangen herabsenkt und hier als an seinem Ende, am stärksten ist; die untere Seite vom Schnabel bis zum Schwanz ist weiß, an der Brust ein wenig ins röthliche spielend und grauulich gewässert; die Decksefbern der Flügel schwarz, die an den Gelenken der Flügel aschgrau; die Schwungsefbern schwarz, an der Wurzel fast bis zur Hälfte herein weiß, die fünf letztern ausgenommen, und mit weißlichen Spizen, die fünf erstern ausgenommen, welche nur schmale röthlichweiße Ranten haben. Hieraus entstehen zwey weiße Flecken auf den Flügeln, der eine an

an der Spitze, der andere an der Wurzel der Schwungfedern. Der keilförmige Schwanz hat in der Mitte vier schwarze Federn, die nur weiße Wurzeln und Spitzen haben, an den übrigen achten zur Seite wird die weiße Wurzel und Spitze immer breiter, so daß auf der äußersten auf jeder Seite das Schwarze so weit verschwunden ist, daß man es nur auf der Mitte des Schaftes noch sieht. Das Weibchen ist heller auf dem Rücken, und an der Brust mit deutlichen halbkreisförmigen blaßbraunen Linien bezeichnet, und etwas schmutziger. Beide Geschlechter sind sich fast in der Größe gleich. Varietäten: 1) Der weiße gemeine Würger. Entweder ganz reinweiß, oder gelblichweiß mit durchschimmernder Hauptfarbe. 2) Der bunte gemeine Würger. Er hat unregelmäßig weiße Flecken an verschiedenen Theilen des Körpers. Hätte dieser Würger die starken muskulösen Beine, scharfen Klauen und den schnellen Flug anderer Raubvögel, so würde er wegen seiner Herzhaftigkeit den kleinen Vögeln sehr fürchtbar seyn. Eben durch diesen Muth und seine Unerbrockenheit hat er sich auch bey den größten Raubvögeln in Ansehen gesetzt. Er jagd daher den stärksten Falken, wenn er sich seinem Reviere nähert, weg, sein Nahrungsneid treibt ihn sogar an, die kleinern Vögel durch ein gewisses scharfes Geschrey: Trui, Trui! von der Gegenseit eines Habichts, Sperbers

und Falken zu ihrer Rettung zu benachrichtigen, und er hat dieser Eigenschaften halber den Namen Wächter erhalten. Seines Fluges und Schwanzes wegen heißt er auch: Bergelster. Er fliegt nämlich nicht weit, gerade, schräge, oder in einerley Höhe, sondern kurz, beständig abwechselnd, und schnell auf und niederwärts schwankend, fast wie ein Specht; und wer auf den Flug der Vögel zu achten gewohnt ist, der kann ihn von weitem, ohne seine Farbe zu sehen, erkennen. Oft sieht man ihn auch, wie einen Raubvogel in der Luft auf einem Plaze flatternd, wenn er unter sich eine Beute bemerkt, nach welcher ihm gelüftet, die aber noch nicht zum Fangen bequem genug ist. Bewundernswürdig ist es, daß die kleinen Vögel, dessen Feind er ist, nicht vor ihm, wie vor andern Raubvögeln fliehen; denn wäre dieß, so würde ihm nie einer seiner schwachen Füße und seines langsamen Fluges halber zu Theil werden. Wie weise ist nicht alles in der Natur eingerichtet! Er läßt sich leicht, sowohl als jung zähmen und zu Lustjagden auf Vögel abrichten. Sein Vaterland ist ganz Europa und das nördliche Amerika. In Deutschland ist er sehr gemein, und unter seinen Gattungsverwandten der einzige Standvogel, der, für Kälte und Nahrungsorgen geschützt, Sommer und Winter bey uns bleibt. Zur Zeit seiner Fortpflanzung lebt er in den Gärten, Vorhölzern und auf den einzelnen Bäumen, die in

in den angrenzenden, freyen Gegenden stehen. Von der Mausezeit bis zu Anfange des Winters zieht er mit seiner Familie in dem Umkreis von einer bis zwey Stunden herum; alsdann aber trennt sich diese häusliche Gesellschaft und jedes Glied derselben sucht einzeln im freyen Felde, oft nahe bey den Dörfern, sich einen Platz aus, wo es den Winter über seine Nahrung finden kann. Doch sind dieß allemal Gegenden, die mit Bäumen oder Sträuchern bewachsen sind, auf deren Gipfel sie sich setzen, und oft stundenlang nach einer Gegend hinsehen, um etwas zur Stillung ihres Hungers zu entdecken. Im Sommer nährt er sich meist von Käfern, Feld- und Maulwurfsgrillen, Blindschleichen, Eydachsen, nur dann von Mäusen und kleinen Vögeln, wenn er jene Thiere der Bitterung halber nicht haben kann. Im Winter aber fängt er Goldammern, Reifige, Stieglitz, Mäuse, Maulwürfe ic. Wenn er Junge hat, so muß er immer über den Feldern und Wiesen herumflattern um Nahrungsmittel zu erhalten, zu andern Zeiten aber sitzt er ruhig auf einem Feldbaume oder Strauche und lauert obigen Thieren auf. Er fängt mit dem Schnabel, und wenn die Maus zu groß ist, um sie bequem im Schnabel zu tragen, so wechselt er in der Luft mit Schnabel und Fängen ab, welches einen artigen Anblick gewähret. Er nimmt auch in Schlingen gefangene größere Vögel aus, und ist im Winter so

breust auf Rebhüner und Wachholderdrosseln zu fallen, muß aber gewöhnlich unverrichteter Sache wieder wegfliegen. Er horstet auf hohen einzeln stehenden Bäumen, besonders gern auf Obstdäumen in Feldern, die nicht weit von Hölzern stehen. Der Horst ist groß und wird aus Heidekraut, Reifern, Grashalmen, Wolle und Haaren zusammengeflochten. Er enthält fünf bis sieben weißgrauliche mit bläßen, olivengrünen und aschgrauen, großen und kleinen Flecken überall bestreute Eyer, welche in vierzehn Tagen ausgebrütet werden. Oft macht er des Jahrs zwey Gehecke. Die Jungen sind am Oberleibe schmutziggaschgrau und am Bauche schmutzigweiß und graugewellt. Sie werden vorzüglich mit Mist-May-Kauf- und andern Käferarten und mit Heuschrecken aufgezogen. Mit den Raben und krähenartigen Vögeln lebt er immer im Streite, und wenn er einen Falken oder Sperber zu lange neckt, so bedienen sich auch wohl diese ihrer Stärke und würgen ihn. Man muß sie mit dem Schießgewehr erschleichen, denn sie sind sehr scheu. Wenn man im Winter und Frühjahr einen kleinen Vogel, in der Gegend, wo sie sich aufhalten, auf einen Busch bindet, und Leimruthen neben ihn herumlegt, so fängt man ihn leicht. Eben so fängt man ihn, wenn man das Geschrey eines Vogels in einem Käfig hören läßt und diesen mit Leimruthen belegt. Ein künstlicher Fang ist, einen kleinen Vogel an

an einen Käfig in eine Steige zu setzen, welche so aufgestellt ist, daß sie, wenn er in dieselbe auf das Stellschloß kommt, über ihn zuschlägt. Daß die Fänge dieser und der folgenden drey Würgerarten von der Obrigkeit den Jägern, als von schädlichen Vögeln, ausgelöst werden, stammt wohl noch von der alten Fabel her, daß der Neuntöbter alle Tage neun Vögel tödten müßte. Es sind in der That nützliche Vögel, und wenn auch dieser, zuweilen einen kleinen Vogel fängt, was schadet denn das im Ganzen, da er dafür auch schädliche Mäuse und Insekten verzehrt? Vorzüglich gern halten sich diese, so wie alle Würgerarten, in solchen Gegenden auf, wo das Vieh Nacht und Tag auf der Weide in eingeschränkten Plätzen bleibt. Hier giebt es eine solche Menge Käfer und Insekten, die den Vögeln und dem Vieh sehr unliebsam werden, und zu deren Vertilgung sind sie vorzüglich bestimmt. Vom Heerde, wo sie nach den Läufern und Lockvögeln fliegen, kann man sie mit Leimruthen fangen und wegbringen. Die Jungen, welche man aus dem Neste nimmt und mit Fleisch aufzieht, kann man so zahm machen, daß sie auf die Hand fliegen, und ihren Fraß nehmen. Sie lassen sich dann auch, wie die Falken, gewöhnen, um kleine Vögel, Lerchen und Wachteln zu haizen. Freylich können sie dieselben nicht wegtragen, allein sie fangen und tödten sie doch. Die Jägersprache ist eben so wie bey den Raubvögeln. 2) Grauer

Neuntöbter oder Würger, *L. minor* — kleiner grauer Würger, kleiner aschgrauer Neuntöbter, kleiner Bergelster, kleiner Krickelster, Italiänischer Würger und kleiner Würger. Die Kennzeichen der Art sind: Der Oberleib ist aschgrau, der Unterleib weiß, an der Brust rosenroth überlaufen; die Stirn schwarz. Dieser Würger ist immer für eine Spielart des vorhergehenden gehalten worden; er weicht aber nicht nur in der Gestalt und Farbe, sondern auch in der Lebensart von ihm ab. Er ist kürzer und gedrungenere gebaut, hat einen stärkern Schnabel, eine schwarze Stirn, ist ein Zugvogel u. s. w. Er ist kleiner als der vorhergehende, sieben und einen halben Zoll lang, wovon der Schnabel sieben Linien und der Schwanz drey Zoll wegnimmt; die Breite ist ein Fuß, und die Flügel legen sich über den dritten Theil des Schwanzes zusammen. Der Schnabel ist sehr stark mit einem großen Zahne, aber kleinen Haaken, und glänzend schwarz; der Augenstern kastanienbraun; die Füße schwärzlich, hinten bleifarben überlaufen; die Klauen gekrümmt und schwarz; die Fußwurzel einen Zoll hoch. Die Stirn ist schwarz; ein breiter schwarzer Strich geht durch jedes Auge; der Kopf, Nacken, Hintertheil und die Seiten des Halses, der Rücken und die obere Deckfedern des Schwanzes sind aschgrau, letztere am hellsten; der ganze Unterleib ist weiß, die

E

Brust

Brust und die Seiten rosenroth überlaufen; die Deckfedern der Flügel schwarz, die kleinsten aschgrau gerändert; die Schwungfedern schwarz, die vordern von ihrer Wurzel an bis fast zur Hälfte weiß, daher ein weißer Fleck auf den Flügeln; einige von den übrigen haben weiße Spitzen, der Schwanz ist keilförmig; die zwey äußersten Federn weiß, mit einem schwarzen Schafte, die übrigen sind schwarz; doch hat die dritte und vierte eine weiße Spitze und ist von der Wurzel an bis auf die Hälfte weiß, die fünfte und sechste ist ganz schwarz bis auf einen nur wenig bemerklichen weißgrauen Fleck an der Wurzel; die untern Deckfedern der Flügel sind theils weiß, theils grau, auch zuweilen schwärzlich gefleckt. Das Weibchen unterscheidet sich fast durch gar nichts vom Männchen, außer daß es ein wenig kleiner ist, einen kürzern und etwas schmälern schwarzen Backenstreifen, nur eine einzige weiße Seitenfeder am Schwanz hat, und die andern alle mehr schwarz sind, als bey'm Männchen. Dieß ist ein Vogel von bewundernswürdiger Gelehrigkeit; denn er ahmt nicht nur, wie die andern singenden Vürger, einzelne Strophen aus den Liedern anderer Singvögel, sondern die ganzen Gesänge ohne Zusatz bis zur größten Täuschung nach. So singt er z. B. vollkommen den Gesang der Nachtrigal, ohne eine Strophe auszulassen, wenn eine in seiner Nachbarschaft sitzt, nur viel leiser, so daß man ihm nahe

seyn muß, um ihn zu verstehen. Es scheint sogar, als wenn ihm gar kein eigner Gesang von der Natur zu Theil geworden wäre. So gelehrig er aber ist, so beißig und zänkisch ist er auch; besonders lebt er mit den Elstern im Kriege, die es bisweilen wagen, seine Eyer oder Jungen zu holen. Beyde Gatten stoßen alsdann mit aller Macht auf einen solchen Feind, und jagen und verfolgen ihn so weit, daß er ihnen nichts mehr schaden kann. Es geschieht dieß unter einem stäten ängstlichen Geschrey: Gää, gää, gää! Ihre Lockstimme hingegen ist Quööä! Er fliegt äußerst sanft und schön, und schwimmt so leicht, wie ein Falke, in der Luft. Er bewohnt Europa, besonders das südliche und mittlere, und wird auch in Rußland angetroffen. Er hält sich in Vorhölzern und Gärten auf. Als Zugvogel geht er zu Anfange des Septembers weg, und kommt im Anfange des May's erst wieder. Da, wo das Vieh den ganzen Sommer im Felde bleibt, ist er sehr häufig; eben so vor dem Thüringer Walde nicht selten. Er nähert sich meist von May-Riß-Erd- und andern Käfern, Feld- und Maulwurfsgrillen, Heuschrecken. Er sitzt, um nach Insekten zu sehen, immer auf den höchsten Bäumen, oder auf einem Reife, Wische oder Feldzeichen. Nur bey'm Regenwetter mag er wohl nach einem jungen Vogel und einer Maus fliegen. Wenn er einen Käfer sieht, so fliegt er schußweise nach ihm hin, hebt ihn

ihn auf, und verzehrt ihn auf dem Baume oder Reife, wo er erst gefressen hat. Das Nest steht auf Bäumen und gern in Gärten auf hohen Obstbäumen. Es ist groß, hat äußerlich eine Lage von Reifchen, Wurzeln und geringen Kräutern, die nach der Mitte zu mit Wolle durchweht sind, und ist inwendig mit Wolle und Federn ausgelegt. Gewöhnlich findet man sechs merklich lange weiße ins grünliche ziehende über der Mitte wie ein Kreuz mit olivenbraunen und aschgrauen Flecken und Punkten umgebene, und sonst sehr einzeln bespriehte Eier in demselben. Die Jungen wachsen sehr geschwind heran, und werden mit lauter Käfern und Heuschrecken ernährt. Bis zum ersten Mausern fehlt ihnen die schwarze Stirnbinde; der Oberleib ist dunkel aschgrau kaum merklich röthlich gewellt; der Unterleib weiß, an der Brust gelblich überlaufen und an den Seiten röthlich gewellt. Man kann sie mit Fleisch aufziehen. Mit den Elstern leben sie beständig im Streite. Sie sind nicht scheu, und können daher leicht geschossen werden. Wenn man auf dem Feldbusche, wo sie sich immer hinsetzen, Leimruten legt, so kann man sie fangen. Sie sind noch unschädlicher als die vorhergehende Art. Man kann ihr Fleisch auch essen. 3) Rothköpfiger Neuntödter oder Würger, *Lanius Pomeranus* seu *L. Collurio rufus*, *L. ruficeps* — Mittlerer Neuntödter, Kriekelster, Walbelster,

Rothkopf, großer rother Neuntödter, schwarzbrügger Neuntödter, kleiner rostiger Neuntödter, rother Warkengel, kleiner rother Warkengel, Pommerischer Würger, Finkenbeißer, Waldfage und Finkenwürgvogel. Er unterscheidet sich von den übrigen Arten durch folgende Kennzeichen: Hinterkopf und Nacken sind rothbraun; der Rücken ist schwarzbraun. Dieser Vogel ist immer als eine Varietät des folgenden angesehen worden; allein wer dieß behauptet, hat den Vogel gewiß nicht gesehen, wenigstens nicht in der freyen Natur beobachtet. Die Länge ist sieben Zoll, die Breite nicht ganz ein Fuß; der Schnabel ist acht Linien und der Schwanz drey und ein Viertel Zoll lang; die Flügel bedecken den dritten Theil des Leptern. Der Schnabel ist sehr zusammengedrückt mit einem merklichen Zahne, aber kleinen Haaken, und von schwarzblauer Farbe; der Augenstern gelblichgrau; die Füße und Klauen schwarzblau; die geschilderten Füße einen Zoll hoch. Der Kopf ist stark; mit der schwarzen Stirn verbindet sich ein schwarzer Streifen, der über den obern Kinnladenwinkel weg durch die Augen bis hinter die Ohren läuft; der Hinterkopf und Nacken sind schön rothbraun; der Rücken schwarzbraun; der Mittelrücken röthlich aschgrau; die obern Deckfedern des Schwanzes gelblich weiß; einige große weiße Achsel, federn bilden, wie bey der Elstern.

ster, einem großen breiten Fleck an beyden Seiten des Rückens; über der Nase hebt die gelblichweiße Farbe, die den ganzen Unterleib bedeckt, mit zwey Punkten an; die Seiten sind etwas röthlicher und unmerklich grau gewässert; die kleinen Deckfedern der Flügel sind schwarzbraun, gelblichweiß gerändert, die größern und die Schwungfedern schwarz, ins bräunliche spielend, die erste Ordnung Schwungfedern mit großen weißen Wurzeln, wodurch ein weißer Fleck entsteht, die zweyte, so wie die großen Deckfedern, mit gelblichweißen Spizen; der Schwanz, wie die Flügel, schwarz ins bräunliche übergehend, die äußerste Feder etwas kürzer, weiß, nur in der Mitte mit einem schwarzen Flecke, die übrigen nach der Mitte zu mit weißen Spizen und immer abnehmenden weißen Wurzeln, so daß die mittelste ganz schwarz ist; die Unterflügel sind hellgrau. Das Weibchen hat weniger Schwarzes und Braunes als das Männchen; überhaupt sind die Farben blässer und mehr abgeschossen; es ähnelt aber sonst dem Männchen im Ganzen. Die gewöhnliche angenommene Farbe des Weibchens, daß es röthlich- aschgrau sey, ist ungegründet, und es ist ein Junges, oder das Weibchen des r o t h r ü c k i g e n Würgers beschrieben. Dieser Vogel ist an mehreren Orten unter dem Namen des Finkenbeißers bekannt, weil er so zänstisch ist, daß er sich mit allen Vögeln, die in seiner Nachbarschaft wohnen, herumbeißt, be-

sonders aber mit den Elstern und im Herbst und Frühjahr mit den Finken. Er ist von großer Gelehrigkeit, setzt sich auf die Baumpitzen und singt den Gesang der meisten Vögel, die um ihn sind, nach; am vollkommensten den der Nachtigall und des Mönchs; nur singt er leise und nicht mit so abgerundeten Tönen. Zwischen diese Gesänge mischt er einige unangenehme kreischende Strophen aus seinem eigenen Gesange. Seine Lockstimme ist ein raubes: Ketsch, äätsch! oder der Ruf des Sperlings; im Affekte aber schreyt er in einem weg: G ä c k, G ä c k, G ä c k! Wegen seines Fluges, und besonders wegen seiner weißen Flügelzeichnung, heißt er in Thüringen: W a l d e l s t e r. Sein Vaterland ist Europa. Als Zugvogel kommt er in den letzten Tagen des Aprils in Deutschland an und zieht in der Mitte des Septembers wieder weg. Auf seinem Zuge fliegt er familienweise von einem Baume und Strauche zum andern, und verliert sich so unvermerkt. Im Sommer wohnt er nicht nur in Gebirgen und Wäldern, in den Gegenden der Viehhallen, sondern auch und vorzüglich in Ebenen, und zwar da in Menge, wo die Pferde Tag und Nacht auf eingeschränkten Weideplätzen sich aufhalten, wenn nur Bäume, Gärten und Hecken in der Nähe sind. Er nährt sich vorzüglich von May- Ros- und Mistkäfern, auch von Heuschrecken und andern Insekten. Nur im Nothfalle geht er junge ohnmächtig.

mächtige Vögel, Eyrbechsen und Mäuse an. In Wäldern, Gärten und Feldern nistet er auf hohe Büsche in dicke Zweige, baut ein großes Nest von Pflanzenstengeln, Moos, Gras, Schweinsborsten, Wolle und Haaren, und legt gewöhnlich sechs weißliche ins Grüne schillernde Eyer hinein, die besonders am stumpfen Ende mit bräunlichen, bläulichen und blaßrothlichen Flecken besetzt und in funfzehn Tagen ausgebrütet sind. Selten findet man das Nest im Felde auf hohen Schlehen- und Maßholderbüschen. Die Jungen sehen bis zum Mäusern oben schmutzigweiß und dunkel aschgrau geschuppt, unten schmutzigweiß und grau gewölkt, und an den Flügel Federn stark rothfarben fantirt aus. Der Schwanz und die Schwingen sind schwarzgrau. Die verschiedenen Arten des Fanges und der Erlegung, so wie der Nutzen und Schaden, sind wie bey dem grauen Neuntödter. 4) rothrückiger Neuntödter oder Bürger, *L. Collario* Lin. s. *L. spinitorquus* — Bechst. — Dornbreher, Dorntreter, kleiner bunter Bürger; mandelbrauner Millwürger, blaupöppiger Bürger, kleiner bunter Markengel oder Würgengel, Dornbrechler, rothgrauer kleinster Bürger; schädlicher Würger, singender Rohrwürger, singender Rohrwürger, großer Dornreich, Dornkreuz, kleiner Neuntödter, Finkenbeißer, kleiner Wahnkreuzel,

Spießer, aschfarbener Neuntödter und Dornbreher. Die Kennzeichen dieser Art sind: Männchen: Der Kopf ist aschgrau; der Rücken, die Deckfedern der Flügel schön rothbraun; Brust und Bauch schwach rosenroth. Weibchen: Der Oberleib schmutzig rothbraun, schwach weiß und schwarzbraun gewässert; Hals, Brust, und Seiten gelblichweiß mit dunkelbraunen Wellenlinien. Er ist der kleinste deutsche Bürger, und in seiner Lebensart und in seinem Betragen scheint er den Uebergang zu den Singvögeln zu machen. Er ist sechs Zoll lang, wovon der Schwanz drey Zoll und der Schnabel sechs Linien mißt; die Breite ist ein Fuß; und die Schwingen legen sich auf den Drittheil des Schwanzes zusammen; der Schnabel ist zusammengebrückt, fast gerade, an der Spitze mit einem scharfen Zahne und Haken versehen; der Augenstern graubraun; die Füße schwarz ins bläuliche sich ziehend; die geschilderten Schienbeine zehn Linien hoch. Männchen und Weibchen sind in der Farbe gar auffallend verschieden. Am Männchen sind Kopf, Hals, Bürger und Knie aschgrau; über den Augen und an der Stirn wird diese Farbe etwas heller; von den Nasenlöchern läuft durch die Augen bis zu den Ohren ein breiter schwarzer Streifen; der Rücken und die Deckfedern der Flügel sind schön rothbraun; die Kehle und die Steißfedern

federn schön weiß, so wie der Unterleib, der an der Brust, dem Bauche und den Seiten schwach rosenroth angelauten ist; die Schwungfedern schwärzlich, die hintern stark rothbraun gerändert: der etwas keilförmige Schwanz an den mittlern Federn schwarz, an den übrigen aber bis über die Hälfte von der Wurzel an zunehmend weiß und mit weißen Spitzen. Am Weibchen ist der ganze Oberleib schmutzig rothbraun; am Nacken und auf den Deckfedern des Schwanzes ein wenig ins aschgraue spielend und auf dem Rücken und den Deckfedern der Flügel kaum merklich weiß gewässert; über den Augen und an der Stirn herum bis zu den Augen gelblich weiß; an den Wangen dunkelbraun; Kehle, Bauch und Afterfedern schmutzigweiß; Hals, Brust und Seiten gelblich weiß, mit dunkelbraunen Querlinien; Schwung- und Schwanzfedern dunkelbraun, letztere etwas ins röthliche spielend; die äußersten Schwanzfedern weiß eingefast; die übrigen aber nur bis auf die vier mittlern mit weißen Spitzen versehen. Varietäten: 1) Der weiße rothrückige Bürger. Er ist ganz weiß. 2) Der bunte rothrückige Bürger. Er hat unregelmäßige weiße Flecken auf verschiedenen Theilen des Körpers. Dieser Vogel nimmt unter den singenden Vögeln keine geringe Stelle ein. Sein Gesang ist aus den Liedern der Schwalbe, des Stieglitzes, der Graßmücke, der Feldlerche, Pieperche, des Weidenzeißigs, der

Nachtrigall, der Bastardnachtigall, des Rothkehlchens, Zaunkönigs u. d. g. und nur wenigen rauhhen eigenthümlichen Strophen zusammengesetzt. Es sind dies alles fast lauter nachgeahmte Melodien; die er in dem nämlichen Augenblicke, als er sie hört, auch nachzusingen vermag. Diejenigen Vögel, die ihm nahe wohnen, bilden aber allezeit seinen eigentlichen bleibenden Gesang, und es ist alsdann, wenn es schon ein alter Vogel ist, Frohsinn und Muthwillen, wenn er den Gesang eines vorbeistiegenden Vogels sogleich nachsingt. Nur die sprechenden Lieder der Goldammern und Finken ist er nicht nachzuahmen im Stande, ob er sie gleich täglich und unaufhörlich hört, und es kann ihn nichts, als der Bau seiner Kehle, daran hindern. Seine Lockstimme ist ein übelklingendes Gää, Gää, Atsch, atsch! Zänksisch ist er, wie alle seine Gattungsverwandten, und jagt und beißt sich daher immer mit den Graßmücken, Goldammern u. d. g. Vögeln, die sich seinem Reviere nähern, herum, doch ist er zu schwermüthig, um jemals einen davon tödten zu können. Bey der Begattung macht er posierliche Wendungen, besonders mit dem Schwanze, breitet ihn fächerförmig aus, schlägt ihn wieder zusammen, dreht ihn bald rechts, bald links, und macht dazu die lächerlichsten Verbeugungen. Er wohnt in Europa, und ist in Deutschland gemein. Als Zugvogel kommt er fast zuletzt, zu Anfang des May an.

an. Ob man ihn gleich auch in Thälern der Wälder, wo Vieh trifft und Viehhalten sind, antrifft, so wohnt er doch mehr im Felde, in Hecken und Gebüsch, und auch da am liebsten an solchen Orten, wo das Vieh weidet und die Pferde eingeschränkt sind. Schon zu Ende des Augusts zieht er mit seiner Familie, ehe sich noch die Jungen gemausert haben, weg, und zwar langsam von einem Feldbusche zum andern, da ihm Hunger und Kälte nicht nöthigen, seine Reise zu beschleunigen. Dieß ist derjenige Bürger, welcher im May so große Niederlagen unter den Maykäfern und im Sommer unter den Mistkäfern, Feldgrillen und Heuschrecken anstellt, und diese Insekten an die Dörnen der Schwarz- und Weißdornstaude anspießt. Man findet daher im Felde solche Büsche, wo eine Menge dergleichen Insekten durchbohrt stecken; nur selten aber trifft man auch einen jungen Vogel, eine junge Maus, eine Eydichse, oder Stücke von denselben, in ihrer Gesellschaft an. Und es ergiebt sich daraus gar deutlich, daß er sich nur an solche Vögel, vierfüßige Thiere und Amphibien wagen darf, die ihn nicht durch Geschwindigkeit ihrer Flügel und Füße entgehen können. Merkwürdig genug ist es aber, daß er nicht, wie die meisten Vögel, den ganzen Tag speiset, und so oft er etwas findet, dasselbe verschluckt, sondern ordentlich bestimmte Mahlzeiten hält, sich erst gleichsam verschiedene Schüsseln zubereitet und

austrägt, ehe er sich zur Tafel setzt. Das Nest steht in einem dichten Busche, welches gewöhnlich ein Schwarz- oder Weißdornbusch ist. Es ist groß, auswendig mit Wurzeln und groben Grassengeln angelegt, darauf folgt eine Lage Moos und Wolle, und die innere Ausfütterung endlich besteht aus lauter kleinen Wurzelsfasern. Gewöhnlich findet man fünf, seltner sechs stumpfe Eyer in demselben, die im Grunde weiß, und überall mit schmutziggelben und aschgrauen Pünktchen bestreuet sind. In vierzehn Tagen sind sie von dem Weibchen ausgebrütet; das Männchen sammelt unterdessen Käser, daß die Mutter, wenn sie der Hunger nöthigt von den Eiern aufzustehen, gleich ihre Mahlzeit bereit findet, oder sitzt etliche Büsche vom Neste auf der Spitze eines Zweiges, wacht und singt. Die Jungen sehen alle fast wie die Mutter aus, am Oberleibe und der Brust grüngrau mit vielen dunkelbraunen Wellen und am Bauche schmutzigweiß, und nehmen auch das Kleid mit in diejenigen Länder, wo sie sich im Winter aufhalten, mausern sich dort, und wir sehen sie erst das folgende Frühjahr in ihrer verschiedenen männlichen und weiblichen Kleidung. Sie sind nicht scheu, und können leicht geschossen werden. Wenn man sie lebendig fangen will, so darf man nur auf denjenigen Busch, wo sie oft sitzen, Leimruthen stecken, sie darnach hinjagen, so fangen sie sich gleich. Nutzen und Schaden sind wie bey dem

vor.

vorhergehenden. Ihr Fleisch, besonders der Zungen, schmeckt sehr gut.

Nicht weiter gehen sagen die Jäger, wenn ein Wild in mehreren Tagen nicht übergewechselt, oder sich gar aus dem Gehege entfernt hat, und es sich der Mühe nicht verlohnet, demselben weiter nach zu gehen.

Nichts übergehen sagt man vom Leithunde, wenn derselbe eine gute Nase hat, so daß er auch die kalten und trockenen Fährten auf hartem Boden und bey dürrem Wetter anfaßt und fleißig darauf forscht.

Nichts zurücke Hoh! rufen die Jäger einander zu, welche auf den beyden Flügeln sich befinden, wenn bey einem Jaggen ein Dickicht abgetrieben worden ist, und die Jagd- oder Treibeleute heraus auf einen Stellweg kommen, damit wieder ganz gemacht werden kann.

Niederfallen sagt man vom Federwildpret, wenn es sich auf den Erdboden setzt.

Niedergethan oder Niederthun sagt man, wenn ein Hirsch oder anderes Wildpret sich niedergelegt hat.

Niedrig geht der Hirsch, wenn er sein Geweihe abgeworfen hat.

Nimmer satt — Tantalus — ist eine besondere Gattung der Sumpfvögel mit folgenden Kennzeichen: Schnabel

lang, pfriemenförmig und unterwärts gekrümmt. Nasenlöcher: ensörmig. Zunge: kurz und breit. Gesicht: bis hinter die Augen kahl. Füße: mit Vorderzehen, die am ersten Gelenke durch eine Haut verbunden sind, und an welchen der Nagel der Mittelzehe etwas breit kammförmig eingeschnitten ist. Wir haben bey uns bloß eine Art, als: Gemeiner Nimmer satt, Sichelschnäblein. T. Falcinellus Linn. — Mit schwarzem, grünschillerndem Gesichte; kastanienbraunem Halse und Körper, und stahlgrün und violett schillernden Flügeln, $1\frac{1}{2}$ Fuß lang. Er variirt in der Farbe, vielleicht aber bloß nach dem Alter und nicht nach dem Geschlechte; denn die alten Männchen und Weibchen sehen sich einander ganz ähnlich, außer, daß letzteres etwas kleiner ist. a) Stirn; Scheitel, Wangen, Kehle und Oberhals braungrau mit weißen Längsstrichen; Unterhals, Brust, After und Schnabel braungrau, und der After, sowie die Seiten des Bauchs, mit stahlgrauem Schiller. b) Hals, Ober Rücken, Brust, Schultern und kleine Deckfedern der Flügel, Bauch und Schnabel kastanienbraun, ohne Glanz. c) Oben, und an den Flügeln und Schwanz glänzend kastanienbraun, und an der Brust grün. In Deutschland trifft man ihn nur Einzeln an den südlich deutschen Flüssen und in Schlesien, sonst im Zuge im mittlern Deutschland. Er wählt sich zur Nahrung: Insekten, Würmer und Pflanzen.

Pflanzenstoffe, und führt auch die Namen: Sichelschnabel, sichelschnäblicher Ibis, grüner, braungrüner, dunkelbrauner, braunrother, kastanienbrauner und kleiner Brachvogel, braunrother Bracher, Welscher Vogel, Sägypter, Türkischer Goisser und Türkischer Schnepf.

Nisten, zu Nester tragen, das Nest machen, und bey den Raubvögeln horsten, sagt man von den Vögeln, wenn sie ihr Nest (Horst) bereiten.

Nothbau werden die Wohnungen der Füchse genannt, welche sie im platten Felde graben.

Mußkrähe oder Tannenheher — *Corvus Caryocatactes* — gehört in die Ordnung und Gattung des Kollkraben, wo sie eine besondere Art ausmacht und auch noch folgende Namen führt, als: Mußbrecher, Mußpücker, Mußbeißer, Mußkretscher, Mußbreischer, Mußknacker, Mußhacker, Waldstael, türkischer Holzschreyer, Tannenheher, Steinheher, Tanneneister, schwarzer Markward und Markdöf. Als besondere Kennzeichen dieser Art sind nachstehende anzusehen, als: die Hauptfarbe ist schwarzbraun mit weißen Tropfen bestreut; die Schwanzfedern sind schwarz mit weißen Spitzen. Dieser Vogel ist so bunt wie ein Staar,

und fast so groß wie der vorhergehende. Seine Länge ist ein Fuß, wovon der Schnabel einen und einen halben Zoll und der Schwanz vier und einen halben Zoll wegnimmt; die Breite ein Fuß acht Zoll und die Flügel bedecken zwey Drittheile des Schwanzes. Der Schnabel ist länger, gerader und stumpfer als bey den andern Vögeln dieser Gattung, und die Farbe schwarz; der Augenstern rußbraun; die Füße schwarz; die geschilderte Fußwurzel ein und drey Viertel Zoll hoch. Der Leib ist schwarzbraun, oben heller, unten dunkler; der Kopf, Nacken und Büzel einfarbig; vor den Augen ein weißer Fleck; an den Wangen und Seiten des Halses eine Menge weißer, kleiner, eyrunder Flecken, auf dem Rücken einzelne größere; an der Kehle nur einzelne Stricheln; an der Brust häufige, große, eyrunde, am Bauche etwas sparsamere, aber größere und fast brechedige Flecken; die obern Deckfedern des Schwanzes schwarz, die untern weiß; die obern und untern Deckfedern der Flügel schwärzlich, die kleinern mit einzelnen brechedigen Spitzen, die Schwungfedern auf der innern und äußern Seite schwarz, doch die vordern dunkler als die hintern, die sechste bis zwölfte mit einer feinen weißen Spitze; die fünfte ist die längste, daher hat er auch einen, obgleich schnellen, doch kurz abgebrochenen, bogenförmigen Flug. Der Schwanz ist schwarz, abgerundet, die erste Feder kürzer mit einer großen, wei-

gen Spitze, die alle Federn haben, doch so, daß sie nach der Mitte zu schmaler wird, und die mittelfte nur sehr schmal weiß gerändert ist. Das Weibchen ist mehr roth, als schwarzbraun. Varietäten: 1) Der weiße Tannenheber. Er ist entweder rein weiß oder gelblich weiß, mit etwas hervorstrehenden dunkeln Flecken. 2) Der bunte Tannenheber. Mit weißen Flügeln und Schwanz. Wenn dieser Vogel in tiefen, von Menschen wenig besuchten Gebirgen wohnt, so ist er gar nicht scheu, und die Jungen lassen sich, wenn sie ausgeflogen sind, oft von Rühirten mit dem Stocke todt schlagen. Wenn sie aber erst einmal ihre Herbstwanderung gemacht haben, dann werden sie vorsichtiger. Ihr Geschrey ist dem des Spechtes und der Elster ähnlich und klingt hoch, scharf und kreischend: Görr görr görr görr! Sie sitzen zuweilen auf dem Gipfel eines Baums und schreyen aus vollem Halse die Töne in einer Reihe hinter einander. Sie fliegen wie eine Dohle und lehnen sich dabei bald auf die rechte bald auf die linke Seite. Man trifft ihn in ganz Europa und in Sibirien an. Er soll sich auch in Nordamerika aufhalten. Seine Wohnungen schlägt er in den stillen Waldungen auf, mehr in gebirgigen Gegenden und zieht das Schwarzholz dem Laubholze im Sommer vor, doch befindet er sich da an besten, wo beyde vermischt wachsen, wo Gärten und

Wiesen in der Nähe sind. Hier hält er sich vom März bis in die Mitte des Septembers auf, alsdann aber streicht er einzeln und auch in Schaaren nach den lebendigen Feldhölzern, die mit Eichen, Buchen und Haselbäuschen bewachsen sind, und man trifft ihn daher im Winter auch in einzeln liegenden Feldhölzern und auf den Straßen an. In Thüringen ist er daher ein bloßer Strichvogel, ob er gleich in kältern Ländern mit Recht zu den Zugvögeln gerechnet werden kann. Die Tannenheber nähren sich im Sommer von verschiedenen Insekten und deren Larven, als Mistkäfern, Bienen, Wespen, von Regenwürmern, von Tannen- und Fichtensamen, im Herbst von Haselnüssen, denen sie den ganzen September und Oktober durch nachfliegen, von Bucheckern, Eicheln, Ebereschbeeren; diese letztern, den Fichtensamen, und die unverdaulichen Haferkörner in dem Pferdemiste, suchen sie den ganzen Winter hindurch auf. Auch sollen sie sich im Herbst den reisenden und reifen Hanfsamenäckern nähern. Sie haben einen weiten Schlund, in welchem sie etliche Haselnüsse und Eicheln aufbewahren können. Sie knaden und verschlucken die Nüsse daher nicht immer sogleich, sondern tragen sie im Kropfe mit sich weg, und verstecken sie, wenn sie nicht mehr hungrig sind. Sie nisten in hohlen Bäumen, deren Oeffnung sie sich zuweilen durch ihren starken Schnabel erweitern müssen und legen fünf bis

bis sechs Eyer. Die Jungen fliegen bald aus, und lassen sich noch lange, ganz stille, auf einem Baumzweige der Reihe nach sitzend, von den Alten füttern. Diese tragen ihnen dann lauter Insekten, Insektenlarven und Regenwürmer zu. Die Baumarder und Wieseln zerstören zuweilen ihre Brut. Sie werden in ganz Deutschland nur einzeln angetroffen, daher man sie auch nur von ohngefähr, und gewöhnlich nur auf dem Striche zum Schusse bekommt. Sie halten besser als die Holzheher. Im Herbst fangen sie sich auch in der Schneuz.

Man will sie auch auf den zum Austrocknen aufgestellten Hanfbunden in großen Spreukeln fangen. Ihr Rußen besteht theils im Fleische, das nicht unangenehm schmecken soll, theils in der Vertilgung vieler schädlicher Insekten und Würmer; und gleichwohl werden diese Vögel von den Jägern häufig als schädlich getödtet. So viel ist gewiß, daß sie dem Jäger auf dem Pirschgange durch ihr Geschrey das Wild verscheuchen, indem dieß allezeit aufmerksam wird, wenn es dieses Geschrey hört.

D.

Oberfalkenier ist der vornehmste unter den Falkenierern, s. d. Wort.

Oberjäger ist in manchen Ländern eine Bedienung bey der Jägerey, die im Range unsern Oberförstern gleich sind. In solchen Staaten, wo ein militärisches stehendes Jäger-Corps gehalten wird, führen die Unter-Officiers den Namen Oberjäger.

Oberjägermeister, Oberlandjägermeister, Oberhofjägermeister ist die vornehmste Stelle bey der Jägerey großer Länder, unter dessen Befehlen alle Oberforstmeister, Wildmeister, und alle hohe und niedere Forst- und Jagdbediente stehen. Nicht weniger hat er auch die Oberaufsicht über sämtliche

Flößen, desgleichen über alle Forstwerke im ganzen Lande. Eine hohe Kenntniß aller in die Fächer seines wichtigen Postens einschlagenden Wissenschaften, so wie eine ausgezeichnete Aufmerksamkeit und Klugheit in Entwerfung aller dahin gehörigen und auf das Beste des Landes abzwecckende Pläne und Ertheilung der nöthigen Befehle sind die glänzenden Eigenschaften dieses großen Mannes. In Ehursachsen findet man sie in der Person unsers würdigen Oberjägermeisters, Er. Excell. Herrn Thym Heinrich Adolph v. Preuß in der glücklichsten Vereinigung.

Oberlandjägermeister s. Oberjägermeister.

Oberleinen sind diejenigen Leinen, welche zu oberst an dem Rethen

... nicht entweder
... gemacht, die
... der Ferkeln
... darauf

... wird an man-
... das Geißter des Hir-
... genannt. S. Hirsch.

... wird eigentlich das
... Geschlecht des Rindvie-
... genannt. Zu den wilden Thie-
... welche Gegenstände der Jagd
... gehören der Auerochse, der
... und der Büffel. S. d.
... Wörter.

Ohren, (leise), kann man
den Jagdhunden machen, wenn
man ihnen einige Morgen nach-
einander gebranntes Geißblatt-
wasser mit dem Saft von unrei-
fen Weintrauben vermischt, in
die Ohren tröpfelt.

Ohren-Steißfuß — Po-
diceps auritus, Lath. oder Co-
lymbus auritus Linn. — oder
Ohrentaucher, Meerdreh-
hals, geöhrtter Taucher,
Schwarztaucherlein, groß-
ohrige Taucherente, Dach-
entlein, Duentlein, ge-
hörnter Steißfuß, und Ka-

ferente genannt. Der Schna-
bel am Oberkiefer ist in der Mitte
etwas einwärts gezogen und am
Unterkiefer nach der Spitze sehr in
die Höhe gebogen. Der Oberleib
ist dunkelbraun, der Unterleib
weiß; hinter jedem Auge befindet
sich ein rostfarbiger Federbüschel,
und die Augentlieder nebst dem
Sterne sind karminroth. Die
Länge beträgt 12 Zoll. Dieser Vo-
gel hält in den meisten Eigenschaf-
ten gleichsam das Mittel zwischen
dem grauehlichen Steiß-
fuß und gehäubten Steiß-
füße und der Schnabel hat eine
so sehr in die Höhe gezogene Ge-
stalt, daß man glaubt, es müsse
derselbe umgekehrt, und zwar der
Unterkiefer der Oberkiefer wer-
den, um damit er seine rechte
Stellung erhielte. Dieser Vogel
findet sich auf deutschen Seen und
Teichen einzeln, öfterer aber wird
er auf dem Zuge im Herbst auf
den Teichen gesehen. Seine Nah-
rung besteht aus Insekten und
Kräutern und das Nest ist im
Schilf schwimmend mit 3 bis 4
gelblichweißen, braungrauen be-
schmuckten Eiern.

Otterja gß ist bey der Fisch-
otter beschrieben worden.

P.

Packen sagt man, wenn die
Hunde Gauen einholen und an-
greiffen.

Palmgeweih ist ein, wie
eine ausgestreckte Hand gestaltetes
Hirschgeweih.

Palmhirsch heißt ein Hirsch,
der ein solches Geweih trägt.

Pantera, Schießheerd
ist ein vierediges, dreysaches, auf
beyden Seiten mit Spiegeln und
inwen-

Inwendig mit einem feinen weissen Inngarne versehenes Garn, zum Fange der Krammets- und kleinen Vögel bestimmt. Der Platz, wo der Vogelfang mit diesem Netze betrieben, und auf dessen einer Seite in der Mitten eine Hütte angebracht wird, wird Roccolo genennet. Dieser Fang ist in Italien, Oesterreich und Tyrol üblich; er ist zwar kostspielig, aber sehr angenehm und einträglich. Er wird in einem Vorholze, jungen Schläge, oder auch in einer Aue, an einem solchen Orte angebracht, wo die Vögel ihren Strich haben, und nach Fig. 9. folgendergestalt bereitet. Die Seiten A—B, A—C, und B—D, wovon erstere gerade vor der Hütte ist, sind jede 64, die Seiten C—E und D—F jede 32 Ellen lang. Um den ganzen Platz ist ein, mit grünen Bäumen, auf beyden Seiten beplanzter Platz. Innerhalb desselben richtet man die Garne auf, zieht sie fest an, und spannet die großen Siegelmaschinen unter sich am Boden mit Haaken fest an, damit das Inngarn leicht hin und wieder gezogen werden könne. Die Bäume, zwischen welchen die Pantera zu stehen kömmt, müssen etwas höher seyn, als diese, und unten herum, so hoch die Netze reichen, von allen Nesten befreyet werden, oben aber alle Nester behalten. So hoch die Netze sind, müssen die Bäume mit einem Zaune umgeben, und dadurch wider das Eindringen der Thiere verwahrt werden. In der Mitte desselben bey ü müssen Haadreiser, wie bey andern Vogelheerden seyn, welche

17 Elle höher sind, als die Netze. Außer diesen müssen noch verschiedene Bäume in der Pantera stehen, die jedoch nicht so hoch sind, als die, welche außen herum stehen. Die Hütte K ist 9 bis 10 Ellen hoch, und besteht aus zwey Stockwerken, wo die Vögel aufbewahrt werden, im obersten aber die Vogelfsteller nebst denjenigen, die den Fang mit ansehen wollen, sich befinden. Nicht weit von der Hütte sind drey, etwa 4 bis 4½ Elle hohe, oben mit Rasen bedeckte Bühnen, worauf die Ruhevögel sind, die man von der Hütte aus ziehen kann, wovon die mittelfte am nächsten bey der Hütte, 6 Ellen lang und 2 Ellen breit, die andern beyden aber 2 bis 2½ Elle im □ sind. Wenn der Vogelzug angehet, fängt man diesen Fang zu betreiben an, wobey man Lockvögel haben, oder in deren Ermangelung ihren Gesang durch die Pfeife nachahmen muß. Die singenden Lockvögel muß man inwendig an die Haadreiser und Bäume 3 Ellen hoch von der Erde in ihren Bauern hängen, und diese mit Tannenreis oder Gras bedecken; sie dürfen aber nie verwechselt werden. Wenn nun auf ihr Locken fremde Vögel herheykommen, und sich auf die Haadreiser oder hohen Bäume setzen; so schiefet man aus besondern, an der Hütte angebrachten Schießscharten aus Armbrüsten, Bolzen, an welchen Pferde- oder Fuchsschwänze, oder auch andere in Gestalt eines Raubvogels geformte Scheufale befestiget sind, in einer solchen Richtung ab, daß sie ohngefähr drey Ellen hoch über die Haadreiser

reifer hinfiegen, und die Vögel, welche sie für Raubvögel ansehen, veranlassen, mit größter Schnelligkeit in die niedern Bäume und Streicher herab zu schießen, wodurch sie in die Netze gerathen. Die Pantera wird folgender gestalt gestrickt: Das Innegarn, welches quer vor die Hütte zu stehen kommt, wird von A bis B 1400 Maschen lang und 31 Fuß hoch gestrickt. Die großen Spiegel aber fängt man mit 140 Maschen an, und macht sie $9\frac{1}{2}$ Spiegel hoch. Die beyden größern Panteren werden mit 120, die kleinern Spiegel aber mit 110 Maschen angefangen, alle aber behalten die obige Höhe. Diese werden eingerichtet wie Stedgarne, nur daß man oben, wo die große Leine ist, gedrehte Ringe von Horn einmacht, damit man die Pantera zusammen und wieder auseinander ziehen kann, welche man, jedes Netz besonders, an drey kleinen, oben an den Latten angeschraubten Kloben und durch dieselben gezogenen Hangeln, woran die Ringe sind, nach Gefallen auf- und niederlassen kann. Zum Fange der Finken und anderer kleinen Vögel, ist die Pantera von gleicher Beschaffenheit, die Netze eben so hoch, aber von weit kleinern Umfange, die Haackreiser werden nicht innerhalb, sondern außerhalb drey Ellen von der Pantera gesetzt. Auch wird über dem Gang um dieselbe ein abschüssiges Dach von Latten gemacht, und mit grünen Reifern bedeckt, weil sonst die Finken,

wenn sie der Pantera zu nahe kämen, in die Höhe steigen würden. Das Garn A. B. wird 800, die beyden längern aber 1200 Maschen lang und 31 Fuß hoch gemacht, die großen Spiegel werden mit 80, und die an der Seiten mit 120 Maschen angefangen, alle aber $9\frac{1}{2}$ Spiegel hoch gemacht.

Panzer nennet man Sackten, die von braunen oder schwarzen Barchend gemacht, mit fester Leinwand gefüttert, entweder mit Fischbein ausgenähet, oder mit Haaren oder Baumwolle ausgestopft werden, und die man den großen englischen Hunden bey der Sauhay ansetzt, damit sie nicht zu Schaden kommen. Unter dem Bauche und an der Brust, als den, der Gefahr am meisten ausgefetzt theilen, werden sie allezeit mit Fischbein ausgelegt, und mit lauter Nestelöchern hart an einander ausgenähet, daß sie so fest, wie ein Panzer werden. Wegen der Hinterläufte muß bey den Seitenflügeln das Maas ordentlich genommen werden, auch müssen an die Vordersehenkel Armeel, auf dem Rücken aber Schnürlöcher gemacht werden, wo man sie mit Riemen zusammen schnüret.

Parforce abrichten, dressiren ist die Art und Weise, die Hünnerhunde, auch die Parforcehunde zu ihrem Geschäfte abzurichten. S. Parforcehund und vorstehender Hund.

Par.

Parforcehund, Parforcejagdhund, Laufhund ist eine Art von Jagdhunden, die ein aufgejagtes Wild, sie mögen es sehen oder nicht, auf der Fährte solange laut jagen, bis es vor Müdigkeit nicht weiter kann, sondern abgefangen werden muß. Die französischen und englischen sind die besten, sie sind gemeinlich weiß und buntgefleckt, auch sehr gut behangen. Die französischen haben einen sehr hellen, die englischen einen nicht so hellen Laut, lassen sich auch seltener hören, dagegen sind sie leichter abzurichten. Auch sind sie gehorsamer, haben eine bessere Nase, halten die Spur ordentlicher und nehmen mit schlechterer Kost vorlieb, als die französischen, welche hingegen den Wiedergang des Hirschens genauer suchen. Ein guter Parforcehund soll einen länglichen Kopf, eine breite Stirne, einen spitzigen Hühel, große Augen, lang behangene Ohren, mittelmäßige Schultern, gebogene Nieren, hohe Hüften, einen hohen dicken Schwanz, dicke Lenden, gerade Kniee, starke Nerven, und kurze dicke Klauen haben. Die Hündin, wovon man gute Rasse ziehen will, muß nächst obigen Kennzeichen, auch hoch, lang und breit vom Leibe seyn. Sie muß, wenn sie hitzig, tragend ist, oder säuget, nicht zum Jagen ausgeführt, sondern mit dem schönsten Hunde, den man hat, zugelassen werden. Das Zulassen muß zwey oder drey mal, nicht weniger, weil sonst der Hündin die Hitze nicht bekommen wird, und nicht mehr-

mal geschehen, weil sonst der Hund zu sehr abgemattet wird. Die beste Zeit dazu ist im Januar, Februar und März. Wenn die Zeit zum Wölffen herannahet, muß man fleißig nach der Hündin sehen, sie warm halten, und nöthigen falls mit Arzneymitteln versehen; Wenn die Hündin mehr Lunge wirft, als sie ernähren kann, so muß man die übrigen doch nicht wegwerfen, sondern sie Bauer- oder andern Hündinnen säugen lassen, und und diese sowohl als die eigenen jungen Hunde der fremden Hündin mit Brandwein waschen, damit sie einerley Geruch haben, und also auch von der alten Hündin mit angenommen werden. Wenn die jungen Hunde etwas herangewachsen sind, füttert und wartet man sie eben so ab, wie die Alten, nur daß sie noch nicht mit in die Meute genommen werden, ihnen auch mehr Freyheit gelassen wird. Wenn er 1½ Jahr alt ist, wird er in die Kuppel gewöhnet; anfänglich werden ihrer zwey und zwey zusammengekuppelt, und müssen den Tag über im Hundezwinger herumlaufen, des Nachts aber werden sie losgekuppelt. Hernach nimmt man sie an die Harn, (eine von Pferdehaaren und Hanf gemachte Leine) an dieser führt sie ein Bursche aus. Dieses geschieht täglich früh und Abends vor der Fütterung, damit sie gewohnt werden, en Meute zu gehen. Wenn sie so eingewöhnet sind, läßt man sie ungekuppelt ausführen, bis sie zwey Jahre alt sind, da sie unter die Meute kommen.

reifer hin
welche
hen,
Schnell
me un
ßen,
gerat
folge
In:
Hü
vor
In
2
r

man mehr in Athem zu
Lohn wird das Train-
(d. Wort) vergenom-
Der ganze Zweck dieser
Schäfte ist, sie in Athem zu
bringen, ihnen Gehorsam zu leh-
ren, und sie zum Rufe und zu
den Hörnern zu gewöhnen. Wenn
die Hunde bey Regenwetter von
der Jagd naß zu Hause kom-
men, muß man in den Kamis-
nen der Ställe Feuer anmachen,
aber mit den Peitschen dabey
bleiben, bis sie wieder abgetrock-
net sind. Bey großer Hitze aber
läßt man sie im offenen Ställe
und Zwinger frey herum laufen,
und giebt ihnen gute Rindsbrü-
hesuppe zu fressen, sieht auch
nach, ob sie sich etwa wund ge-
laufen haben. In diesem Falle
nimmt man Eßig, in welchen
man Kienruß und einige Hände
voll Salz thut, und setzt sie mit
den Füßen hinein, oder man
wäscht ihnen die Füße mit war-
men Weine. Sollten aber gar
einige steif gehen, so wäscht man
sie mit gutem dazu bereiteten
Spiritus, und gehet bis sie her-
gestellt sind, täglich etwas mit
ihnen spazieren. Alle Jahre, vor
dem Anfange der Jagd, muß
man sie purgiren, und den drit-
ten Tag darauf zur Ader lassen,
und zwar die Median-Ader am
Halse, wobey man ihnen den
Hals mit einem Leinchen um-
bindet, damit die Atern auf-
laufen, und man sie besser sehen
könne, auch muß man sich in
Acht nehmen, daß man die Ner-
ven mit der Lanzette nicht ver-
leze. Das übrige Verfahren ist
bey den Worten, Hund, Jagd-
hund,

hund, Hundkrankheiten und Parforcejagd nachzusehen. Hundert Hunde sind die rechte Zahl zu einer Parforcejagd, doch jaget es sich schon mit 50 Hunden sehr gut, weil man sie besser im Saume halten kann; sie sind vollkommen hinlänglich; man nimmt deren nur mehr, weil sie mehr Lärm machen. An manchen Orten bestätigt man vorher die Hirsche mit dem Leithunde; doch geschieht dieses nicht überall.

Parforcejäger nennet man einen Jäger, der sich vorzüglich mit der Parforcejagd abgiebt.

Parforcejagd, Lauf-
Kennjagen. Forciren, ist eine Jagd ohne Rege und Lärmer, welche durch eine Menge Hunde und Jäger zu Pferde dergestalt verrichtet wird, daß die Hunde das angenommene Wild so lange jagen, bis es stürzt, oder sich nieder thut, oder auch von den Hunden gestellt wird, da man es dann mit dem Hirschfänger abfängt, welches aber, wenn nicht die gehörigen Vortheile dabey gebraucht werden, eine gefährliche Arbeit ist, besonders bey einem Hirsche, der vollkommen veredelt hat, und vorzüglich in der Brunst ist. Sobald der Hirsch erlegt ist, machen es die Jäger durch das Parforcehorn kund, legen den Hirsch ins Gehörne, öffnen den Hals und die Gurgel, und geben so den Hunden ihr Genuß warm, alsdann lösen sie den rechten Vorderlauf ab, und überreichen

ihn dem Herrn der Jagd. Endlich zerwirken sie das Stück, und wenn es nicht genießbar ist, geben sie es den Hunden, oder theilen es an die Behörde aus. Auf den ersten Fall werden die Rippen und Knochen ausgelöst; im letztern hingegen, geschieht die Vertheilung folgendergestalt. Die innersten Nierenbraten und das Geweihe gehören dem Herrn der Jagd, der Lammel dem Oberjägermeister, der Rücken und die Keulen nebst den Vorderbeinen den Jagdjunkern und Jagdpasgen; ist aber der Hirsch bestätigt worden, so gehört der rechte Vorderbein dem, der ihn bestätigt hat. Das Herz, die Lunge und Leber gehören den Leithundsknechten, als ihr Recht, und dem Leithunde wird, wenn er vorher an des Hirsches Kopf und Gehirn geführt worden, davon gegeben, Kopf und Hals gehören den Hundeknechten. Die Parforcejagd ist blos eine Jagd für große Herren, und wegen der vielen darauf zu haltenden Leute, Pferde und Hunde, sehr kostspielig, dabey aber auch gefährlich, weil mancher Jäger und manches Pferd dabey verunglückt. Sie ist aber auch nicht allenthalben anwendbar, In Engelland ist sie am gebräuchlichsten; in Deutschland aber nur an einigen Höfen eingeführt. Gewöhnlich ist der Anfang der Parforcejagd im Julius oder zu Anfange des Augusts, wenn die Kälber schon etwas erwachsen sind, und mit dem Thiere weichen können, der Hirsch auch sein völliges Geweihe aufgesetzt und geschlagen hat, und

die guten Hirsche sich von dem Truppe abzusondern pflegen. Die Dauer derselben ist gemeiniglich bis zum dritten November, da sie mit dem Hubertsfeste beschloffen wird. Während der Brunst ist die Jagd um deswillen nicht gut, weil die Hirsche nicht leicht von den Thieren zu trennen sind. Noch weniger im späten Winter, Herbst und Frühjahr, denn die Hunde haben dann nicht die gehörige Witterung, und beschädigen sich die Füße leicht auf dem Froste, so wie auch Menschen und Pferde leicht auf dem Eise stürzen, oder in Windwehen fallen können. Oekonomisch betrachtet bringet die Parforcejagd mehr Schaden als Nutzen, denn nächst ihrer Kostspieligkeit, ist auch das Wildpret eines solcher gestalt parforcirten Hirschens nicht zu gebrauchen, es werden dadurch viele Felber zu Schanden gemacht, und zum Behuf dieser kostbaren Jagd eine Menge Wildpret zum Schaden der Wälder und Felber unterhalten. Eine Parforcejagd gehörig einzurichten, muß der Wald nach allen Richtungen mit Ääen und Wegen durchhauen, die Wässer und Brüche mit Brücken und Dämmen verwahrt seyn, damit man dem Hirsche allenthalben ohne große Umwege folgen kann. Auch müssen die nöthigen Gebäude, Personen und Pferde angeschafft werden. Wenn nun vom Fürsten die Jagd anbefohlen worden, so ziehen am Morgen der Jagd die Piqueurs, Besuchknechte und andere zur Parforcejagd gehörige Jäger aus, und suchen oder be-

stätigen jeder an seinem bestimmten Orte, die vorgefundenen Hirsche, ziehen auf den bestimmten Zusammenkunftsort, (Rendezvous) und erstatten bey dem Haupt der Jägerrey, oder nach Befinden bey dem Fürsten selbst Bericht. Wenn nun der zu jagende Hirsch bestimmt ist, ziehet der Besuchknecht, der ihn auf der Vorsuche gehabt, mit seinem Leithunde nach dem Standorte des Hirschens und bestätiget den Hirsch so enge als möglich. Hierauf setzen sich die Piqueurs und andere dazu gehörige Jäger zu Pferde, nehmen die Hunde zwischen sich und reuten auf die, ihnen bereits von dem Haupte der Jägerrey angewiesenen Posten und Relais. Die, jede aus 5 bis 6 Kuppelhunden bestehende Relais nebst frischen Pferden für die anreitenden Herren, werden dahin gestellt, wo man nach der Bestätigung des Hirschens vermuthet, daß er seinen Laufzunehmen werde. Bey jeder Relais ist ein Pursche von den Hunden, welcher nebst den Reitknechten Acht zu geben hat, wie nahe die Jagd komme, und wenn sie bemerken, daß sie sich weit entfernt, müssen sie sich vorziehen, um nöthigen Falls bey der Hand zu seyn. Sienge aber die Jagd einen ganz entgegen gesetzten Weg, so werden sie durch einen Jäger abgeholt und anderweit angestellt. Die zur Jagd gebrauchten Piqueurs ziehen mit den Hunden voraus und die Herrschaften nach, bis an den Bestätigungsort, wo sie die Färthe untersuchen, und nach allen ih-

ren

ren Kennzeichen genau beobachtet. Wenn man sich davon gehörig unterrichtet hat, so nimmt man 3 bis 4 der besten Hunde aus der Meute, oder hat besondere Lancierhunde; mit diesen ziehen ein Paar Piqueurs zu den Brüchen, die andern aber bleiben mit der Meute vorne. Wenn sie nun die Färthe annehmen, so ruft man ihnen jedesmal besonders zu. Nun wird der Hirsch aus seinem Stande gesprengt, (lanciret) und von den Lancierhunden bis auf einen Weg oder eine Allee gejagt, dann werden die Lancierhunde aufgehalten, (gestopft) und der Hirsch verbrochen. Auch springen die, welche dazu kommen können, vor, und suchen, den Hirsch zu sehen zu bekommen, um die Beschaffenheit seines Geweihs zu beurtheilen. Bisweilen wird auch so lange lanciret, bis dieses geschehen ist. Sind aber, wie mehrentheils zu geschehen pflegt, mehrere Hirsche beisammen, so müssen so viel Jäger, als bey der Meute entbehrlich sind, lanciren, die übrigen aber reuten vor, (carabiniren) und suchen die Hirsche zu sprengen, wobey sie immer genau Acht haben, welchen Weg der rechte nimmt. So lange bis man hiervon Gewisheit hat, wird immer fort lanciret. Wenn dieses geschehen, und ein Jäger die rechte Färthe gefunden hat, meldet er es durch lautes Rufen seinen Kammeraden. Siehet er aber den Hirsch selbst, so ruft er Tajo, juchet, und verbricht die Färthe. Hierauf werden die Lan-

cierhunde gestopft und abgenommen, die Meute herbeugeholt und auf die rechte Färthe angelegt. An manchen Orten müssen die Besuchknechte mit alten Leithunden lanciren, wovon einer mit seinen Leithunden der Färthe nachhänget, und wenn mehrere Hirsche da sind, so greift auch auf jeder Seite einer mit seinen Leithunden vor, und hängt den andern Hirschen nach, bleiben bis die Hirsche durch die Piqueurs mit der Meute gesprengt sind, und der rechte abgesondert ist, worauf sodann die Meute angelegt wird, und die Jagd anfängt. Kommt man nun mit der Jagd zu dem Relais, so stopft (arretirt) man die Hunde, und nimmt frische Hunde und Pferde. In währendem Jaggen muntert man die Hunde durch Zurufen auf, und wenn eine Strecke fortgejagt ist, stopft man die vordersten (den Kopf) damit die hintersten, des Schwanz auch nachkommen. Das Stopfen geschieht dadurch, daß die Piqueurs den Hunden vorjagen, ihnen zurufen, und mit den Peitschen klatschen. Sind zu rasche oder noch zu rohe Hunde dabey, so crabattiret man sie, d. h. man hängt ihnen Riemen oder wollene Luchlappen an den Hals, so lang, daß sie oft darauf treten müssen. So oft dabey die Piqueurs den Hirsch sehen, wird allezeit Tajo gerufen. Wenn nun die Hunde dem Hirsche so nahe kommen, daß sie ihn öfters lanciren, so ist es bald zu Ende, doch wird so lange fortgejaget, bis der Fürst selbst

gen Spitze, die alle Federn haben, doch so, daß sie nach der Mitte zu schmaler wird, und die mittelfte nur sehr schmal weiß gerändert ist. Das Weibchen ist mehr rost, als schwarzbraun. Varietäten: 1) Der weiße Tannenheber. Er ist entweder rein weiß oder gelblich weiß, mit etwas hervorstrehenden dunkeln Flecken. 2) Der bunte Tannenheber. Mit weißen Flügeln und Schwanz. Wenn dieser Vogel in tiefen, von Menschen wenig besuchten Gebirgen wohnt, so ist er gar nicht scheu, und die Jungen lassen sich, wenn sie ausgeflogen sind, oft von Rühirten mit dem Stocke todt schlagen. Wenn sie aber erst einmal ihre Herbstwanderung gemacht haben, dann werden sie vorsichtiger. Ihr Geschrey ist dem des Spechtes und der Elster ähnlich und klingt hoch, scharf und kreischend: Görr görr görr görr! Sie sitzen zuweilen auf dem Gipfel eines Baums und schreyen aus vollem Halse die Töne in einer Reihe hinter einander. Sie fliegen wie eine Dohle und lehnen sich dabei bald auf die rechte bald auf die linke Seite. Man trifft ihn in ganz Europa und in Sibirien an. Er soll sich auch in Nordamerika aufhalten. Seine Wohnungen schlägt er in den stillen Waldungen auf, mehr in gebirgigen Gegenden und zieht das Schwarzholz dem Laubholze im Sommer vor, doch befindet er sich da an denen, wo beyde vermischt wachsen, wo Gärten und

Wiesen in der Nähe sind. Hier hält er sich vom März bis in die Mitte des Septembers auf, alsdann aber streicht er einzeln und auch in Schaaren nach den lebendigen Feldhölzern, die mit Eichen, Buchen und Haselbäumen bewachsen sind, und man trifft ihn daher im Winter auch in einzeln liegenden Feldhölzern und auf den Straßen an. In Thüringen ist er daher ein bloßer Strichvogel, ob er gleich in kältern Ländern mit Recht zu den Zugvögeln gerechnet werden kann. Die Tannenheber nähren sich im Sommer von verschiedenen Insekten und deren Larven, als Mistkäfern, Bienen, Wespen, von Regenwürmern, von Tannen- und Fichtenäsaamen, im Herbst von Haselnüssen, denen sie den ganzen September und Oktober durch nachfliegen, von Bucheckern, Eicheln, Ebereschbeeren; diese letztern, den Fichtenäsaamen, und die unverdaulichen Haselkörner in dem Pferdemiste, suchen sie den ganzen Winter hindurch auf. Auch sollen sie sich im Herbst den reisenden und reifen Hanfäsaamendörnern nähern. Sie haben einen weiten Schlund, in welchem sie etliche Haselnüsse und Eicheln aufbewahren können. Sie knacken und verschlucken die Nüsse daher nicht immer sogleich, sondern tragen sie im Kropfe mit sich weg, und verstecken sie, wenn sie nicht mehr hungrig sind. Sie nisten in hohlen Bäumen, deren Oeffnung sie sich zuweilen durch ihren starken Schnabel erweitern müssen und legen fünf bis

bis sechs Eyer. Die Jungen fliegen bald aus, und lassen sich noch lange, ganz stille, auf einem Baumzweige der Reihe nach sitzend, von den Alten füttern. Diese tragen ihnen dann lauter Insekten, Insektenlarven und Regenwürmer zu. Die Baumarder und Wieselthier zerstören zuweilen ihre Brut. Sie werden in ganz Deutschland nur einzeln angetroffen, daher man sie auch nur von ohngefähr, und gewöhnlich nur auf dem Striche zum Schusse bekommt. Sie halten besser als die Holzheher. Im Herbst fangen sie sich auch in der Schneuz.

Man will sie auch auf den zum Austrocknen aufgestellten Hanfbunden in großen Spreukeln fangen. Ihr Ruken besteht theils im Fleische, das nicht unangenehm schmecken soll, theils in der Vertilgung vieler schädlicher Insekten und Würmer; und gleichwohl werden diese Vögel von den Jägern häufig als schädlich getödtet. So viel ist gewiß, daß sie dem Jäger auf dem Pirschgange durch ihr Geschrey das Wild verscheuchen, indem dieß allezeit aufmerksam wird, wenn es dieses Geschrey hört.

D.

Oberfalkenier ist der vornehmste unter den Falkenierern, s. d. Wort.

Oberjäger ist in manchen Ländern eine Bedienung bey der Jägerey, die im Range unsern Oberförstern gleich sind. In solchen Staaten, wo ein militärisches stehendes Jäger-Corps gehalten wird, führen die Unter-Officiers den Namen Oberjäger.

Oberjägermeister, **O**berlandjägermeister, **O**berhoffjägermeister ist die vornehmste Stelle bey der Jägerey großer Länder, unter dessen Befehlen alle Oberförstermeister, Wildmeister, und alle hohe und niedere Forst- und Jagdbediente stehen. Nicht weniger hat er auch die Oberaufsicht über sämtliche

Flößen, bezugleich über alle Forstwerke im ganzen Lande. Eine hohe Kenntniß aller in die Fächer seines wichtigen Postens einschlagenden Wissenschaften, so wie eine ausgezeichnete Aufmerksamkeit und Klugheit in Entwerfung aller dahin gehörigen und auf das Beste des Landes abzuweckende Pläne und Ertheilung der nöthigen Befehle sind die glänzenden Eigenschaften dieses großen Mannes. In Churfachsen findet man sie in der Person unsers würdigen Oberjägermeisters, Sr. Excell. Herrn Thym Heinrich Adolph v. Preuß in der glücklichsten Vereinigung.

Oberlandjägermeister s. Oberjägermeister.

Oberkeinen sind diejenigen Keinen, welche zu oberst an dem Rehen

Negen sind, woran diese entweder fest oder beweglich angemacht; die Leinen aber selbst an den Forkeln angebunden sind, oder darauf ruhen.

Oberücken wird an manchen Orten das Gedster des Hirsch's genannt. S. Hirsch.

Ochse wird eigentlich das männliche Geschlecht des Rindviehes genannt. Zu den wilden Ochsen, welche Gegenstände der Jagd sind, gehören der Auerochse, der Bison und der Büffel. S. d. Wörter.

Ohren, (leise), kann man den Jagdhunden machen, wenn man ihnen einige Morgen nacheinander gebranntes Geißblattwasser mit dem Saft von unreifen Weintrauben vermischt, in die Ohren tröpfelt.

Ohren-Steißfuß — *Podiceps auritus*, Lath. oder *Colymbus auritus* Linn. — oder Ohrentaucher, Meerdreihals, gehörter Taucher, Schwarztaucherlein, großohrige Taucherente, Dackentlein, Duckentlein, gehörnter Steißfuß, und Kä-

ferente genannt. Der Schnabel am Oberkiefer ist in der Mitte etwas einwärts gezogen und am Unterkiefer nach der Spitze sehr in die Höhe gebogen. Der Oberleib ist dunkelbraun, der Unterleib weiß; hinter jedem Auge befindet sich ein rostfarbiger Federbüschel, und die Augentlieder nebst dem Sterne sind karminroth. Die Länge beträgt 12 Zoll. Dieser Vogel hält in den meisten Eigenschaften gleichsam das Mittel zwischen dem grauehlichen Steißfuß und gehäutten Steißfüße und der Schnabel hat eine so sehr in die Höhe gezogene Gestalt, daß man glaubt, es müsse derselbe umgekehrt, und zwar der Unterkiefer der Oberkiefer werden, um damit er seine rechte Stellung erhielte. Dieser Vogel findet sich auf deutschen Seen und Teichen einzeln, öfterer aber wird er auf dem Zuge im Herbst auf den Teichen gesehen. Seine Nahrung besteht aus Insekten und Kräutern und das Nest ist im Schilf schwimmend mit 3 bis 4 gelblichweißen, braungrauen beschmuckten Eiern.

Otterjagd ist bey der Fischotter beschrieben worden.

P.

Packen sagt man, wenn die Hunde Sauen einholen und angreifen.

Palmgeweih ist ein, wie eine ausgestreckte Hand gestaltetes Hirschgeweih.

Palmhirsch heißt ein Hirsch, der ein solches Geweih trägt.

Pantera, Schießheerd ist ein viereckiges, dreysaches, auf beyden Seiten mit Spiegeln und innen

inwendig mit einem feinen weiten Inngarne versehenes Garn, zum Fange der Krammets- und kleinen Vögel bestimmt. Der Platz, wo der Vogelfang mit diesem Netze betrieben, und auf dessen einer Seite in der Mitten eine Hütte angebracht wird, wird Roccolo genennet. Dieser Fang ist in Italien, Oesterreich und Tyrol üblich; er ist zwar kostspielig, aber sehr angenehm und einträglich. Er wird in einem Vorholze, jungen Schläge, oder auch in einer Aue, an einem solchen Orte angebracht, wo die Vögel ihren Strich haben, und nach Fig. 9. folgendergestalt bereitet. Die Seiten A—B, A—C, und B—D, wovon erstere gerade vor der Hütte ist, sind jede 64, die Seiten C—E und D—F jede 32 Ellen lang. Um den ganzen Platz ist ein, mit grünen Bäumen, auf beyden Seiten beplanzter Platz. Innerhalb desselben richtet man die Garne auf, ziehet sie fest an, und spannet die großen Siegelmaschinen unter sich am Boden mit Haaken fest an, damit das Inngarn leicht hin und wieder gezogen werden könne. Die Bäume, zwischen welchen die Pantera zu stehen kommt, müssen etwas höher seyn, als diese, und unten herum, so hoch die Netze reichen, von allen Nestern befreyet werden, oben aber alle Nester behalten. So hoch die Netze sind, müssen die Bäume mit einem Zaune umgeben, und dadurch wider das Eindringen der Thiere verwahrt werden. In der Mitte desselben bey ü müssen Haadkreiser, wie bey andern Vogelheerden seyn, welche

1½ Elle höher sind, als die Netze. Außer diesen müssen noch verschiedene Bäume in der Pantera stehen, die jedoch nicht so hoch sind, als die, welche außen herum stehen. Die Hütte K ist 9 bis 10 Ellen hoch, und bestehet aus zwey Stockwerken, wo die Vögel aufbewahrt werden, im obersten aber die Vogelfeller nebst denjenigen, die den Fang mit ansehen wollen, sich befinden. Nicht weit von der Hütte sind drey, etwa 4 bis 4½ Elle hohe, oben mit Rasen bedeckte Bühnen, worauf die Ruhvögel sind, die man von der Hütte aus ziehen kann, wovon die mittelmste am nächsten bey der Hütte, 6 Ellen lang und 2 Ellen breit, die andern beyden aber 2 bis 2½ Elle im □ sind. Wenn der Vogelzug angehet, fängt man diesen Fang zu betreiben an, wobey man Lockvögel haben, oder in deren Ermangelung ihren Gesang durch die Pfeife nachahmen muß. Die singenden Lockvögel muß man inwendig an die Haadkreiser und Bäume 3 Ellen hoch von der Erde in ihren Bauern hängen, und diese mit Tannenreis oder Gras bedecken; sie dürfen aber nie verwechselt werden. Wenn nun auf ihre Locken fremde Vögel herbeekommen, und sich auf die Haadkreiser oder hohen Bäume setzen; so schieset man aus besondern, an der Hütte angebrachten Schießscharten aus Armbrüsten, Bolzen, an welchen Pferde- oder Fuchschwänze, oder auch andere in Gestalt eines Raubvogels geformte Scheussale befestiget sind, in einer solchen Richtung ab, daß sie ohngefähr drey Ellen hoch über die Haadkreiser

ster, einen großen breiten Fleck an beyden Seiten des Rückens; über der Nase hebt die gelblichweiße Farbe, die den ganzen Unterleib bedeckt, mit zwey Punkten an; die Seiten sind etwas röthlicher und unmerklich grau gewässert; die kleinen Deckfedern der Flügel sind schwarzbraun, gelblichweiß gerändert, die größern und die Schwungfedern schwarz, ins bräunliche spielend, die erste Ordnung Schwungfedern mit großen weißen Wurzeln, wodurch ein weißer Fleck entsteht, die zweyte, so wie die großen Deckfedern, mit gelblichweißen Spizen; der Schwanz, wie die Flügel, schwarz ins bräunliche übergehend, die äußerste Feder etwas kürzer, weiß, nur in der Mitte mit einem schwarzen Flecke, die übrigen nach der Mitte zu mit weißen Spizen und immer abnehmenden weißen Wurzeln, so daß die mittellste ganz schwarz ist; die Unterflügel sind hellgrau. Das Weibchen hat weniger Schwarzes und Braunes als das Männchen; überhaupt sind die Farben blässer und mehr abgeschossen; es ähnelt aber sonst dem Männchen im Ganzen. Die gewöhnliche angenommene Farbe des Weibchens, daß es röthlich- aschgrau sey, ist ungegründet, und es ist ein Junges, oder das Weibchen des r o t h r ü c k i g e n Bürgers beschrieben. Dieser Vogel ist an mehreren Orten unter dem Namen des Finkenbeißers bekannt, weil er so zänkisch ist, daß er sich mit allen Vögeln, die in seiner Nachbarschaft wohnen, herumbeißt, be-

sonders aber mit den Elstern und im Herbst und Frühjahr mit den Finken. Er ist von großer Gelehrigkeit, setzt sich auf die Baumspitzen und singt den Gesang der meisten Vögel, die um ihn sind, nach; am vollkommensten den der Nachtigall und des Mönchs; nur singt er leise und nicht mit so abgerundeten Tönen. Zwischen diese Gesänge mischt er einige unangenehme kreischende Strophen aus seinem eigenen Gesange. Seine Lockstimme ist ein rauhes: Ketsch, äätsch! oder der Ruf des Sperlings; im Affekte aber schreyt er in einem weg: G ä ä, G ä ä, G ä ä! Wegen seines Fluges, und besonders wegen seiner weißen Flügelzeichnung, heißt er in Thüringen: W a l d e l s t e r. Sein Vaterland ist Europa. Als Zugvogel kommt er in den letzten Tagen des Aprils in Deutschland an und zieht in der Mitte des Septembers wieder weg. Auf seinem Zuge fliegt er familienweise von einem Baume und Strauche zum andern, und verliert sich so unvermerkt. Im Sommer wohnt er nicht nur in Gebirgen und Wäldern, in den Gegenden der Viehhallen, sondern auch und vorzüglich in Ebenen, und zwar da in Menge, wo die Pferde Tag und Nacht auf eingeschränkten Weideplätzen sich aufhalten, wenn nur Bäume, Gärten und Hecken in der Nähe sind. Er nährt sich vorzüglich von May- Ros- und Mistkäfern, auch von Heuschrecken und andern Insekten. Nur im Nothfalle geht er junge ohnmäch-

mächtige Vögel, Eidechsen und Mäuse an. In Wäldern, Gärten und Feldern nistet er auf hohe Räume in dicke Zweige, baut ein großes Nest von Pflanzenstengeln, Moos, Gras, Schweinsborsten, Wolle und Haaren, und legt gewöhnlich sechs weißliche ins Grüne schillernde Eier hinein, die besonders am stumpfen Ende mit bräunlichen, bläulichen und blasröthlichen Flecken besetzt und in funfzehn Tagen ausgebrütet sind. Selten findet man das Nest im Felde auf hohen Schlehen- und Maßholderbüschen. Die Jungen sehen bis zum Mäusern oben schmutzweiß und dunkelashgrau geschuppt, unten schmutzweiß und grau gewölkt, und an den Flügeldecken stark rothfarben kantirt aus. Der Schwanz und die Schwingen sind schwarzgrau. Die verschiedenen Arten des Fanges und der Erlegung, so wie der Nutzen und Schaden, sind wie bey dem grauen Neuntödter. 4) rothrückiger Neuntödter oder Bürger, *L. Collario* Lin. s. *L. spinitorquus* — Bechst. — Dornbreher, Dorntreter, kleiner bunter Bürger; mandelbrauner Millwürger, blaupföpfiger Bürger, kleiner bunter Barkengel oder Bürgengel, Dornbrechler, rothgrauer kleinster Bürger; schädlicher Bürger, singender Rohrwürangel, singender Rohrwürger, großer Dornreich, Dornkreuzel, kleiner Neuntödter, Finkenbeißer, kleiner Wahnkrengel,

Spießer, aschfarbener Neuntödter und Dornbreher. Die Kennzeichen dieser Art sind: Männchen: Der Kopf ist aschgrau; der Rücken, die Deckfedern der Flügel schön rothbraun; Brust und Bauch schwach rosenroth. Weibchen: Der Oberleib schmutzig rothbraun, schwach weiß und schwarzbraun gemäxert; Hals, Brust, und Seiten gelblichweiß mit dunkelbraunen Wellenlinien. Er ist der kleinste deutsche Bürger, und in seiner Lebensart und in seinem Betragen scheint er den Uebergang zu den Singvögeln zu machen. Er ist sechs Zoll lang, wovon der Schwanz drey Zoll und der Schnabel sechs Linien mißt; die Breite ist ein Fuß; und die Schwingen legen sich auf den Drittheil des Schwanzes zusammen; der Schnabel ist zusammengebrückt, fast gerade, an der Spitze mit einem scharfen Zahne und Haaken versehen; der Augenfleck graubraun; die Füße schwarz ins bläuliche sich ziehend; die geschilderten Schienbeine zehn Linien hoch. Männchen und Weibchen sind in der Farbe gar auffallend verschieden. Am Männchen sind Kopf, Nacken, Bürgel und Knie aschgrau; über den Augen und an der Stirn wird diese Farbe etwas heller; von den Nasenlöchern läuft durch die Augen bis zu den Ohren ein breiter schwarzer Streifen; der Rücken und die Deckfedern der Flügel sind schön rothbraun; die Kehle und die Steißfedern

federn schön weiß, so wie der Unterleib, der an der Brust, dem Bauche und den Seiten schwach rosenroth angelauten ist; die Schwungfedern schwärzlich, die hintern stark rothbraun gerändert: der etwas keilförmige Schwanz an den mittlern Federn schwarz, an den übrigen aber bis über die Hälfte von der Wurzel an zunehmend weiß und mit weißen Spitzen. Am Weibchen ist der ganze Oberleib schmutzig rothbraun; am Nacken und auf den Deckfedern des Schwanzes ein wenig ins aschgraue spielend und auf dem Rücken und den Deckfedern der Flügel kaum merklich weiß gewässert; über den Augen und an der Stirn herum bis zu den Augen gelblich weiß; an den Wangen dunkelbraun; Kehle, Bauch und Afterfedern schmutzigweiß; Hals, Brust und Seiten gelblich weiß, mit dunkelbraunen Querlinien; Schwung- und Schwanzfedern dunkelbraun, letztere etwas ins röthliche spielend; die äußersten Schwanzfedern weiß eingefast, die übrigen aber nur bis auf die vier mittlern mit weißen Spitzen versehen.

Varietäten: 1) Der weiße rothrückige Würger. Er ist ganz weiß. 2) Der bunte rothrückige Würger. Er hat unregelmäßige weiße Flecken auf verschiedenen Theilen des Körpers. Dieser Vogel nimmt unter den singenden Vögeln keine geringe Stelle ein. Sein Gesang ist aus den Liedern der Schwalbe, des Stieglitzes, der Graßmücke, der Feldlerche, Pieperche, des Weidenzeißigs, der

Nachtigall, der Vastarnachtigall, des Rothkehlchens, Zaunkönigs u. d. g. und nur wenigen rauhhen eigenthümlichen Strophen zusammengesetzt. Es sind dieß alles fast lauter nachgeahmte Melodien, die er in dem nämlichen Augenblicke, als er sie hört, auch nachzusingen vermag. Diejenigen Vögel, die ihm nahe wohnen, bilden aber allezeit seinen eigentlichen bleibenden Gesang, und es ist alsdann, wenn es schon ein alter Vogel ist, Frohsinn und Muthwillen, wenn er den Gesang eines vorbeisfliegenden Vogels sogleich nachsingt. Nur die sprechenden Lieder der Goldammer und Finken ist er nicht nachzuahmen im Stande, ob er sie gleich täglich und unaufhörlich hört, und es kann ihn nichts, als der Bau seiner Kehle, daran hindern. Seine Lockstimme ist ein übelklingendes Gää, Gää, Atsch, atsch! Zänktisch ist er, wie alle seine Gattungsverwandten, und jagt und beißt sich daher immer mit den Graßmücken, Goldammern u. d. g. Vögeln, die sich seinem Reviere nähern, herum, doch ist er zu ohnmächtig, um jemals einen davon tödten zu können. Bei der Begattung macht er posierliche Wendungen, besonders mit dem Schwange, breitet ihn fächerförmig aus, schlägt ihn wieder zusammen, dreht ihn bald rechts, bald links, und macht dazu die lächerlichsten Verbeugungen. Er wohnt in Europa, und ist in Deutschland gemein. Als Zugvogel kommt er fast zuletzt, zu Anfang des May an.

an. Ob man ihn gleich auch in Thälern der Wälder, wo Vieh trifft und Viehhalten sind, antrifft, so wohnt er doch mehr im Felde, in Hecken und Gebüsch, und auch da am liebsten an solchen Orten, wo das Vieh weidet und die Pferde eingeschränkt sind. Schon zu Ende des Augusts zieht er mit seiner Familie, ehe sich noch die Jungen gemauert haben, weg, und zwar langsam von einem Feldbusche zum andern, da ihm Hunger und Kälte nicht nöthigen, seine Reise zu beschleunigen. Dieß ist derjenige Bürger, welcher im May so große Niederlagen unter den Maykäfern und im Sommer unter den Mistkäfern, Heuschrecken und Heuschrecken anstellt, und diese Insekten an die Dornen der Schwarz- und Weißdornstaude anspießt. Man findet daher im Felde solche Büsche, wo eine Menge dergleichen Insekten durchbohrt stecken; nur selten aber trifft man auch einen jungen Vogel, eine junge Maus, eine Eydäse, oder Stücken von denselben, in ihrer Gesellschaft an. Und es ergiebt sich daraus gar deutlich, daß er sich nur an solche Vögel, vierfüßige Thiere und Amphibien wagen darf, die ihn nicht durch Geschwindigkeit ihrer Flügel und Füße entgehen können. Merkwürdig genug ist es aber, daß er nicht, wie die meisten Vögel, den ganzen Tag speiset, und so oft er etwas findet, dasselbe verschluckt, sondern ordentlich bestimmte Mahlzeiten hält, sich erst gleichsam verschiedene Schüsseln zubereitet und

aufträgt, ehe er sich zur Tafel setzt. Das Nest steht in einem dichten Busche, welches gewöhnlich ein Schwarz- oder Weißdornbusch ist. Es ist groß, auswendig mit Wurzeln und groben Grassfengeln angelegt, darauf folgt eine Lage Moos und Wolle, und die innere Ausfütterung endlich besteht aus lauter kleinen Wurzelfasern. Gewöhnlich findet man fünf, seltner sechs stumpfe Eyer in demselben, die im Grunde weiß, und überall mit schmutziggelben und aschgrauen Pünktchen bestreuet sind. In vierzehn Tagen sind sie von dem Weibchen ausgebrütet; das Männchen sammelt unterdessen Käfer, daß die Mutter, wenn sie der Hunger nöthigt von den Eiern aufzustehen, gleich ihre Mahlzeit bereit findet, oder sitzt etliche Bäche vom Neste auf der Spitze eines Zweiges, wacht und singt. Die Jungen sehen alle fast wie die Mutter aus, am Oberleibe und der Brust grüngrau mit vielen dunkelbraunen Wellen und am Bauche schmutzigweiß, und nehmen auch das Kleid mit in diejenigen Länder, wo sie sich im Winter aufhalten, mauern sich dort, und wir sehen sie erst das folgende Frühjahr in ihrer verschiedenen männlichen und weiblichen Kleidung. Sie sind nicht scheu, und können leicht geschossen werden. Wenn man sie lebendig fangen will, so darf man nur auf denjenigen Busch, wo sie oft sitzen, Leimruthen stecken, sie darnach hinzagen, so fangen sie sich gleich. Nutzen und Schaden sind wie bey dem vor-

vorhergehenden. Ihr Fleisch, besonders der Zungen, schmeckt sehr gut.

Nicht weiter gehen sagen die Jäger, wenn ein Wild in mehreren Tagen nicht übergewechselt, oder sich gar aus dem Gehege entfernt hat, und es sich der Mühe nicht verlohnet, demselben weiter nach zu gehen.

Nichts übergehen sagt man vom Leithunde, wenn derselbe eine gute Nase hat, so daß er auch die kalten und trockenen Fährten auf hartem Boden und bey dürrem Wetter anfaßt und fleißig darauf forscht.

Nichts zurücke Hoh! rufen die Jäger einander zu, welche auf den beyden Flügeln sich befinden, wenn bey einem Jaggen ein Dicksig abgetrieben worden ist, und die Jagd- oder Treibeleute heraus auf einen Stellweg kommen, damit wieder ganz gemacht werden kann.

Niederfallen sagt man vom Federwildpret, wenn es sich auf den Erdboden setzt.

Niedergethan oder Niederthun sagt man, wenn ein Hirsch oder anderes Wildpret sich niedergelegt hat.

Niedrig geht der Hirsch, wenn er sein Geweihe abgeworfen hat.

Nimmer satt — Tantalus — ist eine besondere Gattung der Sumpfbögel mit folgenden Kennzeichen: Schnabel

lang, pfriemensförmig und unterwärts gekrümmt. Nasenlöcher: enförmig. Zunge: kurz und breit. Gesicht: bis hinter die Augen kahl. Füße: mit Vordergehenden, die am ersten Gelenke durch eine Haut verbunden sind, und an welchen der Nagel der Mittelzehe etwas breit kammförmig eingeschnitten ist. Wir haben bey uns bloß eine Art, als: Gemeiner Nimmer satt, Sichel schnäblein. T. Falcinellus Linn. — Mit schwarzem, grünschillerndem Gesichte; kastanienbraunem Halse und Körper, und stahlgrün und violett schillernden Flügeln, $1\frac{1}{2}$ Fuß lang. Er variiert in der Farbe, vielleicht aber bloß nach dem Alter und nicht nach dem Geschlechte; denn die alten Männchen und Weibchen sehen sich einander ganz ähnlich, außer, daß letzteres etwas kleiner ist. a) Stirn; Scheitel, Wangen, Kehle und Oberhals braungrau mit weißen Längsflecken; Unterhals, Brust, Afters und Schnabel braungrau, und der Afters, sowie die Seiten des Bauchs, mit stahlgrauem Schiller. b) Hals, Ober Rücken, Brust, Schultern und kleine Deckfedern der Flügel, Bauch und Schnabel kastanienbraun, ohne Glanz. c) Oben, und an den Flügeln und Schwanz glänzend kastanienbraun, und an der Brust grün. In Deutschland trifft man ihn nur Einzelnen an den südlich deutschen Flüssen und in Schlessien, sonst im Zuge im mittlern Deutschland. Er wählt sich zur Nahrung: Insekten, Würmer und Pflanzen.

Pflanzenstoffe, und führt auch die Rahmen: Sichelschnabel, sichelschnäblicher Ibis, grüner, braungrüner, dunkelbrauner, braunrother, kastanienbrauner und kleiner Brachvogel, braunrother Bracher, Welscher Vogel, Sdysser, Türkischer Goisser und Türkischer Schnepf.

Nisten, zu Nester tragen, das Nest machen, und bey den Raubvögeln horsten, sagt man von den Vögeln, wenn sie ihr Nest (Horst) bereiten.

Nothbau werden die Wohnungen der Füchse genannt, welche sie im platten Felde graben.

Rußkrähe oder Tannenheher — *Corvus Caryocatactes* — gehört in die Ordnung und Gattung des Kollkrähen, wo sie eine besondere Art ausmacht und auch noch folgende Rahmen führt, als: Rußbrecher, Rußpücker, Rußbeißer, Rußkretscher, Rußbreischer, Rußknacker, Rußhacker, Waldstael, türkischer Holzschreyer, Tannenheher, Steinheher, Tanneneister, schwarzer Markward und Markolf. Als besondere Kennzeichen dieser Art sind nachstehende anzusehen, als: die Hauptfarbe ist schwarzbraun mit weißen Tropfen bestreut; die Schwanzfedern sind schwarz mit weißen Spitzen. Dieser Vogel ist so bunt wie ein Staar, und fast so groß wie der vorhergehende. Seine Länge ist ein Fuß, wovon der Schnabel einen und einen halben Zoll und der Schwanz vier und einen halben Zoll wegnimmt; die Breite ein Fuß acht Zoll und die Flügel bedecken zwey Dritttheile des Schwanzes. Der Schnabel ist länger, gerader und stumpfer als bey den andern Vögeln dieser Gattung, und die Farbe schwarz; der Augenstern rußbraun; die Füße schwarz; die geschilderte Fußwurzel ein und drey Viertel Zoll hoch. Der Leib ist schwarzbraun, oben heller, unten dunkler; der Kopf, Nacken und Würzel einfarbig; vor den Augen ein weißer Fleck; an den Wangen und Seiten des Halses eine Menge weißer, kleiner, eyrunder Flecken, auf dem Rücken einzelne größere; an der Kehle nur einzelne Strichelchen; an der Brust häufige, große, eyrunde, am Bauche etwas sparsamere, aber größere und fast brechedige Flecken; die obern Deckfedern des Schwanzes schwarz, die untern weiß; die obern und untern Deckfedern der Flügel schwärzlich, die kleinern mit einzelnen brechedigen Spitzen, die Schwungfedern auf der innern und äußern Seite schwarz, doch die vordern dunkler als die hintern, die sechste bis zwölfte mit einer feinen weißen Spitze; die fünfte ist die längste, daher hat er auch einen, obgleich schnellen, doch kurz abgebrochenen, bogenförmigen Flug. Der Schwanz ist schwarz, abgerundet, die erste Feder kürzer mit einer großen, wei-

fen Spitze, die alle Federn haben, doch so, daß sie nach der Mitte zu schmaler wird, und die mittelfte nur sehr schmal weiß gerändert ist. Das Weibchen ist mehr rost-, als schwarzbraun. Varietäten: 1) Der weiße Tannenheber. Er ist entweder rein weiß oder gelblich weiß, mit etwas hervorstrahlenden dunkeln Flecken. 2) Der bunte Tannenheber. Mit weißen Flügeln und Schwanz. Wenn dieser Vogel in tiefen, von Menschen wenig besuchten Gebirgen wohnt, so ist er gar nicht scheu, und die Jungen lassen sich, wenn sie ausgeflogen sind, oft von Rühirten mit dem Stocke todt schlagen. Wenn sie aber erst einmal ihre Herbstwanderung gemacht haben, dann werden sie vorsichtiger. Ihr Geschrey ist dem des Spechtes und der Elster ähnlich und klingt hoch, scharf und kreischend: Görr görr görr görr görr! Sie sitzen zuweilen auf dem Gipfel eines Baums und schreyen aus vollem Halbe die Töne in einer Reihe hinter einander. Sie fliegen wie eine Dohle und lehnen sich dabei bald auf die rechte bald auf die linke Seite. Man trifft ihn in ganz Europa und in Sibirien an. Er soll sich auch in Nordamerika aufhalten. Seine Wohnungen schlägt er in den stillen Waldungen auf, mehr in gebirgigen Gegenden und zieht das Schwarzholz dem Laubholze im Sommer vor, doch befindet er sich da an denen, wo beyde vermischt wachsen, wo Gärten und

Wiesen in der Nähe sind. Hier hält er sich vom März bis in die Mitte des Septembers auf, alsdann aber streicht er einzeln und auch in Schaaren nach den lebendigen Feldhölzern, die mit Eichen, Buchen und Haselnüssen bewachsen sind, und man trifft ihn daher im Winter auch in einzeln liegenden Feldhölzern und auf den Straßen an. In Thüringen ist er daher ein bloßer Strichvogel, ob er gleich in kältern Ländern mit Recht zu den Zugvögeln gerechnet werden kann. Die Tannenheber nähren sich im Sommer von verschiedenen Insekten und deren Larven, als Mistkäfern, Mienen, Wespen, von Regenwürmern, von Tannen- und Fichtenäsaamen, im Herbst von Haselnüssen, denen sie den ganzen September und Oktober durch nachfliegen, von Bucheckern, Eichel, Ebereschbeeren; diese letztern, den Fichtenäsaamen, und die unverdaulichen Haselkörner in dem Pferdemiste, suchen sie den ganzen Winter hindurch auf. Auch sollen sie sich im Herbst den reisenden und reifen Hanfäsaamendörnern nähern. Sie haben einen weiten Schlund, in welchem sie etliche Haselnüsse und Eichen aufbewahren können. Sie knacken und verschlucken die Nüsse daher nicht immer sogleich, sondern tragen sie im Kropfe mit sich weg, und verstecken sie, wenn sie nicht mehr hungrig sind. Sie nisten in hohlen Bäumen, deren Oeffnung sie sich zuweilen durch ihren starken Schnabel erweitern müssen und legen fünf bis

bis sechs Eier. Die Jungen fliegen bald aus, und lassen sich noch lange, ganz stille, auf einem Baumzweige der Reihe nach sitzend, von den Alten füttern. Diese tragen ihnen dann lauter Insekten, Insektenlarven und Regenwürmer zu. Die Baumarder und Wiesel zersthören zuweilen ihre Brut. Sie werden in ganz Deutschland nur einzeln angetroffen, daher man sie auch nur von ohngefähr, und gewöhnlich nur auf dem Striche zum Schusse bekommt. Sie halten besser als die Holzheher. Im Herbst fangen sie sich auch in der Schneuse.

Man will sie auch auf den zum Austrocknen aufgestellten Hanfbunden in großen Spreukeln fangen. Ihr Nutzen besteht theils im Fleische, das nicht unangenehm schmecken soll, theils in der Vertilgung vieler schädlicher Insekten und Würmer; und gleichwohl werden diese Vögel von den Jägern häufig als schädlich getödtet. So viel ist gewiß, daß sie dem Jäger auf dem Pirschgange durch ihr Geschrey das Wild verschrecken, indem dies allezeit aufmerksam wird, wenn es dieses Geschrey hört.

D.

Oberfalkenier ist der vornehmste unter den Falkenierern, s. d. Wort.

Oberjäger ist in manchen Ländern eine Bedienung bey der Jägerey, die im Range unsern Oberförstern gleich sind. In solchen Staaten, wo ein militärisches stehendes Jäger-Corps gehalten wird, führen die Unter-Officiers den Namen Oberjäger.

Oberjägermeister, Oberlandjägermeister, Oberhofjägermeister ist die vornehmste Stelle bey der Jägerey großer Länder, unter dessen Befehlen alle Oberförstermeister, Wildmeister, und alle hohe und niedere Forst- und Jagdbediente stehen. Nicht weniger hat er auch die Oberaufsicht über sämtliche

Flößen, bezugleich über alle Forstwerke im ganzen Lande. Eine hohe Kenntniß aller in die Fächer seines wichtigen Postens einschlagenden Wissenschaften, so wie eine ausgezeichnete Aufmerksamkeit und Klugheit in Entwerfung aller dahin gehörigen und auf das Beste des Landes abzweckende Pläne und Ertheilung der nöthigen Befehle sind die glänzenden Eigenschaften dieses großen Mannes. In Chursachsen findet man sie in der Person unsers würdigen Oberjägermeisters, Sr. Excell. Herrn Thym Heinrich Adolph v. Preuß in der glücklichsten Vereinigung.

Oberlandjägermeister s. Oberjägermeister.

Oberleinen sind diejenigen Leinen, welche zu oberst an den
Negen

Nagen sind, woran diese entweder fest oder beweglich angemacht; die Leinen aber selbst an den Forkeln angebunden sind, oder darauf ruhen.

Oberücken wird an manchen Orten das Geäster des Hirsches genannt. S. Hirsch.

Ochse wird eigentlich das männliche Geschlecht des Rindviehes genannt. Zu den wilden Ochsen, welche Gegenstände der Jagd sind, gehören der Auerochse, der Bison und der Büffel. S. d. Wörter.

Ohren, (leise), kann man den Jagdhunden machen, wenn man ihnen einige Morgen nacheinander gebranntes Geißblattwasser mit dem Saft von unreifen Weintrauben vermischt, in die Ohren tröpfelt.

Ohren-Steißfuß — *Podiceps auritus*, Lath. oder *Colymbus auritus* Linn. — oder **Ohrentaucher**, **Meerdrehals**, **gehörter Taucher**, **Schwarztaucherlein**, **großohrige Taucherente**, **Dachentlein**, **Duchentlein**, **gehörnter Steißfuß**, und **Kä-**

ferente genannt. Der Schnabel am Oberkiefer ist in der Mitte etwas einwärts gezogen und am Unterkiefer nach der Spitze sehr in die Höhe gebogen. Der Oberleib ist dunkelbraun, der Unterleib weiß; hinter jedem Auge befindet sich ein rostfarbiger Federbüschel, und die Augenlider nebst dem Sterne sind karminroth. Die Länge beträgt 12 Zoll. Dieser Vogel hält in den meisten Eigenschaften gleichsam das Mittel zwischen dem graukelichen Steißfuß und gehäubten Steißfuß und der Schnabel hat eine so sehr in die Höhe gezogene Gestalt, daß man glaubt, es müsse derselbe umgekehrt, und zwar der Unterkiefer der Oberkiefer werden, um damit er seine rechte Stellung erhielte. Dieser Vogel findet sich auf deutschen Seen und Teichen einzeln, öfterer aber wird er auf dem Zuge im Herbst auf den Teichen gesehen. Seine Nahrung besteht aus Insekten und Kräutern und das Nest ist im Schilf schwimmend mit 3 bis 4 gelblichweißen, braungrauen beschnitzten Eiern.

Otter jagd ist bey der Fische otter beschrieben worden.

P.

Packen sagt man, wenn die Hunde Sauen einholen und angreifen.

Palmgeweih ist ein, wie eine ausgestreckte Hand gestaltetes Hirschgeweih.

Palmhirsch heißt ein Hirsch, der ein solches Geweih trägt.

Pantera, **Schießheer** ist ein vieredriges, dreysaches, auf beyden Seiten mit Spiegeln und inwen-

Inwendig mit einem feinen weissen Inngarne versehenes Garn, zum Fange der Krammets- und kleinen Vögel bestimmt. Der Platz, wo der Vogelfang mit diesem Netze betrieben, und auf dessen einer Seite in der Mitten eine Hütte angebracht wird, wird Roccolo genennet. Dieser Fang ist in Italien, Oesterreich und Tyrol üblich; er ist zwar kostspielig, aber sehr angenehm und einträglich. Er wird in einem Vorholze, jungen Schlage, oder auch in einer Aue, an einem solchen Orte angebracht, wo die Vögel ihren Strich haben, und nach Fig. 9. folgendergestalt bereitet. Die Seiten A—B, A—C, und B—D, wovon erstere gerade vor der Hütte ist, sind jede 64, die Seiten C—E und D—F jede 32 Ellen lang. Um den ganzen Platz ist ein, mit grünen Bäumen, auf beyden Seiten beplanzter Platz. Innerhalb desselben richtet man die Garne auf, zieht sie fest an, und spannet die großen Siegelmaschinen unter sich am Boden mit Haaken fest an, damit das Inngarn leicht hin und wieder gezogen werden könne. Die Bäume, zwischen welchen die Pantera zu stehen kommt, müssen etwas höher seyn, als diese, und unten herum, so hoch die Netze reichen, von allen Nesten befreyet werden, oben aber alle Nester behalten. So hoch die Netze sind, müssen die Bäume mit einem Zaune umgeben, und dadurch wider das Eindringen der Thiere verwahrt werden. In der Mitte desselben bey ü müssen Haadreiser, wie bey andern Vogelheerden seyn, welche

1½ Elle höher sind, als die Netze. Ausser diesen müssen noch verschiedene Bäume in der Pantera stehen, die jedoch nicht so hoch sind, als die, welche außen herum stehen. Die Hütte K ist 9 bis 10 Ellen hoch, und bestehet aus zwey Stockwerken, wo die Vögel aufbewahrt werden, im obersten aber die Vogelfsteller nebst denjenigen, die den Fang mit ansehen wollen, sich befinden. Nicht weit von der Hütte sind drey, etwa 4 bis 4½ Elle hohe, oben mit Rasen bedeckte Bühnen, worauf die Ruhvögel sind, die man von der Hütte aus ziehen kann, wovon die mittelmste am nächsten bey der Hütte, 6 Ellen lang und 2 Ellen breit, die andern beyden aber 2 bis 2½ Elle im □ sind. Wenn der Vogelzug angehet, fängt man diesen Fang zu betreiben an, wobey man Lockvögel haben, oder in deren Ermangelung ihren Gesang durch die Pfeife nachahmen muß. Die singenden Lockvögel muß man inwendig an die Haadreiser und Bäume 3 Ellen hoch von der Erde in ihren Bauern hängen, und diese mit Tannenreis oder Gras bedecken; sie dürfen aber nie verwechselt werden. Wenn nun auf ihr Locken fremde Vögel herbeekommen, und sich auf die Haadreiser oder hohen Bäume setzen; so schießt man aus besondern, an der Hütte angebrachten Schießscharten aus Armbrüsten, Bolzen, an welchen Pferde- oder Fuchsschwänze, oder auch andere in Gestalt eines Raubvogels geformte Scheusale befestiget sind, in einer solchen Richtung ab, daß sie ohngefähr drey Ellen hoch über die Haadreiser

reifer hinfliegen, und die Vögel, welche sie für Raubvögel ansehen, veranlassen, mit größter Schnelligkeit in die niedern Bäume und Streicher herab zu schießen, wodurch sie in die Netze gerathen. Die Pantera wird folgender gestalt gestrickt: Das Innegarn, welches queer vor die Hütte zu stehen kommt, wird von A bis B 1400 Maschen lang und 31 Fuß hoch gestrickt. Die großen Spiegel aber fängt man mit 140 Maschen an, und macht sie $9\frac{1}{2}$ Spiegel hoch. Die beyden größern Panteren werden mit 120, die kleinern Spiegel aber mit 110 Maschen angefangen, alle aber behalten die obige Höhe. Diese werden eingerichtet wie Stedgarne, nur daß man oben, wo die große Leine ist, gedrehte Ringe von Horn einmacht, damit man die Pantera zusammen und wieder auseinander ziehen kann, welche man, jedes Netz besonders, an drey kleinen, oben an den Latten angeschraubten Kloben und durch dieselben gezogenen Hangelainen, woran die Ringe sind, nach Gefallen auf- und niederlassen kann. Zum Fange der Finken und anderer kleinen Vögel, ist die Pantera von gleicher Beschaffenheit, die Netze eben so hoch, aber von weit kleinern Umfange, die Haackreiser werden nicht innerhalb, sondern ausserhalb drey Ellen von der Pantera gesetzt. Auch wird über dem Gang um dieselbe ein abschüssiges Dach von Latten gemacht, und mit grünen Reisern bedeckt, weil sonst die Finken,

wenn sie der Pantera zu nahe kämen, in die Höhe steigen würden. Das Garn A. B. wird 800, die beyden längern aber 1200 Maschen lang und 31 Fuß hoch gemacht, die großen Spiegel werden mit 80, und die an der Seiten mit 120 Maschen angefangen, alle aber $9\frac{1}{2}$ Spiegel hoch gemacht.

Panzer nennet man Faltten, die von braunen oder schwarzen Barchend gemacht, mit fester Leinwand gefüttert, entweder mit Fischbein ausgehähet, oder mit Haaren oder Baumwolle ausgestopft werden, und die man den großen englischen Hunden bey der Sauhay ansetzt, damit sie nicht zu Schaden kommen. Unter dem Bauche und an der Brust, als den, der Gefahr am meisten ausgefetzten Theilen, werden sie allezeit mit Fischbein ausgelegt, und mit lauter Nestelldörnern hart an einander ausgehähet, daß sie so fest, wie ein Panzer werden. Wegen der Hinterläufe muß bey den Seitenflügeln das Maas ordentlich genommen werden, auch müssen an die Vordersehenkel Nermel, auf dem Rücken aber Schnürlöcher gemacht werden, wo man sie mit Riemen zusammen schnüret.

Parforce abrichten, dressiren ist die Art und Weise, die Hünnerhunde, auch die Parforcehunde zu ihrem Geschäfte abzurichten. S. Parforcehund und vorstehender Hund.

Par:

Parforcehund, Parforcejagdhund, Laufhund ist eine Art von Jagdhunden, die ein aufgejagtes Wild, sie mögen es sehen oder nicht, auf der Fährthe solange laut jagen, bis es vor Müdigkeit nicht weiter kann, sondern abgefangen werden muß. Die französischen und englischen sind die besten, sie sind gemeinlich weiß und buntgefleckt, auch sehr gut behangen. Die französischen haben einen sehr hellen, die englischen einen nicht so hellen Laut, lassen sich auch seltener hören, dagegen sind sie leichter abzurichten. Auch sind sie gehorsamer, haben eine bessere Nase, halten die Spur ordentlicher und nehmen mit schlechterer Kost vorlieb, als die französischen, welche hingegen den Wiedergang des Hirsch's genauer suchen. Ein guter Parforcehund soll einen länglichen Kopf, eine breite Stirne, einen spizigen Hübel, große Augen, lang behangene Ohren, mittelmäßige Schultern, gebogene Nieren, hohe Hüften, einen hohen dicken Schwanz, dicke Lenden, gerade Kniee, starke Nerven, und kurze dicke Klauen haben. Die Hündin, wovon man gute Raze ziehen will, muß nächst obigen Kennzeichen, auch hoch, lang und breit vom Leibe seyn. Sie muß, wenn sie hitzig, tragend ist, oder säuget, nicht zum Jagen ausgeführt, sondern mit dem schönsten Hunde, den man hat, zugelassen werden. Das Zulassen muß zwey oder drey mal, nicht weniger, weil sonst der Hündin die Hitze nicht benommen wird, und nicht mehr-

mal geschehen, weil sonst der Hund zu sehr abgemattet wird. Die beste Zeit dazu ist im Januar, Februar und März. Wenn die Zeit zum Wölken herannahet, muß man fleißig nach der Hündin sehen, sie warm halten, und nöthigen falls mit Arzneymitteln versehen. Wenn die Hündin mehr Zunge wirft, als sie ernähren kann, so muß man die übrigen doch nicht wegwerfen, sondern sie Bauer- oder andern Hündinnen säugen lassen, und und diese sowohl als die eigenen jungen Hunde der fremden Hündin mit Brandwein waschen, damit sie einerley Geruch haben, und also auch von der alten Hündin mit angenommen werden. Wenn die jungen Hunde etwas herangewachsen sind, füttert und wartet man sie eben so ab, wie die Alten, nur daß sie noch nicht mit in die Meute genommen werden, ihnen auch mehr Freyheit gelassen wird. Wenn er 1½ Jahr alt ist, wird er in die Kuppel gewöhnet; anfänglich werden ihrer zwey und zwey zusammengekuppelt, und müssen den Tag über im Hundezwinger herumlaufen, des Nachts aber werden sie losgekuppelt. Hernach nimmt man sie an die Harn, (eine von Pferdehaaren und Hanf gemachte Leine) an dieser führt sie ein Bursche aus. Dieses geschieht täglich früh und Abends vor der Fütterung, damit sie gewohnt werden, en Meute zu gehen. Wenn sie so eingewöhnet sind, läßt man sie ungekuppelt ausführen, bis sie zwey Jahre alt sind, da sie unter die Meute kommen.

men. Es ist gut, wenn man etwa ein paarmal einen Hirsch mit den jungen Hunden allein jagen kann. Man muß aber den Hirsch mit einigen Fudern Zeug einstellen, da man sie dann auf den Hirsch anlegt, und wenn sie ihn genug im Zeuge herumgejaget haben, vor ihren Augen fängt, und das gewöhnliche Curée macht, damit sie genossen und desto hitziger werden. In Ermangelung der Neze, schießt man einen Hirsch wegdewund, und läßt ihn von den jungen Hunden, wozu man einige Alte nimmt, todt jagen, und verzehren. So macht man es auch mit Sauen oder andern Wildpret, das man par force jagen will. Wenn nun die Parforcejagd ihren Anfang nehmen soll, so nimmt man sie ohngefähr 5 bis 6 Wochen vorher unter die große Meute. Ein Piquer reitet vor, die andern neben und hinter den Hunden. Der vorberste ruft den Hunden zu: Allez, allez, hay! hay! die andern aber: tirez! tirez! co! co! oder allez meute! Anfanglich reutet man ein: dann zweymal des Tages, jedesmal vor der Fütterung eine halbe Stunde aus. Man reutet auch wohl hin, wo Wildpret steht, zeigt es ihnen, strafet sie aber, und läßt sie nicht zwischen den Pferden weg, damit sie Gehorsam lernen. Nach einigen Tagen fängt man an, mit ihnen im Trabe zu reuten, anfänglich eine halbe Stunde, dann immer länger. Nach und nach fängt man auch an zu galopiren, um

sie immer mehr in Athem zu setzen. Alsdann wird das Trainjagen (s. d. Wort) vorgenommen. Der ganze Zweck dieser Geschäfte ist, sie in Athem zu bringen, ihnen Gehorsam zu lehren, und sie zum Rufe und zu den Hörnern zu gewöhnen. Wenn die Hunde bey Regenwetter von der Jagd naß zu Hause kommen, muß man in den Kammen der Ställe Feuer anmachen, aber mit den Peitschen dabey bleiben, bis sie wieder abgetrocknet sind. Bey großer Hitze aber läßt man sie im offenen Stalle und Zwinger frey herum laufen, und giebt ihnen gute Rindsbrühesuppe zu freßen, sieht auch nach, ob sie sich etwa wund gelaufen haben. In diesem Falle nimmt man Eßig, in welchen man Kienruß und einige Hände voll Salz thut, und setzt sie mit den Füßen hinein, oder man wäscht ihnen die Füße mit warmen Weine. Sollten aber gar einige steif gehen, so wäscht man sie mit gutem dazu bereiteten Spiritus, und gebet bis sie hergestellt sind, täglich etwas mit ihnen spazieren. Alle Jahre, vor dem Anfange der Jagd, muß man sie purgiren, und den dritten Tag darauf zur Ader lassen, und zwar die Median-Ader am Halse, wobey man ihnen den Hals mit einem Leinchen umbindet, damit die Atern auflaufen, und man sie besser sehen könne, auch muß man sich in Acht nehmen, daß man die Nerven mit der Lanzette nicht verletzet. Das übrige Verfahren ist bey den Worten, Hund, Jagdhund,

hund, Hundkrankheiten und Parforcejagd nachzusehen. Hundert Hunde sind die rechte Zahl zu einer Parforcejagd, doch jaget es sich schon mit 50 Hunden sehr gut, weil man sie besser im Zaume halten kann; sie sind vollkommen hinlänglich; man nimmt deren nur mehr, weil sie mehr Lärm machen. An manchen Orten bestätigt man vorher die Hirsche mit dem Leithunde; doch geschieht dieses nicht überall.

Parforcejäger nennet man einen Jäger, der sich vorzüglich mit der Parforcejagd abgiebt.

Parforcejagd, Lauf- Rennjagen. Forciren, ist eine Jagd ohne Rege und Tücher, welche durch eine Menge Hunde und Jäger zu Pferde dargestellt wird, daß die Hunde das angenommene Wild so lange jagen, bis es stürzt, oder sich nieder thut, oder auch von den Hunden gestellt wird, da man es dann mit dem Hirschkörper abfängt, welches aber, wenn nicht die gehörigen Vortheile dabey gebraucht werden, eine gefährliche Arbeit ist, besonders bey einem Hirsche, der vollkommen veredelt hat, und vorzüglich in der Brunst ist. So bald der Hirsch erlegt ist, machen es die Jäger durch das Parforcehorn kund, legen den Hirsch ins Gehörne, öffnen den Hals und die Gurgel, und geben so den Hunden ihr Genuß warm, alsdann lösen sie den rechten Vorderlauf ab, und überreichen

ihn dem Herrn der Jagd. Endlich zerwirken sie das Stück, und wenn es nicht genießbar ist, geben sie es den Hunden, oder theilen es an die Behörde aus. Auf den ersten Fall werden die Köhnen und Knochen ausgelöst; im letztern hingegen, geschieht die Vertheilung folgendergestalt. Die innersten Nierenbraten und das Geweihe gehören dem Herrn der Jagd, der Jimmel dem Oberjägermeister, der Rücken und die Keulen nebst den Vorderbügen den Jagdjunkern und Jagdpagen; ist aber der Hirsch bestätigt worden, so gehört der rechte Vorderbuck dem, der ihn bestätigt hat. Das Herz, die Lunge und Leber gehören den Leithundeknechten, als ihr Recht, und dem Leithunde wird, wenn er vorher an des Hirsches Kopf und Gehirn geführt worden, davon gegeben, Kopf und Hals gehören den Hundeknechten. Die Parforcejagd ist bloß eine Jagd für große Herren, und wegen der vielen darauf zu haltenden Leute, Pferde und Hunde, sehr kostspielig, dabey aber auch gefährlich, weil mancher Jäger und manches Pferd dabey verunglückt. Sie ist aber auch nicht allenthalben anwendbar, In Engelland ist sie am gebräuchlichsten; in Deutschland aber nur an einigen Höfen eingeführt. Gewöhnlich ist der Anfang der Parforcejagd im Julius oder zu Anfange des Augusts, wenn die Kälber schon etwas erwachsen sind, und mit dem Thiere weichen können, der Hirsch auch sein völliges Geweihe aufgesetzt und geschlagen hat, und

die guten Hirsche sich von dem Truppe abzusondern pflegen. Die Dauer derselben ist gemeiniglich bis zum dritten November, da sie mit dem Hubertusseste beschloffen wird. Während der Brunst ist die Jagd um deswillen nicht gut, weil die Hirsche nicht leicht von den Thieren zu trennen sind. Noch weniger im späten Winter, Herbst und Frühjahr, denn die Hunde haben dann nicht die gehörige Witterung, und beschädigen sich die Füße leicht auf dem Froste, so wie auch Menschen und Pferde leicht auf dem Eise stürzen, oder in Windwehen fallen können. Oekonomisch betrachtet bringet die Parforcejagd mehr Schaden als Nutzen, denn nächst ihrer Kostspieligkeit, ist auch das Wildpret eines solcher gestalt parforcirten Hirschens nicht zu gebrauchen, es werden dadurch viele Felder zu Schanden gemacht, und zum Behuf dieser kostbaren Jagd eine Menge Wildpret zum Schaden der Wälder und Felder unterhalten. Eine Parforcejagd gehörig einzurichten, muß der Wald nach allen Richtungen mit Äleen und Wegen durchhauen, die Wässer und Brüche mit Brücken und Dämmen verwahrt seyn, damit man dem Hirsche allenthalben ohne große Umwege folgen kann. Auch müssen die nöthigen Gebäude, Personen und Pferde angeschafft werden. Wenn nun vom Fürsten die Jagd anbefohlen worden, so ziehen am Morgen der Jagd die Piqueurs, Besuchknechte und andere zur Parforcejagd gehörige Jäger aus, und suchen oder be-

stätigen jeder an seinem bestimmten Orte, die vorgeschriebenen Hirsche, ziehen auf den bestimmten Zusammenkunftsort, (Rendezvous) und erstatten bey dem Haupt der Jägerey, oder nach Befinden bey dem Fürsten selbst Bericht. Wenn nun der zu jagende Hirsch bestimmt ist, ziehet der Besuchknecht, der ihn auf der Vorsuche gehabt, mit seinem Leithunde nach dem Standorte des Hirschens und bestätigt den Hirsch so enge als möglich. Hierauf setzen sich die Piqueurs und andere dazu gehörige Jäger zu Pferde, nehmen die Hunde zwischen sich und reuten auf die, ihnen bereits von dem Haupte der Jägerey angewiesenen Posten und Relais. Die, jede aus 5 bis 6 Kuppelhunden bestehende Relais nebst frischen Pferden für die anreutenden Herren, werden dahin gestellt, wo man nach der Bestätigung des Hirschens vermuthet, daß er seinen Laufzunehmen werde. Bey jeder Relais ist ein Pursche von den Hunden, welcher nebst den Reitknechten Acht zu geben hat, wie nahe die Jagd komme, und wenn sie bemerken, daß sie sich weit entfernt, müssen sie sich vorziehen, um nöthigen Falls bey der Hand zu seyn. Sienge aber die Jagd einen ganz entgegen gesetzten Weg, so werden sie durch einen Jäger abgeholt und anderweit angestellt. Die zur Jagd gebrauchten Piqueurs ziehen mit den Hunden voraus und die Herrschaften nach, bis an den Bestätigungsort, wo sie die Färthe untersuchen, und nach allen ihren

ren Kennzeichen genau beobachten. Wenn man sich davon gehörig unterrichtet hat, so nimmt man 3 bis 4 der besten Hunde aus der Meute, oder hat besondere Lancierhunde; mit diesen ziehen ein Paar Piqueurs zu den Brüchen, die andern aber bleiben mit der Meute vorne. Wenn sie nun die Färthe annehmen, so ruft man ihnen jedesmal besonders zu. Nun wird der Hirsch aus seinem Stande gesprengt, (lancirt) und von den Lancierhunden bis auf einen Weg oder eine Allee gejagt, dann werden die Lancierhunde aufgehalten, (gestopft) und der Hirsch verbrochen. Auch springen die, welche dazu kommen können, vor, und suchen, den Hirsch zu sehen zu bekommen, um die Beschaffenheit seines Geweihes zu beurtheilen. Bisweilen wird auch so lange lancirt, bis dieses geschehen ist. Sind aber, wie mehrentheils zu geschehen pflegt, mehrere Hirsche besammen, so müssen so viel Jäger, als bey der Meute entbehrlich sind, lanciren, die übrigen aber reuten vor, (carabiniren) und suchen die Hirsche zu sprengen, wobey sie immer genau Acht haben, welchen Weg der rechte nimmt. So lange bis man hiervon Gewißheit hat, wird immer fort lancirt. Wenn dieses geschehen, und ein Jäger die rechte Färthe gefunden hat, meldet er es durch lautes Rufen seinen Kammeraden. Siehet er aber den Hirsch selbst, so ruft er Tajo, juchet, und verbricht die Färthe. Hierauf werden die Lan-

cierhunde gestopft und abgenommen, die Meute herbegeholt und auf die rechte Färthe angelegt. An manchen Orten müssen die Besuchknechte mit alten Leithunden lanciren, wovon einer mit seinen Leithunden der Färthe nachhänget, und wenn mehrere Hirsche da sind, so greift auch auf jeder Seite einer mit seinen Leithunden vor, und hängt den andern Hirschen nach, bleiben bis die Hirsche durch die Piqueurs mit der Meute gesprengt sind, und der rechte abgesondert ist, worauf sodann die Meute angelegt wird, und die Jagd anfängt. Kommt man nun mit der Jagd zu dem Relais, so stopft (arretirt) man die Hunde, und nimmt frische Hunde und Pferde. In währendem Jaggen muntert man die Hunde durch Zurufen auf, und wenn eine Strecke fortgejagt ist, stopft man die vordersten (den Kopf) damit die hintersten, der Schwanz auch nachkommen. Das Stopfen geschieht dadurch, daß die Piqueurs den Hunden vorjagen, ihnen zurufen, und mit den Peitschen klatschen. Sind zu rasche oder noch zu rohe Hunde dabey, so crabattirt man sie, d. h. man hängt ihnen Riemen oder wollene Luchtlappen an den Hals, so lang, daß sie oft darauf treten müssen. So oft dabey die Piqueurs den Hirsch sehen, wird allezeit Tajo gerufen. Wenn nun die Hunde dem Hirsche so nahe kommen, daß sie ihn öfters lanciren, so ist es bald zu Ende, doch wird so lange fortgejaget, bis der Fürst selbst

zugegen ist, und die Hunde den Hirsch stellen. Geschähe dieses vor der Ankunft des Fürsten, so wird der Fürstenruf geblasen. Wenn dieser kommt, so giebt er ihm den Fang mit dem Hirschfänger, und wenn der Hirsch böse ist, sich vor die Hunde stellt, und vielleicht auch einige davon spießet, so muß ein Jäger sich von hinten an ihn schleichen, und ihm das Jarret coupiren, d. h. die Hoße abhauen, worauf der Fürst zum Fange hinzugeführt wird. Wenn sich der Hirsch im Wasser stellt, so schießt ihn der Fürst mit der Pürschbüchse todt. Eine solche Jagd dauert gewöhnlich etwa 2 Stunden, doch kann sie sich, je nachdem sich der Hirsch oft verliert, und dadurch neuen Athem und Kräfte bekommt, auch bis auf 6, 8 Stunden, oder noch länger, verzögern. Ein sehr feister kann in Zeit von einer halben Stunde forcirt werden. Wenn der Hirsch erlegt ist, wird er, wie oben gedacht, zerwirkt, und vertheilt, über den Ueberrest die Haut geschlagen, und von einem Jäger den Hunden, welche in der Entfernung von einigen Schritten liegen, gezeigt, und wenn sie recht feurig darnach thun, sogleich die Haut weggezogen, und die Hunde hingelassen, die denn bald den ganzen Hirsch auffressen. Hierauf steckt jeder Jäger einen Bruch auf den Hut, und setzt sich zu Pferde. Sodann gehet der Zug, in eben der Ordnung zurück, wie er gekommen, wobei die Jäger mit den Hörnern blasen,

Eben so, wie die Parforcejagd auf Hirsche geschieht, wird sie auch auf Sauen, Rehböcke, Haasen u. gemacht.

Parforcepferd ist ein Pferd, das zur Parforcejagd gebraucht wird. Es muß gut auf den Knochen seyn, und ganz sicher gehen, damit die Jäger nicht so leicht in Gefahr kommen, zu stürzen, auch muß es gut ausgeritten, gewand und gut im Maule seyn, damit es leicht zu lenken, her- und hinum zu werfen ist. Uebrigens muß es von mittler Größe, nicht senkrecht, nicht zu breit über die Brust, nicht zu kurz- und steifhalbig, sondern hübsch auf dem Halse gewachsen, lang gestreckt, feurig, mit guten Füßen und Augen versehen seyn. Die Parforcepferde müssen sorgfältig abgewartet, und beim Anfange der Jagdzeit, nebst den Hunden, in Athem gesetzt werden. Nach vollbrachter Jagd muß der Rosarzt untersuchen, ob ihnen etwas fehlt, und ihnen die Schenkel fleißig mit Wein- oder Brandweinspielticht u. waschen, damit sie Kräfte und Biegsamkeit behalten.

Paragier heißt ein Falke oder Habicht, der im ersten Jahre seines Alters zu der Zeit, da diese Vögel ihren Strich haben, nemlich vom September bis zum Dezember gefangen wird. Die Kennzeichen, woraus man beim Ankauf eines solchen Vogels beurtheilen kann, ob er gut zur Baise wird, sind folgende: Die Augen müssen sauber und rein, die Ohren rein und gesund, die

Na.

Nasenhöcher offen seyn, er darf keine Finnen an der Zunge haben, der Hals muß weit, und er muß im Maule gesund seyn, welches man mit dem Mittelfinger fühlen kann. Er muß die Flügel recht an ihrer gehörigen Stelle tragen, und nicht übereinander schlagen, sondern sie ordentlich bewegen, wie es sich gehöret, wenn man ihn auf der Faust etwas schüttelt; die Flügel müssen ganz, und keine Feder verlegt seyn, oder gar fehlen; der Schwanz muß aus zwölf Federn bestehen, die Hände müssen durchgehends sauber, keine Warzen daran, auch nicht zu bisig, geschwollen, oder sonst verkehrt seyn. Der Rücken muß stark seyn, welches man erkennen kann, wenn man ihn auf der Hand stark beweget, wenn er schwach von Rücken ist, sperret er die Flügel aus einander, welches er nicht thut, wenn sein Rücken stark ist. Er muß gefräßig seyn, sich auch gegen den Wind schließen und nicht flattern. Ein solcher Vogel, der schon durch mehreres Herumfliegen klug geworden, ist schwerer abzurichten, als ein abgestrichener Falke, oder ein Nestling. Man muß ihn länger, und so lange wachen lassen, bis er ganz betäubt ist, er muß gleich anfänglich zur Haube gewöhnet werden, große Schellen angelegt bekommen, und fleißig auf der Hand getragen werden, ehe man ihm trauen darf. Zur Waige großer Vögel richtet man ihn auf junge Reiher, Störche, Trutzhühner oder zahme Gänse ab;

den Hasenfang aber lehret man ihn erstlich in der Kammer an einem grauen Kaninchen, nachher im Felde, indem man einen ausgestopften Hasenbalg durch einen Reuter schnell an einer langen Schnur vorweg ziehen läßt, auch auf Hühner und Wachteln, indem man ihm solche fangen läßt, welchen man die Flügel ausgerauft hat. Auf solche wird er begierig fallen, man muß ihn aber alsbald bedecken, ihm den Vogel abnehmen, und nur mit dem Gehirne, Herzen, Eingeweide, oder etwas wenigen vom Fleische, ihn befriedigen.

Past nennet man die rauche Haut, die der Hirsch um das Geweihe hat, ehe es vollkommen wird.

Patte s. Taze.

Pavian s. Affe.

Pelikan — Pelicanus — macht in der Ordnung der Schwimmvögel und zwar mit ganzen Schwimmfüßen eine aus mehreren Arten bestehende Gattung aus, mit folgenden Kennzeichen, als: der Schnabel ist gerade, mit krummer Spitze, nagelförmigem Ansätze, und mit einer Nervenhaut überzogen, wie die Säger- und Entengattung; die röhrenförmigen Nasenhöcher sind in Furchen, zur Seite kaum merklich; das Gesicht ist fast nackt, und an den Füßen sind alle vier Zehen durch eine Schwimmhaut verbunden. Diese Gattung, wovon bey uns nur fünf Arten vorkommen, zerfällt in zwey Familien, nämlich: a) mit ungerahnetem Schna-

Schnabel. 1) Großer Pelikan oder Kropfgans — Pel. Onocrotalus — heißt auch schlechtweg Pelikan, Kropf- und Riesenpelikan, Beutel- Sack- Meer- und Schneegans, Schwanentaucher, Vielfraß, Nimmersatt, Wasservielfraß, Ohrvogel, Drvogel, Eselschreyer, Vogelheine und Kropfvogel. Die Hauptfarbe ist hellrosenfarben, und an der Kehle befindet sich ein großer häutiger hellgrauer Sack. Der Vogel ist 5 Fuß lang, und variiert etwas in der Farbe, so daß das rosenfarbene im Sommer ins Weiße absciegt. Er wählt sich zum Wohnort: Die niedern Gegenden der Donau, von da sie in die deutsche Donau kommen, und sich in andere Seen und Flüsse von Deutschland verfließen, und auch bis nach Sachsen streifen. Seine Nahrung sind Fische, und er macht sein Nest auf Inseln oder auch weit entfernt vom Ufer mit 2 bis 5 weißen Eiern. 2) Schwarzer Pelikan, P. Carpo Linn.: Mit schwarzem Körper, klein geschopftem Kopfe, zugerundetem Schwanz und schwärzlich und olivengelt gemischtem kleinen Kehlsack. Dieser Vogel ist 3 Fuß lang und variiert ebenfalls etwas nach dem Geschlecht in der Farbe; denn dem Weibchen fehlen die weiße Stirn und die weißen Hosen. Er sucht sich seinen Wohnort an den deutschen Seeküsten einzeln, seltner auf dem Zuge im mittlern Deutschland auf

Flüssen und Seen. Seine Nahrung sind Fische, besonders Heeringe in Baien. Er macht sein Nest in Gesellschaft auf Bäumen und Felsen, und darinnen sind 3 weiße, ins Blasgrüne fallende, Eier. Uebrigens giebt man ihn auch die Namen: Kohlschwarzer Pelikan, Korn- Wasser- und Seerabe, schwarzer Wassertaucher, schwarzer Gamstaucher, Feuchtarisch, Scharb, Schaluchorn, Schuluer, Schlucker, großer schwarzer Seerabe, Scaluer, Scalucher, Vielfraß, Bismarvogel. 3) Krähen-Pelikan, P. Graculus Linn.: Der Oberleib schwärzlich; der Unterleib braun; der Schwanz zugerundet; der Kehlsack vorn nackt und röthlich, nach hinten weiß, und mit Dusenfedern besetzt, $2\frac{1}{2}$ Fuß lang. Variirt etwas in der Farbe; denn der Oberleib ist zuweilen mehr dunkelbraun als schwärzlich, und der Unterleib auf weißlichem Grunde dunkelbraun gefleckt. Wahrscheinlich der junge Vogel. Er wohnt an den deutschen Küsten, auch auf den Seen und Flüssen des nördlichen Deutschlands, und nährt sich von kleinen Fischen. Man findet das Nest auf hohen Bäumen, mit 3 weißen Eiern. Dieser Vogel heißt auch: Wassertaucher, Wasserkrähe, Seekrähe, Seeheber, kleiner Kormoran, Kropftaucher, brauner Gamstaucher, Schwimmkrähe, Kropfente, Sackente. * Dieser Vogel wird von Manchen für das Weibchen von dem

dem Vorhergehenden gehalten; allein die merkliche Abweichung in der Größe, da dieser um ein Drittheil kleiner ist, die dünnern Füße, Farbe, u. s. w. unterscheiden ihn hinlänglich von dem Vorigen. Gewiß ist Indessen der Unterschied noch nicht. 4) Fregatt-Pelikan, *P. Aquilus* Linn.: Mit gabelförmigem Schwanze, schwarzem Körper; schwarzem nackten Augenkreise; das Männchen mit einem rothen, und das Weibchen mit einem schwarzen Schnabel. Er variiert in der Farbe: denn die Jungen sind auf dem Rücken und den Flügeln dunkelbraun. Sein Wohnort ist das Weltmeer, besonders zwischen den Wendezirkeln; doch wurde im Winter 1792 einer auf der Weser bey Hannoversisch Minden geschossen. Er wählt sich zur Nahrung Fische und bauet sein Nest auf hohen Bäumen mit 2 fleischfarbenen, dunkelroth gefleckten Eiern. Man giebt ihn auch die Namen: Fregattvogel, Fregatte, Meeradler. Man sollte eigentlich diesen Vogel mit noch andern hieher gehörigen, wegen des schlanken Schnabels, der kurzen Füße, langen Schwingen und des gabelförmigen Schwanzes; als Gattung mit Brisson trennen. 5) Mitgezahnelter Schnabel. 5) Bassanischer Pelikan, *P. Bassanus* Linn. oder Schottische Gans, Bassaner, Bassaner Gans, Gannet, Solend, Schottengans, Solendgans und weißer

Seerabe. Mit keilförmigem Schwanze, schneeweißem Körper, schwarzen vordern Schwungfedern und blauem Gesichte. Sein Wohnort sind die nordischen Küsten von Europa, er versieht sich aber auch zuweilen nach Deutschland, wie ein bey Darmstadt im Winter 1793 gefangenes Exemplar beweist. Er wählt sich zur Nahrung: Fische, besonders Heeringe, und man findet das Nest auf dem Boden mit einem weißen Ey.

Perlen nennet man die krausen Knöpfgen am Hirschgeweihe, wegen der Aehnlichkeit ihrer Gestalt mit den wahren Perlen.

Pfahl heißt bey der Jägerey so viel als Forkel s. d. Wort.

Pfanne nennet man den Theil eines Flintenschloßes, worin das Zündpulver (Zündkraut) geschüttet wird.

Pfeffern, den Vogel pfeffern, nennen die Falkeniere, wenn sie den Falken, im Fall er die Raube oder den Wurm bekommt, oder auch wohl, wenn sie ihn berichten wollen, mit Wasser waschen, worinnen Pfeffer aufgelöst worden.

Pfeiffe ist so viel als Lockpfeife.

- Pfeiffen, Pfiff nennet man die Stimme der Fischotter, die sie in sehr kalten Wintern und in der Ranzzzeit hören lassen,

sen, und welche beynähe klingen, als wenn ein Mann stark auf dem Finger pfeiset.

Pfeifente — **Anas Penelope** — heißt auch gemeine **Pfeifente**, **Schmünte**, **Penelope**, **Brandente**, **Rothhals**, **Röthente**, **Speckente**, **Blasente** und **Eisente** mit weißer Platte. Sie gehört mit der wilden Ente unter einerley Ordnung und Gattung, wo sie eine besondere Art ausmacht, die sich durch nachstehende Kennzeichen von den übrigen unterscheidet, als: der Schwanz ist zugespitzt; der After schwarz; die Stirne weiß; der Kopf rothbraun; auf den Flügeln ein weißes Feld; der Spiegel grün und schwarz eingefast. Sie gehört zu den großen Enten, denn sie ist zwanzig Zoll lang, wovon der Schwanz vier Zoll wegnimmt; die Breite der Flügel, die gefaltet bis auf die Mitte des Schwanzes reichen, zwey und ein Viertel Fuß. Das Gewicht anderthalb Pfund. Vor andern Enten zeichnet sie sich durch ihren runden Kopf, kürzern Hals und Schnabel aus; letzterer ist sechzehn Linien lang, schmal, gewölbt und bläulich bleyfarben; die Spitze schwarz; die Füße sind heller als der Schnabel, dunkelbleyfarben, und die Schienbeine sechzehn Linien hoch. Die Stirn ist weißlich, nach dem Scheitel zu gelblichweiß, etwas mit dunklen Flecken gesprenkelt; Kopf und Hals rothbraun, oder lebhaft kastanienbraun, glänzend schwarzgrün

bespritzt; doch hinter den Augen ungesfleckt; der hintere und untere Theil des Halses und die Brust weinröthlich, bisweilen, wie wohl selten, mit runden schwarzen Flecken bezeichnet; der Rücken und die Schultern schön weiß mit feinen schwarzen Querstichen durchzogen, einige Federn auch mit schwarzen Strichen versehen; der Unterrücken aschgrau, weiß gewässert; die Deckfedern des Schwanzes weiß und klar schwarz bandirt, die leßtern schwarz; der Bauch und die Seiten schön weiß, der After schwarz; die vordern Deckfedern der Flügel weiß, die hintern dunkel aschgrau; die Schwungfedern dunkelbraun, auf der innern Fahne röthlich aschgrau; der Spiegel, den die äußern Fahnen der mittlern Schwungfedern bilden, grün, schwarz eingefast; die hintersten Schwungfedern schwarz mit breiten schönen weißen Kantzen; der Schwanz dunkel aschgrau, die Seitenfedern röthlich weiß eingefast. Das Weibchen ist kleiner und gleicht fast in der Farbe der gemeinen wilden Ente; Kopf und Hals sind gelbroth, schwarzbraun gesfleckt; Flügel und Brust wie am Männchen; der Rücken an den Seiten rothgelb mit großen dunkelbraunen Flecken; der Bauch weiß; Schnabel und Füße schmutzig aschgrau. Beide Geschlechter sind von der Hecke an bis zum nächsten Frühjahr einander gleich; erst im März hat alsdann das Männchen sein ausgezeichnetes Gefieder, und verliert es im Julius, wo die Mau-

Mauserzeit ist, wieder. Ueberhaupt findet man bey diesen Vögeln, ehe sie ihr vollkommenstes Alter erreichen, Verschiedenheiten in der Farbe, wovon die merkwürdigsten *Varietäten* folgende sind: 1) mit ganz weißem Scheitel, schwarz und weiß gestrichelten und gefleckten Schläfen, weiß und schwarz gestrichelten und gewellten Wangen, Kehle und Oberhalse, schmutziggelber Grundfarbe des Rückens und weinröthlichen Seiten um die Brust. 2) Mit hellrothfarbenen Kopfe und Halse, die so wie die Brust schwarz bespritzt sind und mit graugemischtem weißen Feld auf den Flügeln. 3) Ohne weiße Stirn, mit weingelber Brust und bläulichem Spiegel. So leicht dieser Vogel durch seine Gestalt in der Nähe zu unterscheiden ist, so leicht ist er es im Fluge, und auf dem Wasser schwimmend durch seine Stimme. Er giebt nämlich einen angenehmen hellen einsyllbigen flötenartigen Ton von sich, der, wenn ein ganzer Trupp beysammen ist, Accorde, und wenn die Imagination dazu kommt, ganze Melodien bildet. Sie fliegt sehr schnell und gut. Wegen ihrer Scheuheit hat der Jäger Mühe, sich an sie zu schleichen. Sie wird in den meisten Ländern der alten Welt angetroffen. Wahrscheinlich besucht sie im Sommer bloß den Norden. Im October und November ist sie als Zugvogel oft in großen Schaaren bey den Seen, Teichen und Flüssen. So lange das Wasser offen ist, sieht man sie den gan-

zen Winter durch einzeln in Deutschland. Im März zieht sie wieder nach Norden zurück. Im November und December hört man oft in der finstesten Nacht zwanzig und mehr Lüge hinter einander durch die Luft streichen und die accordmäßigen Töne von sich geben. Man findet vorzüglich Schnecken und Wasserkräuter in ihren Magen. Da sie vermuthlich an den nördlichsten Meeren nisten, so weiß man noch nichts von ihrer Fortpflanzungsart. Die verschiedenen Arten des Fanges und der Erlegung sind wie bey den wilden Enten. Da sie sehr scheu ist, so muß man sehr vorsichtig seyn, um ihr schußrecht zu kommen. Ins Netz geht sie aber leichter. Ihr Wildpret wird sehr geschätzt, und sie ist im Herbst und Winter sehr fett. Die Federn sind zart und weich und können, wie die Gänsefedern, zum Ausstopfen der Betten benutzt werden.

Pferd, *Equus Caballus* — das ganze Geschlecht heißt Pferd oder Roß; das männliche Pferd Hengst, das weibliche Stute, das verschnittene Wallach und das junge, Füllen oder Fohlen; die andern Nahmen richten sich nach der Bestimmung, daher Reitpferd, Rutschpferd, Parforcepferd, Schießpferd, Falconierpferd u. s. w. Linné macht eine eigene Ordnung daraus, die sechste: Thiere mit dem Pferdegebiß. Blumenbach beschreibt es in der achten Ordnung

nung unter den Thieren mit Hufen, und Pennant in dem ersten Abschnitte der ersten Ordnung unter den einhufigen Säugethieren. Es bildet eine besondere Gattung, und die Kennzeichen der Art sind: Es hat kurzspitzige Ohren, am Halse eine Mähne und einen überall langbehaarten Schweif. Schon die gewöhnliche Achtung und Aufmerksamkeit, womit dieses schönste aller vierfüßigen zahmen Thiere von jeher von den Menschen ausgezeichnet worden, verbunden mit der Mühe und Sorgfalt, die man auf seine Erziehung verwendet hat, läßt auf nicht gemeine Vorzüge desselben schließen, und diese hat es auch, seit seiner Erhebung zu einem Hausthiere, bewiesen. Es ist stark, dauerhaft, kühn, schnell, gelehrig, mit scharfen Sinnen begabt, wachsam, folgsam, treu, anhänglich, sanftmüthig, und stolz vom Ansehen. Kein Thier ist so, wie das Pferd; mit seines Herrn Leiche verbrannt und beyder Asche zugleich zur Erde bestattet worden, keines Thieres Abstammung wird so, wie die der arabischen Pferde, mit Dofumenten belegt; keins ist so von den größten Dichtern besungen worden, keins ein so allgemeiner Gegenstand der bildenden Künste u. s. w. Keins hat aber auch so sehr seine Vorzüge dem Verluste der Freyheit zu danken, als das Pferd. Denn ob man gleich nicht mit größter Gewißheit sagen kann, daß die Pferde, die jetzt noch heerdenweise in

Arabien, Sibirien, der großen Tataren u. s. w. in der Wildniß gefunden werden, die eigentliche wilde Stammrasse sind, so sind sie doch verwildert, wie man von denen in den Schottischen Hochwäldern, und Südamerika u. s. w. gewiß weiß, und zeigen alsdann, wenn sie wieder durch mehrere Generationen in ihren natürlichen Zustand zurückkehren, daß bloß die Cultur und nicht die rohe Natur selbst sie so ausnehmend verschönert und veredelt hat; denn jene Thiere (*Equus*, *Caballus feras*) sind meist klein, dickköpfig, struppig, vom schlechten Wuchs und Form, äußerst wild und undändig. Da das Thier, durch seinen Körperbau und seine Stärke, den Menschen gleich als nützlich auffallen mußte, so ist es auch von den ältesten Zeiten her der Zähmung unterworfen worden; und daß es den Menschen nützlich werden sollte, ergiebt sich auch aus der Einrichtung seiner Natur, daß es, wie die Menschen, unter allen Himmelsstrichen ausbauern kann und angemessene Nahrungsmittel findet. Mit einer vollständigen Geschichte des Pferdes würde man ein ganzes Buch füllen können, wie es auch schon von vielen geschehen ist. Zu gegenwärtiger Absicht wird ein Auszug von allen den verschiedenen Stücken, die zur Kenntniß, Wartung, Erziehung des Pferdes u. s. w. gehören, hinlänglich seyn. Der schöne, nach allen Theilen wohlproportionirte Kopf, der schöne, breit aufgerichtete Hals, der lan-

ge volle runde Leib mit dem schöngewölbten Hintertheile, die stattlichen Beine, die Mähne als Zierde des Halses, und der lang und dickbehaarte Schweif als Ende des Hinterleibes, alles zeigt die schönste Symmetrie und für das Auge den regelmässigsten angenehmsten Körperbau an. Auch durch die Farbe zeichnet es sich aus. Man theilt sie in einfache, zusammengesetzte und außerordentliche ein. Zu den einfachen gehören die weißen, isabellfarbigen, braunen und schwarzen Pferde; zu den zusammengesetzten die grauen und wolfegrauen, und zu den außerordentlichen die Tiger- Schacken- pfirsichtblutfarbenen und Porcellan- Pferde. So wie Klima, Lebensart, Wartung und Pflege bey den Hausthieren verschiedene Abänderungen hervorbringen, so auch, und zwar in einem vorzüglichem Grade, bey den Pferden. Schönheit und Brauchbarkeit desselben erhalten daher ihre mancherley Abstufungen. Man unterscheidet folgende vorzügliche Nationalpferde, welche man alle, mehr oder minder häufig in Deutschland sieht. 1) Die Arabischen Pferde. Sie sind von mittlern aber vorzüglich schönem Wuchse, mehr mager als fett, geschmeidig, leicht, feurig, stolz und dauerhaft. Man unterscheidet die edlern von den mittlern und schlechten, und über erstere hält man ordentliche Stammbäume. Von ihnen stammen die schönsten Pferde in den meisten Ländern her. Die bes-

ten sollen von der Zucht der Annech um Palmyra herum und vom Libanus bis gegen den Horeb kommen. Doch sagt Bruce in seiner Reise nach den Quellen des Nils, daß er die schönsten Pferde in der Welt in Nubien gesehen habe. 2) Die Barbarischen und Persischen. Von ohngefähr fünf Fuß Höhe, schwächigem Körper, fast immer grauer Farbe, schönem kleinen Kopfe, langem feinen Halse und dünner Mähne. 3) Die Spanischen Pferde besonders aus Andalusien. Von schwerem Körper, großem Kopfe, langen Ohren, starkem und langem Halse, dicker Mähne, breiter Brust und rundem Kreuze, meist schwarz von Farbe, auf der Stirn weiß gezeichnet, von Betragen stolz und kühn, vom Gange natürlich, angenehm. 4) Die Englischen Pferde. Von hohem langgestrecktem Wuchse, kleinem krummnasigem Kopfe, kleinen steifen Ohren und dünnen Beinen. Sie sollen von arabischen und barbarischen Pferden abstammen, und sind wegen ihres festen Trittes, großen Schrittes und wegen ihrer Schnelligkeit, da z. B. ein dergleichen Pferd, Sterling, 82½ Fuß in einer Sekunde zurückgelegt hat, bekannt genug. Man braucht sie zur Parforcejagd und in den Zeiten, wo Tagen zu den Hauptvergnügen großer Herren gehörte, glaubte man, es müßten bloß englische Pferde gebraucht werden. 5) Die Neapolitanischen Pferde haben einen dicken Hals, großen Kopf, eine krumme

krumme Nase und einen guten Anstand, laufen und ziehen gut, sind aber meist boßhaft, eigensinnig und ungelehrig. 6) Die Polnischen Pferde gehören zu den kleinen Pferden, die kein ausgezeichnetes Ansehen haben, aber dabey dauerhaft und geschwind, und also zur Jagd vorzüglich gut zu gebrauchen sind. 7) Die Ungarischen sind den Polnischen ähnlich, etwas gedrungen gebaut, aber nicht von der Dauerhaftigkeit. Beide Rassen machen wilde Gestüte aus, aus welchen sie eingefangen werden müssen. 8) Die Russischen Pferde. Sie sind klein, mit unförmlich langen Mähnen, stark gebaut und dauerhaft. 9) Die Türkischen Pferde. Von dünnem schlanken Halse, langem Leibe, hohem Rücken und dünnen Schenkeln, aber nicht von der Schönheit, wie die Arabischen. Sie sind jähzornig, können aber das Laufen gut aushalten. 10) Die Dänischen Pferde sind volleibig, von schönem Wuchse, dickem Halse und starken Schultern. Es sind dauerhafte Pferde, die einen anmutigen Gang im Wagen haben, und die Schacken und Tigerpferde sind unter ihnen gemein. 11) Die Isländischen Pferde. Die kleinste Rasse, mit kurzen steifen Haaren, gut proportionirt, dauerhaft, aber boßhaft. 12) Die Friesländischen Pferde. Die Stellung ist hoch, der Körper stark, der Rücken und das Kreuz breit, Hals und Kopf kurz. Vorzüglich gute Zugpferde. 13) Die

Deutschen Pferde. Von starkem Körper und Weinen, großem Kopfe, kurzem Halse; starke Pferde zum Ziehen und Reuten. Unter denselben zeichnen sich die krummnäsigen Holsteiner und langgestreckten Mecklenburger vorzüglich auch als schöne Pferde aus. Daß es aber so wenig eigene gute Pferde in Deutschland giebt, kommt von der Einführung ausländischer Beschäler und Zurücksetzung selbstgezogener guter Hengste her. Es ist gar nicht zu läugnen, daß die schlechten ausländischen Beschäler, die man herbenzog, weil es Mode war, fremde Pferde im Gestüte zu haben, unsere guten und dauerhaften Rassen verdorben haben. Beym Kaufe eines Pferdes sieht man auf Gesundheit, Brauchbarkeit und Schönheit. Der Wuchs desselben, die gröbern oder feinem Gliedmaßen, bestimmen allzeit die Brauchbarkeit. Zu einem Jagd- oder Parforcepferde gehört, daß es mehr lang als kurz sey, eine nicht zu breite, aber auch nicht zu enge Brust habe, damit es im Laufen aushalten, auch leicht und schnell laufen kann, daß das Maul gut, doch nicht gar zu empfindlich, daß es auch lieber zu langsam als zu heftig sey, um sich allzeit und gehörig in Bewegung bringen zu lassen. Zu den Schusspferden, die man beym Pürschen braucht, wählt man welche von mittlerer Größe, damit sich leicht auf- und absteigen und doch auch hinter demselben verbergen läßt. Sie müssen so abgerichtet seyn, daß

daß sie ganz ohne Eigenwillen sind, und den Schuß ohne Schrecken hören können. Falkonier-Pferde sind ebenfalls am besten von mittlerer Statur, festem und leichtem Körperbaue, von Schnelligkeit und Ausdauer. Zu beyden letztern Arten sind die Polnischen vom größern Schlage die besten, und man liebt dann in der Farbe, damit sie den jagenden Thieren nicht zu sehr auffallen, Braune oder Fuchse. Von der Verbreitung des Pferdes ist oben das Nöthige beygebracht worden. Die Pferde werden gewöhnlich in Ställen gehalten. Diese muß die frische Luft durchstreichen, und wo möglich die Sonne erleuchten; auch dürfen sie nicht in der Nähe von Schweinställen angebracht seyn, weil den Pferden dieser Geruch zuwider ist. Wo mehrere beyammen stehen, werden eigene Stände nöthig, die 10 Fuß tief, 10 bis 15 Fuß hoch, 6 bis 7 Fuß breit seyn müssen. Der Boden wird zum Abflusse der Feuchtigkeit mit Steinen oder besser mit Holzklöbchen auf die hohe Kante gesetzt, ausgepflastert, die Krippe steht 4 Fuß hoch, die Raufe $1\frac{1}{2}$ Fuß über derselben und die Seitenwände sind ungefähr 4 Fuß hoch. Daß sich der Stand des Pferdes nach seiner Größe richtet, und also darnach etwas verschieden ist, versteht sich von selbst. Reinlichkeit ist eine Hauptsache in Pferdeställen, ob sie sich gleich wenig niederlegen, und viele sogar stehend schlafen. Für die Füllen braucht man bis ins vierte Jahr dreyerley Ställe. Einen eigenen für die halb- und einjährigen,

einen besondern für die zweyjährigen und einen dritten für die dreyjährigen; bis zum zweyten Jahre brauchen sie aber keine Stände. Die Nahrung der Pferde ist nach den Ländern, die sie bewohnen, verschieden; in Deutschland ist das gewöhnliche und beste Futter Hafer und Heu (wo möglich aus Waizenstroh), vermischt, und Heu. Die Menge des Futters richtet sich nach der Bestimmung und Arbeitsamkeit des Pferdes. Wenn das Karn- und Pflugpferd täglich 12 Pfund Hafer, eben so viel Heu und des Abends bey der Abfütterung 5 Pfund Heu verlangt, so kann ein Reut- oder Kutschpferd, das nicht immer gebraucht wird, mit der Hälfte des erstern Futters und den 5 Pfund Heu des Abends vorlieb nehmen. Man füttert auch im Sommer Klee, Esparsette und Gras, und an einigen Orten ist es sogar gewöhnlich nach der Arbeit die Pferde auf die Weide zu treiben. Man giebt ihnen des Tages drey Mahlzeiten, des Morgens von 4 bis 5 Uhr, des Mittags von 11 bis 1 und des Abends von 7 Uhr an. Alle 14 Tage streut man ihnen eine Hand voll Salz unter das Futter, welches ihre Freßbegierde unterhält und sie vor mancherley kränklichen Zufällen bewahrt. Zu ihren Tranke verlangen sie kühles, reines und helles Brunnen- oder Bachwasser des Tages dreyimal. Das Jagdpferd muß ausserdem den Tag vor der Jagd nicht so viel Heu als sonst, aber was davon abgeht, an Körnern zugesetzt bekommen, und am Tage der Jagd vorzüglich spärlich gefüttert werden. Die

Pfer-

Pferde werden erzogen 1) in wilden Gestüthen, wo sie Sommer und Winter im Freyen bleiben; 2) in halbwilden, wo sie nur im Sommer auf dem Felde bleiben, und 3) in zahmen Gestüthen, wo sie nur im Sommer auf die Weide getrieben werden; und dazu kann man noch setzen, 4) in Land- oder Stallgestüthen, wo sie nicht auf die Weide kommen. Wenn man eine gute Nachzucht erhalten will, so muß man die schönsten Zuchthengste und Zuchstuten wählen und nach der dritten, höchstens vierten Zeugung wieder andere Rassen nehmen, um die ausartende Blutverwandtschaft zu verhüten. Das Beschälen oder Bedecken der Stuten von dem Beschäler oder Springhengste läßt man entweder im Freyen geschehen, wo man dem Hengste die Wahl der Stuten überläßt, oder man läßt ihn aus der Hand beschälen, wo es unter Anführung der Menschen geschieht, wobey die Stute durch Seile um die Hinterfüße und durch ein Kummel vom Schlagen abgehalten werden kann. Diese letztere Art der Begattung zieht man der erstern um deswillen vor, weil man dadurch mancherley übeln Folgen bey dem Beschälen vorbeugen und auch auf die Verbesserung der Rassen gehörig sehen kann. Ein guter Hengst kann in einem Jahre an 30 Stuten befruchten, man thut aber besser, ihn nicht mehr als zwanzig zuzulassen, weil bey dem zu öftern Gebrauch die Säfte schlecht und unvollkommen wer-

den und dieß die Ursache des Blindwerdens so vieler Pferde seyn soll. Die natürliche Begattungszeit scheint in die Mitte des März zu fallen und bis zum Junius zu dauern. Die Stute wird alsdann unruhig, das Geburtsglied schwillt und giebt eine gelbliche Feuchtigkeit, die man die Hige nennt, von sich, sie wiehert dabey nach dem Hengsten und hebt den Schweif immer auf. Diese sogenannte Roffigkeit dauert 14—21 Tage. Nach 10½ bis 12 Monaten bringt sie ein Fohlen, höchst selten zwey, und die Fohlzeit ist nahe, wenn die Milch fließt und um die Eiterwarzen sich zähe weiße Tropfen sammeln. Bey der Geburt muß man dem Fohlen das dunkelröthliche, schwammige, milzartige Gewächs, welches vorne an der Zunge sitzt und Fohlenahrung oder Pferdegist heißt, wegnehmen, damit es dasselbe, als schädlich, nicht verschluckt und nach der Geburt gleich die schwammigen Ballen von den Fußsohlen abbrechen. Den neunten Tag nach der Niederkunft wird der Regel nach die Stute wieder roffig und läuft dem Hengste zu. Im fünften Monate werden die Fohlen von der Mutter entwöhnt, und sie haben unterdessen sich schon an die andern härtern Futter gewöhnt. Da bey dem Ankauf des Pferdes sehr viel auf das Alter desselben ankommt, und dieß vorzüglich an den Zähnen erkennbar wird, so ist nöthig, dieß hier einigermaßen deutlich zu machen. Einige Tage nach der Geburt bekommen die Fohlen

ten zwey Vorderzähne in jeder Kinnlade, bald darauf noch zwey andere, und nach Verlauf von drey bis vier Monaten haben sie alle 6 Vorderzähne in beyden Kinnladen. Nach $2\frac{1}{2}$ bis 3 Jahren kommt der zweyte Zahnwuchs, wo sie diese Vorderzähne in eben der Ordnung wieder verlieren, in welcher sie dieselben bekommen haben. Bey dem ersten Bruche, oder wie man auch sagt, wenn sie zu zeichnen anfangen, verlieren sie nämlich oben und unten die beyden mittlern Vorderzähne, welche in 14 Tage durch andere ersetzt sind. Nach einem Jahre verlieren sie die folgenden zwey, und nach 4 oder $4\frac{1}{2}$ Jahren die beyden letzten, welche sämmtlich in jener Zeit wieder ersetzt werden. An diesen letztern, welche man auch Eckzähne nennt, läßt sich das Alter des Pferdes bis zum achten Jahre erkennen, da der schwarze Fleck in ihrer Höhlung (die Bohne oder der Kern) bis dahin sich verlohren hat, und die Vertiefung verlöscht ist. Die im vierten Jahre hervorkommenden eigentlichen Eck- oder Hundezähne bleiben bis zum sechsten Jahre spitzig, bis zum zehnten werden sie aber ganz stumpf und dabey sehr lang. Das männliche Pferd hat überhaupt 40 Zähne. Nach dem zehnten Jahre läßt sich das Alter mit Gewisheit nicht bestimmen, und ein hohes Alter ist alsdann an den sehr langen losen Zähnen, den verschwundenen Gaumensfurchen und an den Grauwerten über den Augen, um die Nase u. s. w. zu erkennen. Den

Stuten fehlen gewöhnlich die Hundezähne, oder sie sind doch sehr kurz. Man hält die Pferde nicht gerne vor dem dritten Jahre zur Arbeit an, läßt sie auch dann erst beschlagen und zwar im Winter an den Vorderfüßen, und im folgenden Frühjahr, wo es nöthig ist, an den Hinterfüßen, wo aber das Eisen nicht aufgebrennt und der Huf äußerlich nicht abgeraspelt werden darf. Reutpferde braucht man nicht gerne vor dem vierten Jahre. Werden sie gehörig in Acht genommen, so können sie 20—24 Jahre Arbeit thun und 40 Jahre leben. Um die Hengste leichter bändigen und da, wo es Stuten giebt, sie sicher brauchen und reuten zu können, macht man sie zu Wallachen und zwar durch Negmittel, Klopfen oder Brennen. Auch das Englisiren wurde sonst mehr als jetzt für eine Schönheit gehalten. Man zerschneidet nämlich im 2ten oder 3ten Jahre dem Pferde zwey Zoll vom After die Sehnen des Schwanzes rund herum durch, bindet den Schweif in die Höhe und schlägt ihn nach der Heilung der Wunde $\frac{1}{2}$ Fuß von der Wurzel ab, wo alsdann der noch übrige Theil gerade aussteht. Man benimmt aber dadurch den Pferden ein Vertheidigungsmittel gegen die Stacheliegen und andere Insekten, und in England mag diese Gewohnheit wegen des nahe hintereinander Spannens der Fuhrpferde nöthig und darum eingeführt worden seyn. Die Pferde sind vielen Krankheiten unterworfen, wovon wir

wir nur die vorzüglichsten mit ihren Heilmitteln hier anführen können. 1. Die Druse. Sie kommt von Erkältung, unterbrochener Ausdünstung, besonders im Herbst und Frühjahr, kumpfiger und verdorbener Nahrung, von plötzlichem Uebergange vom grünen Futter zum trockenen und umgekehrt her, und äußert sich durch Trägheit, Traurigkeit, heisern Husten und schleimigen Ausflusse aus der Nase, wenn nämlich der Knoten, der sich unter dem Rinn zwischen beiden Kieferknochen befindet, aufbricht. Diese Krankheit hat mit dem Schnupfen die größte Aehnlichkeit, und es scheint, daß die vorzüglichste Kur darin bestehen müsse, die Ausdünstung zu befördern. Man hält daher den Stall warm, behängt das Thier mit einer wollenen Decke und giebt ihm kein kaltes Getränk, sondern lauwarmes Wasser mit Gerstenmehl und Honig vermischt. Auch empfiehlt man folgendes Mittel: $\frac{1}{2}$ Pfund gestoßene Wachholberbeeren, $\frac{1}{2}$ Pfund Quentianwurzel, 8 Loth Galgant, mit Honig zu einer Latwerge gemacht. Hiervon legt man Morgens und Abends jedesmal eine Wallnuß groß dem Pferde auf die Zunge. 2) Der Rog, eine gefährliche Krankheit, wird von den meisten für ansteckend gehalten; der berühmte Arzt Camper aber glaubt dieß nicht. Einige geben zur Ursache das Saufen von sehr kaltem Wasser bey warmer Witterung an, weil das Pferd dabey die Nase ins Wasser stecke,

und hier die Schleimhaut, der Sitz der Krankheit, und welche die Höhle der Nase bekleidet, erkältet werde. Oft ist er auch die Folge einer schlechten Behandlung der Druse. An den Kieferknochen seitwärts sitzen ein oder zwey eyrunde Knoten. Fließt die Nase gelbgrünlich oder röthlich, so ist das Pferd fast für verlohren zu achten. Man behandelt die Krankheit im allgemeinen wie die Druse, und setzt zu obiger Latwerge nur noch 4 Loth Schwefel und Spießglas. Ein wirksames Mittel soll noch dieses seyn: Man thut eine hinlängliche Portion Lederkalt in ein Gefäß und gießt allmählig so viel Wasser darauf, als zum Ablöschen erforderlich ist. So wie der Kalt allmählich löset, gießt man immer mehr Wasser zu, um ihn zu verdünnen, steigert das Wasser durch und tränkt das Pferd damit. Dabey giebt man ihm des Tags zwey- bis drey mal folgende Auflösung ein. Man nimmt 40 Gran Mercurium sublimatum corrosivum, löset ihn in 20 Loth Weingeist auf und giebt davon dem Pferde 2 Loth in einem Pfunde abgekochten Reintranke ein. Bey Herrn Wierz zu Frankfurth am Main wird auch für 8 Gulden ein geheimes Mittel in einem Topfe von 1 $\frac{1}{2}$ Pfund, das von einem berühmten Stallmeister herrühret, und noch nie geschlagen haben soll, verkauft. 3) Der Wurm- oder die Pferdepocken. Es entstehen am Halse, dem Körper, oder den Beinen des Pferdes runde oder läng-

längliche Knoten, welche aufbrechen, wie Speck aussehen und eine zähe Feuchtigkeit von sich geben. Sind viele Knoten an einer Stelle, so entsteht daraus ein krebsartiges Geschwür. Fehlerhafte Gäfte und fehlerhafte Fütterung und andere unbekannte Ursachen bewirken diese ansteckende und schwer zu heilende Krankheit. Man heilt sie dadurch, daß man dem Pferde 4 Pfund Blut aus der Halsader läßt und ihm jeden Morgen 2 Loth von einem Pulver aus fein gestoßenem Pockenholz, Spießglas und Schwefelblumen, von jedem gleichviel, eingiebt. Die Geschwüre heilen, wenn man sie mit einer Bähung wäscht, die aus einem halben Quentchen Mercurio sublimato, in 8 Pfund reinem Wasser aufgelöst, besteht. 4) Die Darmgicht (Verkopfung, Kolik). Das Pferd kann nicht misten, windet und wälzt sich und der Bauch schwillt ihm auf. Verdorbenes Futter, versehrte Winde von unrechter Fütterung sind gewöhnlich die Ursachen dieser oft schnell tödtenden Krankheit. Wenn man gestoßene Krebsaugen mit Wein dem Pferde eingiebt, es reitet und nicht hinlegen läßt, so soll es genesen. Man giebt auch Klystiere. 5) Der Durchlauf. Von Erkältung und schlechtem Futter. Ein Klystier von $\frac{1}{2}$ Pfund Baumöhl mit zwey Eyerdottern und zwey Pfund lauem Wasser und innerlich täglich zweymal $\frac{1}{2}$ Pfund Baumöhl mit $\frac{1}{2}$ Loth Salpeter und 1 Loth gepulvert Entianwurzel stillt ihn ge-

wöhnlich. 6) Das Blutstallen stillt Raudensaft mit lauem Weineingegeben. 7) Der Stengel, oder die Bräune, entsteht von einer Entzündung im Halse, wo das Pferd den Hals steif hält und nicht schlucken kann. Die Ursachen sind gewöhnlich plötzliche Erkältung oder staubiges und keregnetes Futter. Aber laß und Klystiere, innerlich aber Buttermilch, 2 Loth Salpeter und ein halb Loth Vitriolspiritus unter das Getränk gethan, sind die besten Gegenmittel. 8) Die Rehe (Verfangenheit, Verschlagenheit). Sie rührt von Erkältung, übertriebener Arbeit, von Mangel an Bewegung bey starker und übersflüssiger Fütterung, von jähling abwechselndem Futter oder einem kalten Trunk nach einer Erhitzung her und zeigt sich als eine gichtische Lahmung und Steifheit an einem oder mehreren Gliedern. Man sucht die stockende Ausdünstung zu befördern und zwar dadurch, daß man das kranke Pferd langsam und egal mit einem Strohisch reibt, mit einer warmen Decke überlegt und ihm einen Trank von 2 Loth Hirschhornspiritus, mit etwas Honig von $\frac{1}{2}$ Pfund Brandwein versetzt, eingiebt. 9) Der Koller oder Schwindel, den man in den stillen und rasenden theilt. Bey der ersten Art ist das Pferd ruhig, hängt den Kopf unter die Krippe, steckt im Fressen, läßt sich den Finger ins Ohr stecken ohne zu schütteln und die Beine ruhig übers Kreuz setzen; bey der andern Art, die gewöhn-

lich eine Folge der ersten ist, raset und tobt es wie wüthend. Fast unheilbare Krankheiten. Man läßt dem Kranken Aber bis zur Ohnmacht, läßt es hungern, wäscht ihm den Kopf beständig mit kaltem Wasser und setzt ihm ein Fontanell an die Brust. Innerlich bekommt es auch folgende Latwerge; 4 Loth Salpeter, 1 Quentchen Gummi ammoniacum und Honig so viel als zu einer Latwerge nöthig ist: dann giebt man dem Pferde eine Kugel von der Größe eines Hühnereroges auf einem hölzernen Spatel ein. Man giebt auch folgenden Trank: 4 Loth gereinigten Salpeter; 2 Loth eröffnenden Eisensafran, 12 Loth Brunnenwasser unter einander gemischt und Morgens und Abends die Hälfte eingegeben. Es muß dabey gute Diät gehalten und sparsam gefüttert werden. 10) Der Feivel. Er rührt von unreinem Getränke her und das Pferd bricht oben am Kopfe etwas auf. Man spricht, rother Gundermann dem Pferde in die Nase geblasen, vertreibe ihn. 11) Die Räube oder Schabe vertreibt man mit einer scharfen Lauge von Holzasche, Kalch und Hühnermist, womit man die Stelle wäscht und alsdann eine Decke darüber breitet. 12) Das Feuer. Die Haut liegt scharf auf. $\frac{1}{2}$ Pfund Senf, $\frac{1}{4}$ Pfund Siebenseide, $\frac{1}{2}$ Pfund grauer Schwefel, $\frac{1}{4}$ Pfund Lorbeer, $\frac{1}{4}$ Pfund Entian, und drey Finger voll Kümmel, davon früh beym ersten Futter und Abends beym letzten einen Löffel voll

darunter gegeben. 13) Das Berenageln wird durch gestoßene und aufgelegte Schafgarbe (Achillea Millefolium) gewiß geheilt. 14) Satteldrückungen und dergleichen Verwundungen lassen sich durch folgendes Mittel bald heilen: Alaun, Salmiak, Grünspan, blauer und weißer Calixtenstein, Weinstein und englisches Kupferwasser, von jedem für 1 Gr., alles in einem neuen Ziegel zerfließen lassen, in ein starkes Papier gegossen, davon täglich einer Haselnuß groß in Wasser aufgelöst, und die Geschwulst oder die Wunde so lange damit gewaschen, bis der Schade geheilt ist. 15) Die Pferde führen auch zuweilen Leber-, Nieren- und Blasensteine bey sich, vorzüglich aber groß sind die Steine, die man in dem Magen und den Därmen findet. Letztere trifft man besonders bey den Mällerpferden an, wahrscheinlich weil sie den ersten Abfall von den frischgehauenen Mühlsteinen bekommen. Man weiß kein wirkliches Mittel dagegen, erkennt auch die Krankheit gewöhnlich nicht eher, als bis sie tödlich ist. Da das Jagdpferd durch die großen Strapazen, welche dasselbe auszuhalten hat, vorzüglich reine Säfte haben muß, wenn es nicht nach der Jagd mehrerley Krankheiten unterworfen seyn soll, so ist es eine allgemeine Regel, daß dasselbe einige Zeit vorher stark purgirt wird, damit die schädlichen Säfte weggehen. Eine solche Purganz besteht aus Zerkoralos 1 $\frac{1}{2}$ Unze, Spanischer Sei-

se und gepülvertter Jalappe von jedem 2 Quentchen, gepülvertem Ingwer 2 Scrupel, Anisöhl 40 Tropfen, wozu man so viel Rosen- oder Purgir- Kreuzdorn-Syrup nimmt, als zur Bereitung einer Pille nothwendig ist. Ferner muß man sich das Pferd gehörig von seinem Urathe entledigen lassen, ehe die Jagd angeht, dasselbe im Anfang nicht übertreiben, und dann wieder nach und nach in Ruhe bringen lassen. Dauert die Jagd mehrere Tage oder Wochen hinter einander, so muß es an Ruhertagen immer geritten werden; damit es immer in Bewegung bleibt u. s. w. f. Lappin a. a. O. Ihre stärksten Feinde sind Bären, Wölfe, Löwen, Tiger u. s. w., gegen welche sie sich vorzüglich durch Ausschlagen mit den Hinterfüßen wehren. Außerdem haben sie viel von Insecten und Würmern zu leiden, besonders aber von der After- und Nasenbremse (Oestrus), die die Eier beym Misten an den After und in die Nase legen, von Stechfliegen (Conops), Bremen (Tabanus), Pferdebestiegen (Hippoposca) und Pferde-läusen (Pediculus), von großen Spulwürmern (Ascaris), Haarwürmern (Trichuris), Palisadenwürmern (Strongylus), Egelwürmern (Fasciola) und Bandwürmern (Taenia). Waschen mit Tabackslauge hilft gegen die Insecten, die sich auf die Haut setzen. Salz und Weidenblätter sollen die Eingeweidewürmer ver-

treiben. Der Nutzen der Pferde ist groß. 1) Das Pferd wird zum Reiten gebraucht, und dazu gewöhnlich abgerichtet. Ein Jagd-Parforce- und Schußpferd hat daher auch eine eigene Behandlung nöthig, s. unten. Das Pferd geht beym Reiten den sogenannten Schritt, Trott, Galopp oder Paß. 2) Es muß auch Lasten tragen; dieß geschieht in Mühlen und bergigen Gegenden u. s. w. 3) Zum Fuhrwesen sind die Pferde unentbehrlich. Sie fahren Kutschen, Posten, Güter, Jagdzeug, und die ökonomischen und Hausbedürfnisse. 4) Man benützt sie zum Betriebe von Maschinen, wenn man nicht Wasser, Wind, oder andere Bewegungskräfte anwenden kann. 5) Sie treiben Wasserkünste und andere Maschinen. 6) Bey den Morgenländern müssen sie Dreschen, oder das Getraide austreten, besonders in Persien in der Provinz Derbent. In Spanien müssen sie nach Linné in den Ziegelscheunen Thon treten. 7) Das Kammfett schmelzen die Feidmeister aus und verkaufen es an die Gerber, Schuster und andere Personen zur Geschmeidigmachung des Leders. 8) Die Harnblase macht man zu Tabackbeutel und Ballons, und verbindet auch Gläser und Flaschen damit. 9) Die Sehnen brausen die Sattler und Orgelbauer, und letztere brauchen sie zum festen Verbande an den Orgelbälgen. 10) Die Milch wird von mehreren Nationen getrun-

ken und die Kalmucken und Tataren machen ein berauschesendes Getränk Kosmos und guten Käse daraus. 11) Der Mist ist ein guter treibender Dünger. Er dient daher zu Mistbeeten, und aus dem Bley durch die Dünste des Eßigs Bleyweiß zu machen. In Schweden und Norwegen füttert man Schafe, Schweine und Rühе, mit etwas Mehl und Kleyen vermischet, damit. Verbrannt wird er zum Salmiak benutzt. Frisch in Wasser eingeweicht und erfrorene Füße darein gesetzt, heilet der Schaden. Der dauerhafteste Ofenkitt besteht aus Pferdemist mit Lehm, Salzwasser, ungelöschtem Kalk, Ziegel- und Glasmehl, Hammerschlag, Feilspänen, Reh- und Kuhhorn, frischem Rinderblut und Wasser. Man fängt auch die Maulwurfsgrillen in eingegrabenem Pferdemist. 12) Das Fleisch wird von den Europäern nur im Nothfall bey Belagerungen gegessen; die Negern, Tataren und Kalmucken essen es aber und finden es sehr schmackhaft, letztere, die doch Schafe und Rinder im Ueberfluß haben, ziehen das Fleisch der Füllen doch allen andern vor. 13) Die Pferdehaut wird zu Sohlen- und Riemenleder und achten orientalischen Chagrin gegerbt. 14) Die Pferdehaare dienen zu Vögelschlingern, Geigenbogen, gewirkten Halsbändern, Armbändern, Knöpfen, Haarfieben, Angeln, ausgestopften Buchdruckerballen, Matragen, Betten, Stühlen, Sat-

teln, Polstern, Rissen, Pinseln, Hüten, Perücken, Seilen u. s. w. Ein Rossschweif ist in der Türkei ein großes Ehrenzeichen. 15) Den Huf braucht der Hornbreher, Kammacher, Messerschmied zu Stielen, der Uhrmacher zu den schön gemachten Uhrgehäusen; kalenirt dient er zu dem Berlinerblau und geraspelt als Dünger auf Aecker und Wiesen u. s. w. 16) Von den Zähnen braucht man die vordern zum Poliren, die Backenzähne aber zu ausgelegter Arbeit; in Irland macht man auch schöne Knöpfe daraus. Unter der gehörigen Vor- und Aufsicht thun sie wenig oder gar keinen Schaden. Daß Füllen Gras und Getraide verzehren und zertrreten, kann verhütet werden, eben so wie das Unglück, das Reuter und Führer haben können u. s. w. In der Jägersprache hat man folgende Ausdrücke: Bey dem Schießpferde, das kein Schimmel, Schälke oder Rappe, aber von langem Halse, gemäßigten Naturell, fromm und bey Jahren seyn muß, hat man außer den auf der Reithahn gewöhnlichen Ausdrücken noch folgende Weibmännische: Es wird gerichtet oder dressirt durch die aus Stricken gemachte Strickzügel, welche Schießleine heißt, und durch die aus einer ganzen Leine geknüpft Schießhalfter. Zuweilen werden dazu auch noch lederne Fesseln um die Beine, und ein Schießgurt um den Leib gebraucht. Es wird getrieben, d. h. der Kopf durch die

die Schießleine gebracht, daß es in dieser niedergebogenen Stellung neben dem Weidmann zu gehen gezwungen ist — mit der Schießleine gearbeitet d. h. mit derselben so geriegelt, daß der Kopf immer mehr auf den Boden kommt — auf der rechten oder linken Hand getrieben, wenn der Jäger rechts oder links steht — auf die Seite, wenn es seitwärts in die Quere gehen muß — auf die rechte Hand oder rechts getrieben, wenn der Jäger auf der linken Seite steht, und es auf die rechte Seite treibt — auf die linke Hand oder links, umgekehrt. Es wird gewendet, und zwar auf die rechte Hand oder rechts, oder auf die linke Hand oder links, wenn es sich entweder vorn oder hinten auf die rechte oder linke Seite drehen muß. Es wird schußfest gemacht, wenn es gewöhnt wird, daß man an allen Orten und Seiten bey demselben schießen kann. Es ist schußfest oder steht vor dem Schusse. Der Jäger zieht mit demselben an Wild. Die Handlung selbst heißt das Anziehen. Es wird ihm schön gethan — wenn man es streichelt oder mit Brod oder Hafer füttert. Man bestraft es mit Schießlinie bey Unarten. Bey der Parforcejagd u. s. w. s. unten.

Pfund heißt im Jägerausdruck jeder Streich, den Einer bey einem Jagen, wenn er einen Weidmännischen Fehler begehet, mit dem Weidmesser bekommt,

Pieplerche oder **Spießerche** — *Alauda trivialis et minor* — heißt auch **Gereuthkraut**, **Busch**, **Holz**, **Garten**, **Wald**, **Spiz**, **Baum**, **Heide**, **Pfeif**, **Bastart**, **kleine**, und **Winterlerche**, **Leim**, **Kraut**, **Brein**, **Schmel**, und **Stoppelvogel**, **Greinerlein**, **Stöpling**, **Suckerlein**, **Löwerle** und **Waldbachstelze** gehört in die Gattung Lerche als eine besondere Art mit folgenden Unterscheidungskennzeichen: Die Schwanzfedern sind schwärzlich, die äußerste ist zur Hälfte weiß, doch mit braunem Schaft, die zweyte hat eine weiße keilförmige Spitze; auf den Flügeln stehen von den Deckfedern zwey weißliche Streifen; der Nagel oder Sporn der Hinterzähne ist halbmondförmig gekrümmt und nicht lang. Ihrem Ansehen nach ist sie ein Mittel Ding zwischen einer Lerchen- und Bachstelzenart. Sie ist fünf und einen halben Zoll lang, der Schwanz zwey und ein Viertel Zoll, die Breite neun und drey Viertel Zoll und die gefalteten Flügel reichen einen Zoll auf den Schwanz. Der Schnabel ist fünf Linien lang, spitzig, beyde Riefen gleich lang, die Rändern eingezogen, der Oberkiefer an der Spitze ausgeschnitten und schwarzbraun, der untere weißlich; der Augenstern dunkelbraun; die Füße blaß fleischfarben; die Schienbeine zehn Linien hoch; die Nägel hornfarben,

ben, die hintere kurz und gekrümmt. Der Kopf ist mehr lang als rund, und mit dem Nacken, Rücken, dem obern Deckfedern des Schwanzes und Seiten olivenbräunlich, schwärzlich gefleckt, am Nacken, den mittelmäßigen Steißfedern und den Seiten am wenigsten, auf dem Kopfe am feinsten, und auf dem Rücken am stärksten; der Unterleib bis zum Bauche rothgelblich, auch nach dem Alter gelbröthlich, mit vielen schwarzen länglich dreieckigen Flecken, die vom Schnabelwinkel an der Seite der Kehle herunterlaufen, und sich über die Brust ausbreiten; Kinn; Bauch und mittelmäßige Astersfedern weiß; die Schenkel Federn rothgrau; die kleinern Deckfedern der Flügel olivenbräunlich, die zwey Reihen größere schwärzlich, die obere Reihe mit weißlicher Einfassung, die untere mit röthlichweißer, daher die zwey weißlichen Streifen auf den Flügeln; die Schwungfedern dunkelbraun, olivengrün kantirt; die hintersten langen röthlichgrau; die zwey lezten Federn sehr stark olivengrün, der Schwanz etwas gabelförmig, alle Federn zugespitzt, schwärzlich, die äußerste äußerlich zur Hälfte weißlich, die zweyte in der Mitte an der Spitze mit einem kleinen keilförmigen, weißen Flecken, die übrigen schmal olivengrün gerändert, die beyden mittelsten am stärksten; die Unterflügel grau, und ihre Deckfedern gelblichgrau. Das Weibchen ist nur wenig vom Männchen verschieden. Die Kehle, der

Hals und die Brust sind nicht so gelb, fast weiß; der weiße Flecken in der zweyten Schwanzfeder kleiner und die zwey Streifen auf den Flügeln weißer. Auch die einjährigen Männchen sehen nicht so gelb am Unterleibe aus, als die ältern. Varietäten: 1) die weiße Pieplerche. Sie ist selten ganz rein weiß. 2) Die bunte Pieplerche. Auf dem Körper an verschiedenen Stellen große weiße Flecken. Die Pieplerche hat die besondere Eigenschaft, welche nur sehr wenige Vögel mit ihr gemein haben, daß sie außer der Zeit ihrer Fortpflanzung, also im Herbst, Winter und Frühjahr ganz andere Locktöne von sich giebt, als im Sommer, und sich alsdann auch nur im höchsten Nothfall auf einem Baum oder Busch setzt. Sie läßt alsdann die piependen Töne von sich hören, wenn sie fliegt, oder auf der Erde herumläuft, welche ihr den Namen Pieplerche verschafft haben, die aber eigentlich Gid, gidgid! klingen. Ihre Lockstimme aber, die sie zur Zeit der Begattung und wenn sie Junge hat, hören läßt, ist ein zärtliches und ängstliches: Zip! Zip! und wird bloß in der Gegend ihres Nestes vernommen. Man kann daher sicher darauf rechnen, wenn man dieß Geschrey von ihr von einem Baume herab hört, daß man ihrem Neste nahe ist, und wenn sie Junge hat, so sieht man sie auch mehrentheils mit einem Schnabel voll Insekten sitzen und ihr Geschrey in dem Verhältnisse ver-

verdoppeln und verstärken, je näher man demselben kommt. Ihr Gesang, ob er gleich nur aus drey gezogenen, trillernden und lullenden Strophen besteht, ist doch sehr angenehm. Sie singt entweder auf dem Gipfel eines Baumes sitzend, oder schwingt sich dabey von demselben auf einige Augenblicke in schiefer Richtung flatternd in die Höhe, läßt sich in einem sanften Fluge fast allezeit auf die nämliche Stelle wieder nieder, und ruft im Niedersezen noch etlichemal sanft und abnehmend langsam die zärtlichen Töne: *Zia, zia, zia!* Man hört sie bis im Julius. Man kann sie zähmen, doch nicht ohne Mühe; und sie befindet sich am besten, wenn sie in der Stube frey herumlaufen darf, doch nimmt sie auch mit einem kleinen Käfig vorlieb. Und auch hier beobachtet sie die Jahreszeiten in Ansehung ihrer Lockstimme, piept im Herbst und Winter, und schreyt und singt im Frühjahr und Sommer. Man findet sie in ganz Europa, die kältesten Zonen ausgenommen, und in Deutschland ist sie, besonders in den bergigen und waldigen Gegenden, z. B. dem Harz- und Thüringewalde, in großer Anzahl anzutreffen. Der Strich dieser Zugvögel geht schon im August an, wo sie sich einzeln oder in Gesellschaft von drey bis zwölf ins Feld begeben, und ihre Nahrung vorzüglich in den Kraut- und Kohlfeldern und im September auf den abgemäheten Haferäckern suchen. In den ersten

Tagen des Octobers verlassen sie uns unvermerkt, ohne daß sie sich in so große Schaaren zusammenschlüßen, wie die Feldlerchen, wenigstens hat man sie noch nicht so gesehen. Eben so verstohlen schleichen sie sich gewöhnlich im Frühjahr in den letzten Tagen des März wieder in ihre alten Stände; doch bemerkt man alsdann zuweilen, wenn noch Schnee oder unangenehme Bitterung einfällt, Heerden von tausend und mehrern, die sich auf feuchten Waldwiesen, und bey warmen Quellen niederlassen. Ihren Aufenthalt haben sie eigentlich in den vordern Wäldern gebirgiger Gegenden und in den Gärten und Wiesen, die in der Nähe liegen. Sie suchen in dem Walde mehrentheils die lichten Gegenden aus, wo Holz ausgerottet oder ausgerottet ist, und daher ihr gewöhnlicher Name, den ihnen die Jäger geben, Gereuthlerche. Diese Vögel fressen in der Freyheit keine Sämereyen wie die andern Lerchenarten, sondern nähren sich von Heuschrecken, Mücken, Fliegen, Nachtfaltern, kleinen Käfern, Raupen und allerhand kleinen Insekten. In der Stube wollen sie Nachtigallenfutter haben, wenn sie lange dauern sollen. Sie haben sich auch nicht wie die andern Lerchen im Sande, sondern besprühen sich nur ganz fein mit Wasser. Im Walde findet man ihr Nest des Jahrs zweymal auf neu ausgerotteten Plätzen, auf allerley von Holz entblößten Anhöhen, im Heidekraut,
an

an oder unter alten Stöcken, Baumwurzeln und Erbkloßen, unter den Wachholderbüschen, in Wiesen und Gärten im bloßen Grase. Es ist schlecht gebaut, äußerlich aus dünnen größern Grashalmen, und inwendig aus dünnen und grünen, mit einzelnen Pferde- und andern Thierhaaren vermische. Das Weibchen legt vier bis fünf rundliche graue Eyer, die rothbraun marmorirt sind, und brütet sie mit dem Männchen, das es einige Stunden des Nachmittags abgelöst, in vierzehn Tagen aus. Die Jungen fliegen, um sich vor ihren vielen Feinden zu retten, so bald aus, als sie nur ihre Flügel brauchen können. — Die alten bekommen oft einen Kuckuck auszubrüten. Die Füchse, Wiesel, Marder, Iltisse, Katzen, Raben und Kestern vertilgen oft die Brut, und die Alten werden fast von allen Raubvögeln, die in Wäldern wohnen, verfolgt. Man kann mit der Flinte leicht an sie kommen. Man kann sie zur Strichzeit im Felde auf einem Heerde fangen, wenn man sich Lockvögel dazu aufzieht. Im Herbst fängt man sie häufig in dem Nachtgarn, wenn man auf Feldlerchen streicht. Es ist ein gewöhnlicher Tränkevogel, den man bis im September auf dem Tränkeheerde fangen kann. Ihr Fleisch schmeckt angenehm. Sie vertilgen viele schädliche Nachtfalter, besonders den Fichtenspinner und die Nonne.

Pinkert ist ein Finkle, den man zum Lockvögel auf dem Finkenheerde brauchet.

Piqueur heist bey der Parforcejagd jeder Jäger, der dem Hirsch zu Pferde nachsetzet, vorzüglich aber der, welcher den Hirsch zu bestärken und aufzujagen hat. Er muß nicht nur vollkommen hirschgeweiht seyn, und besonders das Parforcejagdwesen vollkommen verstehen, sondern auch sein Pferd zu regieren wissen, und dabey keine Ungemächlichkeit noch Gefahr scheuen. Er muß alle seine Hunde ihren Eigenschaften und Nahmen nach kennen und wissen, in welcher Ordnung er sie nach einander gehörig in Arbeit zu bringen habe. Auch muß er das Hifthorn gehörig blasen und wissen, wenn er solches hoch oder tief, stark oder schwach blasen soll.

Pirol — Oriolus — macht in der Ordnung der krähartigen Vögel eine eigene Gattung mit folgenden Kennzeichen aus: Schnabel: Stark, gerade, kegelförmig, sehr spizig, die obere Kinnlade etwas ausgeschnitten. Nasenlöcher: Unbedeckt. Zunge: Gespalten und spizig. Mit der Gattung der Würger gränzt diese an die Singvögel. Fast alle machen ein künstliches safförmiges Nest und leben einzeln. Bey uns ist nur eine einzige Art einheimisch, nämlich der Gemeine Pirol — oder gelbe Rade, — Or. Galbula seu Coracias Galbula — oder Kirschvogel, Pfingstvogel, Weib.

Weihrauch, Kirschdieb, Kirschholdt, Kersentiefe, Weidwall, Wiedewall, Wiederwalch, Wittewald, Wittewalch, Widuel, Wittewell, Wyrol, Wyrolt, Wyrolb, Bierhold, Bierholz, Bruder, Berolft, Eyrolt, Bierole, Bierhold, Gerolft, Bieresel, Bierhahn, Gelbvogel, Gelbling, Bülow, Bülau, Vogel Büloh, Büloon-Vogel, Schulz von Bülow, Schulz von Therau, Golddrossel, Goldamsel, Goldmerle, Gummerdrossel, Regenlärche, Kirschdrossel, Weihrauchvogel, Gugelfahraus, Gugeloder Kugel-Fihau, gelbe Kirschdrossel, Galbuckvogel, und Chlorian, mit folgenden Kennzeichen der Art. Männchen: Gelb, Flügel und Schwanz, außer der gelben Spitze, schwarz, Weibchen: Zeisiggrün, die Flügel schwärzlichgrau, und der Schwanz außer der gelben Spitze olivengrün. An Größe gleicht er einer Schwarzdrossel, ist neun Zoll lang, wovon der Schwanz dreyn und einen halben Zoll und der Schnabel einen Zoll wegnimmt. Der Schnabel ist stark, rundlich, erhaben, oben etwas eingekrümmt, und corallenroth; der Augenstern graubraun; die einen Zoll hohe Fußwurzel, so wie die Zähne sind aschgrau. Kopf, Hals, Rücken, Kehle und Unterleib sind schön goldgelb; die Flügel schwarz; die Deckfedern der gro-

ßen Schwungfedern bleichgelb gesäumt, wodurch ein gelber Fleck auf den Flügeln entsteht; von dem Schwanz sind die mittlern Federn ganz schwarz, die übrigen nur an der Wurzelhälfte, dann goldgelb. Das Weibchen ist nicht so schön; nur an den Enden der olivengrünen Schwanzfedern und an den untern Deckfedern des Schwanzes und der Flügel zeigt sich die goldgelbe Farbe, sonst ist der Oberleib zeisiggrün und der Unterleib graugrünlich mit dunkeln Streifen; die Flügel sind schwärzlichgrau. Es ist ein muthiger und zänkischer Vogel. Er fliegt nicht so leicht als die ihnen ähnlichen Drosselarten. Seine Lockstimme ist Büloh, er schreyt auch ängstlich Krääk und auch zuweilen wie die Katzen. Obgleich sein Gesang eben nichts besonders auszeichnendes hat, so hört man ihn doch wegen seiner hohen, flötenartigen Stimme gern. Er besteht aus folgenden Tönen: a fis a-fisa fis-a-lis, d. a. Die beyden ersten Terzien kommen in kurzen Absätzen, die letzten sechs Töne aber geschwind hintereinander, und zwar das letzte a eine Octave tiefer. Er ist sehr schwer zu zähmen, lernt aber, jung aufgezogen, Lieder pfeifen. Seine Heymath ist Europa und der Orient. Er sucht Feldhölzer und Borchölzer auf. Hier trifft man ihn in hohen dichtstehenden Bäumen an, besonders wenn das Laubholz mit etwas Nadelholz vermischt ist. Wenn die Kirschen reif sind, geht er auch in die

die Gärten. Im May kömmt er an, wenn schon die Bäume grün sind, und geht im August auch wider fort. Seine Nahrung besteht aus vollkommenen Insekten, aus ihren Puppen, Raupen und Eiern, dann aus dem Fleisch der Kirschen; aus Weinbeeren, Vogel-Hollunderbeeren und in südlichen Ländern aus Feigen. So bald sie im Frühling ankommen, fangen sie auch an, ihr künstliches und bewundernswürdiges Nest zu bauen. Es hängt dieß auf einem hohen Busch, oder auf einem Baum in einer Gabel zwischen zwey Zweigen, ist mit Wolle, Flach, Stroh und Grashalmen um denselben verbunden, und mit Grashalmen, Würzelchen, Moos, Flechten, Spinnweben und Puppenhälsen ausgebauet und ausgefüttert. Es hat eine beutelförmige Gestalt, hängt wie ein Körbchen zwischen zwey Handhaben, kann vom Winde bewegt, aber wegen seines fest verflochtenen Baues nicht herabgeworfen werden. Das Weibchen legt vier bis fünf weiße, einzeln schwarzbraun gefleckte Eier, und brütet sie mit dem Männchen gemeinschaftlich in vierzehn Tagen aus. Man sagt, das Männchen brüte, wider die Gewohnheit anderer Vögel, mehr als das Weibchen. Die Jungen sind gefleckt und sehen den Weibchen bis zur ersten Mauserung gleich. Sie scheinen sich nicht bey uns zu mausern. Sie sind scheu, und daher nicht leicht zu schießen, wenn man sie nicht durch Nachahmung ihrer Lock-

töne auf Bäume lockt, wo man sich einigermaßen verstecken kann. Ist aber erst ein Vogel von der Gesellschaft geschossen, so kömmen die andern alle nach dem Platz und lassen sich nach und nach schießen. Sie gehen auch in die Dornen oder Sprenkeln, vor welchen Kirschen oder Beeren hängen. Ihr Fleisch ist sehr wohlschmeckend; Schade daß sie nicht häufiger sind. Sie verzehren, besonders wenn sie Junge haben, viele schädliche Raupen und Insekten. Man muß sie von Kirschbäumen abzuhalten suchen, sonst werden sie denselben, so wie den Weinreben schädlich. Auch nach den Feigen fliegen sie.

Wissen, Pisten, Pischen oder Spießen heißt das Pfeifen der Haselhühner unter einander.

Plattnen heißt der Vogelfang der auf dem Plattbaume bewirkt wird.

Prellnetz, Spiegelnetz, Spiegelgarne ist eine Art von Netzen, die nur zur Schweinsjagd gebraucht werden. Es ist eben so lang als ein Jagdtuch, aber nur halb so hoch, spieglig gestrickt, hat aber eben so starke, oder noch stärkere Leinen. Die Forkeln, welche überhaupt etwas stark seyn müssen, sind oben an einer etwas hohen eisernen Gabel beschlagen, worinnen die Oberleine ruhet. Ein solches Netz muß ohngefehr gehen Schritte weit vor dem Laufstuche durch die

die Wochsel hinausgestellt werden. Wenn nun von den Säuen welche immer in einer geraden Linie hinter einander laufen, einige über den Wochsel sind, so wird die Oberleine in die Gabeln gelegt, da dann die noch übrigen nicht herüber können, sondern sich stoßen und zurückprellen; daher sein Name. Bey jeder Forkel müssen zwey Windleinen seyn, eine inwendig, die anders auswendig anzubinden, denn sie müssen auf beyden Seiten fest halten. Um die Gefahr, welche bey dem Aufstellen eines solchen Netzes für die Arbeiter von den Säuen zu befürchten ist, zu vermeiden, thut man wohl, die Forkeln unten mit Gelenken zu machen, und auf den Flügel eine Winde zu stellen, mit welcher man das Prellnetz geschwind aufrücken kann. Noch eine andere Art von Prellnetzen gebraucht man zum wilden Entenfange, s. Entenfang.

Probejagen ist eine Art von Bestätigungsjagen, die ein junger Jäger, wenn er seine Lehrzeit ausgestanden, und seine Behänge gehörig gemacht hat, veranstaltet, um zu zeigen, daß er das Seinige gelernt hat. Heut zu Tage ist es nicht sehr mehr üblich.

Prube, Prudel heißt ein kleiner Sumpf, dessen sich die Hirsche zum Abkühlen und die Säuen zum Wälzen bedienen.

Pürschen heißt überhaupt großes oder kleines Wildpret mit

der Büchse oder Flinte schießen. Es ist die wohlfeilste unter allen Arten von Jagd, denn eine einzige Person kann solche mit einem Hunde, auch oft ohne denselben verrichten. Die nöthigen Kenntnisse aller dabey anwendbaren Vortheile, ein scharfes Gesicht, gutes Gehör, feste Hände, leiser Tritt, gutes, jedoch nicht blankes Gewehr, und gutes Pulver und Blei, besonders zur Kugelbüchse gut passende Kugeln, sind die nöthigen Erfordernisse dazu. Die Kleidung des Jägers ist, nach der Farbe der Bäume, im Sommer grün, und im Winter grau. Auf großes Wildpret schlägt man Netze, oder bringet an gelegenen Orten Anstände und Schirme an. Auf die Füchse und Hasen stellt man sich am Holzrande, auf letztere auch an Saatfeldern an, doch beobachtet man dabey allezeit den Wind, daß er von dem Wilde auf den Jäger, aber nicht von diesem auf das Wild zugehe. Die Wasserpürsche geschieht auf allerley Wasservogel, man braucht dabey nur deren Aufenthalt zu erforschen, und einen Ort auszuweisen, wo man verdeckt stehen, oder sich anschleichen kann. Morgens und Abends ist dazu die beste Zeit. Auf Enten und andere ganz untertauchende Vögel muß man mit der Büchse gleich auf die Mitte zu, wo sie sich eintauchen, mit der Flinte hinhalten, weil das Wasser die Schrothe anzieht, 3 Quersfinger drüber im Schwimmen aber, je nachdem sie geschwinde oder langsamer schwimmen, etwas

was vorhalten. Auch muß man niemals gegen, sondern allemal von hinten, oder von der Seite schießen, weil sie sich sonst bey Erblickung des Feuers, gern untertauchen. Der beste Schuß auf größere Thiere und Vögel ist mit der Büchse, weil man damit nichts zu Schanden, sondern entweder todt schießt oder fehlet, überhaupt auch das gute Schießen mit der Flinte gewöhnt. Insbesondere nennet man Pürsch, wenn man, mit der Büchse im Walde herum ziehend Wildpret schießt. Die besten Stunden dazu, sind die Nachmittagsstunden, da das Wildpret gern aus dem Dickicht auf junge Gehäus zu treten pflegt.

Pürschhund, Cours-hund ist eine Art schneller und flüchtiger Jagdhunde, die man braucht, angeschossenes Wildpret zu verfolgen und einzuholen. Man kann auch im lichten Holze gesunde Bächen oder Rehe damit heßen, denn sie haben bey nahe die Geschwindigkeit der Windhunde, werden auch durch eine Windhündin und einen englischen Hund erzeugt. Er muß von Jugend auf sorgfältig gewöhnet werden, dem Jäger nachzukriechen, und wenn der Schuß geschehen, dem Wilde doch nicht eher nachzulaufen, bis er gesetzt wird; dann aber demselben in der größten Geschwindigkeit nachzusetzen, um es nieder zu ziehen, auch nach Befinden aus einem ganzen Trupp heraus zu suchen. Auf hauende Schweine nimmt man lieber Saurüben,

deren Verlust, wenn einer zu Schanden geschlagen wird, nicht so beträchtlich ist, als bey einem Pürschhunde. Man verstücket den Pürschhunden weder Ohren, noch Schwanz, auch füttert man sie, um ihre Leichtigkeit zu erhalten, nur wie Windhunde. Auch muß man sie alle Tage ausführen, und zu Hause die übrige Zeit des Tages im Zwinger herum laufen lassen, des Nachts aber in den Stall sperren, ohne sie anzuhängen.

Pürschkarren, Pürschwagen. Ist in großen Jagdzeughäusern ein besonderer Karren, Wagen, um das erlegte Wild darauf an den Ort seiner Bestimmung zu fahren. Ein solcher Karren hat zwey, ein Wagen aber vier Räder, außerdem aber sind sie einander in allen Stücken gleich. Der Kasten ist von Brettern hinten und vorne mit Aufzügen. Vorn sind auswendig vier eiserne Haaken angebracht, weil man gemeinlich das vornehmste Stück Wild, den stärksten Hirsch oder Keuler daran zu binden, das übrige aber in den Kasten zu legen pflegt.

Pürschmeister ist ein Jagdbeamter bey einer fürstlichen Jägerey, der das ganze Jägerhaus mit allen Jägerpürschen, Wagenmeister, Knechten, Pürschjungen, Hunden und allem Jagdzeuge, auch alle Jagdhandwerker unter seiner Aufsicht, auch seine Wohnung im Jägerhofe; wo alles von ihm abhänget, hat. Seinen Namen hat er daher, weil

weil er bey dem Hirschbrunstschießen, so wie bey der Auerhahnhas die Herrschaft zum Pürschen anführen muß. Er hat alles Jagdzeug und Geräthschaften zu besorgen, die Tücher und Netze nach geendigter Jagd trocknen, ausbessern, und wieder an ihrem Ort aufheben zu lassen, über die Hunde, nach ihren Namen und Aufenthalte, ob sie nämlich im Jägerhose, oder auswärts auf Meistereyen, Vorwerken u. unterhalten werden, in gleichen über ihren Zuwachs und Abgang ein richtiges Verzeichniß und über ihre Fütterung gehörige Rechnung zu führen. Bisweilen ist er bey kleinen Höfen auch zugleich Oberjäger.

Pürschrohr, Pürschbüchse ist eine Kugelbüchse mit gezogenem Rohre, tüchtigem Schafte, und einem kurzen, hohlen, und nach dem Backen ausgeschnittenen Anschläge, worinnen ein Beklästchen, zu Aufbewahrung des Ladenmaasses, Krägers, auch nöthigen Kugeln und Pflaster ist. Das beste Schloß dazu ist, ohnerachtet es jetzt nicht mehr sehr im Gebrauch ist, ein deutsches, denn es kann nicht eher losgehen, bis der Stein auf die Pfanne aufgesetzt ist, und wenn man zwischen den Stein und die Pfanne einen Tuchlappen legt, und den Stein darauf setzt; so bleibt Pulver, Rad und Stein trocken, und man kann denselben in Hup abziehen, und losdrücken. Auch ist mit einem solchen Schlosse der Schuß aus freyer Faust viel sicherer,

weil es viel leiser und ohne Verrückung des Gewehres losgeht, als wie ein französisches. Die Büchse muß vollkommen Kugelig, mit ganz gleichförmig eingetheilten, weder zu tiefen, noch zu flachen Zügen seyn. Wenn sie zu hoch, zu kurz, oder auf die Seite schießt, so kann man ihr durch Verrückung des Kornes oder Biesieres helfen. Wenn sie aber einmal gleichen Schuß hält; so kann ihr nur durch frisches Bohren geholfen werden, wenn Eisen genug am Lauffe ist. Eine solche Büchse schießt man auf 100 bis 120 Schritte ein, indem man mit scharfem Korn auf einen Fleck von der Größe eines Species Thalers unten anhält, in weiterer Entfernung nimmt man das Korn voller.

Pürzel, Bürzel ist der Schwanz der Hirsche und wilden Schweine.

Pulver, Schießpulver ist eine Zusammensetzung von Schwefel, Kohlen und Salpeter, die man in der Pulvermühle bereitet, um bey seiner Entzündung, vermöge seiner treibenden Kraft, den Schuß damit aus dem Gewehre zu treiben. Der Schwefel ist das geschwinde Entzündungsmittel, der Salpeter, wenn er angezündet ist, sucht einen weitem Raum, und die Kohlen, so aus Linden: Schießbeeren: Erlen: Weiden: und andern leichten Holze seyn müssen, verbinden den Schwefel und Salpeter, und dienen auch zum Auf-

fame

fangen der Feuerfunken, und zu längerer Erhaltung der Flamme. Die Zubereitung des Pulvers geschieht folgendergestalt. Man stößt die Kohlen und den Schwefel, und vermischt sie mit einander in einem Zuber, der Salpeter aber wird geläutert, und etwas reine Salpeterlauge unter die gestoßenen Kohlen und Schwefel gegossen, alles unter einander gerührt und auf die Mühle gebracht, wo es anfänglich gestampfet, nachher aber durch Körnsiebe, von der Größe, welche die Körner haben sollen, gesiebet wird, welches alles durch die Bewegung der Mühle bewirkt wird. Was durch die Siebe gegangen, thut man in ein Staubsieb, schlägt den Pulverstaub durch, der Rückstand aber wird auf den mit Leisten umgebenen Dörrofen gebracht und getrocknet, nachher aber feuersicher aufbewahrt. Zum Versuch, ob das Pulver rein ist, schütte man etwas davon auf weißes Papier, und zünde es an, je weniger das Papier davon verunreiniget wird, je reiner und stärker wirkend ist das Pulver, und so umgekehrt. Das beste und feinste ist das Püsch- und Scheibepulver, das man in die Büchsen und Flinten brauchet, darauf folgt das Musketenpulver und das Kanonenpulver. Wenn man Pulver einigemal mit rectificirten Weingeist besprenget, und wieder abtrocknet, so bekommt es doppelte Stärke.

Punktirter Strandläufer. — *Tringa Oehropus* —

macht unter den Sumpfvögeln in der Gattung der Strandläufer eine eigene Art aus, welche auch die Nahmen: grüner oder gelbfüßiger Strandläufer, kastanienbrauner, schwarzer Strandläufer, größter Strandläufer, großer Sandläufer, Weißarsch, Steingästel, Grünbeinlein, Grünfüßl, Mattkrill, bunt, Wasserhühnlein, bunt und geschädtes Mottbühnlein, braunes Wasserhuhn mit schwarzem Schnabel und grünen Füßen, und bey den meisten Jägern fälschlich Wasserbecassine führt. Die Kennzeichen dieser Art sind folgende: der Oberleib ist olivenbraun mit weißen und dunkelbraunen edigen Flecken; die Bauch- und Steißfedern und die obere Hälfte der Schwanzfedern sind weiß und die Füße grünlich. Die Größe ist wie eine Misteldrossel, die Länge fast elf bis zwölf Zoll, wovon der Schwanz zwey und einen Viertel Zoll wegnimmt, die Breite achtzehn Zoll und die Flügel reichen zusammengelegt bis an die Schwanzspitze. Der Schnabel ist sechzehn Linien lang, an der Spitze etwas abwärts gebogen, schmutzig dunkelgrün, an der Spitze schwarz; der Augenstern nußbraun; die Schienbeine vorn geschildert, sechzehn Linien hoch und mit den Füßen dunkel- oder aschgraugrün; die mittlere und äußere Zähe mit einer kleinen Haut verbunden. Der Kopf ist klein, der Hals lang und der

Rör.

Körper stark und abgerundet. Der Scheitel und Obertheil des Halses sind mehr aschgrau als dunkelbraun, und weiß gestrichelt; der übrige Oberleib, die Schulter, der Streif und die hintern und kleinern Deckfedern der Flügel und die letzten Schwungfedern sind dunkelbraun mit kleinen röthlich weißen dreys- und viereckigen, und dergleichen dunkelbraunen ins Schwarze übergehenden Flecken, und schillern ins Grüne; die oben ziemlich langen Deckfedern des Schwanzes sind weiß, an der Wurzel ein wenig dunkelbraun; eine weiße Linie geht vom Schnabel nach den Augen; Augenkreis, Rinn und Kehle sind weiß; Wangen, Unterhals und die obere Hälfte der Brust weiß mit kurzen dunkelbraunen Strichen; Unterbrust, Bauch, Schenkel, und die mittelmäßigen Aftersfedern weiß; die Seiten vorne weiß und dunkelbraun bandirt, hinten so wie die untern Deckfedern der Flügel dunkelbraun in die Quere weiß gestreift; die erste und zweyte Ordnung der Schwungfedern mit ihren Deckfedern schwärzlich; der Schwanz gerade, weiß, von der Mitte an nach den äußern Federn zu abnehmend schwarz bandirt, so daß die äußere ganz weiß ist, die zweyte ein schwarzes Band und einen schwarzen Punkt hat, die dritte ein und ein halbes Band, die vierte zweyte Bänder, die fünfte zwey und ein halbes, die sechste drey und ein halbes Band, an den beyden mittelften sind auch die Spitzen schwärzlich, an

den übrigen aber weiß. Wegen der weißen Deckfedern des Schwanzes und der weißen Hälfte der Schwungfedern entsteht an diesen Theilen ein zwey Finger breiter weißer Fleck, den man besonders im Fluge sehr deutlich bemerken kann. Das Weibchen ist am Halse und Kopfe dunkler und an den Flügeln und Schwanze heller, als auf dem Rücken, und die weißen Flecken stehen nicht so häufig. Vor der Paarungszeit leben diese Vögel einzeln, während derselben paarweise, und nach derselben in kleinen Heerden von vier bis acht Stücken, fliegen sehr schnell und schreyen dabey unaufhörlich und laut: Gü, Gü! Sie sind scheu, laufen hurtig, vertriehen sich nicht bey Annäherung eines Menschen, sondern fliegen eiligst und mit großem Geschrey davon. Sie riechen stark nach Bisam, und auch die ausgekärgten behalten diesem Geruch noch lange. Man trifft diese Vögel in Europa, Sibirien und Nordamerika an. In Deutschland sieht man sie an allen großen Fluß- See- und Teichufern. Es sind Zugvögel, die uns truppweise im September verlassen, und vom August an, von einem Teich- Fluß und Seeufer zum andern fliegen. Sie ziehen des Nachts und zwar, wie man an den Locktönen hört, sehr hoch in der Luft hin. Ihre Nahrung besteht aus Würmern, Insekten, Schnecken, Fischlaich u. s. w. was das Wasser ans Ufer treibt. Sie fressen auch Regenwürmer, die auf den Ufern und nassen Wiesen hervor kriechen. Sie

Sie wenden fast alle Steine um, um etwas nahrhaftes darunter zu finden. Sie nisten nicht viel in Deutschland, wie ich glaube mehr im Norden. Das Nest steht am Ufer im Gras. Die fünf bis sechs Eier sind grünlichweiß, braun gefleckt und werden in drey Wochen ausgebrütet. Die Jungen sind am Oberleibe dunkelbraun, alle Federn rostgrau eingefärbt, und nur einzeln weiß gefleckt; die Deckfedern der Flügel sind dunkler als der Rücken; der Hals und die Brust sind grünlich weiß mit vielen dunkelbraunen Strichen; der Schwanz ist schwarz und weiß gestreift, und sowohl die Deckfedern desselben als auch die Wurzeln haben noch schwärzliche Bänder und sind nicht weiß, wie bey den Alten. Viele Falkenarten, besonders die Halbweyhe, auch Füchse, Marber, Iltisse und Wiesel stellen ihnen nach. Auf dem Leibe habe ich eine gel-

be Milbe gefunden. Sie lassen sich ziemlich nahe kommen, und man schießt sie alsdann mit Dunst. Im Herbst, wenn sie truppweise an den Ufern der Teiche und Flüsse sind, fliegen sie allezeit wie die folgende Art, wenn sie aufgejagt werden, auf die entgegengesetzte Seite, es müssen ihrer daher mehr seyn, wenn man sie schießen will. Wo man sie immer an den Ufern hin und herlaufen sieht, fängt man sie wie die folgende Art in Laufbohlen, die man gern an das Ufer und etwas in das Wasser stellt. Wenn man mehrere solcher Stellungen am Ufer weg macht, so kann man ihrer viel fangen. Man fängt sie auch mit Leimruthen auf denselben Stellen, wo sie immer hinfallen. Man schätzt ihr Wildpret sehr hoch und manche essen es lieber, als von einer wirklichen Becassine, trotz des starken Bisamgeruchs im Frühlinge.

Q.

Quackente — *Anas Clangula* — gehört als eigene Art zur Ordnung und Gattung der wilden Ente und führt noch folgende Nahmen: Quackente, Klapperente, Klangente, Hohlente, Strausente, Eisente, Brillenente, Baument, schwarz- und braunköpfiger Ententauher, Dickkopf, Köllje das Männchen und Köllje Quene.

das Weibchen, Bierdüglein, Golddüglein und Klinger. Von den übrigen Arten unterscheidet sich diese Ente durch folgende Kennzeichen: der Kopf ist durch die gesträubten Federn dick und schwarz, bey dem Männchen grünglänzend, bey dem Weibchen rostfarben überlaufen, an jedem Mundwinkel ein weißer Fleck; die Färbung schwarz und weiß; an der Hinterzähne eine flügelartige Haut

Haut. Die Länge beträgt neun-
zehn Zoll, wovon viertelhalb Zoll
auf den Schwanz kommen; die
Breite ist zwey Fuß und vier
Zoll und die Flügel reichen ge-
faltet bis auf die Mitte des
Schwanzes. Das Männchen wiegt
ein und drey Viertel Pfund und
das Weibchen nur ein Pfund.
Der nur ein und drey Viertel
Zoll lange Schnabel ist schwarz
und breit; der Augenstern gold-
gelb; die Schienbeine sind an-
derthalb Zoll hoch und mit den
Schwimmfüßen orangegelb; der
Kopf und Oberhals schwarz, grün-
glänzend und violett. Die wei-
chen sammtartigen Federn sträu-
ben sich auf dem Scheitel und
an den Wangen, daher der Kopf
ungewöhnlich dick wird; an bey-
den Mundwinkeln ist ein großer
weißer Fleck; der Rücken, die
kleinern Deckfedern der Flügel,
der Steiß und Schwanz sind
schwarz, letzterer etwas getheilt
und mit starken und steifen
Schäften versehen; der untere
Theil des Halses, die Brust und
der Bauch weiß; die Schenkel-
federn schwarz gefleckt; die Schul-
terfedern schwarz und weiß und
sichelförmig über die Flügel ge-
krümmt; die großen Deckfedern
weiß; die vordern Schwungfe-
dern dunkelbraun, die mittlern
weiß, daher ein weißer, unten
brauner Spiegel auf den Flä-
geln entsteht. Das Weibchen
ist kleiner, mit dunkelbraunem
Kopfe, grauem Halse, weißer
Brust, Bauche und mittlern
Schwungfedern; die Deckfedern
der Flügel und die Schulterfe-
dern sind dunkelbraun und asch-

grau; die vordern Schwungfe-
dern und der übrige Körper ruß-
schwarz; die Farbe überhaupt
schmutzig; die Füße dunkelbraun.
Zuweilen trifft man auch alte
Weibchen an, die sich in der
Farbe mehr dem Männchen nä-
hern. Die Jungen haben ei-
nen braunen, auch schwärzlichen
Kopf mit weißen oder weißgrauen
Flecken und auch ohne dieselben.
Es sind sehr scheue Enten, die
gar nicht aus dem Wasser kom-
men, daher sehr geschickt schwim-
men und gut und lange unter-
tauchen. Gezähmt werden sie
leicht lahm, weil sie das Gehen
nicht gewohnt sind. Sie geben
einen lauten quackenden Ton von
sich, woher eben ihr Name. Ihr
Sommeraufenthalt ist der Nor-
den von Europa und Ame-
rika. Als Zugvögel hat man
sie immer nur in kleinen Flä-
chen auf deutschen Teichen im
Oktober und November gesehen.
Im März ziehen sie wieder in
ihre nördliche Heymath zurück.
Sie schwärmen im Winter nicht
nur an den deutschen Seeküsten,
sondern auch auf den offenen
Seen und Teichen herum. Ihre
Nahrung besteht aus Muscheln,
doch fressen sie auch Fische und
Frösche. Gezähmt nehmen sie
bloß Brod an. Aus den natur-
historischen Werken über die nörd-
lichen Länder ist es bekannt, daß
diese Ente ein schönes rundes
Nest aus Gras und ihren eig-
nen Federn macht und 7 bis 10
weiße Eyer in dasselbe legt. Es
soll nicht bloß in Binsen und
Schilf an den Ufern, sondern
auch auf Bäumen stehen. So

h

schwer

schwer sie sich schießen lassen, so gut gehen sie ins Netz. Ihr Wildpret ist fett, schmeckt aber thranig und wird daher vorher in Essig gelegt. Den Schaden, den sie bey uns an Fischen thun, ist nicht beträchtlich.

Queerflügel ist ein durch das Holz gehauener Weg, der

sich gerade vor einem barinnen angestellten Jagen befindet, s. Flügel.

Quertuch heißt dasjenige Tuch, welches das Jagen und den Lauf von einander scheidet.

Queerwände sind im Leshenfange die kurzen Wände.

R.

Rabe — *Corvus corax* — ist der oben beschriebene Kolk-
rabe. An vielen Orten nennet man nächst den eigentlichen Raben, auch die Krähen so. Im eigentlichen Verstande werden folgende Gattungen darunter verstanden: 1) der Waldrabe, Steinrabe, Scholte, *Corv. gracilus*, den man auf hohen Gebirgen in Deutschland, in der Schweiz, Frankreich und Italien findet. Er ist so groß wie ein Huhn, hat einen langen, rothen, gebogenen Schnabel, langen Hals, rothe Füße und kurzen Schwanz. Seine Farbe ist schwarz, ins grüne spielend. Er lebt bloß von Würmern und Insekten, und horstet in Felsenrißen und alten Gebäuden. Seine Jungen, die sehr wohlschmeckend seyn sollen, werden mit großer Mühe und Gefahr aus den Horsten geholt. 2) Der Kolk-
rabe, Goldrabe, große Nacht-
vogel, *Corv. corax* ist noch etwas größer, als jener, und von Far-
be kohl-schwarz, doch hat man

auch hin und wieder Abänderungen der Farbe, und in den nordischen Ländern ganz weiße Raben. Man findet ihn in ganz Europa, wo er auf den höchsten Bäumen horstet, und im zeitigen Frühjahr 4 bis 6 schmutzig grüne Eyer mit kleinen braunen Flecken, in der Größe kleiner Hühnereyer legt, und in 30 Tagen ausbrütet. Während der Brutzeit entfernt sich das Männchen nur vom Neste, wenn es seiner Gattin Nahrung holet. Sie leiden kein anderes Nest in ihrer Nähe, und leben Paarweise so, daß ein, einmal gepaartes Paar sich nie wieder trennet. Er hat eine sehr scharfe Witterung von allen seinen Raube, und lebt vorzüglich vom Aase, doch raubt er auch Hasen, Hühner, Fasanen, auch zahmes Federwildpret und Lämmer, wenn er dazu kommen kann. Nicht weniger Fische, Krebse, Insekten und allerley Saamen und Körner. Er ist sehr schlau und gelehrig, stiehlt gern, auch was er nicht

nicht genießen kann, und versteckt es. Er läßt sich leicht zähmen, und wenn man ihm die Zunge löset, lernet er auch Worte nachsprechen. Er erreicht ein hohes Alter. Seine Flügel Federn braucht man zum Schreiben, Zeichnen und zum Besiedern des Flügels (eines musicalischen Instruments.) Man vertilget die Raben ebenso, wie die Krähen (s. Krähe) ausserdem aber kann man sie auch mit papiernen Tuten fangen, die man inwendig mit Vogelkleeim bestreicht, und ein Stück Fleisch hineinlegt. 3) Der Seerabe, s. d. Wort.

Rabenhütte ist so viel als Krähenhütte und zum Fange der Raben und Krähen bestimmt.

Rabenkrähe — *Corvus Corone* — gehört mit dem Kollkraben in eine Ordnung und Gattung, wo sie eine besondere Art ausmacht, deren Kennzeichen folgende sind, nämlich sie ist schwarz, an der Brust mit bläulichem Glanze; der Schwanz zugerundet; der Schnabel länger, als die Schienbeine und die Nasenlöcher mit Borsten bedeckt. Sie heißt auch Krähe schlechtweg, gemeine Krähe, schwarze Haus- und Feldkrähe, gemeiner kleiner schwarzer Feldrabe, Mittelrabe, Krähe, Krährabe, schwarzer Krährabe, schwarze Raubkrähe, und Askrähe. Beym ersten Anblicke unterscheidet sich dieser Vogel von dem vorhergehenden durch nichts, als

daß er weit kleiner ist. Seine Länge beträgt anderthalb Fuß und die Breite drey Fuß; der Schnabel ist stark, dick, gewölbt, an der Spitze etwas übergebogen, von Farbe schwarz und zwey und einen Viertel Zoll lang, der Schwanz aber hat eine Länge von fast acht Zoll. Die Flügel reichen fast bis an die Schwanzspitze. Der Augenstern ist kastanienbraun; die Füße sind schwarz; die geschilderten Beine zwey und einen halben Zoll hoch. Das ganze Gefieder ist schwarz; am Oberleibe mit einem violetten Glanze überzogen. Das Weibchen ist etwas kleiner und gebt gebückter. Es giebt in dieser Art folgende Farbenvarietäten: 1) die ganz weiße Rabenkrähe bald mehr bald weniger rein weiß; 2) die bunte Rabenkrähe, weiß und schwarz gescheckt; 3) die Rabenkrähe mit grauem Halsbande; 4) die Rabenkrähe mit grauem Bauche. Vielleicht Nr. 3 und 4, eine Bastardzucht von der Raben- und Nebelkrähe; 5) die kleine Rabenkrähe. Beträchtlich kleiner als die gewöhnlichen Vögel, nicht viel größer als eine Dohle. Vielleicht vom letzten Ey, wie bey mehreren Vögeln. Die Rabenkrähen haben so wie der gemeine Rabe, die Nebelkrähe, Saatkrähe und die Dohle einen schreitenden, hin und herwankenden, aber doch dabey stolzen Gang, und einen langsamen aber festen und gewissen Flug, der auch den stärksten Windstoß aushält. Die Schwingen sind dabey an ihren

Spitzen wie Finger ausgespreitet, und nicht wie bey andern Vögeln an einander gefügt und geschlossen. Sie wiederholen fliegend und sitzend ihr rauhes Grab, Grab! daß sie mit großer Anstrengung austreten müssen. Im Frühjahr haben sie ein heiseres Geschrey, das ohngefähr Krä! Krä! klingt, damit sie sich einander zur Paarung locken, und welches das Weibchen öfterer auf der Spitze eines hohen Baumes sitzend ausstößt, als das Männchen. Bey der Paarung, die unter allerhand Liebkosungen auf der Erde geschieht, giebt das Männchen noch überdieß allerhand quackelnde Töne von sich. So klug, und wohl noch kläger als die gemeinen Raben, sind sie. Dem Ackermanne nähern sie sich z. B. ungescheyt, so bald sich aber ein anders gekleideter Mensch neben den Pflug stellt, so weichen sie auf zwey bis dreyhundert Schritte weit und kommen nicht eher wieder in die Furche, und wenn sie die köstlichsten Speisen in derselben zu finden wüßten, bis der vorige Pflüger die Pflugsterze wieder in die Hand nimmt. Ihr Geruch ist auch sehr fein, denn sie wittern das Nas weit, wittern die Maden und Mäuse unter der Erde und suchen sich ihrer zu bemächtigen. Sie verfolgen alle Raubvögel mit Nachdruck, lieben die Gesellschaft ihres Gleichen noch mehr als die gemeinen Raben, indem sie sich Sommer und Winter zusammen halten, können so wie jene gezähmt werden, und Worte nachsprechen lernen, und tragen

gezähmt und frey alles, was glänzt, zusammen. Sie werden sehr alt, daher der Krähen Tod zum Sprichwort geworden ist. Man trifft sie in Europa, Sibirien, Nordamerika, und auf mehreren Inseln der Südsee an. In Deutschland sind sie in mehreren Gegenden sehr häufig. Sie lieben vorzüglich die Feldhölzer, dann die Waldungen, die ans Feld grenzen, und die Berberwälder an einer Bergkette. Mitten im tiefen Gebirge findet man sie entweder sehr selten oder gar nicht, weil sie ihrer Nahrung halber immer Aecker und Wiesen in der Nähe haben müssen. Sie sind Strich- und Standvögel, je nachdem ihr Sommeraufenthalt beschaffen ist. Diejenigen, welche in kleinen Feldhölzern wohnen, schlagen sich im Herbst in großen Scharen zusammen, ziehen am Ende des Octobers, wenn sehr stürmisches und regnerisches Wetter eintritt, von ihrer Heimath weg, von einer großen Wiesen zur andern, und lagern sich gern des Winters über am Tage in bergigen Gegenden in den Wiesengründen, wo warme Quellen offene Plätze lassen, auf den Feldern, wo Mist hingefahren wird, und ziehen des Nachts mit großem Geschrey in die Wälder dahin, wo sie Schutz vor Sturm und Wetter haben. Im März gehen sie wieder in ihre Heimath zurück. Sie haben gern die Dohlen in ihrer Gesellschaft. Diejenigen hingegen, die am Fuße eines waldigen, vorzüglich mit Schwarzholz besetzten, Kettengebirgs

Kirgs wohnen, wie z. B. in Thüringen, ziehen niemals weg. Im Oktober begeben sich einige Familien derselben zusammen, wählen, wie es scheint, einen Anführer oder Familienvater, der sie des Morgens ins Feld und Abends wieder nach Hause führt. Ihr Schlaf ist sehr leise; denn wenn man des Nachts im Walde geht, und dem Aufenthalte einer solchen Krähe nahe kommt, so fliegt sie augenblicklich auf, erhebt ein gräßliches Geschrey, die andern werden sogleich auch wach, gesellen sich zu ihr, stimmen aus vollem Halse in ihre ängstlichen Töne ein, und begeben sich nicht eher wieder zur Ruhe, bis sie nichts mehr bemerken, und diejenige, welche gestört wurde, sucht in der dunkelsten Nacht einen neuen Wohnplatz auf, und bezieht den alten nie wieder. Ihre Hauptnahrung besteht in Regenwürmern, die sie alle Morgen von Wiesen und Nieden auflesen, in Erdmäden, besonders den schädlichen Engerlingen, und in Maulwurfsgrölen, die sie hinter dem Pflug finden, auch in Feldmäusen, denen sie vor ihren Löchern aufpassen. Letztere sind besonders ihre Herbst- und Winternahrung. Außerdem fressen sie nackte Erbschnecken, Wasserschnecken, um welcher willen sie sich bey abgelassenen Fischteichen einsinden, große Käfer, Krebse, Wassergeleyer, besonders der Taucherarten, junge Vögel, als: Gänse, Hühner, Enten, Rebhühner und Haasen, allerhand Aas, Pferde-, Räh- und Menschenoth, aus-

gesteutes Getraide, als Weizen, Gerste, Erbsen, Heidekorn, Spelt, auch grüne Saat, Graskeime und Graswurzeln, verpflanzte Kohlpflanzen, Kirschen, Birnen, Oliven u. dgl. Wenn im Winter eine über einer Heerde (Kette) Rebhühner schwebt, so ergiebt sich sogleich das schwächste freiwillig, kauert sich im Schnee hin, wird von ihr mit dem Schnabel getödtet, da unterdessen die übrigen sich unter ängstlichem Geschrey auf die Flucht begeben. Wenn sie einen Krebs fangen, und denselben besonders ihren Jungen bringen wollen, so beißen sie ihn sogleich beyde Scheren ab, um vor Verlesung sicher zu seyn. Sie verstecken auch zuweilen, wenn sie Ueberfluß z. B. an Aas haben, Stücken unter Moos und Laub, wie die Füchse, und sehen fleißig zu, ob es noch da ist, lassen es aber gewöhnlich nicht über einen Tag vergraben liegen. In harten Wintern gehen sie in die Städte und Dörfer. In gelinden Wintern machen die Einheimischen schon zu Ende des Februars Anstalt zum Neste, sonst im März, so wie diejenigen, welche in Schaaeren herumgestrichen sind. Die Standvögel bauen einzeln, die Strichvögel aber zusammen in Feldhölzern. Es giebt Gegenden in Thüringen, und besonders im Herzogthum Altenburg, wo sich in kleinen Eich- und Kieferwäldchen, wie bey den Saatkrähen, zwanzig bis dreyßig Nester auf einem großen Baume befinden, welche oft mit ihren Unterlagen, die gewöhnlich aus Dor-

ren

nen bestehen, unter einander und mit denen auf den nahe stehenden Bäumen verbunden sind. Die zweite Lage eines Nestes sind Wurzeln, die dritte Schalen, die vierte Moos und die Ausfütterung Schweinsborsten, Kuh- und Haasenhaare. Das Weibchen legt vier bis sechs Eier, welche blaugrün und mit großen und kleinen aschgrauen und olivenbraunen Flecken besetzt sind, die am stumpfen Ende zusammenfließen. Männchen und Weibchen brüten sie in achtzehn bis zwanzig Tagen gemeinschaftlich aus, versorgen ihre Jungen treulich, füttern sie so lange bis sie sich selbst ernähren können, an, und machen alsdann gewöhnlich zur zweiten Brut Anstalt. Die Jungen, welche vor dem ersten Mausern noch keinen besondern Glanz haben, gehen dem Pfluge nach, wo sie immer Nahrung finden, und fressen auf den abgemähten Wiesen und Viehtrittsten allerhand Würmer, auch Kuh- und Pferdemit. Sie lassen sich mit Fleisch und Brod sehr leicht auffüttern, und so zahm machen, daß man sie ausfliegen lassen kann; ja sie sollen sogar, wie die Tauben und Schwalben zu Briefträger gebraucht werden können. Baumarder, Wieseln und verschiedene Raubvögel zerstören zuweilen ihre Brut. Auf ihnen hauset eine graue Laus, und in ihnen Band- und Rundwürmer. Die verschiedenen Arten des Fanges und der Erlegung sind wie bey den Kollkraben. In manchen Gegenden macht das Krähen

schießen, welches im May in Feldhölzern geschieht, wenn die Jungen ausfliegen, eine besondere Jagdflußbarkeit, und die Fänge, die da gesammelt werden, ein wichtiges Accidenz für die Jäger aus. In manchen Gegenden, auch in Deutschland, wird das Fleisch der Jungen so gut als Taubenfleisch gefunden und gegessen. Gut schmecken wenigstens die Eier. Die Flügel Federn werden wie vom Kollkraben gebraucht. Aus ihrer Nahrung ergiebt sich, daß sie mehr nützliche als schädliche Vögel sind. Nur da, wo sie in der Nähe der Felder wohnen und an den Getraide und Feldfrüchten sehr schädlich werden, ist ihrer großen Vermehrung Einhalt zu thun. In Raabelwäldungen treten sie, wenn sie in Menge da wohnen, die jungen zerbrechlichen Quirle ab, wenn sie sich darauf setzen, daher diese einen krüppeligen Wuchs erhalten.

R a h m e n , R ä h m e n , Rohmen nennet man bey der Hasenhake, wenn die Windhunde einen Haasen einholen, und ihn nöthigen, einzulenken und einen andern Weg einzuschlagen.

Ralle — Rallus — macht unter den Sumpfvögeln eine aus mehrern Arten bestehende Gattung aus, deren Kennzeichen sind: der Schnabel mittelmäßig lang, gerade, an den Seiten zusammengebrückt, pfriemenförmig zugespitzt, an der Spitze kaum etwas abwärts gebogen; die

die Nasenlöcher länglich und schmahl; die Zunge an der Spitze runzlich und rauh; die Füße mit mittelmäßig langen gespaltenen Zehen, und der Leib zusammengedrückt. In der Lebensart sind die Vögel dieser Gattung mit denen aus der Knarrer Gattung verwandt, unterscheiden sich aber sehr durch die Schnabel und Fußform. Die bey uns vorkommende Art ist die Wasserralle — *R. Aquaticus* — oder große Wasserralle, große Ralle, Sammethuhn, Niethuhn, Sammethühnlein, schwarze Wasserstelze, schwarzer Wassertreter, Wasserhuhn, langschnäbliches Wasserhuhn, kleines Wasserhühnchen, Thauschnarre, schwarzer Caspar, grauer Wiesenknarrer, schwarze Kalle, und Aschhuhn. Die Schnabelwurzel ist roth; der Oberleib schwarz mit weißen Querstreifen. Die Länge beträgt 9 Zoll. Dieser Vogel variiert nach Geschlecht und Alter: etwas in der Farbe: denn das Weibchen hat eine weniger lebhafte Farbe und der schmalle rothe kahle Bügel zwischen Schnabel und Augen fehlt. Bey den Jungen sind Bauch und Schenkel rostbraun und der hintere Theil der letztern ist schwarzgrau ohne weiße Querstreifen. Sie nehmen ihren Aufenthalt an den buschreichen Ufern der Flüsse, Seen und Teiche und ziehen einzeln weg. Sie nähren sich von Insekten, Sumpfpflanzen und Saamen. Ihr Nest findet man im Schilf

und Binsen mit 6 bis 8 gelblichen, klar rothbraun gefleckten Eiern.

Rammeln nennet man das Begattungsgeschäft der Haasen, s. Haase.

Rammelzeit ist die Zeit, in welcher die Haasen rammeln, diese fängt, wenn es die Witterung erlaubt, um Lichtmes an, und geschieht den ganzen Sommer durch, so oft eine Häs in gesetzt hat.

Rammer heißt das männliche Geschlecht der Haasen, s. Haase.

Ranzen heißt die Begattungszeit der Raubthiere, mit Ausnahme des Fuchses, bey dem es rollen heißt. Die Zeit das von ist bey jedem Thiere besonders aufgeführt.

Rangzeit ist die Zeit obigen Geschäftes, s. Ranzen.

Raschzeit heißt bey der Jagerey so viel als geschwind im Laufen.

Rauben, den Raub- oder vom Raube fressen, heißt die Nahrung der Raubthiere, und den Genuß derselben.

Raubschütze, Wildschütze, Wilddieb ist überhaupt derjenige, der unbefugter Weise jaget und Wildpret schießt. Besonders nennet man diejenigen so, die ein ardentliches Gewerbe damit

damit treiben, und gewissermaßen davon leben. Diese sollen den Oberlauffischen Statuten zu Folge mit Landesverweisung und Staupenschlag bestraft werden. S. Oberamts-Pat. v. 24. Febr. 1710 und vom 27. März 1666 ingl. v. 23. May 1722 C. A. III. S. 403. 513. u. 517. auch 36. Lauf. Koll. Berl. B II. 539 u. 543. In Chursachsen ist durch das Mandat v. 9. Sept. 1738. S. C. A. I. S. 1492. f. verordnet worden, daß nicht allein die, hieserhalb ergangenen Gesetze besonders das Gen. v. 26. Jus. 1711. fest und unverbrüchlich gehalten werden solle, sondern hiernächst auch anbefohlen worden, daß niemanden ausser der ordentlichen Strafe, Pürsche oder sonst zündende Büchsen in den landesherrlichen Waldungen, Gehölzen, oder Gehreen zu tragen, gestattet, über dieses auch dann ausser Dienst befindlichen Jägerwischen, ingleichen andern, als Vagabunden anzusehenden Personen, weder in den Wildbahnen, noch auf der ordentlichen Strafe Pürschs oder Schießgewehr, heimlich oder öffentlich bey sich zu führen, erlaubt seyn solle, vielmehr dergl. Personen, wo selbige mit Schießgewehr betroffen werden, angehalten, und zu fernerer Untersuchung an das nächste Amt ausgeliefert, auch sodann, befundenen Umständen nach, mit der Strafe des Festungsbaues angesehen, nicht weniger diejenigen Raubschützen, welche entweder auf frischer That betreten, oder sonst von glaubwürdigen Personen behörig

gen Orts angezeigt worden, ohne Verzug in Verhaft genommen, und ebenfalls in das nächste Amt zu fernerm Verfahren ausgeliefert, sodann aber, wenn sie schuldig befunden, zum Festungsbau condemnirt, sowohl diejenigen, welche Wildpretsdiebe wesentlich in ihren Häusern hegen, oder sonst das von ihnen gesällete Wildpret verparthieren helfen, und daran Theil nehmen, wenn sie dessen hinlänglich überführt, gestalteten Sachen nach, mit Gefängniß oder Geldstrafe und nach Befinden mit Festungsbau nachdrücklich angesehen werden sollen. Wenn dergleichen Raubschützen, so entweder auf der wirklichen That, oder auch nur mit Schießgewehr von denen verpflichteten Forstbedienten angetroffen worden, sich gegen diese, wenn sie ihnen das Gewehr abfordern, oder sich ihrer Personen bemächtigen wollen, gewaltsamer Weise zur Wehr setzen, oder aber gar Feuer auf sie geben, so sollen die Churfürstl. Forstbedienten, auf jene ihr Gewehr zu lösen, und ihnen dadurch eine Verwundung bezubringen, folglich Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, oder sie auch allenfalls mit Rettung ihres Lebens gar darnieder zu schießen, ohne Besorgung einiger Verantwortung dieser wegen besorgt seyn. S. Ebd. Dieses Mandat soll jährlich zweymahl öffentlich abgelesen werden. S. Ebd. Uebrigens soll denen Jagd- und Forstbedienten wider die Raubschützen und andere Wildpretsdiebe von der Miliz die erfor-

forderliche Affistenz ohnweigerlich geleistet worden. S. Rescr. v. 29. Octbr. 1729. S. C. A. I. S. 1493. f.

Raubthier nennet man ein jedes vierfüßiges Thier, das sich vorzüglich, oder auch nur zum Theil durch das Fleisch anderer Thiere oder Vögel, ingleichen von Fischen, wie auch mit As nährt. Diese sind in Deutschland der Bär, der Luchs, der Wolf, der Fuchs, der Dachs, der Biber, die Fischotter, die wilde Kage, der Baum- und Steinmarder, der Iltis, das Wiesel, der Igel, der Hamster u. von diesen werden der Bär und der Luchs zur Hohen- der Wolf zur Mittel- und die übrigen zur Niederjagd gerechnet; die Ausnahme die in Rücksicht der Wölfe hier statt findet, s. Jagd. Die Vertilgung der Raubthiere ist allen Jägern vorzüglich zu empfehlen, und eine ihrer vornehmsten Pflichten. Wie sie zu bewirken, ist bey der Beschreibung jedes Raubthieres deutlich beschrieben.

Raubvögel machen unter den Landvögeln die erste Ordnung — *accipitres* — und unterscheiden sich durch den krummen, starken, wenigstens an der scharfen Spitze haakenförmig gebogenen Schnabel und durch die Füße zum Stehen, welche kurz oder mittelmäßig, bis über die Hüften befiedert und gewöhnlich stark sind, mit völligstreyen, unten warzigen Zähnen und großen, gebogenen scharfen Krallen. Wir

theilen sie ein a) in solche die hier zu Lande horsten, diese sind: 1) der Habicht, 2) der Sperber, 3) der Steinadler, der Mausegeyer, 4) alle Arten von Eulen, 5) der Milan, oder Schwalbenschwanz, 6) der Baumfalle, 7) der Mittelgeyer, 8) der Kolkrahe, 9) alle Arten von Krähen, 10) die Dohle, 11) die Eister, von welcher die ersten sieben Sorten krummschnäblich sind, b) in Zugvögel, welches solche sind, die nur auf dem Striche im Frühjahr und Herbst sich in Menge bey uns aufhalten, und nur im Winter einzeln, wenn sie davon übereilt werden, hier bleiben, im Sommer aber gar nicht hier sind, dahin gehören alle Arten von Falken, c) Wasservögel, welche zu Wasser rauben, auch größtentheils im Rohr und Schilf, oder doch in der Nähe der Teiche horsten, als: der gelbe, der schwarze Rohrvoegel, der Fischaar, der Fischreiher, die Rohrdommel, die Spigpumpe, der Laucher. Die Vertilgung derselben ist eben so dringend zu empfehlen, als die der Raubthiere, so wie auch ihre Vertilgungsart bey der Beschreibung jedes derselben genau aufgeführt ist.

Rauch die Fasanen zu locken, und desto besser besammen zu behalten. S. Fasanenrauch.

Rauchschwalbe — *Hirundo rustica* — oder Feuerschwalbe, Bauern- Küchen- Stadt- Haus- Fenster- Leimen- Giebel- Brüche- Stachel-

chel: Stechschwalbe, gewöhnliche, gemeine und innere Hauschwalbe und Schwalbm gehört als besondere Art in die Gattung. Schwalbe oder Tagsschwalbe, und in die erste Familie mit drey Zähnen nach vorne und einer nach hinten. Die Stirn und Kehle sind kastanienbraun; die schwarzen Schwanzfedern aber, die beyden mittelsten ausgenommen, mit einem weißen Fleck bezeichnet. Die Länge beträgt $6\frac{1}{2}$ Zoll. Am Weibchen und an den Jungen sind die Farben heller. Sonst giebt es auch noch: a) die weiße Rauchschwalbe rein weiß oder gelblich weiß; und b) die aschgraue Rauchschwalbe. Sie wählt sich ihren Aufenthalt in Städten und Dörfern und zieht im Herbst Heerdenweise weg. Ihre Nahrung besteht vorzüglich in Fliegen, Mücken, Hasen, Wassermotten &c. Sie macht ihr Nest in Gebäuden auf Brettern, Balken &c. oben, offen und legt 4 bis 6 weiße hellbraun und violett punktirte Eyer.

Rebhuhn oder Feldhuhn — *Perdix* — macht unter den hühnerartigen Vögeln eine eigene Gattung aus, mit kurzem, starkem und gebogenem Schnabel; mit Augen, über welchen keine nackte Haut ist, aber bey vielen dafür kleine warzige Auswüchse sind; die Nasenlöcher sind mit einem hervorstehenden häutigen Rande bedeckt; die Füße unbefiedert und verschieden mit einem Sporn; der Schwanz ist kurz. Sie

halten sich in Feldern auf, nähren sich daher vorzüglich vom Getrayde, Sämereyen andern Pflanzenstoffen, Insekten und Würmern und pflanzen sich paarweise fort. Bey uns halten sich folgende Arten auf: 1) Gemeine Rebhuhn oder Feldhuhn — *Perdix cinerea* Lath. s. *Tetra Perdix* Lin. — auch **Feldhuhn** und **Rebhuhn** schlechtweg, gemeines und graues Rebhuhn, Rabbhuhn, Repphuhn, Ruffhuhn, Wild- und Berghuhn genannt und unterscheidet sich von den übrigen Arten durch folgende Kennzeichen. Unter den Augen ist ein nackter warziger Fleck und der Schwanz ist gelbroth. Das Männchen hat auf der Brust einen großen kastanienbraunen hufeisendähnlichen Fleck und die Flügeldeckfedern sind rothbraun gefleckt. Das Weibchen ist unter der Brust nur mit einigen kastanienbraunen Flecken versehen und die Flügeldeckfedern sind schwarzbraun gefleckt. Es ist ein starker, fleischiger Vogel, von zwölf und einen halben Zoll Länge, wovon der Schwanz drey Zoll wegnimmt, und achtzehn und einen halben Zoll Breite. Das Gewicht ist anderthalb bis zwey Pfund. Der Schnabel ist fast ein Zoll lang, übergekrümmt, scharf, bläulich, ins olivenbraune fallend; der Augenfleck ist rothbraun; die fast zwey Zoll hohen, geschuppten Schienbeine sind bläulich fleischfarben, die Zähne etwas dunkler. Unter den Augen liegt ein hochrother warziger

ziger kahler Streifen, der hinter den Augen ein spitziges Dreieck bildet; die Stirn, mit einem Streifen, der sich von derselben an über die Augen weg bis in den Nacken zieht, und die Kehle sind schön braunroth; über der braunrothen Stirn und dem Augestreifen läuft ein aschgrauer hin bis in den Nacken; der Scheitel ist olivenbraun, mit feinen gelblich weißen einzelnen Längstreifen, die eine schwarze feingeküpfelte Einfassung haben; die Schläfe, der Hinter- und Vorderhals bis zur Hälfte der Brust sind schön aschgrau mit den feinsten schwarzen Wellenlinien, die man nur in der Nähe erkennt; der Hinterhals ist auch etwas rostgelb gemischt; der Rücken hat eine aschgrau und goldgelb gemischte Grundfarbe mit feinen schwarzen Querlinien und einigen stärkern schwarzbrunen; der Streif und die langen obern Deckfedern des Schwanzes, die bis zur Schwanzspitze reichen, haben eben die Farbe, aber einzelne breite kastanienbraune Streifen; auf der Brust steht ein schön kastanienbrauner Fleck (Schild) in Gestalt eines Hufeisens, die Ausbuchtung nach unten zu; die Seiten sind hellaschgrau mit feinen schwarzen Querlinien und einzelnen großen rothbraunen Querbändern; die Mitte des Bauches ist weiß, schwärzlich bespritzt, der After röthlich weiß; die Schenkeledern inwendig röthlich weiß, auswendig rothgrau, schwarzgesprengt und weißgestreift; die Deckfedern der Flügel und die Schulterfedern rostgrau, jede Fe-

der mit einem schönen gelblich-weißen Längstreifen, der eine schwarz gezeichnete Einfassung hat, mit feinen schwarzen Querlinien und einem großen rothbraunen Fleck auf der innern Fahne; die Schwungfedern sichelförmig eingebogen, die vordern dunkelbraun mit rostgelben Querbändern, die hintern eben so, aber noch überdies dunkelbraun bespritzt; die Deckfedern der Unterflügel und die Achselsehern weiß; von den achtzehn Schwanzfedern die sieben äußern braunroth mit rostgelben schwarzbespritzten Spitzen, die vier mittlern wie die Deckfedern des Schwanzes. Das Weibchen ist im Ganzen dunkler als das Männchen; der rostbraune Scheitel hat viele eprunbe weißgelbe Sprenkeln; der Hinterhals und ganze Oberleib bis zu den Deckfedern des Schwanzes ist rostgelb mit großen und kleinen schwarzen und dunkelashbraunen Querstreifen; die Deckfedern der Flügel und die Schulterfedern haben statt der großen rothbraunen Flecken schwarzbraune; das kastanienbraune Hufeisen an der Brust besteht nur aus einzelnen dergleichen Flecken; zuweilen fehlt auch dieses Brustschild ganz; der Wangenfleck unter und hinter den Augen ist auch etwas kleiner, und so wie der Schwanz heller. Wenn man beide Gatten im Frühjahr und Sommer fliegen sieht, so kann man gleich an der hellern Farbe des ausgebreiteten Schwanzes sehen, welches das Weibchen ist. Die Jungen sind vor dem ersten Jahre mit einem dunkelbraunen Schnabel

ver:

sehen, haben grüngelbliche Füße und die männlichen einen gesprengelten Kopf und Oberhals wie die alten Weibchen. Auch die Farbe ist im Ganzen heller. Varietäten: a) Das weiße Rebhuhn. Es ist rein weiß oder grauweiß, welches die grauliche Schattirung der dunkeln Zeichnung macht. b) Das bunte Rebhuhn. Weiße Theile und Flecken. Es giebt auch welche, die gelbroth oder schwarz gefleckt sind. c) Das Rebhuhn mit dem Halsbade. Um den Hals läuft ein weißes Halsband. Da der Körper der Rebhühner so schwer und mit so wenigen und kurzen Federn besetzt ist, so fliegen sie schwer, nicht weit und nicht hoch, obgleich ziemlich schnell. Besser laufen sie mit aufgerichtetem Halse und nickendem Kopfe. Sie sind scheu und der Jäger kommt ihnen gewöhnlich bloß mit dem Hühnerhunde nahe. Das Männchen schreyt laut Girk-läh, das Weibchen aber abgebrochen Gär-l. Dieß ruft damit seine Jungen zusammen und antwortet dem Männchen; jenes aber lockt damit nicht nur dem Weibchen, sondern die ganze Familie und begrüßt den Morgen und die benachbarten Familien damit. Sie sind leicht zu zähmen. Sie lieben die gemäßigten Himmelsstriche in Europa und Asien, halten sich in Feldern auf, und lieben besonders diejenigen Orter, wo Büsche und Feldhölzer in der Nähe sind, in welchen sie sich verbergen. Den Stand, den sich ein Pärchen einmal gewählt hat, verläßt es nicht leicht; wo sie also gehegt werden,

verlassen sie ihren Geburtsort nie. Im Winter verkriechen sie sich dicht zusammen unter dem Schutz des Windes hinter die Feldraine, lassen sich auch wohl einschnüren. Ihre Nahrung besteht im Sommer aus Insecten von mancherley Art, Gsäme, Getraide, vorzüglich Weizen, Gerste, Buchweizen, Hirsen und grünen Grass und Kräuterspitzen, auch von Wacholderbeeren, wenn sie deren in ihrer Nähe haben können. Zu ihrer Verdauung brauchen sie Kiese und zum Bade Staub und Sand. Gezähmt giebt man ihnen Weizen, Gerste, Brod, Semmeln und Kopfkraut. Sobald im März der Schnee weg ist, trennt sich die Familie paarweise. Die Männchen, die noch kein Weibchen haben kämpfen dann oft um eins. Sie leben bis an ihren Tod paarweise zusammen. Das Männchen lockt dann des Abends und Morgens vorzüglich stark und tritt das Weibchen unter mancherley zärtlichen Stellungen, mit Kopfnicken, Flügel und Schwanzausbreiten u. dgl. Wenn das Frühjahr gut ist, und die Vögel schon gepaart und also alte Paare sind, so trifft man schon nach der Mitte des Aprils Eier und zu Ende des Mayes und Anfang des Junius Junge an. Von jungen Vögeln aber später von der Mitte des Junius bis zum Anfange des Julius. Das Nest, welches im Getraide, auf Wiesen, in den Vorhölzern der Waldungen steht und aus nichts als etwas Stroh und Grasshalmen oder Blättern besteht und mit einigen von ihren kleinen Federn ausgelegt ist, enthält 12 bis

22 blaßolivengraue Eyer. Sie sind in drey Wochen ausgebrütet und die röthlichen, wolligen Jungen laufen gleich aus den Eiern davon. Das Männchen bewacht Nest und Junge sorgfältig, stößt sogar mit den Weibchen wie ein Raubvogel auf die Hunde, die sich ihnen nähern. In vierzehn Tagen bis drey Wochen können sie schon eine kleine Strecke fliegen. Sie verbergen sich bey der Warnungsstimme der Eltern gleich unter das Gras oder einen Erdklos. Man findet oft noch im Herbst ganz junge Rebhühner. Diese rühren nicht von einer zweyten Brut, sondern daher, daß die Eyer von der ersten zerstört worden sind. Die jetzige spärliche Vermehrung dieses Federwildes rührt vorzüglich von den häufigen Akebaue her, in welchen sie gern nisten, und in welchem ihre Brut durch das öftere Abmähen zerstört wird. Wenn man die Eyer nimmt und sie einer Haushenne unterlegt, so werden sie leicht ausgebrütet, und man füttert sie anfangs mit Ameiseneiern und dann mit Grise aus Weizen und Gersten und mit Hirsen auf, bis sie Weizen und Gerste fressen können. Durch mit abgeschnittenen Flügeln ausgefetzte Weibchen kann man Gartenbruten bekommen. Man fängt die Familien dann im Herbst ein, speißt was man will, und setzt im Frühjahr die übrigen wieder aus. Sie gewöhnen sich leicht an einen solchen Ort. Von allen Arten von Raubthieren und Raubvögeln, die ihnen nur nahe wohnen, werden sie verfolgt, und

sie sind unter den wilden Thieren flügel gewiß diejenigen, welche die mehresten Feinde haben. Füchse, Raben, Elstern, große und kleine Wiesel, Falken, Weihen, Bussarde, Sperber, Kollkraben, Rabenkrähen und Elstern stellen Alt und Jung nach. Neuerlich findet man längliche weißliche Milben und inwendig Bandwürmer. Man hat folgende Jägerbeobachtungen von ihnen: 1) Um den listigen Fuchs in ihren Nachtlager nicht auf die Spur zu lassen, erheben sie sich allezeit von dem Plage, wo sie am Tage über herausgelaufen und ihr Futter gesucht haben, und stürzen sich fliegend in dasselbe. 2) Der listige Fuchs weiß sich oft am Tage, wenn er auf ihre Spur kommt, unerwartet an sie zu schleichen, und wenn er sie im Eignen verfehlt, so erhascht er sie oft noch im Auf-fliegen. 3) Wenn kaum die Jungen aus dem Ey sind, suchen sie sich, durch einem geheimen Naturtrieb gereizt, vor ihrem Feinden sogleich zu verstecken. Ich traf einmal eine solche Brut an, wie sie eben aus einem Baum herausgekrochen kam. Da ich ihr zu nahe war, so konnten sich die Jungen weiter nicht verbergen, als daß sie in eine tiefe Fahr-gleise hüpfen und da auf- und abließen um einen Nigen zu finden. Um diesen ihren Trieb zu erforschen, nahm ich ein Paar Haselstrauchzweige und legte sie hin; wie ein Blitz waren sie alle darunter, und ich ergriff sie alle funfzehn mit einer Hand.

so

so sehr hatten sie sich brunter und zusammengedrückt. Die Mutter lief unterdessen ängstlich um mich in der Hecke herum, und war ganz außer sich vor Kreutzen, da ich sie ihr wieder gab.

4) Wenn die erwachsenen Jungen am Tage gesprengt sind, so lockt sie des Abends der Vater durch seine oben angegebenen Locktöne alle zusammen, und fliegt dann mit ihnen zu den Weibchen, die ihm durch die ebenfalls oben angegebenen zärtlichen Locktöne seinen Aufenthalt bemerklich gemacht hat. Diese Vögel gehören zur niedern Jagd. Man schießt sie hauptsächlich vor dem vorstehenden oder Hühnerhunde, dann, wenn sie im Treibjagen aufgestöbert werden. Zu ihren gewöhnlichen Fangarten gehört: 1) Das Hochgarn; 2) das Steckgarn; 3) das Treibzeug; 4) das Glockengarn; 5) der Lyras; 6) die Schneehaube. Man schießt nicht nur sondern fängt sie auch 7) mit abgerichteten Falken, 8) in Laufdohnen und 9) in der Steige. Hierzu braucht man ein grünes Bret von der Größe eines mittelmäßigen viereckigen Tischblatts. Dieß wird auf vier Säulchen mit eisernen Spitzen so hoch aufgestellt, daß ein Rebhuhn bequem darunter stehen kann. Im Winter streut man Stroh oben darauf. Ringsherum sind dräthorne Fallthüren, die sich einwärts leicht aufstoßen lassen, auf jeder Seite wenigstens sechs. Diese werden anfangs angebunden, damit die Hühner ungehin-

dert durchlaufen, und die sowohl außerhalb als innerhalb derselben liegenden Körner auffressen können. Wenn dieß etlichemal geschehen ist, so läßt man die Thüren zufallen; die Hühner, die zu den Körnern wollen, stoßen sie von selbst auf, und schließen sich ein. Man fängt wie leicht zu erachten, auf diese Art nicht wie bey dem Glockengarne die ganze Schaar auf einmal. Ihr Wildpret ist zart, wohl-schmeckend und gesund, saftig ohne fett zu seyn. Vom Julius bis zum Winter sind sie am besten. Die Jungen von sechs bis acht Wochen sind vorzüglich delikat. Wenn man sie lebendig fängt, so nimmt man eine von den vordern Schwungfedern und schießt sie ihnen hinter dem Genick in den Kopf. Um zum Verspeisen immer Hühner vorräthig zu haben, hat man gewisse Kästen, die man Rebhühnerkisten nennt. Sie sind zwölf Fuß lang, und sechs Fuß breit, und die Höhe richtet sich nach den mehr oder wenigern Fächern, die man nöthig hat. Diese Fächer werden wie bey einem Bücherschrank und nicht höher gemacht, als daß ein Rebhuhn aufrecht darinne stehen kann. Auf einer oder beyden schmalen Seiten wird ein dräthernes Gitter angebracht. Auf der breiten Seite aber ist in der Mitte eine kleine Thür zum Einsetzen des Futters und Trinkens, und zum beliebigen Ausfangen. Den Boden bestreut man mit Sand, und den ganzen Kasten besetzt man so, daß ihn die freye Luft durch

Ne

Ne

durchstreichen kann. Wenn man Gift gießt, Sie rufen sich im Eins.
 ihnen zumweilen in dieser Gefährlichkeit. 2) Rothb. Reb-
 genschaft einen Kuckuck vor- te loden. 3) Rothb. Reb-
 wies, so nehmen sie vorzüglich hahn, Feldhahn, oder Roth-
 gut zu. Die Eier werden unter hahn, P. rufa, Lacham, u.
 der die kräftigen Sprissen gerechnet. Tetra orulus - Schrei und
 Die Federn kann man in Ka. und Gurgel weiß, von einer
 napes und schlechte Betten sehr schwarz weißpunktierten Linie
 liche Insekten, Henscherl. variiert in der Farbe: denn es
 ten, Nap. und Johann. sieht a) weiß; b) weißbunte
 Käfer u. a. m. In gebirgigen - schwarz weißpunktierten Linien
 Gegenden, wo man fürchten muß, Seitenfedern mit gelbrothen Rän-
 daß im Winter viel Rebhühner dern. Es wählt sich zum Wohn-
 verlohren gehen, fängt man sie ort im südlichen Gegenden -
 im Herbst und den ersten Win- gebirgige, steinige Gegenden in gro-
 tertagen auf eine oder die andere sammelt sich im Herbst in gro-
 oben angegebene Weise im Gae- sen Heerden, seine Nahrung
 ten ein, setzt sie in Schöpfen sind Sämereyen, Gewürme und
 oder besonders dazu eingerichtete Insekten. Das Nest findet man
 Kammern, die man, damit sie zwischen und unter Steinen
 die Köpfe nicht zerstoßen, oben mit 12 bis 18 weißen, rothge-
 mit einer Tuch, oder Gandecke mit 12 bis 18 weißen, rothge-
 überzieht, und füttert sie des sprengten Eiern. Man giebt
 Winters mit Weizen, Gerste ihm auch die Nahrung: Ro-
 und Krautköpfen. Im Frühjahr thes, rothes Europäisches,
 läßt man sie dann wieder im rothsüßiges, Italiänisches,
 Reviere los. So kann man die Welsches, Griechisches,
 ses vorreffliche Wildpret in den Schweiz. Rebhuhn, Pers-
 rauesten Gegenden erhalten. Ihr Berg- und Steinhuhn, Pers-
 Schaden ist nicht beträchtlich, mife.
 und besteht in Aufscharren der
 ausgefäeten und grünen Saat.
 Sie gehen vorzüglich den Wei-
 zen nach. In Weinbergen sol-
 len sie die Weinbeeren lie-
 ben. Ihrenthalben wird sich aber
 gewiß der Landmann nicht be-
 schweren. In der Jägersprache
 drückt man sich also aus: Eine
 Familie heißt eine Kette, Rit-
 te, Volk, Schaar, auch Com-
 pagnie Rebhühner. Sie sal-
 len auf die Weide oder das

Rebhühnerfang ist die Art
 und Weise, die Rebhühner todt
 oder lebendig in seine Gewalt zu
 bekommen. Dieses geschieht: 1)
 durch schießen, wozu ein guter
 vorsehender Hund unentbehr-
 lich ist; dieses geschieht entwe-
 der im Herbst, da die Vögel
 so lange warmes Wetter ist,
 auszuhalten. Auch im Früh-
 wenn sie in Paaren liegen,
 ten sie bey schönen Sonnen

so sehr hatten sie sich brunter und zusammengedrückt. Die Mutter lief unterdessen ängstlich um mich in der Hecke herum, und war ganz außer sich vor Kreutzen, da ich sie ihr wieder gab.

4) Wenn die erwachsenen Jungen am Tage gesprengt sind, so lockt sie des Abends der Vater durch seine oben angegebenen Locktöne alle zusammen, und fliegt dann mit ihnen zu den Weibchen, die ihm durch die ebenfalls oben angegebenen zärtlichen Locktöne seinen Aufenthalt bemerklich gemacht hat. Diese Vögel gehören zur niedern Jagd. Man schießt sie hauptsächlich vor dem vorstehenden oder Hühnerhunde, dann, wenn sie im Treibjagen aufgestöbert werden. Zu ihren gewöhnlichen Fangarten gehört: 1) Das Hochgarn; 2) das Steckgarn; 3) das Treibzeug; 4) das Glockengarn; 5) der Tyras; 6) die Schneehaube. Man schießt nicht nur sondern fängt sie auch 7) mit abgerichteten Falken, 8) in Laufdohnen und 9) in der Steige. Hierzu braucht man ein grüngefärbtes Bret von der Größe eines mittelmäßigen viereckigen Tischblatts. Dieß wird auf vier Säulchen mit eisernen Spitzen so hoch aufgestellt, daß ein Rebhuhn bequem darunter stehen kann. Im Winter streut man Stroh oben darauf. Ringsherum sind dräthorne Fallthüren, die sich einwärts leicht aufstoßen lassen, auf jeder Seite wenigstens sechs. Diese werden anfangs angebunden, damit die Hühner ungehin-

dert durchlaufen, und die sowohl außerhalb als innerhalb derselben liegenden Körner auffressen können. Wenn dieß etlichemal geschehen ist, so läßt man die Thüren zufallen; die Hühner, die zu den Körnern wollen, stoßen sie von selbst auf, und schließen sich ein. Man fängt wie leicht zu erachten, auf diese Art nicht wie bei dem Glockengarne die ganze Schaar auf einmal. Ihr Wildpret ist zart, wohlgeschmeckend und gesund, saftig ohne fett zu seyn. Vom Julius bis zum Winter sind sie am besten. Die Jungen von sechs bis acht Wochen sind vorzüglich delikat. Wenn man sie lebendig fängt, so nimmt man eine von den vordern Schwungfedern und sticht sie ihnen hinter dem Genicke in den Kopf. Um zum Verspeisen immer Hühner vorräthig zu haben, hat man gewisse Kasten, die man Rebhühnerkassen nennt. Sie sind zwölf Fuß lang, und sechs Fuß breit, und die Höhe richtet sich nach den mehr oder wenigern Fächern, die man nöthig hat. Diese Fächer werden wie bey einem Bücherschrank und nicht höher gemacht, als daß ein Rebhuhn aufrecht darinne stehen kann. Auf einer oder beyden schmalen Seiten wird ein dräthernes Gitter angebracht. Auf der breiten Seite aber ist in der Mitte eine kleine Thür zum Einsetzen des Futters und Trinkens, und zum beliebigen Ausfängen. Den Boden bestreut man mit Sand, und den ganzen Kasten besetzt man so, daß ihn die freye Luft durch

durchstreichen kann. Wenn man ihnen zuweilen in dieser Gefangenschaft einen Krautkopf vorwirft, so nehmen sie vorzüglich gut zu. Die Eyer und besonders die Dotter werden unter die kräftigen Speisen gerechnet. Die Federn kann man in Kaminen und schlechte Betten füttern. Sie fressen allerhand schädliche Insekten, Heuschrecken, May- und Johannis-Käfer u. a. m. In gebirgigen Gegenden, wo man fürchten muß, daß im Winter viel Rebhühner verlohren gehen, fängt man sie im Herbst und den ersten Wintertagen auf eine oder die andere oben angegebene Weise im Garten ein, setzt sie in Schöpfen oder besonders dazu eingerichtete Kammern, die man, damit sie die Köpfe nicht zerstoßen, oben mit einer Tuch- oder Garndecke überzieht, und füttert sie des Winters mit Weizen, Gerste und Krautköpfen. Im Frühjahr läßt man sie dann wieder im Reviere los. So kann man dieses vortreffliche Wildpret in den rauhesten Gegenden erhalten. Ihr Schaden ist nicht beträchtlich, und besteht in Aufscharren der ausgesäeten und grünen Saat. Sie gehen vorzüglich den Weizen nach. In Weinbergen sollen sie die Weinbeeren lieben. Ihrenthalben wird sich aber gewiß der Landmann nicht beschweren. In der Jägersprache drückt man sich also aus: Eine Familie heißt eine Kette, Kette, Volk, Schaar, auch Compagnie Rebhühner. Sie fallen auf die Weide oder das

Gedäß. Sie rufen sich. Sie stauben, wenn sie sich im Sande baden. 2) Rothess Rebhuhn, Feldhuhn, oder Rothhuhn, *P. rufa*, Latham, s. *Tetra orufus* — Schnabel und Füße hochroth; Wangen, Kehle und Gurgel weiß, von einer schwarzen weißpunktirten Linie eingeschlossen, 13 Zoll lang. Es variirt in der Farbe: denn es giebt a) weiße — rein oder unrein weiß; b) weißbunte — schmutzig weißröthlich, die Seitenfedern mit gelbrothen Rändern. Es wählt sich zum Wohnort im süblichen Deutschland, gebirgige, steinige Gegenden — sammelt sich im Herbst in großen Heerden, seine Nahrung sind Sämereyen, Gewürme und Insekten. Das Nest findet man zwischen und unter Steinen mit 12 bis 18 weißen, rothgesprengten Eiern. Man giebt ihm auch die Nahmen: Rothess, rothes Europäisches, rothfüßiges, Italiänisches, Welsches, Griechisches, Schweizerisches Rebhuhn, Berg- und Steinhuhn, Permise.

Rebhühnerfang ist die Art und Weise, die Rebhühner tod oder lebendig in seine Gewalt zu bekommen. Dieses geschieht: 1) durch schießen, wozu ein guter vorstehender Hund unentbehrlich ist; dieses geschieht entweder im Herbst, da die Vögel, so lange warmes Wetter ist, gehalten. Auch im Frühjahr wenn sie in Paaren liegen, halten sie bey schönen Sonnenschei-

ne,

so sehr hatten sie sich brunter und zusammengeedrückt. Die Mutter lief unterdessen ängstlich um mich in der Hecke herum, und war ganz außer sich vor Kreuden, da ich sie ihr wieder gab.

4) Wenn die erwachsenen Jungen am Tage gesprengt sind, so lockt sie des Abends der Vater durch seine oben angegebenen Locktöne alle zusammen, und fliegt dann mit ihnen zu den Weibchen, die ihm durch die ebenfalls oben angegebenen zärtlichen Locktöne seinen Aufenthalt bemerktlich gemacht hat. Diese Vögel gehören zur niedern Jagd. Man schießt sie hauptsächlich vor dem vorstehenden oder Hühnerhunde, dann, wenn sie im Treibjagen aufgestöbert werden. Zu ihren gewöhnlichen Fangarten gehört: 1) Das Hochgarn; 2) das Steckgarn; 3) das Treibzeuch; 4) das Glockengarn; 5) der Tyras; 6) die Schneehaube. Man schießt nicht nur sondern fängt sie auch 7) mit abgerichteten Falken, 8) in Laufdohnen und 9) in der Steige. Hierzu braucht man ein grüngelbtes Bret von der Größe eines mittelmäßigen viereckigen Tischblatts. Dieß wird auf vier Säulchen mit eisernen Spizen so hoch aufgestellt, daß ein Rebhuhn bequem darunter stehen kann. Im Winter streut man Stroh oben darauf. Ringsherum sind drätherne Fallthüren, die sich einwärts leicht aufstoßen lassen, auf jeder Seite wenigstens sechs. Diese werden anfangs angebunden, damit die Hühner ungehin-

dert durchlaufen, und die sowohl ausserhalb als innerhalb derselben liegenden Körner auffressen können. Wenn dieß etlichemal geschehen ist, so läßt man die Thüren zusallen; die Hühner, die zu den Körnern wollen, stoßen sie von selbst auf, und schließen sich ein. Man fängt wie leicht zu erachten, auf diese Art nicht wie bei dem Glockengarne die ganze Schaar auf einmal. Ihr Wildpret ist zart, wohl-schmeckend und gesund, saftig ohne fett zu seyn. Vom Julius bis zum Winter sind sie am besten. Die Jungen von sechs bis acht Wochen sind vorzüglich delikats. Wenn man sie lebendig fängt, so nimmt man eine von den vordern Schwungfedern und schießt sie ihnen hinter dem Genick in den Kopf. Um zum Verspeisen immer Hühner vorräthig zu haben, hat man gewisse Kasten, die man Rebhühnerkassen nennt. Sie sind zwölf Fuß lang, und sechs Fuß breit, und die Höhe richtet sich nach den mehr oder wenigern Fächern, die man nöthig hat. Diese Fächer werden wie bey einem Bücherschrank und nicht höher gemacht, als daß ein Rebhuhn aufrecht darinne stehen kann. Auf einer oder beyden schmalen Seiten wird ein dräthernes Gitter angebracht. Auf der breiten Seite aber ist in der Mitte eine kleine Thür zum Einsetzen des Futters und Trinkens, und zum beliebigen Ausfängen. Den Boden bestreut man mit Sand, und den ganzen Kasten besetzt man so, daß ihn die freye Luft durch

durchstreichen kann. Wenn man ihnen zuweilen in dieser Gefangenschaft einen Krautkopf vorwirft, so nehmen sie vorzüglich gut zu: Die Eyer und besonders die Dotter werden unter die kräftigen Speisen gerechnet. Die Federn kann man in Kaminen und schlechte Betten fällen. Sie fressen allerhand schädliche Insekten, Heuschrecken, May- und Johannis-Käfer u. a. m. In gebirgigen Gegenden, wo man fürchten muß, daß im Winter viel Rebhühner verlohren gehen, fängt man sie im Herbst und den ersten Wintertagen auf eine oder die andere oben angegebene Weise im Garten ein, setzt sie in Schöpfen oder besonders dazu eingerichtete Kammern, die man, damit sie die Köpfe nicht zerstoßen, oben mit einer Tuch- oder Garndecke überzieht, und füttert sie des Winters mit Weizen, Gerste und Krautköpfen. Im Frühjahr läßt man sie dann wieder im Reviere los. So kann man dieses vorzügliche Wildpret in den rauhesten Gegenden erhalten. Ihr Schaden ist nicht beträchtlich, und besteht in Aufscharren der ausgesäeten und grünen Saat. Sie gehen vorzüglich den Weizen nach. In Weinbergen sollen sie die Weinbeeren lieben. Threntalben wird sich aber gewiß der Landmann nicht beschweren. In der Jägersprache drückt man sich also aus: Eine Familie heißt eine Kette, Ritze, Volk, Schaar, auch Compagnie Rebhühner. Sie fallen auf die Weide oder das

Geäß. Sie rufen sich. Sie stauben, wenn sie sich im Sande baden. 2) Rothess Rebhuhn, Feldhuhn, oder Rothhuhn, *P. rufa*, Latham, s. *Tetra orufus* — Schnabel und Füße hochroth; Wangen, Kehle und Gurgel weiß, von einer schwarzen weißpunktirten Linie eingeschlossen, 13 Zoll lang. Es variirt in der Farbe: denn es giebt a) weiße — rein oder unrein weiß; b) weißbunte — schmutzig weißröthlich, die Seitenfedern mit gelbrothen Rändern. Es wählt sich zum Wohnort im südlichen Deutschland, gebirgige, steinige Gegenden — sammelt sich im Herbst in großen Heerden, seine Nahrung sind Sämereyen, Gewürme und Insekten. Das Nest findet man zwischen und unter Steinen mit 12 bis 18 weißen, rothgesprengten Eiern. Man giebt ihm auch die Nahmen: Rothess, rothes Europäisches, rothfüßiges, Italiänisches, Welsches, Griechisches, Schweizerisches Rebhuhn, Berg- und Steinhuhn, Permise.

Rebhühnerfang ist die Art und Weise, die Rebhühner tod oder lebendig in seine Gewalt zu bekommen. Dieses geschieht: 1) durch schießen, wozu ein guter vorstehender Hund unentbehrlich ist; dieses geschiehet entweder im Herbst, da die Vögel, so lange warmes Wetter ist, gut aushalten. Auch im Frühjahr wenn sie in Paaren liegen, halten sie bey schönen Sonnenschei-

ne,

ne, vor dem Hunde recht gut aus, man muß sich aber wohl versehen, daß man nicht das ganze Paar auf einen Schuß schieße, denn sie liegen gewöhnlich nahe beysammen. Auch liegen oft einzelne Hähne im Felde, die keine Henne haben, und man thut wohl, dieselben wegzuschießen, weil sie sich sonst gern in ein anderes Revier gewöhnen.

2) Mit dem Hochgarne. 3) Mit Stecknetzen, da man um den Ort, wo sie liegen, besonders wenn es ein kleines Gehölz oder ein noch stehendes Stück Getraide ist, Stecknetze stellt, und sie dann ganz sachte hineinjaget, oder wartet, bis sie des Abends indem sie aufs Feld gehen, in dieselben gerathen. 4) Mit dem Treibezeuge. 5) Mit dem Tyras im Sommer und 6) mit der Schneehaube im Winter, s. alle diese Wörter. 7) Mit dem Stockengarne, auf folgende Weise: Man streuet dahin, wo sich Rebhühner gern aufzuhalten pflegen, gekochten Weizen oder Haas, der um des willen gekocht seyn muß, damit er bey eintretender naßer Bitterung nicht keime, und aufgehe. Geschiehet es auf dem Schnee, so muß man ringsherum in einer Höhe von etwa einerhalben Elle einen schwarzen Faden ziehen, für welchen sich die Krähen und dergl. Vögel, nicht aber die Rebhühner scheuen. Wenn die Rebhühner dieses Futter gut angenommen haben, so stellt man über diesem Platz ein viereckiges Netz, das in der Mitten so viel Busen

hat, daß man es über Mannshoch in die Höhe ziehen kann, während die vier Ecken mit Hasen in einander gesteckt bleiben. Mitten im Netze muß ein eiserner Ring seyn, den man über Mannshoch an einem eisernen Stabe in die Höhe ziehen kann, so daß das Ganze, wegen der auf der Erde angehefteten vier Ecken, die Gestalt einer Glocke bekommt. Auf allen vier Seiten aber bleibt eine so hohe Defnung, daß die Hühner sehr bequem hinein zu dem gestreuten Futter laufen können. Nächst diesem Futter bindet man einen Büschel unausgedroschene Weizenähren an einen Faden an, der oben an dem Ringe fest gemacht wird, daß er an dem Stocke senkrecht herunter hängt. Wenn nun die Rebhühner auch diesen Fraß unter dem Netze vollkommen angenommen haben, so bindet man den Ring oben nicht mehr an, sondern legt ihn so hinauf, daß wenn die Rebhühner die Weizenähren fressen wollen, sie den Faden anziehen, und dadurch veranlassen, daß der Ring am Stabe herunter fähret, und das, mit hinlänglich weiten Spiegeln versehene Netz herabfällt, und die Hühner bedeckt. 8) Mit der Steige. Diese ist ein Kasten von Gatterwerk wie eine Hühnersteige, so hoch, daß ein Rebhuhn bequem darinnen stehen kann, und etwa $1\frac{1}{2}$ Elle ins Gevierte, mit einer breternen Decke, die im Winter mit Stroh bedeckt wird. Die vier Säulen sind unten mit eisernen Stacheln beschlagen, womit man sie in die Erde

Erde klopft, Ringherum sind drätherne Fallthüren, die sich nach ihnen aufstoßen lassen, an jeder Seite wenigstens sechs. Diese werden anfänglich in die Höhe gespreizet, damit die Hühner ungehindert zu dem hineingestreuten Futter kommen können. Wenn sie nun dasselbe angenommen haben, macht man sie zu, damit die Hühner, wenn sie zu dem Futter wollen, sie nach hinten aufstoßen, hinein gehen, und wenn sie einmal darinnen sind, nicht wieder heraus können, sondern gefangen sind. 9) Durch Waizen mit dem Falten oder Habichte, s. Waize.

Rebhühnergarten ist ein kleiner Garten, ohngefähr zehn Schritt ins Gevierte haltend, ohne alle Bäume und Buschwerk, in einer Ecke, aber mit einer Hütte von Brettern versehen, die nur so hoch ist, daß ein Paar Rebhühner bequem darinnen seyn können, auch muß sie mit Fallthüren versehen seyn; der Garten selbst aber von allen Seiten wohl verwahret, auch auf den Wänden mit Dornen belegt seyn, damit keine Kage hinein kann. In diesen Garten thut man im Herbst das alte Paar von einem gefangenen Volke Rebhühner, denen man die Flügel verschneidet, und sie theils im freyen Garten, größtentheils aber in der Hütte füttert, in letztere auch etwas zu Saufen für sie sezet, und sie alle Abende zum Schutz für Raubvögel hineintreibt und solche zumacht, früh aber wieder heraus läßt. Im

Frühjahre, sobald sie anfangen sich zu begatten, ziehet man der Henne die abgestuhten Federn aus, so wird sie bald die gehörige Stärke der Flügel bekommen, um ausfliegen zu können; aber sie wird eben so gewiß auch täglich zu ihrem Hahne herein kommen. Diesem ziehet man die Federn erst zu Anfange des May aus, da denn das Paar im Sommer ihr Fortpflanzungsgeschäft betreiben, und ohnfehlbar mit ihrer ganzen Familie im Herbst in den Garten zurück kommen wird, in welchen man unterdessen allerlei Getraide säen, auch Kraut pflanzen kann, damit sie bey ihrer Zurückkunft Nahrung und Schutz finden. Nach und nach treibt man sie wieder in die Hütte, verschneidet ihnen die Federn und verspeißt die Jungen, verfähet aber mit den Alten auf obige Weise.

Rebhühnerkammer ist eine Kammer, worinnen man Rebhühner aufbewahrt. Sie muß in einiger Entfernung von allen Wänden mit Rahmen besetzt, und diese mit Leinwand bezogen seyn, ein gleiches muß auch unterhalb der Decke statt finden, damit die Hühner sich nicht die Köpfe einstößen. Der Fußboden muß immer eine queere Hand hoch mit Sande bestreuet seyn, in den Ecken aber müssen Hütten von Strohschütten angebracht werden, damit die Hühner sich darinnen verstecken können. In diese Kammer sperrt man die Hühner mit verstuhten Flügeln, und füttert sie mit geringen Waizen,

zen, auch Kraut, Braunkohl u. wobey man ihnen täglich frisches Wasser giebt, es ihnen hauptsächlich aber nie an Sande fehlen lassen darf. Nach und nach verspeist man sie im Winter; denenjenigen aber, die man im Frühjahr wieder ins Freye lassen will, ziehet man vorher die abgestuhten Federn aus, und wenn diese wieder gewachsen sind, setzt man sie aus. Doch muß solches lieber zu spät als zu zeitig, und nicht eher geschehen, bis der Winterstich der Raubvögel vorüber ist, und die meisten wieder fort sind, denn die Hühner haben durch die lange Gefangenschaft von ihrer Geschwindigkeit im Fliegen verloren, und werden also um so eher eine Beute ihrer Feinde.

Rebhühnerkassen ist ein, in mehrere Fächer getheilter, Kasten, worein man die Rebhühner, die man nach und nach verspeisen will, einzeln vertheilet, und sie eben so abwartet, wie in der Rebhühnerkammer. Die Fächer dürfen nicht höher seyn, als daß ein Rebhuhn bequem darin stehen kann.

Recht geben heißt, wenn die Jäger ihren Hunden während der Arbeit mit Liebkosungen zu erkennen geben, daß sie ihre Sache gut gemacht haben, um sie für die Zukunft desto mehr aufzumuntern.

Recht guter Hirsch wird ein jagdbarer Hirsch genannt, wenn er in der Feißezeit vollkommen gut ist.

Regemachen heißt so viel, als das Wildpret aussagen.

Regenpfeiffer — Charadrius — macht in der neunten Ordnung, welche die Sumpfvögel enthält, eine eigene Gattung aus, welche nachstehende Kennzeichen hat: der Schnabel ist rundlich, kurz, spizig und vor der Spitze dicker; die Nasenlöcher sind schmal; und die Füße bloß dreizehig ohne Hinterzehe. Man trifft die meisten dieser Vögel vorzüglich an weiten und rauschenden Stellen der Flüsse, und bey den Mündungen, nur wenige auf Tristen und Riethen an, doch sind an den letztern die meisten einheimischen. Man nennet sie in der Jägersprache Braachvogel; die Lebensart aber schneidet sie von denselben sehr ab, wenn sie schon einander in der Gestalt gleichen, denn sonst würde man auf eine schickliche Art zwey Familien in einer Gattung machen können. Sie lassen zur Regenzeit eine starke pfeiffende Stimme hören. Aus dieser Gattung sind folgende Arten bey uns einheimisch, als: 1) Großer Regenpfeiffer — Charadrius Oedicnemus — auch dickknieiger Regenpfeiffer, Dickfuß, Steinwölzer, dickknieiger Trappe, Steinpardal, Triel, grünschnäblicher Pardal, Gluth, Grünschnäbler, Griel, großer Braachvogel, Eulentopf, Keilhaaken, Polurer und Erdbraacher genannt. Den Nahmen Dick-

Dieß Fuß *Oedicnemus* hat er erhalten, weil man ihn vorzüglich dicke Kniee zuschreibt, welches das Gelenke zwischen Fuß und Schienbein ist. Allein dieß Kennzeichen ist vorzüglich von jungen Vögeln genommen, welche sich noch nicht gemauert haben, und die man häufiger als die Alten antrifft. Denn obgleich diese Vögel wirklich ein stärkeres sogenanntes Knie, als andere langbeinige Sumpfvögel haben; so ist dieß doch bey alten Vögeln eben nicht sehr auffallend, und alle Sumpfvögel haben solche dicke Kniee. Daher bestehen die unterscheidenden Kennzeichen dieser Art in folgenden: Die Kniee sind aufgeschwollen, die Farbe ist lechensgrau, über und unter den Augen befindet sich eine gelblichweiße Querbinde. Das Weibchen ist etwas heller als das Männchen. Die Größe ist wie eine Nebelkrähe; die Länge ein Fuß fünf Zoll, wovon der Schwanz fünf Zoll wegnimmt; die Breite zwey Fuß vier Zoll und die Flügel bedecken zusammengelegt zwey Drittheile des Schwanzes. Das Gewicht ist ein Pfund bis ein Pfund vier Loth. Das Weibchen ist etwas kleiner und leichter. Der Schnabel ist ein und einen halben Zoll lang, gerade, oben etwas gebogen, die breiten Kinnladen fast gleich lang und spizig, nach der Wurzel zu breit; Spitze, Ränder und ein Streifen längs der obern Kante hin schwarz, das übrige grünlichgelb; die Nasenlöcher sind länglich; die Augen

groß, hervorstehend mit hellgelben Augenstern und Augentiefern; ein nackter gelber Kriß umgiebt dieselbe und erstreckt sich bis fast zum Ohre; die Füße sind grüngelblich, die Schienbeine zwey und einen halben Zoll hoch, über den Knieen, welche vorzüglich in der Jugend sehr dick geschwollen sind, einen Zoll hoch nackt, die äußere und mittlere Zehe mehr als die innere durch eine Haut verbunden; die Zehen im Verhältniß der Beine, so wie bey dem großen Trappen kurz, auch so die schwarzen Nägel. Der Kopf ist groß und so wie der ganze Oberleib rostgelb mit schwärzlichen Längsstriichen; Unterhals, Oberbrust und Seiten sind weißgelblich mit schmalen schwarzbraunen Längsstriichen; Kinn, Bauch, After und die untern Deckfedern der Flügel weiß; über den Augen und unter denselben geht eine gelblich weiße Linie bis hinter die Ohren; die Wangen sind ebenfalls weiß; eben so läuft über den großen Deckfedern der Flügel mit dem Rande parallel ein weißliches Querband; die Schwungfedern und die Deckfedern der ersten Art sind schwarz, die erste, sechste bis achte haben eine weiße breite Binde und weiße Spitzen, die übrigen sind nur an dem Ursprunge weißlich; der keilsförmig zugerundete Schwanz hat nach außen rein weiße Federn mit schwarzen Spitzen und in der Mitte einige schwärzliche Quersflecken; die in der Mitte sind bräunlich mit schwärzlichen Längsstriichen, dergleichen gebogenen Quersstriichen

schel: Stechschwalbe, gewöhnliche, gemeine und innere Hauschwalbe und Schwalm gehört als besondere Art in die Gattung Schwalbe oder Lagschwalbe, und in die erste Familie mit drey Zähnen nach vorne und einer nach hinten. Die Stirn und Kehle sind kastanienbraun; die schwarzen Schwanzfedern aber, die beyden mittelsten ausgenommen, mit einem weißen Fleck bezeichnet. Die Länge beträgt $6\frac{1}{2}$ Zoll. Am Weibchen und an den Jungen sind die Farben heller. Sonst giebt es auch noch: a) die weiße Rauchschwalbe rein weiß oder gelblich weiß; und b) die aschgraue Rauchschwalbe. Sie wählt sich ihren Aufenthalt in Städten und Dörfern und zieht im Herbst Heerdenweise weg. Ihre Nahrung besteht vorzüglich in Fliegen, Mücken, Hasen, Wassermotten &c. Sie macht ihr Nest in Gebäuden auf Brettern, Balken &c. oben offen und legt 4 bis 6 weiße hellbraun und violett punktirte Eyer.

Rebhuhn oder Feldhuhn — *Perdix* — macht unter den hühnerartigen Vögeln eine eigene Gattung aus, mit kurzem, starkem und gebogenem Schnabel; mit Augen, über welchen keine nackte Haut ist, aber bey vielen dafür kleine warzige Auswüchse sind; die Nasenlöcher sind mit einem hervorstehenden häutigen Rande bedeckt; die Füße unbefiedert und verschiebene mit einem Sporn; der Schwanz ist kurz. Sie halten sich in Feldern auf, nähren sich daher vorzüglich vom Getrayde, Sämereyen andern Pflanzenstoffen, Insekten und Würmern und pflanzen sich paarweise fort. Bey uns halten sich folgende Arten auf: 1) Gemeine Rebhuhn oder Feldhuhn — *Perdix cinerea* Lath. s. *Tetra Perdix* Lin. — auch **Feldhuhn** und **Rebhuhn** schlechtweg, gemeines und graues Rebhuhn, Rabbhuhn, Repphuhn, Ruffhuhn, Wild- und Berg- huhn genannt und unterscheidet sich von den übrigen Arten durch folgende Kennzeichen. Unter den Augen ist ein nackter warziger Fleck und der Schwanz ist gelbroth. Das Männchen hat auf der Brust einen großen kastanienbraunen hufeisenähnlichen Fleck und die Flügeldeckfedern sind rothbraun gefleckt. Das Weibchen ist unter der Brust nur mit einigen kastanienbraunen Flecken versehen und die Flügeldeckfedern sind schwarzbraun gefleckt. Es ist ein starker, fleischiger Vogel, von zwölf und einen halben Zoll Länge, wovon der Schwanz drey Zoll wegnimmt, und achtzehn und einen halben Zoll Breite. Das Gewicht ist anderthalb bis zwey Pfund. Der Schnabel ist fast ein Zoll lang, übergekrümmt, scharf, bläulich, ins olivenbraune fallend; der Augenstern ist rothbraun; die fast zwey Zoll hohen, geschuppten Schienbeine sind bläulich fleischfarben, die Zähne etwas dunkler. Unter den Augen liegt ein hochrother warziger

ziger kahler Streifen, der hinter den Augen ein spitziges Dreieck bildet; die Stirn, mit einem Streifen, der sich von derselben an über die Augen weg bis in den Nacken zieht, und die Kehle sind schön braunroth; über der braunrothen Stirn und dem Augestreifen läuft ein aschgrauer bin bis in den Nacken; der Scheitel ist olivenbraun, mit feinen gelblich weißen einzelnen Längsstreifen, die eine schwarze feingeküpfelte Einfassung haben; die Schläfe, der Hinter- und Vorderhals bis zur Hälfte der Brust sind schön aschgrau mit den feinsten schwarzen Wellenlinien, die man nur in der Nähe erkennt; der Hinterhals ist auch etwas rostgelb gemischt; der Rücken hat eine aschgrau und goldgelb gemischte Grundfarbe mit feinen schwarzen Querlinien und einigen stärkern schwarzbräunlichen; der Steiß und die langen obern Deckfedern des Schwanzes, die bis zur Schwanzspitze reichen, haben eben die Farbe, aber einzelne breite kastanienbraune Streifen; auf der Brust steht ein schön kastanienbrauner Fleck (Schild) in Gestalt eines Hufeisens, die Ausbuchtung nach unten zu; die Seiten sind hellaschgrau mit feinen schwarzen Querlinien und einzelnen großen rothbraunen Querbändern; die Mitte des Bauches ist weiß, schwärzlich bespritzt, der After röthlich weiß; die Schenkeldecken inwendig röthlich weiß, auswendig rothgrau, schwarzgesprenkt und weißgestreift; die Deckfedern der Flügel und die Schulterfedern rostgrau, jede Fe-

der mit einem schönen gelblichweißen Längsstreifen, der eine schwarz gezeichnete Einfassung hat, mit feinen schwarzen Querlinien und einem großen rothbraunen Fleck auf der innern Fahne; die Schwungfedern sichelförmig eingebogen, die vordern dunkelbraun mit rostgelben Querbändern, die hintern eben so, aber noch überdies dunkelbraun bespritzt; die Deckfedern der Unterflügel und die Achselsfedern weiß; von den achtzehn Schwanzfedern die sieben äußern braunroth mit rostgelben schwarzbespritzten Spitzen, die vier mittlern wie die Deckfedern des Schwanzes. Das Weibchen ist im Ganzen dunkler als das Männchen; der rostbraune Scheitel hat viele eprunbe weißgelbe Sprenkeln; der Hinterhals und ganze Oberleib bis zu den Deckfedern des Schwanzes ist rostgelb mit großen und kleinen schwarzen und dunkelashbraunen Querstreifen; die Deckfedern der Flügel und die Schulterfedern haben statt der großen rothbraunen Flecken schwarzbraune; das kastanienbraune Hufeisen an der Brust besteht nur aus einzelnen dergleichen Flecken; zuweilen fehlt auch dieses Brustschild ganz; der Warzenfleck unter und hinter den Augen ist auch etwas kleiner, und so wie der Schwanz heller. Wenn man beyde Gatten im Frühjahr und Sommer fliegen sieht, so kann man gleich an der hellern Farbe des ausgebreiteten Schwanzes sehen, welches das Weibchen ist. Die Jungen sind vor dem ersten Jahre mit einem dunkelbraunen Schnabel

ver.

sehen, haben grüngelbliche Füße und die männlichen einen gesprengelten Kopf und Oberhals wie die alten Weibchen. Auch die Farbe ist im Ganzen heller. Varietäten: a) Das weiße Rebhuhn. Es ist rein weiß oder grauweiß, welches die grauliche Schattirung der dunkeln Zeichnung macht. b) Das bunte Rebhuhn. Weiße Theile und Flecken. Es giebt auch welche, die gelbroth oder schwarz gefleckt sind. c) Das Rebhuhn mit dem Halsbade. Um den Hals läuft ein weißes Halsband. Da der Körper der Rebhühner so schwer und mit so wenigen und kurzen Federn besetzt ist, so fliegen sie schwer, nicht weit und nicht hoch, obgleich ziemlich schnell. Besser laufen sie mit aufgerichtetem Halse und nickendem Kopfe. Sie sind scheu und der Jäger kommt ihnen gewöhnlich bloß mit dem Hühnerhunde nahe. Das Männchen schreyt laut Gierläh, das Weibchen aber abgebrochen Gär. Dieß ruft damit seine Jungen zusammen und antwortet dem Männchen; jenes aber lockt damit nicht nur dem Weibchen, sondern die ganze Familie und begrüßt den Morgen und die benachbarten Familien damit. Sie sind leicht zu zähmen. Sie lieben die gemäßigten Himmelsstriche in Europa und Asien, halten sich in Feldern auf, und lieben besonders diejenigen Oerter, wo Büsche und Feldhölzer in der Nähe sind, in welchen sie sich verbergen. Den Stand, den sich ein Pärchen einmal gewählt hat, verläßt es nicht leicht; wo sie also gehegt werden,

verlassen sie ihren Geburtsort nie. Im Winter vertriehen sie sich dicht zusammen unter dem Schutze des Windes hinter die Feldraine, lassen sich auch wohl einschnehen. Ihre Nahrung besteht im Sommer aus Insecten von mancherley Art, Gesäme, Getraide, vorzüglich Weizen, Gerste, Buchweizen, Hirsen und grünen Gräsern und Kräuterspitzen, auch von Wacholderbeeren, wenn sie deren in ihrer Nähe haben können. Zu ihrer Verdauung brauchen sie Kiesel und zum Bade Staub und Sand. Gezähmt giebt man ihnen Weizen, Gerste, Brod, Semmeln und Kopfkraut. Sobald im März der Schnee weg ist, trennt sich die Familie paarweise. Die Männchen, die noch kein Weibchen haben kämpfen dann oft um eins. Sie leben bis an ihren Tod paarweise zusammen. Das Männchen lockt dann des Abends und Morgens vorzüglich stark und tritt das Weibchen unter mancherley zärtlichen Stellungen, mit Kopfnicken, Flügel und Schwanzausbreiten u. dgl. Wenn das Frühjahr gut ist, und die Vögel schon gepaart und also alte Paare sind, so trifft man schon nach der Mitte des Aprils Eier und zu Ende des Mayes und Anfang des Junius Junge an. Von jungen Vögeln aber später von der Mitte des Junius bis zum Anfange des Julius. Das Nest, welches im Getraide, auf Wiesen, in den Borshölzern der Waldungen steht und aus nichts als etwas Stroh und Grashalmen oder Blättern besteht und mit einigen von ihren kleinen Federn ausgelegt ist, enthält 12 bis

22 blaßolivengraue Eyer. Sie sind in drey Wochen ausgebrütet und die röthlichen, wolligen Jungen laufen gleich aus den Eiern davon. Das Männchen bewacht Nest und Junge sorgfältig, stößt sogar mit den Weibchen wie ein Raubvogel auf die Hunde, die sich ihnen nähern. In vierzehn Tagen bis drey Wochen können sie schon eine kleine Strecke fliegen. Sie verbergen sich bey der Warnungsstimme der Eltern gleich unter das Gras oder einen Erdklos. Man findet oft noch im Herbst ganz junge Rebhühner. Diese rühren nicht von einer zweyten Brut, sondern daher, daß die Eyer von der ersten zerstört worden sind. Die jetzige spärliche Vermehrung dieses Federwildes rührt vorzüglich von den häufigen Kleebaue her, in welchen sie gern nisten, und in welchem ihre Brut durch das öftere Abmähen zerstört wird. Wenn man die Eyer nimmt und sie einer Haushenne unterlegt, so werden sie leicht ausgebrütet, und man füttert sie anfangs mit Ameiseneiern und dann mit Gerste aus Weizen und Gersten und mit Hirsen auf, bis sie Weizen und Gerste fressen können. Durch mit abgeschnittenen Flügeln ausgefetzte Weibchen kann man Gartenbruten bekommen. Man fängt die Familien dann im Herbst ein, speißt was man will, und setzt im Frühjahr die übrigen wieder aus. Sie gewöhnen sich leicht an einen solchen Ort. Von allen Arten von Raubthieren und Raubvögeln, die ihnen nur nahe wohnen, werden sie verfolgt, und

sie sind unter den wilden Gesüßgel gewiß diejenigen, welche die mehresten Feinde haben. Füchse, Raben, Störche, große und kleine Wiesel, Falken, Weihen, Bussarde, Sperber, Kolkraben, Rabenträben und Elstern stellen Alt und Jung nach. Neuerlich findet man längliche weißliche Milben und inwendig Bandwürmer. Man hat folgende Jägerbeobachtungen von ihnen: 1) Um den listigen Fuchs in ihren Nachtlager nicht auf die Spur zu lassen, erheben sie sich allezeit von dem Plage, wo sie am Tage über heraußgelaufen und ihr Futter gesucht haben, und stürzen sich fliegend in dasselbe. 2) Der listige Fuchs weiß sich oft am Tage, wenn er auf ihre Spur kommt, unerwartet an sie zu schleichen, und wenn er sie im Egen verfehlt, so erhascht er sie oft noch im Auf-fliegen. 3) Wenn kaum die Jungen aus dem Ey sind, suchen sie sich, durch einem geheimen Naturtrieb gereizt, vor ihren Feinden sogleich zu verstecken. Ich traf einmal eine solche Brut an, wie sie eben aus einem Baum herausgekrochen kam. Da ich ihr zu nahe war, so konnten sich die Jungen weiter nicht verbergen, als daß sie in eine tiefe Fahr-gleise hüpfen und da auf- und abfließen um einen Nigen zu finden. Um diesen ihren Trieb zu erforschen, nahm ich ein Paar Haselstrauchzweige und legte sie hin; wie ein Bliß waren sie alle darunter, und ich ergriff sie alle funfzehn mit einer Hand.

so

so sehr hatten sie sich brunter und zusammengebrückt. Die Mutter lief unterdessen ängstlich um mich in der Hecke herum, und war ganz außer sich vor Freuden, da ich sie ihr wieder gab.

4) Wenn die erwachsenen Jungen am Tage gesprengt sind, so lockt sie des Abends der Vater durch seine oben angegebenen Locktöne alle zusammen, und fliegt dann mit ihnen zu den Weibchen, die ihm durch die ebenfalls oben angegebenen zärtlichen Locktöne seinen Aufenthalt bemerklich gemacht hat. Diese Vögel gehören zur niedern Jagd. Man schießt sie hauptsächlich vor dem vorstehenden oder Hühnerhunde, dann, wenn sie im Treibjagen aufgestöbert werden. Zu ihren gewöhnlichen Fangarten gehört: 1) Das Hochgarn; 2) das Steckgarn; 3) das Treibzeuch; 4) das Glockengarn; 5) der Tyras; 6) die Schneehaube. Man schießt nicht nur sondern fängt sie auch 7) mit abgerichteten Falken, 8) in Laufdohnen und 9) in der Steige. Hierzu braucht man ein grüngelbtes Bret von der Größe eines mittelmäßigen viereckigen Tischblatts. Dieß wird auf vier Säulchen mit eisernen Spizen so hoch aufgestellt, daß ein Rebhuhn bequem darunter stehen kann. Im Winter streut man Stroh oben darauf. Ringsherum sind drätherne Fallthüren, die sich einwärts leicht aufstoßen lassen, auf jeder Seite wenigstens sechs. Diese werden anfangs angebunden, damit die Hühner ungehin-

dert durchlaufen, und die sowohl außerhalb als innerhalb derselben liegenden Körner auffressen können. Wenn dieß etlichemal geschehen ist, so läßt man die Thüren zufallen; die Hühner, die zu den Körnern wollen, stoßen sie von selbst auf, und schließen sich ein. Man fängt wie leicht zu erachten, auf diese Art nicht wie bey dem Glockengarne die ganze Schaar auf einmal. Ihr Wildpret ist zart, wohl-schmeckend und gesund, saftig ohne fett zu seyn. Vom Julius bis zum Winter sind sie am besten. Die Jungen von sechs bis acht Wochen sind vorzüglich delikate. Wenn man sie lebendig fängt, so nimmt man eine von den vordern Schwungfedern und schießt sie ihnen hinter dem Genicke in den Kopf. Um zum Verspeisen immer Hühner vorräthig zu haben, hat man gewisse Kästen, die man Rebhühnerkisten nennt. Sie sind zwölf Fuß lang, und sechs Fuß breit, und die Höhe richtet sich nach den mehr oder wenigern Fächern, die man nöthig hat. Diese Fächer werden wie bey einem Bücherschrank und nicht höher gemacht, als daß ein Rebhuhn aufrecht darinne stehen kann. Auf einer oder beyden schmalen Seiten wird ein dräthernes Gitter angebracht. Auf der breiten Seite aber ist in der Mitte eine kleine Thür zum Einsetzen des Futters und Trinkens, und zum beliebigen Ausfangen. Den Boden bestreut man mit Sand, und den ganzen Kasten besetzt man so, daß ihn die freye Luft durch

durchstreichen kann. Wenn man ihnen zuweilen in dieser Gefangenschaft einen Krautkopf vorwirft, so nehmen sie vorzüglich gut zu. Die Eyer und besonders die Dotter werden unter die kräftigen Speisen gerechnet. Die Federn kann man in Kaminen und schlechte Betten fällen. Sie fressen allerhand schädliche Insekten, Heuschrecken, May- und Johannis-Eäfer u. a. m. In gebirgigen Gegenden, wo man fürchten muß, daß im Winter viel Rebhühner verlohren gehen, fängt man sie im Herbst und den ersten Wintertagen auf eine oder die andere oben angegebene Weise im Garten ein, setzt sie in Schöpfen oder besonders dazu eingerichtete Kammern, die man, damit sie die Köpfe nicht zerstoßen, oben mit einer Tuch- oder Garndecke überzieht, und füttert sie des Winters mit Weizen, Gerste und Krautköpfen. Im Frühjahr läßt man sie dann wieder im Reviere los. So kann man dieses vortreffliche Wildpret in den rauhesten Gegenden erhalten. Ihr Schaden ist nicht beträchtlich, und besteht in Aufscharren der ausgesäeten und grünen Saat. Sie gehen vorzüglich den Weizen nach. In Weinbergen sollen sie die Weinbeeren lieben. Ihrenthalben wird sich aber gewiß der Landmann nicht beschweren. In der Jägersprache drückt man sich also aus: Eine Familie heißt eine Kette, Ritte, Volk, Schaar, auch Compagnie Rebhühner. Sie fallen auf die Weide oder das

Geäß. Sie rufen sich. Sie stauben, wenn sie sich im Sande baden. 2) Rothess Rebhuhn, Feldhuhn, oder Rothhuhn, *P. rufa*, Latham, s. *Tetra orufus* — Schnabel und Füße hochroth; Wangen, Kehle und Gurgel weiß, von einer schwarzen weißpunktirten Linie eingeschlossen, 13 Zoll lang. Es variirt in der Farbe: denn es giebt a) weiße — rein oder unrein weiß; b) weißbunte — schmutzig weißröthlich, die Seitenfedern mit gelbrothen Rändern. Es wählt sich zum Wohnort im südlichen Deutschland, gebirgige, steinige Gegenden — sammelt sich im Herbst in großen Heerden, seine Nahrung sind Sämereyen, Gewürme und Insekten. Das Nest findet man zwischen und unter Steinen mit 12 bis 18 weißen, rothgesprengten Eiern. Man giebt ihm auch die Nahmen: Rothess, rothes Europäisches, rothfüßiges, Italiänisches, Welsches, Griechisches, Schweizerisches Rebhuhn, Berg- und Steinhuhn, Permise.

Rebhühnerfang ist die Art und Weise, die Rebhühner tod oder lebendig in seine Gewalt zu bekommen. Dieses geschieht: 1) durch schießen, wozu ein guter vorstehender Hund unentbehrlich ist; dieses geschieht entweder im Herbst, da die Vögel, so lange warmes Wetter ist, gut aushalten. Auch im Frühjahr wenn sie in Paaren liegen, halten sie bey schönen Sonnenschei-

ne;

ne, vor dem Hunde recht gut aus, man muß sich aber wohl vorsehen, daß man nicht das ganze Paar auf einen Schuß schieße, denn sie liegen gewöhnlich nahe beisammen. Auch liegen oft einzelne Hähne im Felde, die keine Henne haben, und man thut wohl, dieselben wegzuschießen, weil sie sich sonst gern in ein anderes Revier gewöhnen.

2) Mit dem Hochgarne. 3) Mit Stecknetzen, da man um den Ort, wo sie liegen, besonders wenn es ein kleines Gehölz oder ein noch stehendes Stück Getraide ist, Stecknetze stellt, und sie dann ganz sachte hineinjaget, oder wartet, bis sie des Abends indem sie aufs Feld gehen, in dieselben gerathen. 4) Mit dem Treibezeuge. 5) Mit dem Tyras im Sommer und 6) mit der Schneehaube im Winter, s. alle diese Wörter. 7) Mit dem Glockengarne, auf folgende Weise: Man streuet dahin, wo sich Rebhühner gern aufzuhalten pflegen, gekochten Waizen oder Hanf, der um des willen gekocht, seyn muß, damit er bey eintretender naßer Witterung nicht keime, und aufgehe. Geschiehet es auf dem Schnee, so muß man ringsherum in einer Höhe von etwa einerhalben Elle einen schwarzen Faden ziehen, für welchen sich die Krähen und dergl. Vögel, nicht aber die Rebhühner scheuen. Wenn die Rebhühner dieses Futter gut angenommen haben, so stellt man über diesem Platz ein viereckiges Netz, das in der Mitten so viel Busen

hat, daß man es über Mannshoch in die Höhe ziehen kann, während die vier Ecken mit Haken in einander gesteckt bleiben. Mitten im Netze muß ein eiserner Ring seyn, den man über Mannshoch an einem eisernen Stabe in die Höhe ziehen kann, so daß das Ganze, wegen der auf der Erde angehefteten vier Ecken, die Gestalt einer Glocke bekommt. Auf allen vier Seiten aber bleibt eine so hohe Oefnung, daß die Hühner sehr bequem hinein zu dem gestreuten Futter laufen können. Nächst diesem Futter bindet man einen Büschel unausgedroschene Weizenähren an einen Faden an, der oben an dem Ringe fest gemacht wird, daß er an dem Stocke senkrecht herunter hängt. Wenn nun die Rebhühner auch diesen Fraß unter dem Netze vollkommen angenommen haben, so bindet man den Ring oben nicht mehr an, sondern legt ihn so hinauf, daß wenn die Rebhühner die Weizenähren fressen wollen, sie den Faden anziehen, und dadurch veranlassen, daß der Ring am Stabe herunter fährt, und das, mit hinlänglich weiten Spiegeln versehene Netz herabfällt, und die Hühner bedeckt. 8) Mit der Steige. Diese ist ein Kasten von Gatterwerk wie eine Hühnersteige, so hoch, daß ein Rebhuhn bequem darinnen stehen kann, und etwa $1\frac{1}{2}$ Elle ins Gevierte, mit einer breternen Decke, die im Winter mit Stroh bedeckt wird. Die vier Säulen sind unten mit eisernen Stacheln beschlagen, womit man sie in die Erde

Erde klopset. Ringsherum sind drätherne Fallthüren, die sich nach ihnen aufstoßen lassen, an jeder Seite wenigstens sechs. Diese werden anfänglich in die Höhe gespreizet, damit die Hühner ungehindert zu dem hineingestreuten Futter kommen können. Wenn sie nun dasselbe angenommen haben, macht man sie zu, damit die Hühner, wenn sie zu dem Futter wollen, sie nach hinten aufstoßen, hinein gehen, und wenn sie einmal darinnen sind, nicht wieder heraus können, sondern gefangen sind.

9) Durch Waizen mit dem Falten oder Habichte, s. Waize.

Rebhühnergarten ist ein kleiner Garten, ohngefähr zehn Schritt ins Gevierte haltend, ohne alle Bäume und Buschwerk, in einer Ecke, aber mit einer Hütte von Brettern versehen, die nur so hoch ist, daß ein Paar Rebhühner bequem darinnen seyn können, auch muß sie mit Fallthüren versehen seyn; der Garten selbst aber von allen Seiten wohl verwahret, auch auf den Wänden mit Dornen belegt seyn, damit keine Kage hinein kann. In diesen Garten thut man im Herbst das alte Paar von einem gefangenen Volke Rebhühner, denen man die Flügel verschneidet, und sie theils im freyen Garten, größtentheils aber in der Hütte füttert, in letztere auch etwas zu Saufen für sie sezet, und sie alle Abende zum Schutz für Raubvögel hineintreibt und solche zumacht, früh aber wieder heraus läßt. Im

Frühjahre, sobald sie anfangen sich zu begatten, ziehet man der Henne die abgestuhten Federn aus, so wird sie bald die gehörige Stärke der Flügel bekommen, um ausfliegen zu können; aber sie wird eben so gewiß auch täglich zu ihrem Hahne herein kommen. Diesem ziehet man die Federn erst zu Anfange des May aus, da denn das Paar im Sommer ihr Fortpflanzungsgeschäft betreiben, und ohnfehlbar mit ihrer ganzen Familie im Herbst in den Garten zurück kommen wird, in welchen man unterdessen allerlei Getraide säen, auch Kraut pflanzen kann, damit sie bey ihrer Zurückkunft Nahrung und Schutz finden. Nach und nach treibt man sie wieder in die Hütte, verschneidet ihnen die Federn und verspeißt die Jungen, verföhret aber mit den Alten auf obige Weise.

Rebhühnerkammer ist eine Kammer, worinnen man Rebhühner aufbewahret. Sie muß in einiger Entfernung von allen Wänden mit Rahmen besetzt, und diese mit Leinwand bezogen seyn, ein gleiches muß auch unterhalb der Decke statt finden, damit die Hühner sich nicht die Köpfe einstößen. Der Fußboden muß immer eine queere Hand hoch mit Sande bestreuet seyn, in den Ecken aber müssen Hütten von Strohschütten angebracht werden, damit die Hühner sich darinnen verstecken können. In diese Kammer sperrt man die Hühner mit verstuhten Flügeln, und füttert sie mit geringen Waizen,

ne, vor dem Hunde recht gut aus, man muß sich aber wohl versehen, daß man nicht das ganze Paar auf einen Schuß schieße, denn sie liegen gewöhnlich nahe beysammen. Auch liegen oft einzelne Hähne im Felde, die keine Henne haben, und man thut wohl, dieselben wegzuschießen, weil sie sich sonst gern in ein anderes Revier gewöhnen.

2) Mit dem Hochgarne. 3) Mit Stecknehen, da man um den Ort, wo sie liegen, besonders wenn es ein kleines Gehölz oder ein noch stehendes Stück Getraide ist, Stecknehe stellt, und sie dann ganz sachte hineinjaget, oder wartet, bis sie des Abends indem sie aufs Feld gehen, in dieselben gerathen. 4) Mit dem Treibezeuge. 5) Mit dem Tyras im Sommer und 6) mit der Schneehaube im Winter, s. alle diese Wörter. 7) Mit dem Stockengarne, auf folgende Weise: Man streuet dahin, wo sich Rebhühner gern aufzuhalten pflegen, gekochten Waizen oder Hauf, der um des willen gekocht, seyn muß, damit er bey eintretender nasser Bitterung nicht keime, und aufgehe. Geschiehet es auf dem Schnee, so muß man ringsherum in einer Höhe von etwa einerhalben Elle einen schwarzen Faden ziehen, für welchen sich die Krähen und dergl. Vögel, nicht aber die Rebhühner scheuen. Wenn die Rebhühner dieses Futter gut angenommen haben, so stellt man über diesem Platz ein viereckiges Netz, das in der Mitten so viel Busen

hat, daß man es über Mannshoch in die Höhe ziehen kann, während die vier Ecken mit Haken in einander gesteckt bleiben. Mitten im Netze muß ein eiserner Ring seyn, den man über Mannshoch an einem eisernen Stabe in die Höhe ziehen kann, so daß das Ganze, wegen der auf der Erde angehefteten vier Ecken, die Gestalt einer Glocke bekommt. Auf allen vier Seiten aber bleibt eine so hohe Oefnung, daß die Hühner sehr bequem hinein zu dem gestreuten Futter laufen können. Nächst diesem Futter bindet man einen Büschel unausgedroschene Weizenähren an einen Faden an, der oben an dem Ringe fest gemacht wird, daß er an dem Stocke senkrecht herunter hängt. Wenn nun die Rebhühner auch diesen Fraß unter dem Netze vollkommen angenommen haben, so bindet man den Ring oben nicht mehr an, sondern legt ihn so hinauf, daß wenn die Rebhühner die Weizenähren fressen wollen, sie den Faden anziehen, und dadurch veranlassen, daß der Ring am Stabe herunter fährt, und das, mit hinlänglich weiten Spiegeln versehene Netz herabfällt, und die Hühner bedeckt. 8) Mit der Steige. Diese ist ein Kasten von Gatterwerk wie eine Hühnersteige, so hoch, daß ein Rebhuhn bequem darinnen stehen kann, und etwa $1\frac{1}{2}$ Elle ins Gevierte, mit einer breternen Decke, die im Winter mit Stroh bedeckt wird. Die vier Säulen sind unten mit eisernen Stacheln beschlagen, womit man sie in die Erde

Erde klopset. Ringsherum sind drätherne Fallthüren, die sich nach ihnen aufstoßen lassen, an jeder Seite wenigstens sechs. Diese werden anfänglich in die Höhe gespreizet, damit die Hühner ungehindert zu dem hineingestreuten Futter kommen können. Wenn sie nun dasselbe angenommen haben, macht man sie zu, damit die Hühner, wenn sie zu dem Futter wollen, sie nach hinten aufstoßen, hinein gehen, und wenn sie einmal darinnen sind, nicht wieder heraus können, sondern gefangen sind. 9) Durch Waizen mit dem Falten oder Habichte, s. Waize.

Rebhühnergarten ist ein kleiner Garten, ohngefähr zehn Schritt ins Gevierte haltend, ohne alle Bäume und Buschwerk, in einer Ecke, aber mit einer Hütte von Brettern versehen, die nur so hoch ist, daß ein Paar Rebhühner bequem darinnen seyn können, auch muß sie mit Fallthüren versehen seyn; der Garten selbst aber von allen Seiten wohl verwahret, auch auf den Wänden mit Dornen belegt seyn, damit keine Rahe hinein kann. In diesen Garten thut man im Herbst das alte Paar von einem gefangenen Volke Rebhühner, denen man die Flügel verschneidet, und sie theils im freyen Garten, größtentheils aber in der Hütte füttert, in letztere auch etwas zu Saufen für sie sezet, und sie alle Abende zum Schutz für Raubvögel hineintreibt und solche zumacht, früh aber wieder heraus läßt. Im

Frühjahre, sobald sie anfangen sich zu begatten, ziehet man der Henne die abgestuhten Federn aus, so wird sie bald die gehörige Stärke der Flügel bekommen, um ausfliegen zu können; aber sie wird eben so gewiß auch täglich zu ihrem Hahne herein kommen. Diesem ziehet man die Federn erst zu Anfange des May aus, da denn das Paar im Sommer ihr Fortpflanzungsgeschäft betreiben, und ohnfehlbar mit ihrer ganzen Familie im Herbst in den Garten zurück kommen wird, in welchen man unterdessen allerlei Getraide säen, auch Kraut pflanzen kann, damit sie bey ihrer Zurückkunft Nahrung und Schutz finden. Nach und nach treibt man sie wieder in die Hütte, verschneidet ihnen die Federn und verspeißt die Jungen, verfähret aber mit den Alten auf obige Weise.

Rebhühnerkammer ist eine Kammer, worinnen man Rebhühner aufbewahrt. Sie muß in einiger Entfernung von allen Wänden mit Rahmen besetzt, und diese mit Leinwand bezogen seyn, ein gleiches muß auch unterhalb der Decke statt finden, damit die Hühner sich nicht die Köpfe einstößen. Der Fußboden muß immer eine queere Hand hoch mit Sande bestreuet seyn, in den Ecken aber müssen Hütten von Strohschütten angebracht werden, damit die Hühner sich darinnen verstecken können. In diese Kammer sperrt man die Hühner mit verstuhten Flügeln, und füttert sie mit geringen Waizen,

gen, auch Kraut, Braunkohl u. wobey man ihnen täglich frisches Wasser giebt, es ihnen hauptsächlich aber nie an Sande fehlen lassen darf. Nach und nach verspeist man sie im Winter; denenjenigen aber, die man im Frühjahr wieder ins Freye lassen will, ziehet man vorher die abgestuhten Federn aus, und wenn diese wieder gewachsen sind, setzt man sie aus. Doch muß solches lieber zu spät als zu zeitig, und nicht eher geschehen, bis der Winterstreich der Raubvögel vorüber ist, und die meisten wieder fort sind, denn die Hühner haben durch die lange Gefangenschaft von ihrer Geschwindigkeit im Fliegen verlohren, und werden also um so eher eine Beute ihrer Feinde.

Rebhühnerkasten ist ein, in mehrere Fache getheilter, Kasten, worein man die Rebhühner, die man nach und nach verspeisen will, einzeln vertheilet, und sie eben so abwartet, wie in der Rebhühnerkammer. Die Fächer dürfen nicht höher seyn, als daß ein Rebhuhn bequem darin sitzen kann.

Recht geben heißt, wenn die Jäger ihren Hunden während der Arbeit mit Liebkosungen zu erkennen geben, daß sie ihre Sache gut gemacht haben, um sie für die Zukunft desto mehr aufzumuntern.

Recht guter Hirsch wird ein jagdbarer Hirsch genannt, wenn er in der Feißezeit vollkommen gut ist.

Regemachen heißt so viel, als das Wildpret aufjagen.

Regenpfeiffer — Charadrius — macht in der neunten Ordnung, welche die Sumpfvögel enthält, eine eigene Gattung aus, welche nachstehende Kennzeichen hat: der Schnabel ist rundlich, kurz, spizig und vor der Spitze dicker; die Nasenlöcher sind schmal, und die Füße bloß dreyzehig ohne Hinterzehe. Man trifft die meisten dieser Vögel vorzüglich an weiten und rauschenden Stellen der Flüsse, und bey den Mündungen, nur wenige auf Triften und Riethen an, doch sind an den letztern die meisten einheimischen. Man nennet sie in der Jägersprache Braachvögel; die Lebensart aber schneidet sie von denselben sehr ab, wenn sie schon einander in der Gestalt gleichen, denn sonst würde man auf eine schädliche Art zwey Familien in einer Gattung machen können. Sie lassen zur Regenzeit eine starke pfeiffende Stimme hören. Aus dieser Gattung sind folgende Arten bey uns einheimisch, als: 1) Großer Regenpfeiffer — Charadrius Oedicnemus — auch dickknieiger Regenpfeiffer, Dickfuß, Steinwölzer, dickknieiger Trappe, Steinpardal, Triel, grünschnäblicher Pardal, Gluth, Grünschnäbler, Griel, großer Braachvogel, Eulenkopf, Keilhaaken, Polurer und Erdbraacher genannt. Den Rahmen Dick-

Dickfuß *Oedicnemus* hat er erhalten, weil man ihn vorzüglich dicke Kniee zuschreibt, welches das Gelenke zwischen Fuß und Schienbein ist. Allein dieß Kennzeichen ist vorzüglich von jungen Vögeln genommen, welche sich noch nicht gemauert haben, und die man häufiger als die Alten antrifft. Denn obgleich diese Vögel wirklich ein stärkeres sogenanntes Knie, als andere langbeinige Sumpfvögel haben; so ist dieß doch bey alten Vögeln eben nicht sehr auffallend, und alle Sumpfvögel haben solche dicke Kniee. Daher bestehen die unterscheidenden Kennzeichen dieser Art in folgenden: Die Kniee sind aufgeschwollen, die Farbe ist lerchengrau, über und unter den Augen befindet sich eine gelblichweiße Querbinde. Das Weibchen ist etwas heller als das Männchen. Die Größe ist wie eine Nebelkrähe; die Länge ein Fuß fünf Zoll, wovon der Schwanz fünf Zoll wegnimmt; die Breite zwey Fuß vier Zoll und die Flügel bedecken zusammengelegt zwey Drittheile des Schwanzes. Das Gewicht ist ein Pfund bis ein Pfund vier Loth. Das Weibchen ist etwas kleiner und leichter. Der Schnabel ist ein und einen halben Zoll lang, gerade, oben etwas gebogen, die breiten Kinnladen fast gleich lang und spizig, nach der Wurzel zu breit; Spitze, Ränder und ein Streifen längs der obern Kante hin schwarz, das übrige grünlichgelb; die Nasenlöcher sind länglich; die Augen

groß, hervorstehend mit hellgelben Augenstern und Augentriebem; ein nackter gelber Kreis umgiebt dieselbe und erstreckt sich bis fast zum Ohre; die Füße sind grüngelblich, die Schienbeine zwey und einen halben Zoll hoch, über den Knieen, welche vorzüglich in der Jugend sehr dick geschwollen sind, einen Zoll hoch nackt, die äußere und mittlere Zehe mehr als die innere durch eine Haut verbunden; die Zehen im Verhältniß der Beine, so wie bey dem großen Trappen kurz, auch so die schwarzen Nägel. Der Kopf ist groß und so wie der ganze Oberleib rostgelb mit schwärzlichen Längsstrichen; Unterhals, Oberbrust und Seiten sind weißgelblich mit schmalen schwarzbraunen Längsstrichen; Kinn, Bauch, After und die untern Deckfedern der Flügel weiß; über den Augen und unter denselben geht eine gelblich weiße Linie bis hinter die Ohren; die Wangen sind ebenfalls weiß; eben so läuft über den großen Deckfedern der Flügel mit dem Rande parallel ein weißliches Querband; die Schwungfedern und die Deckfedern der ersten Art sind schwarz, die erste, sechste bis achte haben eine weiße breite Binde und weiße Spitzen, die übrigen sind nur an dem Ursprunge weißlich; der keilsförmig zugerundete Schwanz hat nach außen rein weiße Federn mit schwarzen Spitzen und in der Mitte einige schwärzliche Quersflecken; die in der Mitte sind bräunlich mit schwärzlichen Längsstrichen, dergleichen gebogenen Quersstreifen

und großen schwarzen Spitzen. Das Weibchen ist etwas kleiner, und im Ganzen heller, und die Streifen sind dunkelbraun. An den Jungen bemerkt man im ersten Jahre die kahle Augenhaut nicht so genau, und sie sind von so heller Grundfarbe, wie die Weibchen. In seinen Sitten und seiner Lebensart hält dieser Vogel das Mittel zwischen einem Trappen und einem Regenpfeifer. Er hält sich am Tage sehr versteckt, ist furchtsam und scheu, so daß er dem Jäger einige hundert Schritte weit entflieht. Man hört ihn am Tage, noch mehr aber des Nachts, wo er vorzüglich in Bewegung ist, sein lautes Gluth, das klagend klingt, indem er es eine Tergie in die Höhe fortzieht, schreyen. Sonst giebt er auch noch zur Falzzeit einen pfeisenden Ton von sich. Bey Veränderungen des Wetters läßt er sich vorzüglich hören. Man bemerkt auch alsdann, daß er sehr unruhig ist, und schnell, bald da bald dorthin, fliegt, indem man ihn jetzt an dieser, und einige Augenblicke darauf, an einer andern Stelle schreyen hört. Man trifft diesen Vogel in Europa, Asien und Afrika an, doch geht er nicht weit gegen Norden, und ist auch in den mittleren Gegenden von Europa nicht häufig. Er hält sich in unfruchtbaren Gegenden mehr an Anhöhen als in Tiefen auf. Vorzüglich gern ist er auf Schaftriften. Er geht im October weg, und kommt zu Anfange des Aprils wieder. Seine Wanderungen geschehen in kleinen Flä-

gen, wo sich einige Familien zusammenschlagen. Seine Nahrung besteht in Insekten, Würmern, jungen Fröschen, Schnecken, Heuschrecken, Maulwurfsgrillen, Regenwürmern, Getreidekörnern, grüner Saat und andern Pflanzenstoffen. Man sagt: daß man ihn in Aegypten und Palästina in Käfigen halte, seines Geschreyes und Mäusesanges halber. Bey uns nimmt er mit Brod, Fleisch und allerley Gemüse vorlieb. Bey uns ist die Falzzeit im May, und im Junius scharrt das Weibchen eine Vertiefung in die Erde oder legt ihre zwey bis drey aschgraulichweißen, olivenbraun gefleckten und gestrichelten Eyer zwischen die Vertiefung einiger Steine. Sie werden drey Wochen bebrütet. Sobald die Jungen ausgetrocknet sind, laufen sie mit der Mutter davon, und sind lange Zeit mit wollenartigen gelblichweißen Federn bekleidet, daß sie wie junge Eulen aussehen. Sie werden nicht bald flügge, denn man trifft noch zu Anfange des Octobers Junge an, die nicht recht fliegen können. Das Männchen begleitet das Weibchen allenthalben. Auf Malta sollen sie des Jahres zweymal brüten, das eine Mal im Frühjahr, das andere Mal im August. Seine Feinde hat er mit den Rebhühnern gemein. 2) Goldregenspfeiffer s. oben. 3) Regenpfeiffer mit dem Halsbande — Char. Hiatula — oder Strandpfeiffer, Griefläufer, Seelerche, Uferlerche, sprenglicher Grillvogel, Sandläu-

läufer, Sandvogel, Seemornell, Ostvogel, Brachvogel, Brachhuhn, kleiner Strandläufer, Koppengerlein, Kobelrogerlein, Sandrogerlein, Grieshuhn, Grieshennel, Lullfuß und Lullh von seinem Geschrey. Die Kennzeichen der Art sind: Stirn, Kehle und ein mit dieser zusammenhängendes Halsband sind weiß; die Oberbrust und ein Band hinter der Stirn schwarz; die Schnabelwurzel und Füße gelb. An Größe übertrifft dieser Vogel die Feldlerche, und gleicht ohngesähr der Rothdrossel, ist sieben und einen halben Zoll lang, wovon der Schwanz über zwey Zoll wegnimmt, vierzehn und einen Drittel Zoll breit, und die gefalteten Flügel reichen fast an die Schwanzspitze. Das Gewicht ist vier Unzen. Der Schnabel ist acht Linien lang, gerade, an der Spitze etwas dicker, von der Wurzel bis zur Mitte orangegelb, von da an bis zur Spitze schwarz; die Nasenlöcher linienförmig; der Augenstern nussbraun; die geschilderten Schlenkeine, so wie die Zehen orangegelb; die mittlere Zehe mit der äußern durch eine kleine Haut verbunden; die Nägel schwarz. Der Kopf ist rund; die hohe Stirn weiß; hinter derselben ein breites schwarzes Querband; die obere Schnabelwurzel mit schwarzen sammtartigen Haaren besetzt; hinter den Augen ein schmaler weißer Streif bis hinter die Ohren; der Scheitel ist grau-

braun (lichtbraun); die Kehle weiß und verbindet sich mit einem breiten weißen Ringe, der den Hals umgiebt; unter demselben steht ein schwarzer, der auf dem Oberhalse schmal und schwächer, am Unterhalse aber, und an der Oberbrust breit und dunkler ist; der Rücken samt den Schulterfedern und Deckfedern der Flügel ist graubraun (lichtbraun); von den mittelmäßigen obern Deckfedern des Schwanzes sind die mittlern graubraun und die zur Seite weiß; der übrige Unterleib und die Seiten sind schön weiß; die untern Deckfedern des Schwanzes lang; die vordern Schwungfedern sind dunkelbraun mit schwärzlichen Spitzen, die vier ersten mit weißen Schäften in der Mitte, die vier folgenden mit weißlichen länglichen Flecken in der Mitte, von den mittlern Schwungfedern sind zwey weiß und zwey weißlich, die hintern längern aber wieder dunkelbraun; von den länglichen Achselfedern sind einige graubraun mit weißen Spizenden; die Unterdeckfedern der Flügel weiß; und ihre Schwungfedern grau; der zugerundete, aus zwölf Federn bestehende Schwanz ist dunkelbraun, nach den Spitzen schwärzlich, die Spitzen sind röthlich weiß, die äußerste Feder ist weiß, die folgende vor dem Ende mit einem dunkelbraunen Flecken und die dritte mit noch einem noch größern versehen. Das Weibchen ist etwas kleiner, hat einen schwarzen Schnabel, schwarze Flügel, dunkelbraune Wangen, einen schmälern und mehr

mehr dunkelbraunen als schwarzen Ring am Unterhalse und an der Oberbrust; die vordern Schwungfedern dunkler; die Weisne gelb; der Schwanz ist nach der Wurzel zu heller; übrigen ist es dem Männchen gleich *).

*) Wenn man zuweilen im September an den Ufern einen kleinen in der Farbe ganz ähnlichen Vogel sieht, der nicht arderfer als eine Lerche ist, aber schwarzen Schnabel und Füße hat, so ist es der Alexandrinische Regenspfeifer (*Charadrius Alexandrinus* Lin.), der nur einzeln in Deutschland gefunden wird.

Es ist ein scheuer Vogel, der die weit ausgestreckten, steinigten Ufer schnell durchläuft, in kurzen Absätzen fliegt, und wenn er sitzt, immer den Schwanz, wie eine Wachtelze, bewegt. Auf Teichen läßt er sich auch auf den Wassergräsern nieder, die ihn tragen. Er läßt im Fliegen und zur Paarungszeit einen hellen einfachen Ton: Kü! kü! Tull! tull! von sich hören. Dieser Vogel wird in Europa, den nördlichen Asien und Amerika, wie auch auf einigen Inseln der Südsee angetroffen. Sein Aufenthalt sind die sandigen und steinigten Ufer der Meere, Seen, Teiche und Flüsse. Am Tage sitzt er in Höhlen, und man sieht ihn daher am häufigsten in der Dämmerung. Er schreyt immer Kü, Kü. Als Zugvogel sieht man ihn schon im August und bis zu Ende des Octobers allenthalben in Deutschland an den Ufern, wo er auch oft nistet. Er wandert in kleinen Heerden von 6 bis 12. Zu Ende des

Märzes und Anfang des Aprils ist er wieder da. Wasserinsekten und Würmer machen seine Nahrung aus. Diese Vögel nisten gern an sandigen Küsten, daher man sie auch zur Brütezeit in Deutschland vorzüglich an der Nord- und Ostsee zu suchen hat. Doch nisten sie auch an deutschen Flüssen, z. B. an der Werra. Sie pflanzen sich nur einmal des Jahrs fort. Das Weibchen legt im May oder Junius 4 bis 5 weiße, mit vielen kleinen schwarzen Punkten besetzte, Eier auf den bloßen freyen Sand an unbefuchte Orte. Die Eier sind fast so groß als Wachtelener und werden in 18 bis 21 Tagen ausgebrütet. Die Jungen sind im ersten Jahre merklich kleiner als die Alten und haben folgende Farbe: Der Schnabel ist schwarz; die Füße graulich gelb, auch zuweilen graulich; die Stirn röthlich weiß; die Zügel schwarz und weißbunt; die Backen dunkelbraun, röthlich überlaufen; der Scheitel und Hinterkopf graubraun, alle Federn weißröthlich gelb eingefärbt; Kehle und Ring um den Hals weiß; die obere Brust in der Mitte rostfarben und dunkelbraun gefleckt, an den Seiten schwarzbraun nach hinten einen schwärzlichen schmalen Ring bildend; Rücken und Deckfedern der Flügel graubraun, alle Federn weißröthlich gelb eingefärbt; die obern Deckfedern des Schwanzes theils weiß, theils graubraun; der Bauch weiß; die Schwungfedern schwärzlich, die mittlern stark weiß eingefärbt; die letztern hell-

hellrothfarben färbt; der Schwanz an der Wurzel lichtbraun, nach der Spitze zu schwärzlich; die äußerste Feder ganz weiß, die zwey folgenden mit schwärzlichen Flecken in der Mitte, die übrigen mit weißen, die zwey mittelsten mit rothfarbenen. Da die Jungen vor dem Elter und den Wasserratten nicht sicher in ihrem Neste liegen, so verlassen sie es bald, setzen sich alsdann auf eine Klippe, oder einen andern erhabenen Ort am Ufer, und lassen sich von ihren Eltern vollends groß füttern. Die Feinde haben sie mit dem gemeinen Sandläufer gemein. Man schießt und fängt sie wie den gemeinen Strandläufer. Das Wildpret hat einen angenehmen schnepfenartigen Geschmack. Sie werden auch durch Vertilgung der plagenden Mückenarten, die sie in ihrem Larvenzustande vertilgen, nützlich.

4) Dummer Regenpfeifer, *Char. Morinellus* Linn. heißt auch der kleine Brachvogel, Dütchen, kleine Schwarzbrust, Morinell, Kornell, Morinelle, Morinellen, Lappländischer Regenpfeifer, Kornellkibitz, hauptdummer Gypis, Poffenreißer, Pommeranzen- und Citronenvogel, Brachvogel. Oben braugraun, alle Federn rothfarben eingefärbt; über den Augen ein weißer Streifen, der im Nacken zusammenläuft; der Schwanz aschgrau mit weißer Spitze; am Männchen die Brust rothroth mit einer weißen Querbinde; am Weib-

chen die Brust gelblich aschgrau überflogen, 9 Zoll lang. Er variirt in der Farbe; denn die Jungen sind am Unterleibe rothgelb und weißgefleckt, und dem Weibchen fehlt der aschgraue Hals, auch die schwarze Unterbrust, die das Männchen auch nach der Mauser verliert. Er wählt sich zum Wohnort den Norden von Europa, und erscheint nur auf seinem Zugtruppweise in Deutschland, wo er dann in einigen Gegenden, z. B. im Anhaltischen, sehr gemein ist. Man sieht ihn dann auf Lehden und Brachäckern. Er nähert sich von Insekten und Würmern. 5) Schreyender Regenpfeifer — *Char. vociferus* — oder Schreykibitz, Schwanzkibitz, Kibitz, Schreyer, Kibitz und langschwänziger Kibitz ist dem Regenpfeifer mit dem Halsbunde ähnlich, aber weit größer; denn die Länge beträgt fast zehn Zoll. Er hat um die Kehle und den Hals einen weißen Ring, und unter diesem an der Brust einen weißen und schwarzen Halbkreis. Die Füße sind gelb. Er wohnt einzeln am Rheine, kommt aber auch bisweilen mit dem Kampfhahne in die Riethe bey Frankenhäusen in Thüringen, und zieht gegen den August hin wieder weg.

Reh oder Rehwild — *Cervus Capreolus* — wovon das männliche Geschlecht Rehbock, oder Bock schlechtweg, das weibliche aber Reh, Nide, Nüde, Rehgal, Rehziege,

ge, oder Hille genannt wird, gehört mit zur Hirschgattung und in eben dieselbe Ordnung. Als Kennzeichen der Art hat unser Rothwild sechs Schneidezähne in der untern Kinnlade; keine Thränenhöhle und keinen äußerlichen Schwanz oder Blume; ein aufrechtes knotiges gewöhnlich in zwey Spitzen sich endigendes Gehörn, und weiße Hinterbacken. Es ist eine ungemein schöne, slinke, muntere und artige Thierart, die zwar nicht das große majestätische Ansehen des Rothhirsches und Dammhirsches hat, aber dafür mehr Gewandtheit, Verschlagenheit, Feuer und Stolz zeigt. Der Bock kämpft mit jungen Hirschen, mit Dammhirschen und geht oft als Sieger vom Kampfplaz; und jene Thiere, welche einmal die scharfen Spitzen des Rehwildgehörns empfunden haben, lassen sich nicht leicht mit ihm wieder in Zweykampf ein. Die Länge der Böcke ist vier Fuß; die Höhe zwey und einen halben Fuß; die Schwere fünfzig bis achtzig Pfund. Der Kopf ist wohl gebildet, klein, zwischen Ohren und Augen sehr stark und nach dem Munde zu dünn; die Thränenhöhlen fehlen; die Augen sind groß, haben einen bläulichen Augapfel und sind feurig; die Ohren sind lang, oval, zugespitzt, von innen und aussen wollig, und stehen ziemlich weit auseinander; im Munde stehen in der untern Kinnlade sechs Schneidezähne, die vom zweyten bis zum vierten Jahre ausfallen und durch neue ersetzt wer-

den; die Eckzähne fehlen; auf jeder Seite sind oben und unten sechs scharfe gespitzte Backenzähne, deren jeder inwendig zweymal ausgehöhlt und auswendig zweymal auswärts gebogen ist. Der Hals ist proportionirlich lang und wird hoch getragen; der Körper ist abgerundet; der Rücken wenig eingebogen; die Läufe sind schlank, und die schwarzen Klauen und gleichfarbigen eyrunden Afterklauen glänzen wie polirt. Unter dem ersten Gelenke der Hinterbeine steht ein wulstiger Büschel. Die Blume ist wenig oder gar nicht sichtbar. Ein vorzügliches Merkmal, woran ihn schon der Jäger von weitem erkennt, wenn er auch kein Geweih sieht, ist ein langer Haarpopf unter dem Leibe am Zeugungsgliede. Die Riecke ist nicht so groß und nicht so schwer, hat einen schmälern Kopf, längern und dünnern Hals, schmälere Brust und schlankern Leib. Sie trägt gewöhnlich kein Gehörn, doch findet man sie auch, wiewohl sehr selten, mit einem kurzen, meist einspießigen Gehörn, das sie ebenfalls jährlich abwirft. Man erkennt sie schon von ferne durch ihren niedrig tragenden Kopf und besonders durch den langen gelblichen Haarbüschel am Geburtsgliede. Die Farbe wird zu gleicher Zeit mit dem Rothwilde des Jahres zweymal verändert. Im Sommer sind die Kürzern und schlichtern Haare entweder gelbbraun oder rothbraun, und im Winter, wenn sie länger und weicher werden, aschgrau, und erscheinen durch die mehr oder we-

niger

niger gelben oder weißen Spitzen, bald dunkelgrau, bald röthlichgrau. Ueber der Nase läuft an der Oberlippe weg ein schwarzer Streifen, wie ein Schnurrbart; der übrige Theil der Nase ist bis an die Augen schwarz und weiß gesprengt; das Untermaul weiß, die Kehle gelb; der Unterhals mit zwey weißen Flecken gezeichnet; der Bauch schmutzig weißgelb; die Hinterbacken im Winter ganz weiß, im Sommer gelbweiß. An der Wurzel ist das Haar immer dunkel- aschgrau. Der Rehbock setzt nach Verhältniß seiner Größe ein weit kleineres Gehörn und kürzere Stangen auf, als der Hirsch, sie stehen auch enger zusammen und sind nur etwas hinten hinausgebogen. Die Rosenstöcke sind nicht sichtbar, sondern stecken unter der Haut in der Hirnschale, und die Stangen scheinen daher unmittelbar aus der Stirn hervorzuspriessen. Wenn das Bockkalb sechs Monate alt ist, so keimen die ersten fingerlangen Spieße hervor. Es heißt alsdann ein Spießbock. Wenn dieser im November und December, wie die alten Böcke, sein Gehörn abwirft, so ist es im März und April schon wieder vollkommen hergestellt und hat vier Enden oder eine Stange oben mit zwey Gabeln, zuweilen bekommt er aber die Spieße auch noch einmal, welche immer größer werden. Im ersten Falle hat er in einigen Gegenden den Namen Gabelbock. Im dritten Jahre erhält das neue Gehörn an jeder Stange noch einen klei-

nen Eisprußel, und im vierten und fünften auch wohl unter demselben noch einen Aushsprußel. Hat der Rehbock erst sechs oder acht Enden, dann nimmt die Anzahl derselben selten zu, wohl aber die Stärke der Stangen, die Mehrheit und Größe der Perlen und die Breite der Rosen. Er wird aber nie nach der Anzahl der Enden, sondern bloß nach Alter und Stärke benannt, und heißt daher ein geringer, starker, und sehr starker Rehbock. Wie bey den Hirschen, so fegen die alten Böcke eher als die jungen, jene also im März, diese im April, und sie thun dieß an schlanken Bäumchen mit größerer Heftigkeit und Schnelligkeit, als das Edelhild. Man hat auch Farben-Varietäten. 1) Das schwarze Rehwild. Man trifft es im Schaumburgischen und Hessischen vorzüglich an. Es ist rabenschwarz und hat auch verglichen Hinterbacken. Bey der Vermischung mit rothen entstehen oft zwey schwarze auch zwey rothe, auch ein rothes und schwarzes Kalb. Schwarze mit schwarzen gepaart geben auch nicht immer bloß schwarze. 2) Das dunkelbraune Rehwild mit gelben Hinterbacken. 3) Das geschäkte Rehwild. Entweder roth und schwarz, oder roth und weiß geschäkt. Sehr selten. 4) Das weiße Rehwild. Selten. 5) Das Bastardreh. Vom Schaf und Rehbock, oder Reh und Widder; und vom Rehbock und der Ziege. Wenn man systematisch genau das Rehge-

schlecht

schlecht benennen wollte, so mußte das Männchen Rehirsch, und das Weibchen Rehtier heißen, und wirklich nähern sie sich auch im ganzen äußern Ansehen mehr dem Hirsche, als irgend einer andern Thiergattung. Der Name Rehbock und Rehgeiß, den sie schon lange führen, hat also wohl daher seinen Ursprung, weil sie in den übrigen Eigenschaften dem Ziegen Geschlechte so nahe kommen, so locker in ihrer Nahrung sind und in ihrer Fortpflanzungsart demselben gleichen. Sie begatten sich sogar, wie wir gesehen haben, mit den Ziegen und mit den von Einigen zur Ziegen gattung gerechneten Schaafen. Sie scheinen also im Reiche der Natur den Uebergang von der Hirsch- zur Ziegen gattung zu machen. So kurzweilig, wie das Ziegen Geschlecht, ist auch das Rehwild. Außerdem zeichnet es noch ein vorzüglich scharfes Gesicht und ein feiner Geruch aus. Da sie den Kopfsimmer in die Höhe tragen und sich von einer Seite nach der andern dem Winde entgegen drehen, so wittern sie den anschleichenden Weidmann schon auf 3—400 Schritte. Stößt man ihnen im Holze, besonders des Abends oder Nachts, auf, oder stehen sie in der wahren oder falschen Brunst, so lassen sie ein weit-schallendes helles Bellen (Schmälen) fast den Hundebellen gleich hören. Dieß setzen sie gewöhnlich in einer Entfernung langsam schleichend so lange fort, bis sie dasjenige deutlich sehen, was sie stutzig machte, und ist es ein

Mensch oder Hund, so laufen sie mit der größten Schnelligkeit davon. Das Schmälen des Bocks klingt stärker und dumpfiger als das der Geiß. Die alte Nixe giebt auch überdieß noch einen eignen feinen Laut von sich, wie welchen sie ihre Zungen zu sich ruft, oder den Reiz zur Brunst anzeigt, und welchen der Jäger beim Blattschießen nachahmt, um den Bock vor sein Rohr zu locken. Ob sich das Rehwild gleich nicht wie der Hirsch süßlet, da es überhaupt viel reinlicher als dieser ist, so schwimmt es doch fertig, und man hat mehrere, oft ohne Noth, über breite Flüsse rubend gesehen. So wenig man am Rehbocke in und außer der Brunst die Kennzeichen der Wuth eines erhitzen Hirsches bemerkt hat, so zeigt er doch zuweilen, daß er nicht immer das sanftmüthige Thier ist, als man nach seinen übrigen Eigenschaften vermuthen sollte. Er kämpft oft mit seines Gleichen so stark, daß einer von beyden das Leben verliert; und oft nehmen bloß aus Spielereyen angefangene Zweykämpfe bey solchen, die zu einer Familie gehören, ein so trauriges Ende. Die Lebensdauer des Edelmwils hat das Rehwild nicht, da es eine viel feinere Organisation hat; man setzt daher ihr größtes Lebensziel auf 16 Jahre. Das Reh geht in Europa bis Norwegen und Schweden hinauf und von Sibirien aus erstreckt es sich in Asien bis hinab nach China, Persien, Java und Ceylon. Ob es sich auch in Afrika

Pa und Amerika befindet, ist noch nicht ganz ausgemacht. Lieber wohnen zwar die Rehe in hinlänglichen Waldungen, und in Gebirgen auf erhabenen Plätzen, doch trifft man sie auch in Ebenen und auf den höchsten Gebirgen an, ja sie gehen auch gern in Niedrungen, wo Sümpfe und Moräste sind. Lichte Hölzer, Laub- und Gehölzholz, verödete Plätze, hohe Waldwiesen, nahe Aecker bestimmen in einer waldigen Gegend ihren gewöhnlichen Wohnsitz; doch ziehen sie Gränzwaldungen, von welcher Art sie auch seyn mögen, allen andern vor. Sie vereinigen sich nicht wie die Hirsche in starken Rudeln, sondern leben nur in Gesellschaft von drey bis fünf Stücken, und man sieht ihrer selten 10 bis 12 beyfammen. Der Bock ist stets um seine Geis, deren er eine, zwey, selten drey hat, lebt unter denselben und seinen Jungen, wie ein Hausvater und vertheidigt sie als solcher. Ein Rudel Rehwild ist also gewöhnlich eine Familiengesellschaft, die so lange ungetrennt bleibt, bis die Jungen wieder neue Familien errichten. Wenn sie der harte Winter die höhern Gebirge zu verlassen nöthigt, so wandern sie in die niedrigen Waldungen herab; kehren aber im Frühjahr allezeit wieder in ihren alten Standort zurück. Ehe sie sich niederthun, scharren sie sich mit den Vorderläufen einen runden Platz, um im Sommer kühl und im Winter trocken zu liegen. Das Rehwild ist sehr lecker, und

es nimmt daher das Maul nicht so voll wie der Hirsch, wenn es sich äset, sondern wählt Gras und Kräuter sorgfältig aus. Man sieht es daher auf den Waldwiesen allenthalben herum schleichen und sich die Klee- und andere feine Kräuterarten aussuchen. Des Abends und Morgens findet man sie auf trocknen Wiesen, in jungen Gehölzen und Schlägen, auf den angrenzenden Aeckern und in dergleichen Gärten. Knospen, Blüthen, Laub, junge Rinde und Zweige von allerley Bäumen, Sträuchern und Stauden, Hafer, Erbsen, Linsen und Bohnenkraut, Eicheln und Bucheckern, wilbes Obst, Beeren u. dgl. suchen sie vorzüglich auf. Sie gehen auch nach den fetten Sumpf- und Wasserkräutern, und es ist auffallend, daß sie vorzüglich beyde Extreme, die dürren Hügelkräuter und die fetten Sumpfkrauter, vorzüglich lieben. In harten schneereichen Wintern genießen sie oft viel unverdauliche Reiser besonders von Birken u. s. w. Sie gehen dann sogar in der größten Hungersnoth aufs Aas. Den Durst können sie sich im Nothfall ohne Quelle durch Ableckung des Thaues und Regens von den Blättern und durch Schneelöschchen. Das Salz lieben sie wie das Edelmild. Beym Ausgehen tritt allezeit der Bock zuerst aus dem Holze und kundschaftet die Gegend aus; die Kiehe folgt ihm; werden sie aber verjagt, so geht sie voran und er folgt, um sie erst in Sicherheit zu lassen. So macht er es auch, wenn die Jungen dabey sind.

Dhn.

Ohngeachtet den mancherley aus Thiergärten hergenommenen Beyspielen der Brunst des Rehwilds im August, und der vorgeblichen Tragzeit von 9 Monaten, hat doch eine genaue Beobachtung im Freyen bis jetzt noch gelehrt, daß die wahre Brunstzeit in das Ende des Novembers bis in die Mitte des Janners fällt. Der Rehbod hat alsdann gewöhnlich abgeworfen, und er macht es daher in dieser Hinsicht dem Hirsche nicht gleich. Im August treibt zwar der Bod das Reh, besonders die jüngern auch, allein wie die wiederholten Deffnungen bis im Jänner beweisen, ohne Erfolg, wenn auch an einem jungen gereizten Reh ein wirkliches Bedecken erfolgen sollte. Der feurige Bod befindet sich zu dieser Zeit schon wohl, und dieß wirkt auf seinen Begattungstrieb. Das Geräusch, mit welchem er ihn zu befriedigen trachtet, und das Blatschießen, das durch dieß Ereigniß verursacht wird, verbunden mit der Unzulichkeit des vollkommenen Gehörns bey der Rothhirschbrunst sind die ersten Veranlassungen gewesen, die Begattung der Rehe im August zu sehen. Da sich im December, auch vierzehn Tage vor und nach diesem Monate, die Geis zur Begattung willig findet, und dasselbe also ganz stille vor sich geht, auch in dieser Jahreszeit die Wälder nicht so fleißig besucht werden, so ist der eigentliche Act nicht so oft, wie bey dem Edelhirsch, bemerkt, und daher die eigentliche und wahre Brunstzeit zweifelhaft worden; doch zeigen die einzelnen Beyspiele, wo man den Be-

schlag selbst gesehen, und die dann erst gegenwärtige Frucht in der Geburtsmutter oder dem Tragstocke, daß die Brunst des Rehbocks im August eine falsche oder geile, wie die Alten sagen, gewesen sey. Von dieser Zeit an trägt die Geis fünf und einen halben Monat, oder 21 Wochen, und setzt im May und Junius gewöhnlich zwey, (meist ein männliches und weibliches Kalb) selten eins, noch seltner aber drey Junge, an einen düstern einsamen Ort in eine Dichtung, oder in hohes Gras. Vier bis fünf Tage vorher schleicht sich die Mutter vom Vater weg, und nach acht bis zehn Tagen führt sie ihm erst seine Kinder zu. Beyde Eltern tragen dann zärtliche Sorgfalt gegen dieselben, und zeigen so viel Herzhaftekeit, daß sie Menschen und Hunde angehen, die ihnen ihre Jungen rauben wollen. Sie säugen vier Monate und länger, und heißen Rehkälber (Rehkügel, Rehzickel), wenn die männlichen ein Jahr alt sind, Spieser, oder Spiesböcke, die weiblichen Schmalthiere, Schmalrehe und Schmalrieken. Die Kälber sind braunroth und weiß gefleckt, lassen sich leicht zähmen, und man kann sie gewöhnen, daß sie mit einem in den Wald und wieder zurück laufen. Daß die warme Lust im August und andere Umstände nicht zuweilen ein außer der Zeit gesetztes Kalb, wie bey den meisten Thieren verursachen sollte, ist an sich nicht unwahrscheinlich und die Erfahrung bestätigt es. Wenn keine

Krank-

Krankheiten den Rehstand schmä-
lern, so ist die Vermehrung leicht-
er und stärker, als bey dem Roth-
wild. Allein das Reh wird von
vielen Krankheiten heimgesucht:

1) Die Knotenkrankheit,
an welcher das Rothwild leidet,
befällt auch die Rehe. 2) Die
Nutzgahrung bekommen sie
meist daher, weil sie in harten
Wintern viele Baumrinden und
junge Zweige verzehren, die sich
im Magen zusammenwickeln und
in den Falten desselben wie ein-
geleimt festsetzen. Dieß und 3)
die Ruhr, welche nach langem
Hunger und zu viel genossenen
jungen Laube und saftigen Früh-
lingskräutern entsteht, streckt oft
im Frühjahr den ganzen Reh-
stand hin. 4) Die Leberfäule
verursacht der häufig gefalle-
ne Wehlthau; wenn es viele
Mast gegeben hat, und ein lauer,
nasser Winter folgt, so werden
sie innerlich so faul, wie die
Schaafe. 5) Zu viel Enger-
linge unter der Drossel, oder
auch unter dem Knoten, wo sie
große Löcher ins Wildpret fressen,
verursachen ihnen auch zu-
weilen den Tod. Wölfe, Fuch-
se, Hunde, Füchse, wilde
Kazen, und auch das große
Wiesel stellen diesen Thieren
nach. Bey dem Schnee und
Eisruft werden sogar alte Rehe
den Füchsen zu Theil und das
Wiesel springt den jungen im
Rücken, beißt ihnen die Hals-
flecken durch, daß sie zuletzt hin-
stürzen. Bremsen, Holz-
böcke (*Acarus Ricinus* L.)
und Läuse plagen sie, so wie
den Hirsch, doch nicht in solcher

Menge; innerlich Bandwür-
mer und Blasenwürmer.
Von den vielen Jägerbeobach-
tungen heben wir folgende aus:
1) Da das Reh mehr familien-
weise lebt, als das andere Wild
und ein Bock mit einer Gattin
vorlieb nimmt; so läßt sich das
Weltgehen vieler Geissen daraus
erklären, daß man die Gewohn-
heit hat, ohne Rücksicht auf seine
Eigenheit, so viel Böcke wegzus-
chießen, als man nur habhaft
werden kann. Man muß, um
seinen Rehstand in immer gleicher
Vollkommenheit zu erhalten, we-
nigstens auf drey Riesen einen
Bock rechnen. 2) Unter anderes
Wildpret in einem Thiergarten
schicken sich die Rehe des-
halb nicht, weil sie eine eigene und
kostbare Fütterung verlangen, in-
dem man ihnen Hasergarben,
Bucheckern, Eicheln, Obst und
gestampfte Kartoffeln vorwerfen
muß. Doch kann man die wild
eingefangenen auch nicht sogleich
in einen eigenen Rehgarten an-
setzen, und man wählt dazu sicher-
er zahmaufgezogene. Der Raum,
wo man sie hält, darf aber nicht
zu enge seyn, weil sie häufige
Bewegung und Abwechselung ha-
ben wollen; er muß doch wenig-
stens 100 Morgen enthalten, und
aus Laubholz, großen Buchen
und Eichen, auch Brüchen und
Geröhrig, Aekern und Wiesen
bestehen. Der Zaun braucht nur
fünf Fuß hoch zu seyn; die Boh-
len müssen aber dicht über einan-
der liegen, weil das Rehwild
gern durchkriecht. Aus einem
solchen Rehgarten kann man sie
auch nach und nach durch Aus-
setzung

hebung einiger Fächer in freyen Wildnissen, die sich für sie schilfen, ansetzen. 3) Alle Hunde lieben die Witterung der Rehe vorzüglich, als von andern Wildpret; vermuthlich, wegen der häufigen Fährte, die durch die unzähligen Wiedergänge und Absprünge in einem kleinen Bezirke vervielfältiget werden. Wer mit Jagdhunden jagen will, und keine Rehe schießen darf, muß daher dieselben gleich anfangs davon abzubringen suchen. 4) Beym Treibjagen gehen die Rehe gewöhnlich an den Seiten durch, oder rückwärts durch die Treiber. 5) Bey kühlen und nassen Wetter laufen die Böcke fast gar nicht aufs Blatt, auch dann nicht, wenn es viele Schmalrehe giebt. Sonst thun sie es am häufigsten von 10 Uhr des Morgens bis 5 Uhr des Abends. 6) Ungeöhnlich gestaltete oder monströse Gehörne sind beym Rehbocke weit häufiger als beym Hirsche, vermuthlich weil er zur Zeit des Aufsatzes dasselbe nicht gehörig schont, und sogar muthwillige Verletzungen an demselben zu Wege bringt. Man findet sie mit seltsamen Gestalten und Verdrehungen, mit vier bis sieben Stangen, mit acht bis vierzehn Enden. 7) Daß die Fleischnahrung dem Rehwild nicht ganz zuwider ist, wird von Hr. Bechstein durch ein Beispiel einer gefährzten Geiß bewiesen, deren liebster Fraß die Eingeweide von wilden und zahmen Thieren, besonders Lunge und Leber, und dann rohes und gekochtes Fleisch war. Es frist Brod und trinkt Milch,

doch beydes einzeln und nicht gemischt. Daß Roth-Dam- und Rehwild lederne Handschuhe und anderes Lederwerk angehen, ist eine Erfahrung, die schon mehrere Jäger, welche Thiergärten vorstehen, gemacht haben werden. Wer die Kennzeichen der Hirschfährte kennt, kann dieselbe auch auf das Rehwild anwenden, doch ist die genaue Kenntniß nicht so nothwendig, da keine Bestätigungszeichen auf dasselbe gemacht werden. Die Fährte ist flüchtig und trabend geschränkt und fast stets gezwungen, doch spalten sie auch die Klauen, wenn sie flüchtig sind, und setzen alsdann die Afterklauen ein. Die Hinterfährte ist etwas kleiner als die Vorderfährte, und der alte Bock macht seine Spur etwas stumpfer als die Ziege. Beym Wurschegehen und auf dem Anstande sollte eigentlich das Rehwild bloß mit der Büchse geschossen werden; und nur bey Treibjagen sind eigentliche Flinten, mit groben Schrotten oder Rehposten geladen, erlaubt. Uebrigens werden sie, ausser dem Rehplatten, wie die Hirsche gejagt und im Rehgarn gefangen, auch mit einigen dazu bestimmten, unten aber wegen des Durchkriechens wohlverwahrten, Zeuchen eingestellt. Beym Blatten ahmt der Jäger auf einem Buchen- oder Birnblatte, oder einer künstlichen Lockpfeife, dem zweystimrigen Rufe der Rieknach, wenn sie den Gatten verlangt, auf welchen betrügerischen Ruf der Freuden ahnende Bock wie ein Pfeil geschoßen kommt.

un:

und den unerwarteten Tod der Büchsenkugel empfängt. Diese angenehme Jagd dauert von Jacob bis zu Ende des Augusts, so lange sie nämlich aufs Blatt laufen. Das Wildpret des Rehwildes ist eine vortreffliche Speise; ein Zimmerbraten von einem Spiesbock oder Schmal Reh wird für sehr delikate gehalten. Auch Leber und Zunge schmecken gut. Man benutzt leider in dieser Rücksicht das Rehwild das ganze Jahr. Die Haut, rohgahr gemacht, giebt Satteldecken, vor dem auch Stühle und Polster. Die Sattler brauchen sie gegen den Druck bey Pferden unter den Gurt und die Kummte. Weißgerber dient sie, wenn sie die Engerlinge nicht durchbohrt haben, zu vortrefflichen Beinkleidern, Handschuhen u. dgl. Die Haare sind elastischer als Hirschhaare und daher zum Auspolstern der Stühle und anderer Dinge vorzüglich brauchbar. Bey langwierigen Krankheiten einen Kranken in eine Rehbockshaut, der auf die rauhe Seite mit einem Tuch, welches mit Hirschtalg bestrichen ist, gelegt wird, gewickelt, soll das beste Mittel gegen das Wundliegen seyn. Die Gehörne werden zu Messerstielen, Pfeifenröhren, Tabackstopfern, Stockknöpfen und dergleichen verarbeitet. Auch braucht man sie als Wandhaken. Der medicinische Gebrauch von andern Theilen, als von der Milz, Galle, Losung u. ist abergläubisch. Es ist wohl mehr als ausgemacht, daß die Lederhaftigkeit

des Rehwildes in Waldungen größern Schaden anrichtet, als die Gefräßigkeit des Rothwildes. Sie verbaizen daher die jungen Schläge, die frey liegen und von der Sonne beschienen werden, des Winters nicht immer bloß aus Noth, sondern aus Leckerey und Muthwillen. Eine Lerchenbaums-Aussaat kann man im Freyen gar nicht vor ihnen behalten, eben so alle fremde Holzarten. Es giebt daher auch Forstmänner, wie z. B. Herr Forstmeister Dettelt in Ilmenau, die kein Reh auf ihrem Reviere dulden. Auch auf Waldwiesen, die sie mehr durch ihr stetes Ausschuchen des Futters vertreten, als durch Fraß beschädigen, werden sie lästig, so wie in nahen Gärten und Feldern. Bey der Waldb- und Feldwirtschaft steht daher das Reh in keinem guten Rufe, so sehr es auch der Jäger rühmt. In der Jägersprache bedient man sich folgender Ausdrücke: Fast alles wie bey dem Rothhirsch. An Gehörnen heißen die Spitzen bloß Enden. Der weiße Hintertheil — Spiegel, auch das Schild. Der Haarbüschel an der Ruthe des Bocks — Pinsel. Das weibliche Geburts-glied — Feigenblatt, Feuchtblatt auch wohl Eichenblatt und der Haarbüschel daran — Schürze. Die Rehhaut nenne man auch Rehfell. Der Rehbock und die Kiehe sind nicht feist, sondern stark. Doch haben sie kein Fett, sondern Feist. Die Stellen, wo der Bock die Kiehe treibt, heißen Treibeplätze. Wenn der Rehbock da,

wo er seinen Stand hat, oder sich niederlassen will, das Moos ober den Rasen wegscharrt, so heißt dieß das Pläzen.

Rehblatten, Blatten, Rehe aufs Blatt schießen, geschieht im August, wenn der Rehbock aufs Blatt gehet, man stellt sich nemlich auf den Anstand, und ahmet auf einer, aus birkener Rinde verfertigten Pfeife die Stimme der Rinde nach, da denn der Bock herbey gelaufen kommt und geschossen wird, s. Blattschießen.

Rehbrunst ist die Zeit der Begattung, welche vom November bis zu Ende Decembers dauert.

Rehkalb, Rehkäglein, Rehkügel, Rehziecklein und Rehkiglein heißen die jungen Rehe, so lange sie noch kein Jahr alt sind.

Rehkasten ist ein zum Fortbringen lebendiger Rehe gefertigter hölzerner Kasten, er ist so groß, daß ein Rehbock bequem darinnen liegen und stehen kann, übrigens ganz so verfertigt, wie ein Hirschkasten, s. d. Wort.

Reheneke sind 50 doppelte Schritte lang, 16 bis 20 Maschen hoch, wovon jede 3 Zoll ins Gevierte hält, damit kein Fuchs oder Haase hindurch schlüpfen könne. Sie werden von 4 Faden starken Bindfaden gestrickt, die Schlagleinen aber müssen 12 Faden stark seyn, und an jedem Ende

sechs Ellen vorgehen; die Hefstel müssen von weißbuchenem Holze und die Forkeln leicht seyn, damit ein Mann eines tragen und stellen könne. Beym Stellen bindet der Stellmann das Reh auf, faßt den Hefstel in die rechte Hand, das Reh zum Ablaufen, und nimmt den Haaken verkehrt auf die linke Schulter, dann nimmt ein anderer ihm den Hefstel und etwas vom Rehe, vom Haaken, schlägt ein, oder bindet an, und der Stellmann läuft mit dem Rehe ab; hierauf wird es scharf gezogen und hinten auch ausgeschlagen, damit es recht stelle. Man kann sie auch zur Wolfe- und Fuchsjagd brauchen.

Reisflein ist dasjenige Zeichen in der Hirschfährte, welches darinnen einen kleinen Reifen bildet, und daher entsteht, wenn der Hirsch mit der Hinterschale in die vordere tritt, und dadurch obiges Zeichen bildet.

Reihen nennt man das Begatten der Wasservögel, als Gänse, Enten &c.

Reiher — Ardea — macht unter den Sumpfvögeln eine eigene Gattung aus, mit folgenden Kennzeichen: der Schnabel ist gerade, lang, spizig, etwas zusammengebrückt; die obere Kinnlade auf dem Rücken meist mit einer Längsfurche. Die Nasenlöcher sind länglich, oben zur Hälfte bedeckt in einer Furche liegend. Die Zunge ist lang, häutig und flach. An den Füßen sind die Zehen unverbunden, doch zweifachen

schen der äußern und mittlern an der Wurzel eine merkliche Hautfalte und der Nagel der Mittelzehe ist am innern Rande gezähnt. Ueberhaupt sind die Füße nicht so hoch als am Storch und Kranich, aber dafür sind die Zehen länger, besonders die hintere, so wie auch die Krallen. Er hat übrigens noch vier Wollbüschel, wovon zwey zu beyden Seiten der Brustmitte und zwey zu beyden Seiten des Afters stehen, und einen besondern Geruch haben. Die ganze Gattung ist in zwey Familien, in dünnhalsige und in dickhalsige Reiher getheilt, und von beyden kommen bey uns folgende Arten vor: A) Dünnhalsige Reiher: der Schnabel ist lang und beyde Kinnladen gerade; die Füße sehr lang und weit über der Ferse federlos, der Hals auf seiner Hinterseite der ganzen Länge nach schmal mit wollenartigen Flaumfedern bedeckt. Die Nahrung besteht vorzüglich in Fischen. 1) Gemeiner Reiher — *Ard. vulgaris* Bechst. — heißt auch Reiher schlechtweg, Reiher, großer, grauer, blauer, weißbunter Reiher, graue Rohrdommel, türkischer Reiher, Bergreier, Fischreier, großer Kammreier, Reyer, aschgrauer Reyer, Schittreyer, grauer Reigel, gehaubter und ungehaubter Reiher, grauer aschfarbiger Reiher und Rheinreier; er unterscheidet sich von den übrigen Arten durch folgende Kennzeichen: Der

Kopf hat einen herabhängenden schwärzlichen Federbusch; der Rücken ist aschblau oder aschgrau; der Unterleib weiß; am Vorderhalse und an der Brust stehen längliche schwarze Flecken. Die Länge ist drey Fuß, wovon der Schwanz einen halben Fuß und der Schnabel fünf Zoll wegnimmt; die Breite fünf Fuß; die Flügel legen sich an der Spitze des Schwanzes zusammen, und das Gewicht ist vier Pfund. Der Schnabel ist auf dem Rücken hin hornfarben ins gelbliche ziehend, sonst, und vorzüglich an der Wurzel, gelblich; der nackte Bügel grüngelb; der Augenstern gelblich; die Schienbeine sechs Zoll hoch, vorn geschilbert, hinten aber neßförmig, so wie die Zehen dunkelschieferfarben, fleischroth überlaufen, der nackte Theil der Schenkel fleischrothgelb. Die Stirn und der Vorderkopf mit seinen großen Federn, die gleichsam schon einen Federbusch machen, sind weiß; über den Augen ein schwarzer Streifen, der sich mit den schwarzen Federn des Hinterkopfs vereinigt; die zugespitzten Straußfedern des Hinterkopfs, die am Nacken herabliegen, sind lang, bey alten Männchen werden die zwey längsten oft sechs Zoll lang angetroffen; der Hinterhals ist weiß ins graue schillernd; der Rücken aschgrau; von dem Mittelrücken und den Schultern laufen lange zugespitzte silberweiße Federn über die Flügel herab, wovon die längsten oft sechs Zoll lang, und kaum vier Linien breit sind. Sie machen

K

den

den Vogel ein schönes Ansehen. Die mittelmäßigen obern Deckfedern des Schwanzes und der Schwanz selbst sind dunkelashgrau; die Deckfedern der Flügel ebenfalls, doch noch etwas dunkler; der ganze Unterleib weiß, an der Kehle rein weiß, von der Gurgel an aber laufen bis zur Hälfte der Brust herab lange zugespitzte Federn, welche nach der Seite gekehrte, schöne, lanzetförmige schwarze Flecken haben; über dem Flügelwinkel steht ein großer weißer Fleck; der Rand der Flügel ist weiß; unter den Achseln fängt ein breiter sammt-schwarzer Streifen an, der an den Seiten weg bis zum After läuft, wo er die langen weißen Afterfedern schwarzbunt macht; die Schenkelfedern sind vorn weiß, hinten grau; die vordern Schwungfedern schwarz, blau angelauten, die hintern dunkelashgrau; die Deckfedern der Unterflügel grau, weiß verwaschen. Das Weibchen unterscheidet sich durch nichts, als daß die Straußfedern auf dem Kopfe weit kürzer, ja bey manchen gar unmerklich, der Augenkern grüngelb und die Füße olivenbraun sind. Diese Farbe haben Männchen und Weibchen nur von der dritten Mauserung an; bis dorthin sind es die sogenannten grauen Reiher, die sonst für eine besondere Art gehalten wurden; da man sie, wie ganz natürlich, auf ihrem Striche häufiger sieht. Diesen fehlt nämlich das Weiße am Vorderkopfe; die schwankenden schönen Schulterfedern, die, wenn sie bey den dreijährigen noch da

sind, doch nicht rein weiß erscheinen; weiter fehlt die Länge des Federbusches, die schwarze Seitenfarbe; und die Farbe ist überhaupt mehr dunkelashgrau, so gar der Schnabel ist oben ganz schwärzlich. Die einjährigen Weibchen haben fast gar keinen Federbusch. Der Reiher ist ein stiller, trauriger, unleidenschaftlicher, aber sehr scheuer Vogel, der mit seinem überaus scharfen Gesichte den Jäger sehr weit bemerkt, und etliche hundert Schritte weit vor ihm aufsteigt. Sein Flug ist schwer, und er bewegt die großen breiten Flügel nur langsam. Wenn er sich in die Höhe heben will, so steigt er fast allezeit erst in einem Kreise herum, steigt aber bisweilen bis zu den Wolken hinauf. Er fliegt nicht, wie der Storch, mit ausgestrecktem Halse, sondern legt den Vorderhals nach dem Rücken zu, verdoppelt den Hinterhals also gleichsam, so daß es aussieht, als wenn er einen Kropf hätte, die Füße streckt er dabey hinten aus. Sein Geschrey: Krei! ist kreischend, und klingt sehr unangenehm, besonders wenn eine ganze Heerde des Abends diese Mißtöne von sich hören läßt. Diese Vögel wohnen in der alten und neuen Welt. Sie gehen aber nicht bis zum rauhesten Norden hinauf. Ihr Aufenthalt sind diejenigen Baum-Waldungen, welche große Seen und Weiber in ihrer Nähe haben. Sie sind daher mehr in gebirgigen als ebenen Gegenden. Schon in der Mitte des Augusts streichen die Jungen fast allent-

hal-

haben an den Teichen herum; und dieß ist vielleicht die Ursache, warum sie für eine besondere Art sind gehalten worden, da man sie da allenthalben antrifft. Im September bilden sie größere Heerden, und sobald im October die Nachtfroste eintreten, ziehen sie in wärmere Gegenden. Im März, wenn keine starken Fröste mehr zu befürchten sind, kommen sie wieder heim. Wenn man im Winter hin und wieder in Deutschland an den Flüssen einzelne gemeine Reiher antrifft, so sind diese vermuthlich aus einer nördlichen Gegend z. B. aus Schweden. Ihre Hauptnahrung besteht in Fischbrut, die ihnen, wenn sie Rille an dem Ufer ohngefähr einen Fuß tief im Wasser stehen, in Menge zuschwimmt. Vielleicht daß sie ihre Extremite herbey lockt, denn daß sie dem Reiherheine Glanze oder Geruche nachgiengen, ist wohl ungegründet. Sie fressen auch ausser den Fischen, Insecten, Frösche, Froschlurven, Krebse, Schnecken und sogar Wasserspizmäuse. Sie können lange hungern. Man kann sie leicht zähmen, alsdann fressen sie Hühnergedärme, oder Fleischabgänge aus der Küche, fangen Mäuse und Sperlinge u. s. w. Nicht bloß auf ihren Reisen, sondern auch in ihrer Heimath sind es verträgliche und gesellschaftliche Vögel, die auf hohen Erlen, Eichen, Fichten, Kiefern ein flaches großes, aus Reisern, Schilfbalmen und Wolle bestehendes Nest bauen, und drey bis vier grünlichblaue Eyer von der Größe

der Haushühnereyer legen, und diese in fünf und zwanzig Tagen ausbrüten. Die Jungen werden mit kleinen Fischen ernährt, die ihnen beide Eltern bis sie flügge sind, in der weiten Nachenöffnung an der Kehle vortragen. Sobald sie ausgeflogen sind, vereinigen sie sich. Die Bäume, auf welche sie nisten, sehen von den weißen ähnelnden Unrathe garstig aus und verdorren endlich. Die Kolkraaben und Rabenkrähen, Marder und Wiesel nehmen den Alten die Eyer aus; letztere auch die Jungen. An diese wagen sich auch nur die Falken, denn auf alte sieht man keine Raubvögel für sich stoßen. Als Jägerbeobachtungen sind nachstehende zu merken: 1) Die Jäger sagen, daß der Reiher allezeit dahin trete, wo er der Sonne entgegenstände, damit er keinem Schatten ins Wasser werfe, der die Fische zurückscheucht. 2) Da die zahmen mit sonderlicher Geschicklichkeit, ganz in den Leib zurückgezogenem Halse und blig schnell hervorschießendem Schnabel Sperlinge auf den Höfen fangen, so zeigt diese Eigenschaft und auch einzelne Erfahrungen bey der Deffnung, daß sie wohl vorzüglich auf die Wassermäuse mit Jagd machen, wenn sie am Ufer stehen, und daß dieß vielleicht die Hauptwinternahrung für sie ist. Sie gehören zur niedern Jagd. In den meisten Gegenden Deutschlands werden die Ständer von der Obrigkeit ausgelöst, weil sie den Fischteichen nachtheilig sind. Man er-

leicht sie entweder im Zeiche stehend, oder schießt sie im Fluge. Wenn die Jungen flügge sind, so giebt dieß eine besondere Jagd, wo auch viele Alte, die über ihnen herum schweben und ängstlich thun, erlegt werden. Man fängt sie mit Angelhaken, an welche man einen Fisch bindet; auch in Schleifen, die man da ins Wasser pflöckt, wo man sie oft herum waten sieht. Die Reiherbaize mit abgerichteten Falken ist eine besondere Lustbarkeit großer Herren. Daher auch in Sachsen ein Gesetz s. Codex Aug. III. S. 426. sie dem Landesherrn in manchen Provinzen vorbehält. Das Fleisch der Jungen ist wohlschmeckend, besonders in Pasteten; und es ist in einigen Gegenden ein bloßes Vorurtheil, daß man sie als Raubvögel nicht ist. In Pasteten soll es vorzüglich gut schmecken. Die Alten haben ein zähes und grobes Wildpret, das mit Eßig und Gewürz nur genießbar wird. Es hat einen sehr starken Fischgeschmack. Die Eyer sollen ebenfalls gut schmecken. Die langen Kopf- Hals- und Brustfedern benutzen die Feder schmücker zu mancherley Federbüschen. Die Flügel geben Weher zum Trocknen des gestärkten Carns und Zeuchs, auch Rehrbesen. Den Fischreichen werden sie, besonders zur Laichzeit, schädlich, und die Bäume, auf welchen sie sitzen, leiden von ihrem ähnden Unrathe. In der Jägersprache heißen die Weine Ständer, wie bey allen Sumpfvögeln. 2) Purpur-

reier, *A. purpurea* Linn.: ober gehäubter und glattköpfiger Purpureier, braunrother und purpurfarbener Reiher. Der Scheitel schwarz mit einem Federbüsche, der (bey Männchen) zwey herabhängende lange Federn hat; der Oberleib aschgrau mit olivengrünem Anstriche, der Unterleib rothbraun, mit purpurfarbenem Anstriche, 2 Fuß 10 Zoll lang. Er variiert, wie der gemeine Reiher, in der Farbe; denn die Jungen sehen am Oberleibe purpurbraun aus, am Unterleibe weißlich gelbbraun, und haben einen glatten Kopf, wie Hr. Bechstein aus Ungarn weiß, wo diese Vögel nisten (*Ardea purpurata* Linn.); dann wird der Unterleib hochroth oder röthelfarben ohne Purpurglanz. Man findet diesen Vogel einzeln am Rheine, der Donau, und andern deutschen Flüssen, auch in sumpfigen Wald- und Berggegenden — häufig am schwarzen Meere, in Ungarn u. s. w. Sie verstreichen sich im Herbst in mehrere Gegenden Deutschlands und ihre Nahrung ist, wie bey dem gemeinen Reiher. Hr. G. Becker hat an Hr. Bechstein über die Fortpflanzung dieses Reiher's folgende schöne Bemerkung mitgetheilt: Diese Vögel nisten nicht, wie der gemeine Reiher, auf Bäumen, sondern tief im Rohre verborgen. Des Nestes Structur ist merkwürdig; denn auf 8 bis 9 Fuß ins Gevierte waren von den Alten alle Rohrstengel an ihren Spitzen nach einem gemeinschaftlichen

lichen Mittelpunkte hingebogen, so daß diese zusammengebogenen Rohre eine außerordentlich feste Lage und eine ordentliche Decke bildeten, auf der ein Mensch, ohne einzusinken, festen Fuß fassen, und unterhalb welcher man, wie unter einer Halle, stehen konnte. Im Mittelpunkte dieser zusammengebogenen Rohrfenzugel war das Nest, welches aus einer mäßigen Vertiefung der zusammengelegten Rohre selbst bestand und mit dürren Rohrbältern ausgefüllt war. Von 4 im Neste befindlichen Jungen entschlüpfen zwei mit einer besondern Gewandtheit mittelst Eingreifung ihrer plumphen langen Lehen und Nägel durch das Rohr und die Schilfstängel. Sie hatten eine gräßliche Stimme, die einigermaßen dem Geschnatter der weiblichen Hausenten glich. An den beyden ausgenommenen Jungen war schon der Hals, wiewohl unvollkommen, gestrichelt, und bey einem erblickte man schon Spuren des Federbusches, während der andre glatköpfig war. 3) Weißer Reiher, *A. alba* Linn.: heißt auch: Großer weißer Reiher oder Rager, weißer Reigel, weißer Gelbschnabel, großer weißer Reiher ohne Federbusch. Mit glattem Kopfe, hochgelbem Schnabel und weißem Körper, $3\frac{1}{2}$ Fuß lang. Man findet ihn selten an der Donau und andern deutschen Flüssen auf dem Zuge, aber in Menge am caspischen und schwarzen Meere und die Nahrung ist wie beym gemeinen Reiher. 4) Schwarzer

Reiher, *A. atra* Linn.: Mit glattem Kopfe, nacktem Gesichte und schwärzlichem Körper. (Größe des gemeinen Reiher's.) Sein Wohnort sind Schlessien und die Lausitz. Vielleicht aber wechselt man ihn mit dem schwarzen Storch, denn außer den schwarzen Füßen unterscheidet ihn nichts von diesem. Wenn des jungen schwarzen Storches Schnabel und Füße nicht nach dem Tode olivengrünlich angestrichen worden (bey Alten bleibt doch die rothe Urfarbe unverkennbar), so sind sie in 8 bis 10 Tagen gänzlich schwarz. 5) Federbuschreiher, Großer Silberreiher, *A. Egretta* Linn. auch Silberreiher, türkischer und indischer Reiher genannt: Mit wenig merklichem Federbusch, weißer Farbe, und schmalen, über den Schwanz herausgehenden Schulterfedern. (Größe: 3 Fuß 2 Zoll lang). Er nimmt seinen Wohnort sehr selten in Deutschland an Flüssen und Seen auf dem Zuge. Seine Nahrung ist die gewöhnliche Reihernahrung, auch findet man sein Nest in Morästen im Rohre mit 4 bis 6 grünlischen Eiern. 6) Straußreiher, oder kleiner Silberreiher und kleiner weißer Reiher, *A. Garzetta* Linn.: Mit einem langen Federbusch am Hinterkopfe, silberweißer Farbe, und schmalen, über den Schwanz hinreichenden, Schulterfedern (Klein: 1 Fuß 11 Zoll lang). Er hat seinen Wohnort einzeln in Bayern, Oesterreich, Schlessien und der Lausitz an Flüssen und Seen, und

am Buge am Rheine
üringen. Er hat die
g wie andere Reiher
a Nest in schilfreichen
rien mit 4 bis 6 weißen
Eiern. B. Dickhalsige Rei-
her sind bey uns ebenfalls Ne-
ten, welche unter Nachtreiber
und Rohrdommel aufgeführt
worden sind.

Reiherbaise, oder Rei-
herbaise, ist eine Jagd zum
Vergnügen großer Herren, da sie
die Reiher mit Falken, Blau-
füßen oder andern abgerichteten
Raubvögeln fangen lassen. Die-
ses geschieht am besten bey schö-
nem und stillem Wetter, da man
mit dem Falken nach dem muth-
maßlichen Aufenthalte der Rei-
her reitet. Wenn nun die Stö-
berhunde einen Reiher auftrei-
ben; so wirft der Falkenier
den Vogel ab, welcher, so bald
er den Reiher gewahr wird,
wenn er bereits etwas genossen,
das Gewölle im wählenden Flie-
gen auswirft, dann aber so hoch
in die Höhe steigt, daß man
ihn kaum sehen kann, wobey er
jedoch den Reiher nicht zu be-
merken scheint; wenn er ihm
aber die Höhe abgewonnen, thut
er mit seinen starken Waffen
einen heftigen Anfall auf den
Reiher, giebt ihm einen Griff
und einen Fang, schwingt sich
wieder über, unter und neben
ihn her, bis er seinen Vortheil
ersieht, ihm von neuen bezu-
kommen, weil der Reiher den
Hals auf den Rücken legt, und
den spitzigen Schnabel über sich
hält, wodurch der Falke öfters

beschädiget wird, daher man bey
einem jungen Falken auch gern
noch einen Alten zu Hülfe nimmt.
Bisweilen wendet sich der Rei-
her mit dem ganzen Leibe, und
schwebet mit ausgespannten Flü-
geln in der Luft, bis er endlich
besiegt, mit dem Falken zugleich
herunterfällt. Zuweilen läßt man
den Reiher wieder loß, wenn man
ihm vorher einen blechernen Ring,
mit dem Namen der Herrschaft
und der Jahrzahl bezeichnen, an
ein Bein geschmiedet hat. Die
dabey üblichen Nebensarten sind:
Der Vogel wird an den
Reiher gelassen, er steigt
(wenn er auf ihn stößt), er wird
auf das Gefangene abgerich-
tet, und gekipet, er fällt in
ein ander Land, wenn er den
Raub verfehlet und einen fal-
schen Weg einschlägt.

Rein belegt heißt von einer
Hündin, wenn sie mit einem
Hunde von ihrer Race und Güte
ist bezogen worden.

Reine Fährte sagt man
vom Edelhirsche, wenn diese Fähr-
te nach dem Regen im Sande
rein stehen bleibt, welches bey
der Fährte des Thieres nicht ge-
schieht.

Reines Jagen heißt, wenn
nur einerley Art und zwar von
gleichem Alter und Geschlechte,
z. B. Hirsche oder Sauen, allein
gejagt werden.

Reißen oder Werfen nen-
net man beym Wolfe oder Luch-
se, wenn sie ihren Raub fan-
gen und niederziehen.

Reiß.

Reißgejagd, **Reißgejagd** ist eine, allen Rittergütern in den Oesterreichischen Erblanden zustehende Gerechtigkeit, vermöge welcher sie allerley Wildpret und Raubthiere, vom Rehe und Wolfe abwärts und alles Federwildpret, von der wilden Gans und dem Rebhuhn hinab, nach einen gewissen, in der Jagdordnung vorgeschriebenen Maassstaaße, schießen, hegen, oder bairgen dürfen.

Reilmasche heißt an Jägerzeugen eine Masche, deren Knoten beym Stricken nicht recht gemacht ist, und die Nadel mit dem Zwirne falsch durchgesteckt wird, so daß sich die Masche hin- und herziehet.

Reigen nennet man, wenn man, um einen Haasen, Fuchs oder auch einen Luchs zum Schusse herbey zu locken, die Stimme der Haasen, durch Blasen zwischen die zusammengelegten Spitzen des Daumens und Zeigefingers nachahmet, s. Fuchsfang.

Relais heißt bey der Parforcejagd ein Ort, wo frische Pferde und Hunde bereit stehen, um die, welche bis dahin die Jagd gemacht haben, abzulösen s. Parforcejagd.

Relanciren heißt bey eben dieser Jagd, wenn man den rechten Hirsch verloren hat, aber doch ohngefähr weiß, wo er zuletzt geblieben, oder wenn die Färthe für die Hunde bald zu alt und zu kalt wird, einige der besten Hunde aus der Meute

nehmen, und den Hirsch wieder auffuchen, und wenn diese den rechten Hirsch wieder anjagen, die übrigen Hunde auch wieder auf der Färthe anlegen, und zum Fange aufmuntern. S. Parforcejagd.

Retter, **Schirmer**, ist ein Windhund, welcher die andern Hunde von den gefangenen Haasen abtreibet, damit sie ihn nicht anreißen, auch oft den Haasen seinem Herrn apportiret. Wie er abzurichten, s. Windhund.

Reversjagd nennet man die Gnadenjagd von dem Revers, den der, welcher sie erhält, an den Jagd- oder Wildbannsherrn ausstellt. S. Gnadenjagd.

Revieren sagt man vom Hühnerhunde, wenn er im Felde fleißig sucht.

Richten heißt es eigentlich, wenn mit dem hohen Zeuche gestellt wird, und ist eben so viel als Einrichten.

Riegel wird der Wechsel oder Ort genannt, wo ein Wild gern hinkommt, oder hin- und herzieht.

Ringeltaube *Columba Palumbus* — oder große Holztube, Ringtube, Plochtube, große gemeine und gewöhnliche wilde Taube, Holz- Wild- und Schlagtaube, Waldtaube, und Kohltaube. Beym Linné gehört diese, so wie die Holz- Gemeine wilde- und Turzeltaube in die Ordnung der Eing-

Eingebögel; nach Latham aber machen die Tauben eine für sich bestehende Ordnung aus, die aber freylich alsdann nur eine Gattung enthält. Die Kennzeichen der Art sind: An beyden Seiten unten am Halse steht ein weißer halbmondförmiger Fleck; der Schwanz ist am Ende schwärzlich. Sie ist unter den milden Tauben die größte, siebenzehn und einen halben Zoll lang, wovon der zugerundete Schwanz fast sechs Zoll wegnimmt; die Breite der ausgespannten Flügel ist neun und zwanzig Zoll, und diese reichen bis zwey Zoll vor das Schwanzende. Der Schnabel ist neun Linien lang, gerade, vorn etwas abwärts gekrümmt, die Nasenhaut roth, weiß überpudert, das übrige röthlich weiß; der Augenstern weißgelb; die geschilderten Füße fleischroth; die Nägel schwarz; die oben etwas besetzten Schienbeine ein Zoll hoch. Kopf und Kehle sind dunkelashgrau; der Vorderhals und die Brust purpurashgrau oder weinröthlich; der Seiten- und Hinterhals schön taubenhalbig, d. h. blau, ins purpurrothe und glänzend grünspielend; an den Seiten des untersten Theils des Halses steht ein großer fast halbmondförmiger weißer Fleck, der nicht völlig um den Hals geht, und daher nur uneigentlich den Namen eines Ringes führt, wovon die Taube benennet ist; der Bauch, die Deckfedern der Unterflügel, die mittelmäßigen untern Deckfedern des Schwanzes und die Schenkel sind hell weißgrau, ersterer

auch kaum merklich purpurfarben überlaufen; die Seitenfedern hellashgrau; der Obrerrücken, die Schultern und kleinern Deckfedern der Flügel, die nach den Rücken zu stehen, ashgraubraun; der Mitterrücken und die kurzen Steißfedern hellashgrau; die Deckfedern der ersten Ordnung der Schwungfedern schwarz; die vordern großen Deckfedern der Flügel mit einigen darüberstehenden kleinern schön weiß, daher am vordern Flügelrande ein großer weißer Fleck entsteht; die übrigen großen Deckfedern hellashgrau; die vordern zehn Schwungfedern schwarzgrau, auswendig fein weiß gesäumt, und durch die zweyte bis zur siebenten inswendig weißgefleckt, die übrigen braungrau; die Schwanzfedern schmutzig dunkelashgrau, gegen das Ende zu ins schwärzliche übergehend, und, wenn man sie von unten besieht, in der Mitte mit einem breiten weißgrauen Bande durchzogen. Die Ringeltaube ist kleiner, der Schnabel mehr gelb als roth, der weiße Fleck an den Seiten des Halses nicht so stark, die Brust blässer, und die Deckfedern der Flügel ganz dunkelgrau. Varietät: 1) Die weiße Ringeltaube. Eine solche Varietät, welche bloß an der Brust etwas röthlich angefliegen war, habe ich vor einigen Jahren gesehen. Diese Taube ist wie die folgende scheu, und wie alle Tauben, nach Maassgabe ihrer Form sehr flüchtig, doch diese nicht so flüchtig als die folgende Holztaube. Sie liebt nicht die großen

großen Gesellschaften, wie die Holztäubchen, sondern etliche Familien schlagen sich mehrentheils nur zusammen. Die Heymath dieser Taube ist ganz Europa und Sibirien. In Deutschland trifft man sie in allen Waldungen an; wo sie es aber haben kann, zieht sie die Nadelwaldungen den Laubhölzern vor, eben so auch die Vorhölzer der in tiefen Gebirgen, damit sie nicht weit ins Feld zu fliegen hat. In Deutschland ist sie ein Zugvogel, der nach der Erndte im October wegwandert; sie kommt in der Mitte des März, allezeit aber zwey bis drey Wochen später als die Holztäubchen, zurück. Sobald die Erndte eintritt, fliegen sie in die Vorhölzer um den Aekern nahe zu seyn, wenigstens die ausgeflogenen Jungen, denn die Alten haben oft noch mit der zweyten Brut zu thun. Nach und nach verbinden sich im September mehrere Familien zusammen, so daß der Flug zwölf bis zwanzig Stück stark wird; so treten sie ihre Wanderung in warme Länder an, und kommen auch wieder so zurück. Ihre Nahrung besteht in Früchten, Tannen- und Kiefernsaamen, Bucheckern, Eichel, allen Arten von Getraide und Hülsenfrüchten, Hafer ausgenommen, und in Heidelbeeren, wornach ihr Fleisch sehr gut schmeckt. Zur Verdaulichkeit brauchen sie Steinchen. Sie girren oder ruffen zur Zeit der Paarung und bey heitern Tagen viel stärker als die Haustauben, aber auch viel einfacher, **K r u g u k u k**.

heulen auch, wie der zahme Tauber, wenn er die Täubin zum Neste ruft. Der Tauber macht auch gar possierliche Bewegungen, indem er bald vor- bald rückwärts und bald zur Seite springt, und den Kopf nach allen Seiten dreht. Die Täubin legt des Jahres zweymal zwey große längliche weiße Eyer, selten drey, und brütet sie in neunzehn bis zwanzig Tagen aus. Der Tauber trägt ihr, wenn sie bald legen will, eine Menge durrer Reisern auf einen Baum, sie legt sie nahe an den Stamm und rund um sich, und macht daraus ein sehr kunstloses, großes, flaches Nest, das von Stürmen, wenn es sehr hoch steht, viel zu leiden hat, und oft zu Grunde geht. Die Jungen werden aus dem Kropfe gefüttert, so wie sich beyde Gatten ihre Bärtlichkeit auch durch Füttern aus dem Kropfe zu erkennen geben. Der Tauber löst seine Täubin, so wie im Brüten, also auch in Versorgung der Jungen ab. Die ersten Jungen fliegen im May aus, die von der zweyten Brut zu Ende des Julius oder zu Anfang des Augusts. Die Waldmarder zerstören oft ihre Brut und mehrere Raubvögel, als der Habicht, Wänderfalk und Sperber verfolgen alt und jung. Auch findet man die Taubenläuse, die die Haustauben haben auf ihnen, besonders auf den Jungen. Sie sind außerordentlich scheu, und daher muß man mit List und durch Anschleichen schußrecht an sie zu kommen suchen; im Herbst merkt man

man die Bäume in den Fels-
hölzern, wo sie, wenn sie auf-
gejagt werden, aufsitzen, stellt
sie in die Gegend und schießt
sie. Sonst stellt man eigene
Heerde mit Schlagwänden
für sie auf. Sie gehen, wie die
Holztauben, am liebsten zwi-
schen eif und ein Uhr auf den
Tränkheerd, sind aber sehr
behutsam dabey; nach Sonnen-
untergang kommen sie auch zu-
willen. Das Wildpret der
Jungen giebt ein sehr schmack-
haftes Essen. Man sucht sie
daher gern in Nestern auf; die
alten haben ein trocknes und zä-
hes Fleisch. In Waldbegenden
bauen sie auf dem Getraide, das
sie gelegt hat, so wie die zah-
men Tauben, Schaden; am
schädlichsten werden sie aber in
Nadelwäldern im Frühjahr der
Fichtenfaat, die man deshalb
mit Fichtenreisern belegen muß,
wenn sie nicht die Körner ausles-
sen sollen. Lieber sollte man auf
sie als auf die Eulen Schießgelb
legen.

Ninkentuch sind solche Lü-
cher zu Jagdzeugen, welche kein
Gemäße haben, sondern wo die
Reinen in Riemen gehen.

Ninne, Nönne, ist ein
leichtes Garn, zum Fange der
Raubvögel. Es ist etwa 5 bis
6 Maschen lang, und 17 bis 18
Maschen hoch von ganz festem
Bzwirne über einen Haasengarn-
stock gestrickt; um und um statt
des, in andere Garne gehören-
den Saumsgarnes, eingebörtelt,
und mit einer Erbsenfarbe gefärbt,

damit der Raubvogel sie nicht
von ferne sehen könne. Von die-
sen Netzen werden vier Netze auf
vier gerade in's Gevierte gestell-
ten hohe Schwunggerten, wie man
zu Angelruthen gebraucht, ganz
leise in eine unter sich geschnit-
tene Kerbe, daß man kaum das
Holz von der Schaale verschnei-
det, aufgehangen; in der Mitte
wird zwischen diesen Netzen eine
weiße Taube, oder dergleichen
Henne, angepflockt. Wenn nun
der Raubvogel auf diese Lockspei-
se stoßen will, verwickelt er sich
in den Netzen. Doch fängt man
gewöhnlich nur junge, selten aber
alte Raubvögel darinnen, s. Ha-
bichtsrinne, Habichtsfang.

Nitter ist eine Art von
Windhunden, s. d. Wort.

Nitterliche Thiere nen-
net man die wilden Sauen in
eben dem Verstande, als man
den Hirsch edel nennet.

Nöhre heißt jeder Eingang
eines Fuchs- oder Dachsbaues.

Nohrdommel, dickhä-
figer Reiher — *Ardea Stel-
laris* — gehört mit dem Nach-
reier und den fünf unten ste-
henden Arten in die zweite
Familie der Reihergattung
als eine besondere Art und heist
auch gemeine Nohrdommel,
große Nohrdommel, Sp-
rump, Nohrtrummel, Was-
ferochs, Faule, Nohrdump,
Moosochse, Mooskrähe,
Moosreier, Nohrbrüller,
U. s. oder Urind, Meer-
Moos-

Moos- und **Lorwind**, **Kohr-**
pompe, **Erdbull**, **Moos-**
kuh, **Hörtyhel** und **Moos-**
reigel. Die Kennzeichen dieser
 Art sind: der Kopf ist fast
 glatt; der Rücken rostgelb,
 der Bauch heller, jener in
 die Quere und dieser in
 die Länge gestreift; die
 Halsfedern stark, an un-
 tern Vorderhalse am läng-
 sten, dicht und aufgeschwol-
 len. Von den übrigen Rei-
 hern weicht er in der Gestalt durch
 seine kürzern Beine und durch
 die dicken, aufgeschwollenen Fe-
 dern sehr starken Hals ab; ist
 ihnen aber in seinem Betragen
 sehr ähnlich. Die Länge ist zwey
 Fuß vier Zoll, wovon der Schna-
 bel drey und einen halben und
 der Schwanz vier und einen hal-
 ben Zoll wegnimmt; die Breite
 fast vier Fuß; die Schwingen
 berühren zusammen gelegt die
 Schwanzspitze. Der Schnabel ist
 stark, gerade, scharf zugespitzt,
 braun, unten etwas grünlich;
 der Augenstern rothgelb; die Füße
 hellgrün, bey jungen graugelb;
 die geschälberte Fußwurzel vier
 Zoll hoch; die Klauen hornbraun.
 Der Oberkopf ist dunkel schwarz-
 braun und hat am Hinterkopfe
 längere Federn als gewöhnlich,
 doch bilden sie keinen merklichen
 Federbusch; die Wangen, der
 Hinter- und Seitenhals sind
 rostgelb, zickzackförmig dunkel-
 braun fein und unterbrochen in
 die Quere gestreift; die großen
 nackten Flügel schmutzig gelb;
 vom Schnabel geht auf beyden
 Seiten ein schwarzbrauner Strei-
 fen herab; die Halsfedern sind

stark, lang, am untern Vorder-
 halse am längsten, stehen dicht
 und aufgeschwollen, sind oben
 auf blasgelbem Grunde mit ei-
 nem Gemisch von rostbraun und
 schwarz unordentlich in die Que-
 re gestreift; und vorne laufen
 von der gelblich weißen Kehle
 an in der Mitte herab zwey Rei-
 hen verglichen großer Flecken;
 der Rücken, die langen Schul-
 terfedern, und die Deckfedern der
 Flügel sind rostgelb und rost-
 roth gemischt mit schwarzbrau-
 nen Flecken und Querstreifen;
 durch die schwarzen Flecken und
 Streifen entstehen bey zusammen-
 gelegten Flügeln auf dem Rük-
 ken herab große lange Flecken
 wie Bänder; die kleinen Deck-
 federn an dem Flügelwinkel sind
 rostfarben und egal dunkelbraun
 gewellt; die mittelmäßigen Steiß-
 federn rostgelb, schwärzlich un-
 gleich und winklich bandirt; die
 langen Bauchfedern gelblich weiß
 mit länglichen, einzelnern dun-
 kelbraunen Flecken; die vordern
 Schwungfedern dunkelbraun, blau-
 lich angelaufen und mit schö-
 nen rostrothen Querverbinden; die
 hintern wie die großen Deckfe-
 dern der Flügel; von den rost-
 gelben Schwanzfedern sind die
 beyden mittlern schwärzlich, röth-
 lich gerändert, die übrigen un-
 ordentlich dunkelbraun gefleckt,
 und winklich in die Quere ge-
 streift. Am Weibchen sind
 weder die Halsfedern so lang und
 dick, noch ist der Scheitel so
 schwarz, der Leib aber dunkler
 gefärbt und gefleckt. Es ist ein
 träger Vogel, der ganze Tage
 lang auf einem Fleck stehen
 bleibt,

bleibt. Bey Gefahr streckt er den Hals, den er sonst sehr einzieht, mit dem Schnabel und dem ganzen Körper gerade in die Höhe, und steht unbeweglich da, lehnt ihn auch wohl an einen Schilfstengel an, und der Jäger geht daher oft vor ihm, als vor einem zugespitzten Pfahl oder alten Strunk vorbei. Er sieht in dieser Stellung, wie am Schnabel aufgehangen aus, und gewährt einen sonderbaren Anblick. Er steigt hoch in die Luft, und nimmt besonders gegen Abend seine Wanderungen vor. Wenn er aufsteigen will, so hüpfet er, wie der Storch, einige Schritte auf der Erde hin, um die Flügel in Bewegung zu setzen, beschreibt alsdann einige Kreise, und gewinnt so die Höhe. Er fliegt, wie der gemeine Reiher, mit zusammengelegtem Halse. Merkwürdig ist sein Geschrey, daß er, zur Zeit der Paarung und bey Veränderungen des Wetters, oft ganze Nächte durch hören läßt. Es ist sehr stark, da er seine Kehle außerordentlich aufblasen kann. Bey stiller Nacht hört man dieß dumpfe Gebrüll: *T-prumb hu hu!* das er mit kleinen Prausen drey bis viermal ausstößt, auf eine halbe Meile weit, und er hat damit schon manchem Wanderer Schrecken eingejagt. Eine ungegründete, alte Sage aber ist es, daß er dabey den Schnabel ins Wasser oder in den Morast stecke. Noch eine andere Stimme läßt er zuweilen hören, die fast wie das Geschrey des Raben klingt. Hat man ihn in Furcht, oder Zorn

gebracht, so stellt er sich in *Postur*, kränkt die Federn fürchterlich, zieht den Hals ein, sperrt den Schnabel weit auf, und zwar mit der Miene, als wenn er nach den Augen zielt. Er wehrt sich alsdann, wenn er Widerstand findet, mit seinem Schnabel gegen alles, was ihm angreift, heftig, und macht daher den Falken, die auf ihn abgerichtet werden, viel zu schaffen, indem er ihnen nicht nur mit schneckenlinienmässigem Fluge aus dem Gesicht zu kommen sucht, sondern sie auch in der Noth mit seinem spizigen Schnabel stark, ja oft tödtlich, verwundet. Dieser Vogel lebt in Europa, dem nördlichen Asien und auch vielleicht im nördlichen Amerika. In Deutschland ist er eben nicht selten. Er lebt an großen Flüssen, die ausgetretene, sumpfige und schilfriche Stellen haben, an Seen und großen Teichen. Sobald im Frühjahre das Eis aufbricht, ist er da, im September zieht er aber schon in Gesellschaft seiner Jungen weg. Seine Nahrung besteht in Fischen, Fröschen, Muscheln, Wassermäusen und allerhand Wasserinsecten. Er sitzt daher beständig in Sümpfen und seichten Wassern mit eingezogenem Halse, und schnell diesen blizschnell, wie aus einer Scheibe, nach dem Thiere, das ihm in die Nähe kommt, tödtet es mit einigen Stichen, die er ihm mit seinem spizigen Schnabel giebt, und verschluckt es ganz. Er legt nicht, wie der gemeine Reiher, sein Nest auf Bäumen an, sondern in schilfigen und rothi-

rehrigen Seen, Sümpfen und Teichen auf trocknen Rasen und Hügeln, baut es aus Röhren, Schilf und andern Reisern zusammen und legt drey bis fünf schmutzig blaßgrüne Eyer in dasselbe. In fünf und zwanzig Tagen kommen die Jungen zum Vorschein, und laufen sogleich mit den Alten davon. Einige Jäger behaupten sogar, daß sie oft, wenn es nöthig wäre, ein schwimmendes Nest machten, welches sie an das Rohr oder Schilf, wie die Taucher, befestigten. Die Jungen lassen sich mit Fröschen sehr gut aufziehen, und reinigen alsdann die Gärten von Kröten, Eydechsen, Schlangen und Insecten. Die Kalkrazen und Rabenkrähen gehen nach den Eynen, und mehrere Raubvögel stoßen auf ihn, er macht ihnen aber durch die Stärke seines Schnabels viel zu schaffen. Außerlich plagt sie die Reiherläus und innerlich Egelwürmer. Es ist diesem Vogel im Wasser und in Sümpfen schwer bezukommen. Doch fällt er einem aufmerksamen Jäger, der auf sein Geschrey zu achten weiß, das meistemal durch den Schuß in die Hände. Wenn er nicht tödtlich verwundet ist, so wehrt er sich mit heftigen Bissen gegen den Schützen. Wenn man seinen Gang weiß, so kann man ihn auch in Schlingen und Klebgarnen fangen. Sonst baigten ihn große Herren mit Falken. Der Schaden ist vorzüglich aus der Nahrung ersichtlich. Bey uns ist man das Fleisch nicht gern; hinge-

gen in London wird dieser Vogel auf den Märkten verkauft und sein Fleisch für einen Pfefferbissen gehalten. Die lange Hinterklaue pflegt man in Silber eingefaßt als Zahnstocher zu brauchen. Hierher gehören auch noch folgende Arten: 1) Die kleine Rohrdommel, *Ard. minuta* — oder kleiner Reiher, kleine Mövstuh, kleiner brauner Rohrdommel, der kleine Rohrdommel aus der Barbaren, kleine gestirnte Reiher aus der Barbaren, grüngelber Reiher, Staudenragerl und Rohrtump. Die Kennzeichen der Art sind: Der Kopf ist glatt und schwarz so wie der Schwanz, grünglänzend; die Hauptfarbe des Oberleibes braun, des Unterleibes gelblichweiß. Die Größe ist ohngefähr wie bey dem grünsüßigen Meerhuhn; die Länge vierzehn Zoll; die Breite ein Fuß neun Zoll; der Schnabel zwey und einen halben Zoll und der Schwanz zwey und ein Viertel Zoll lang; die Flügelspitzen legen sich auf der Schwanzspitze zusammen; der Schnabel ist gerade, an den Seiten gedrückt, spitzig, grüngelb, an der Spitze schwärzlich; der Augenstein orangengelb; die Füße hellgrün und geschildert drey Zoll hoch. Der Scheitel und Rücken sind schwarz und glänzen ins Grüne; die Bügel nackt und gelblich; der lange Hals ist oben, so wie die Wangen, rostfarben ins Kastanienbraune übergehend; die Deckfedern auf dem Rücken

der

der Flügel und die großen Deckfedern hellbraunroth, die übrigen Deckfedern blas lehmiggelb; die untere Seite des Halses, mit ihren langen Federn, die Brust und die Hüften gelblich weiß; die Brust länglich schwarz gefleckt und erhält dadurch gleichsam ein schwarzes Querband; der Bauch und der After weißlich; die vordern und hintern Schwungfedern dunkelbraun, letztere mit rostfarbiger Spitze und Einfassung, und erstere auf der Außenseite grünlichglänzend; die zwölf Schwanzfedern schwarz, und grünlichglänzend. Das Weibchen ist etwas kleiner, hat oben einen dunkelbraunen, unten einen gelblichen Schnabel; der Scheitel ist schwarz, grünlichglänzend; die Stirn kastaniendraun umzogen; der Oberleib dunkelbraun, die Federn rostfarben gerändert; der Unterleib bis auf den weißen Bauch röthlich, alle Federn in der Mitte mit dunkelbraunen Flecken; der Schwanz schwarzgrün mit rostfarbener Spitze. Der Körper dieses Vogels ist sehr schmal. Dieser Vogel hat fast alle Eigenschaften mit dem großen Rohrdommel gemein, und richtet den Schnabel und ganzen Leib, wenn er auf einem Baume sitzt, und jemanden bemerkt, so grade in die Höhe, daß man ihn für einen spitzigen Ast ansieht. Er verbreitet sich in Europa, Asien und Amerika sehr weit. Er geht bis Jamaika herab, und überwintert vielleicht auch daselbst. In Deutschland kommt er allenthalben, aber nur einzeln, vor. Er ist ein Zugvogel, da man

ihn im August an solchen Orten antrifft, wo er im Sommer nicht gesehen wird. Seine Nahrung besteht vorzüglich in Wasserinsekten, Blutigeln, Schnellen, kleinen Fröschen und Fischbrut. Sein Nest steht in der Nähe eines Flusses oder Sees auf dem Boden, ist aus Schilf, Reiser, Gräsern zusammengesetzt und enthält vier bis sechs weiße runde Eier. An den Jungen hat die schwarze Farbe keinen Glanz; Brust und Bauch sind gelblich, mit einem graubraunen Striche auf jeder Feder, und der Oberleib ist graubraun mit gelblichen Federrändern. Mehrere Raubvögel stoßen auf Ast und Jung. Man muß sich zum Schuß an sie zu schleichen suchen. Der von ihnen verursachte Schaden ist von keiner Bedeutung. So viel man weiß, ist man das Fleisch nicht. 2) Schwäbischer Reiher, A. Marsigli, Gmelin Linn. auch kleine Mooskuck, grüngelber Reiher, Rohrdommel genannt: Mit glattem Kopfe, rostgelbem, oben dunklerem, unten hellerem Körper mit schwarzlichen lanzetförmigen Strichen, weißer Kehle und Schwanz. (Kleiner als die Rohrdommel). Er hat seinen Wohnort an der Donau in Schwaben, Bayern — zieht weg, und hat eben die Nahrung wie obiger. 3) Gestrichelter Reiher, A. danubialis, Gmelin Linn.: Mit glattem Kopfe, dunkelbraunem Körper, der mit schwarzen und röthlichen Linien gestrichelt ist, und weißem Hals und Brust. (Größe von

von der kleinen Rohrdommel. Er hat seinen Wohnort an der Donau. Ob dieser und der folgende nicht mit dem Vorhergehenden, oder gar mit dem kleinen Rohrdommel verwandt ist? Herr G. Becker schreibt darüber an Herrn Beckstein: Es ist wohl mehr als wahrscheinlich, daß diese bisher als Arten aufgeführten Vögel, bloß Altersverschiedenheiten von *Ardea minuta* sind. Ich habe mehrere unbezweifelte Junge dieser Art gesehen, die mehr oder weniger mit den Beschreibungen, die man freylich als unvollkommen von *Ardea Marsigli*, *danubialis* und *badia* hat, übereinstimmen. Es läßt sich freylich mit völliger Gewißheit nur wenig über derley Gegenstände bestimmen, da aus angebörner Schlaus- und Scheuheit sie sich selbst und ihre Wohnplätze unsern Augen sorgfältig zu verbergen wissen. 4) Kastanienbrauner Reiher, *A. badia*, Gmelin Linn.: Mit glattem Kopfe, kastanienbraunem Oberleibe, schmutziggroßem Unterleibe, und einem weißen Längsstreifen von der Gurgel bis zum Bauche. (Größe der Nebelkrähe.) Er hat seinen Wohnort: In Schlesien und in der Lausitz. 5) Kallenreier, *A. comata*, Gmelin Linn. oder kleiner Reiher und Sqaadoreier. Oben rostroth, unten weiß, mit weißem Steiße, und am Hinterkopfe mit einem sehr langen herabhängenden weißen schwärzlich gesäumten Federbusche, 14 Zoll lang. Er variirt in der Farbe

des Oberleibes, bald heller, bald dunkler, also bald rostfarben, bald kastanienbraun. Er nimmt seinen Wohnort an der Donau, auch in Thüringen an Flüssen und Seen, aber selten auf dem Buge.

Rohrfänger — *Sylvia* oder *Motacilla Salicaria* — gehört als eigene Art in die Gattung Sänger und zwar unter die Familie der Wurmfräser und heißt auch noch Rohrsperling, Schilfschmäher, Weidengucker, Rohrgrasmücke, Rohrschleifer, Schilfbornreich, Weidenmücke, kleine braungelbe Grasmücke, Wyderle und Zepste. Er hat über dem Auge eine weiße und schwarze Linie; der Oberleib ist rostgelb, schwarz gefleckt; der Steiß lohgelb, schwarz gestrichelt; der Unterleib röthlichweiß; der Schwanz etwas keilförmig und alle Federn, fast wie am Baumläufer, zugespitzt. Die Länge beträgt 4½ Zoll. Er variirt etwas im Alter; denn die Jungen sind in der Grundfarbe heller und die Alten dunkler fuchseroth. Er wohnt im Rohre, Schilf und Gebüsche am Gewässer und wandert einzeln weg. Die Nahrung besteht aus Waserinsecten und das Nest findet man im Rohre oder Gebüsche mit 5 schmutzig weißen, braunmarmorirten Eiern.

Kollen ist das Begattungs- geschäft der Füchse und anderer Raubthiere, und daher die Kollzeit die Zeit, in der dieses vorkommt. Rofe,

Rose, Rosen, Rosenstock ist die Stelle auf dem Kopfe des Hirsches, wo das Geweih aufsteht, wovon der krause Ring am Untertheile jeder Stange insbesondere die Rose genennet wird. Wenn die Rosen dicht auf dem Rosenstocke wachsen, und nebst den Stangen recht stark und krause sind, so zeigt es ein hohes Alter des Hirsches an.

Rost ist das angehende Verderbniß des Eisens und anderer Metalle; die davon nach und nach zerstreßen werden und ihren Grund in äußerlicher Feuchtigkeithaben. Eisen, und vorzüglich Gewehr dafür zu verwahren, schmieret man es gewöhnlich mit Baumöl ein, weil dieses aber noch immer wägrige Feuchtigkeiten bey sich hat, so gieße man, um ihm diese zu benehmen, Bley in das Del, lasse es darinnen abkühlen, und ein Stück darinnen liegen, wenn man es zum Gebrauche aufhebet. Oder man reibe Bleyglätte in klarem Baumöl auf einem Steine ganz fein, thue es in eine dünne und durchscheinende Büchse von Lindenholz, und hänge es an einen warmen Ort, so lange bis ein reines Del durchbringt, das man in einem untergesetzten Gefäße aufängt, und das Gewehr damit einschmieret. Gezogene Röhre, die man lange nicht brauchet, kann man zur Verwahrung für den Rost mit reinem zerlassnem Schöpfseff vollgießen. Auch kann man alles Eisenwerk um es für Rost zu verwahren, alle Monate mit Speck einschmieren. Ist der Rost schon im Eisen, so nehme man 4 Loth

Ziegelmehl, 2 Loth Trippel und 1 Loth Stahlfeilspäne, vermische es mit einander und schenke das Eisen damit. Auch Weinsleinöl nimmt den Rost weg und giebt ihm einen hellen Glanz.

Rothkehlchen oder **Rothkehliger Säger**, gehört mit dem Rohrsänger in eine Gattung und Familie als besondere Art — *Sylvia s. Motacilla Rubecula* — und heißt auch: Rothkehl, Rothbrüstchen, Rothkröpfchen, Waldröthlein, Waldröthchen, Rothbarth, Kehlrothchen, Rottkröpflein, Rottbrüstlin, Rotelein, Winterrotelein und Hausröthlein. Es unterscheidet sich von den übrigen Arten durch den schmutzig olivengrünen Oberleib und die orangerothe Kehle und Brust. Man kennt diesen Vogel überall, wo Hecken und Büsche sind, wenigstens sieht und fängt man ihn dann auf seinem Zuge. Er ist $5\frac{1}{2}$ Zoll lang, wovon der Schwanz $2\frac{1}{4}$ Zoll mißt. Der 5 Linien lange Schnabel ist hornbraun, die Wurzel und der Nachen gelb; der Augenstern und die Füße sind schwarzbraun und 11 Linien hoch. Stirn, Wangen und Unterleib bis zum Bauche sind tief orangenroth; der Oberleib mit den Deckfedern der Flügel schmutzig olivengrün; Steiß, Seiten und After heller; die Seiten des Halses und der Brust schön hellgrau; der Bauch weiß; die Schwung- und Schwanzfedern olivengrün gerändert; die vordern großen Deckfedern der Flügel mit gelben dreyeckigen Punkten

ten an den Spitzen, die von den Vogelkallern Spiegel genannt werden. Das Weibchen ist nur von dem Kenner zu unterscheiden. Es ist etwas kleiner; an der Stirn nicht so breit orange-roth; an der Brust blässer; die Füße sind fleischbraun, und mehrtheils fehlen die gelben Spiegel. Uebrigens hat es auch fleischbraune Füße. Dieser Vogel variiert in der Farbe, und die Jungen sind am Oberleibe olivengrau schmutzig gelb gestrichelt und gefleckt, und am Unterleibe schmutzig gelb mit olivengrauen Federrändern. Es giebt auch nachstehende Varietäten: 1) Das weiße Rothkehlchen. Ganz weiß. 2) Das weißbrüstige Rothkehlchen. Stirn, Kehle, Brust und Bauch weiß. 3) Das bunte Rothkehlchen. Mit unordentlichen weißen Flecken, auch weißen Theilen des Körpers. Ein munterer Vogel, der beständig in Bewegung ist, den Schwanz in die Höhe schlägt und Bewegungen macht. Er lockt immer Sisi, sifisri! Der Gesang, den es gern auf dem Gipfel eines mittelmäßigen Baums verrichtet, klingt melancholisch und in der Abend- und Morgenbämmerung vorzüglich angenehm. Es ist sehr zänkisch und leidet im Freyen keinen Kameraden neben sich, geschweige denn im Zimmer, wo zwey zusammen, die frey herum laufen, beständig im Streite leben, und jeder seinen Winkel zu vertheidigen sucht. Das schwächere muß oft mit dem Leben bezahlen. Man trifft diesen Vogel in ganz

Europa an. Er ist in Waldgegenden, besonders in gebirgigen sehr gemein. Im October gehen sie als Zugvögel weg, und man trifft sie alsdann bis zum November in allen Wäldern, Büschen, Gärten und Hecken an. Sie scheinen nur von einem Walde und Gebüsch zum andern zu gehen. Einzelne sind sogar in gelinden Wintern anzutreffen, wo sie alsdann in die Nähe der Häuser kommen, und in den Hecken, Holzstöcken und Stäbchen ihr Futter suchen. In der Mitte des März sind sie wieder da, und liegen dann lange Zeit in den Säunen und Hecken, ehe sie in die Berge gehen, die gewöhnlich noch hoch mit Schnee bedeckt sind. Es kommen, wie fast bey allen Zugvögeln, auch die Männchen 14 Tage früher als die Weibchen. Ihre Nahrungsmittel machen Insecten, Fliegen, Mücken, Hasen, Käupchen, kleine Nachfalter ic. Regenwürmer, und allerhand Beeren, Johannisbeeren, rothe und schwarze Hollunderbeeren, und im Nothfalle im Winter auch Spindelbeerbaum Früchte aus. Im Zimmer nehmen sie mit allem Vorliebe, was auf den Tisch kommt. Sie baden sich sehr gern. Sie nisten des Jahrs zweymal ins Moos, in Klüften und Ritzen, auch in hohle Baumstrünke. Das Nest besteht äußerlich aus Erdmoos, und ist inwendig mit einigen Grashalmen, Thierhaaren und Federn ausgefüttert. Es enthält 4 bis 7 Eier, die auf gelblichweißem Grunde einzelne rothgelbe zerflossene Punkte und

und Striche haben, die sich am obern Ende in einen hellbraunen Ring verwandeln. Sie werden von beyden Eltern vierzehn Tage lang bebrütet. Die Jungen sind bis zum ersten Mausern dunkelgrau und, durch die schmutzig gelbe Einfassung aller Federn, gelb gesprenkelt. Sie verlassen vor den Raubthieren das Nest ehe sie noch fliegen können. Füchse, Marder, Iltisse, Wiesel u. dgl. gehen nach der Brut, und Sperber, Thurm- und Baumfalken verfolgen die Alten auf ihren Wanderungen. Sie werden auch von Milben und Lausfliegen (*Hippobosca*) geplagt. Sie lassen sich mit der Flinte sehr nahe kommen. Im Herbst fängt man sie in Spreukeln und in der Schneuß sehr häufig. Sie gehen auch auf die Kloben und Leimruthen in den Weisenhütten. Im Frühjahr, wenn sie in Hecken und Bäumen auf ihren Wiederrüge sind, so steckt man einige lange Stöcke quer aus der Hecke, besteckt diese mit Leimruthen, und zwey Personen schlagen dann leise an die Hecken und jagen die Rothkehlchen auf die Leimruthen. Diese sind nämlich gewohnt auf alle aus der Hecke herausstehende niedrige Reiser sich zu setzen, um von da auf die Erde nach den Insekten und Regenwürmern sehen zu können. Man nennt das in Thüringen die Rothkehlchensjagd. Wenn man an eine solche Hecke, wo sie sich aufhalten, einen bloßen wunden Platz macht, Regen- oder Mehlwürmer darauf wirft

und ihn mit Leimruthen besteckt, so fangen sie sich ebenfalls leicht, wenn man sie dahin treibt. — Sie gehen auch nach diesen Lockspeisen ins Nachtigallengarn und in den Weisenschlag. Auf dem Tränkeherde sind sie ebenfalls Abends, Morgens und Mittags zu fangen. Das Fleisch schmeckt vortreflich. Sie nützen auch im Haushalte der Natur durch Wegfangung schädlicher Fliegen und anderer Insekten.

Rothschwänzchen ober schwarzkehliger Sänger — *Sylvia s. Modacilla Phoenicurus* — heißt auch gemeines Rothschwänzchen, Rothschwanz, Rothstert, Rothstertchen, Rothbrüßlein, Gartenrothschwanz, Gartenrothschwänzchen, Röthling, Gartenröthling, Hundrothlein, Rotzägel, Schwarzkehlchen, Mauernachtigall, schwarzkehlige Mauernachtigall, Waldrothschwänzchen, Bienen Schneppe, Rothzahl, Hünting, Rothstiert, Wüstling, Rothkehlchen mit schwarzem Kinn, Rothbüchlein, Waldrothscheißl, Rotzägel, Sommerrotel, Hausrothschwänzchen, Saulecker, Wistling, Frischchen. Es gehört mit dem Rothkehlchen unter eine Familie als eigene Art, welche sich dadurch unterscheidet, daß das Männchen oben dunkel- aschgrau; die Kehleschwarz; die Brust und der Schwanz roth-

rostroth, das Weibchen oben röthlich aschgrau; die Kehle weiß; die Brust schmutziggroßfarben, weiß gewölkt; der Schwanz rostroth ist. Es ist so groß als ein Rothkehlchen, fünf und ein Viertel Zoll lang, wovon der Schwanz zwey und ein Viertel Zoll mißt. Der Schnabel ist fünf Linien lang, rund zugespitzt, schwarz, an den Ecken und inwendig gelb; der Augenstern schwarz; die Füße ebenfalls; die Schienbeine zehn Linien hoch. Der Vorderkopf ist weiß; eben so ist ein Streifen über den Augen; der Oberleib dunkel aschgrau, röthlich überlaufen; der Steiß rostroth; Brust, Seiten und Oberbauch rostroth, letzterer weiß gewölkt; der Unterbauch und After rostgelb; die großen Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern dunkelbraun, rostgelb eingefärbt; der Schwanz rostroth, die beyden mittlern Federn dunkelbraun. Das Weibchen ist oben röthlich aschgrau, unten schmutzig roßfarben, weiß gewässert, am Bauche schmutzig weiß. Erst nach dem ersten Mausern bekommen die Männchen diese bestimmte Kleidung, denn vor der Zeit sehen sie am ganzen Leibe aschgrau und weißgeschuppt aus. Es ist ein unruhiger Vogel, der stets in Bewegung ist, herum hüpfet oder fliegt, sich immer bückt und den Schwanz hin und her, auf und nieder schüttelt. Im Herbst und Frühjahr ist er in niederm Gebüsch, im Sommer aber auf den Bäumen, und wo er in der Nähe der Häuser wohnt, auf

den Mauern und Dächern. Seine Lockstimme ist ein helles Hüt, hüt hüt, die dit! und ein schmelzendes Tzä. Er singt auf den Gipfeln der Bäume und Dächern den ganzen Sommer hindurch einige nicht unangenehme Strophen. In der Stube ist er so zärtlich wie die Nachtigall. Er wohnt in ganz Europa und dem nördlichen Asien. Er gehört zu den Zugvögeln, der uns in der ersten Hälfte des Octobers verläßt, und zu Ende des März und Anfang des Aprils wieder kommt. Dann ist er vorzüglich in den Gartenzäunen anzutreffen. Im Sommer ist er in Feldhölzern, Gärten, wo Weidenbäume stehen, auch in tiefsten Laubwäldern. Diejenigen, welche in Gärten wohnen, gehen auch auf die Häuser, und bauen in denselben und in alten Mauern ihr Nest. Sie fressen mehrere Arten von kleinen kriechenden und fliegenden Insekten, Regenwürmer, Johannis- und rothe und schwarze Holzkunderbeeren. Sie nisten des Jahrs zweymal in Baumhöhlen, Felsentigen, Mauern, Löchern und unter den Dächern. Das Nest ist eine schlechte Unterlage von Federn, Grasshalmen und Haaren. Das Weibchen legt sechs bis acht schön hell blaugrüne Eyer, und brütet sie mit dem Männchen in 14 Tagen aus. Katzen und Wiesel suchen die Brut auf; deswegen die Jungen auch sehr früh aus dem Neste hüpfen. Sie sind mit der Flinte leicht zu schießen. Im Frühjahr treibt man sie

wie die Rothkehlchen, auf Stöcke, die auf einen lebendigen Zaun gestellt und mit Reimruthen besetzt sind. Sie gehen auch durch eine Kirsung von Mehlwürmern auf einen bloßen Platz unter die Reimruthen und in Fallgärnchen. Im Herbst werden sie in Feld- und Vorhölzern und in Gärten häufig in der Schneuß und in Spreukeln gefangen. Sie sind mit dem Rothkehlchen die vorzüglichsten kleinen Schneußvögel. Sie gehen auch leicht auf den Tränkheerd. Ihr Fleisch schmeckt sehr angenehm und ist gesund. Sie fangen auch mehrere schädliche Insekten weg. Da, wo sie nahe an einem Bienenstande wohnen, fangen sie zur Zeit, wenn sie Junge haben, und kalte Witterung einfällt, viele Bienen weg; man muß also durch Scheufale sie davon abzuhalten suchen.

Rothwild — Cervus Elaphus — ist unter den jagdbaren Thieren dasjenige, das wegen seines schlanken proportionirten Wuchses, seines großen, gelenkigen und gewandten Körpers, seiner festen und lenksamen Schenkel, und seines ansehnlichen Kopspizes alle Waldthiere an Schönheit und Majestät übertrifft, und welches der vorzüglichste Gegenstand der prächtigsten Jagdblustbarkeiten ist, hat auch vorzüglich deswegen den Namen Edelmild erhalten. Das Männchen heißt der edle Hirsch, Edelhirsch, Rothhirsch, Hirschbock, Hirschböll, und das Weib-

chen das Wild, Stüdwild, Thier, und die Hindin; auch Hirschkuh. Nach der angenommenen Linneischen Eintheilung gehört das Rothwild in die fünfte Ordnung, unter die wiederkäuenden Thiere, nach der Blumenbachischen in die neunte Ordnung unter die Thiere mit gespaltenen Klauen und nach einer verbesserten Pennantschen in der ersten Ordnungszweiten Abschnitt unter die zweyhüfigen Thiere; bey allen aber unter die Hirschgattung und wird zur hohen Jagd gerechnet. Die Kennzeichen der Art bestehen in folgenden: Die Geweyhe sind ganz rund, rückwärts gekrümmt, ästig und haben Augensprossen; und vor den Augen ist eine Thränenhöhle. Der ganze Körperbau des Hirsches ist hoch und langgestreckt, weißlich zum Laufen und Springen eingerichtet. Er wird oft sechs Fuß lang, drey und einen halben Fuß hoch und der Schwanz, oder die Blume, hält gewöhnlich zehn Zoll. Seine Größe, noch mehr aber seine Schwere, richtet sich nach der Gegend, die er bewohnt, und vorzüglich nach den Nahrungsmitteln, die er hat. Man trifft ihn 300 bis 400 Pfund schwer an, doch weiß man auch Beispiele, daß einer 5 bis 8 Centner gewogen hat. Der Kopf ist im Verhältniß gegen den übrigen Körper klein und länglich; das Stirnblatt lang und dick. Die Ohren sind ziemlich groß, eprund

eyrand zugespitzt, und stehen weit auseinander; sie richten sich bey dem geringsten Geräusch auf, um den Schall recht aufzunehmen und sind leicht beweglich. Die Augen sind groß, braungelb, stehen weit auseinander und blitzen im Affekte. Unter dem Vorderwinkel derselben befindet sich eine über einen Zoll tiefe, einen Zoll lange und acht Linien breite Höhle, welche inwendig eine dünne gefaltete Haut hat. In dieser sogenannten Thränenhöhle sammlet sich durch Schweiß und andere ausgeführte Feuchtigkeiten eine dem Ohrenschmalze ähnliche, mit Haaren vermischte Masse, welche Anfangs weich wie Wachs ist, nach und nach aber so hart wie Horn wird, rund, glatt, glänzend, gelblich braun und mit schwarzen Aderchen durchzogen, erst übelriechend ist, zuletzt aber wohlriechend wird. Wenn sie in den Höhlen selbst erhärtet und so groß wird, daß dadurch der Hirsch am Sehen gehindert wird, so sucht er sich derselben an Bäumen und Gesträuchen durch Reiben zu entledigen. Diesen sogenannten Hirschbezoar oder die Hirschthräne sammelten sonst die Jäger zu Wunderkuren. Die Nasenlöcher sind weit und rund. In der untern Kinnlade stehen acht breite Schneidezähne, wovon sich drey nach der linken und drey nach der rechten Seite etwas drehen. Sie fallen bis ins vierte Jahr einzeln aus, und es schieben sich statt derselben neue, breitere, festere und krümmere ein. In der obern Kinnlade stehen vorn an jeder Seite zwey

krumme Eckzähne, die man Haafen nennt, und auf jeder Seite der beyden Kinnladen sechs scharf gerändete Backzähne; also hat der Hirsch zusammen 34 Zähne. Die Geweyhe sind knochenartig, dicht, mit mehr oder weniger zurückgebogenen Spitzen oder Enden, stehen etwas seitwärts und liegen im Laufen wagerecht über dem Rücken. Der Hals ist lang, erhaben, sogar über sich hingewandt, zottig und giebt dem Hirsche ein trotziges Ansehen. Der Rücken ist gestreckt, an den Enden etwas eingebogen, an den Keulen fleischig und gewölbt. Die Beine oder Läufe sind hoch, wohl proportionirt, oben stark und unten so dünn, daß man sich wundern muß, wie sie eine solche Last tragen und so große und oft erstaunenswürdige Sprünge aushalten können. Das Fußblatt ist schwarzshaalig, glänzend und hinten mit zwey gleichfarbigen Afterklauen, die ihnen besonders in der Flucht bergab, durch das Eingreifen in den Boden, sehr gute Dienste thun, versehen. Die Farbe ist vom April bis zum Oktober gelb oder braunroth; alsdann verdichten sich die Haare und die Haut bekommt ein graues Ansehen. Der Unterleib ist, so wie die Unterkeulen, weißlich. Von der Sommerfarbe hat das Geschlecht den Namen Rothwild. Dem Thiere, oder weiblichen Geschlechte, fehlt das majestätische Ansehen, das den Hirsch so sehr auszeichnet, indem es nicht den schönen proportionirten Körperbau, nicht die schönen gewölbten Keulen, nicht den

stark-

starken langbehaarten Hals hat, kleiner, schwächer ist (denn es wiegt mit allem höchstens 200 bis 250 Pfund) und gebeugter geht, und ihm vorzüglich die Kopfgierde mangelt; denn wenn man auch einzelne weibliche Hirsche mit Gemeihen angetroffen hat, so ist dieß doch eine große Seltenheit, und hat der Regel nach wohl, wie bey manchen Vögeln, deren Weibchen hahnenfedrig werden, den Grund darin, daß sie entweder vor Alter oder als Gell- oder alte Schmalthiere durch andere Hindernisse nicht zur Fortpflanzung tüchtig sind. Die Hirsche wechseln alle Jahre ihr Gemeih. Die starken werfen es der Regel nach im Februar und März, die geringern später und zwar bis zu Ende des Mayes ab. Man glaubte sonst fälschlich, daß die Engerlinge sich aus der ganzen Haut bis unter das Gehörn fräßen, hier ein Gemühl verursachten, wodurch diese Thiere gereizt würden, sich an den Bäumen zu reiben; und dadurch das Gemeih abzustößen. Es löst sich aber vielmehr von selbst ab, indem an der Stelle, wo es angewachsen ist, ein Fleischwulst in die Höhe quillt und die Trennung entweder von selbst, oder durch einen geringen äußern Anstoß verursacht. Vielleicht daß der hervorsprossende Fleischknoten, der den Keim zum neuen Gehörn enthält, einen gewissen Reiz zum Abschütteln und Abschlagen verursacht. Sie werfen selten zugleich beyde Stangen ab; und diejenigen, welche Spieße

tragen, die durch ihre geringe Schwere nicht leicht von selbst abbrechen, bewirken dieß durch Einstechen in die Erde, oder durch Anstoßen und Einzwängen in jungem Gehölze. Nach einigen Tagen keimt aus der gestänzten flachen Erhöhung, dem sogenannten Rosenstocke, ein weicher, rauhhaütiger Knorpel, der nach vierzehn Tagen schon eine Stange mit dem ersten Enden, in den folgenden vierzehn Tagen den zweyten Schuß von Enden zeigt, und dann so fort wächst, bis nach 10 bis 14 Wochen das Gemeih mit der behaarten Haut eingefaßt, seine bestimmte Größe und Gestalt erhalten hat. Unterdessen tragt der Hirsch immer mit gebeugtem Kopfe, um diese weiche Kopfgierde nicht zu beschädigen, und heißt ein Kolbenhirsch. Wenn das Gemeih vollkommen hart und zugespitzt, oder, nach der Jägersprache, veredelt ist, welches bey alten Hirschen im Julius und bey Jungen im August geschieht; so fängt der häufige Ueberzug an sich abzulösen, der Hirsch fängt ein Tucken, und wird dadurch genöthigt, sich erstlich an weichen und schwachen, und dann an starkem und hartem Holz zu reiben, und dadurch diese Haut abzuschlagen. Man findet zwar diese abgestreifte Haut selten, allein man hält es noch nicht für ganz ausgemacht, daß sie der Hirsch, wenn er nicht gestöhrte wird, selbst verzehre, eben so wenig, als daß sie eine von den alten Weidmännern ihr begelegte Wunderkraft besitze. Sicher

der ist, daß sie den Ameisen einen Leckerbissen gewährt. Anfangs sieht das gereinigte Gehörn weiß aus, nach etlichen Tagen aber wird es gelb, und nach vierzehn Tagen hat es seine bestimmte dunkelgelbe, kaffeebraune oder schwarzbraune Farbe; und die Spitzen desselben bleiben nur durch das öftere Stossen in die Erde, in Sand und durch das Wehen an den Bäumen weiß. Ungegründet ist, daß es von dem Saftte desjenigen Baums gefärbt werde, an welchem es rein gesetzt worden ist. Seine Bestandtheile haben, wie man aus wahrscheinlichen Gründen vermuthen kann, einerley Quelle mit dem männlichen Samen. Vielleicht daß dieser Stoff, der jetzt an andern Orten entbehrtlich ist, durch eigne Absonderungsgefäße hierher geleitet wird, das alte Gehörn abtreibt, und so lange im Zustande bleibt, bis das neue erwachsen ist. Die Verwandtschaft dieses und des Zeugungstoffes wird dadurch noch natürlicher, daß bey der Castration das Geweih, wenn es da ist, stehen bleibt, und wenn es nicht da ist, nur ein sehr unvollkommenes Wachsthum zeigt, nur einen kleinen monströsen Knorpel treibt. Eben dieß geschieht bey einer bloß starken Verletzung des Zeugungsgliedes. Auch der junge Hirsch erhält erst dann, wenn seine Mannbarkeit Zeit heran naht, sein erstes Gehörn, und der alte eilt erst dann zur Brunst, wenn es gänzlich erwachsen ist, und also jene Säfte gleichsam zu diesem edlen

Zwecke entwickelt und angewendet werden können. Anzahl und Gestalt der Enden an einem Geweihe ist nach dem Alter, der Nahrung und andern zufälligen, wenigstens für uns nicht erkennbaren, Umständen verschieden. Der junge Hirsch setzt nach dem ersten Jahre bloß zwey Espieße ohne Enden auf, nach dem zweyten eben so viel, oder gewöhnlicher zwey Gabeln d. h. zwey Espieße mit einem Ende an jedem; nach dem dritten bekommt er sechs oder acht Enden, nach dem vierten eben so viel, nach dem fünften zehn, auch wohl mehr oder weniger, und dieß geht in diesem Verhältnisse bis zum achten Jahre fort, nach welcher Zeit die Anzahl der Enden unbestimmt wird; doch kennt der Jäger das Alter des Hirschens an der Stärke und Unebenheit der Stangen, der Kürze und Breite des Rosenstocks, des engen Raums zwischen den Rosen und dem Kopfe, der breitem und ausgehöhltern Krone, wozu noch die Breite und Stumpfsheit der Klauen, und die Farbe und Beweglichkeit der Zähne kommt. Ganz alte, so wie ganz junge Hirsche, pflegen auch die obersten Enden nie recht vollkommen zu veredeln, wahrscheinlich weil jenen die schon merckliche Schwäche des Alters, diesen aber die noch unvollendete Ausbildung ihres Körpers den dazu nöthigen Stoff versagt. Alte Hirsche tragen der Regel nur 14. bis 18 Enden, mehrere sind eine Ausnahme von der Regel. Selten weicht auch die Stellung und

Wie:

Biegung der Enden in der Folge von der Form ab, die sie bey dem dritten oder vierten Aufsehen hatten. Nur Verletzungen während der weichen Hervorsprossung können dem hierzu nöthigen Bildungstrieb eine andere Richtung geben und Mißgewächse verursachen. Wenn ein Gehörn drey, vier und mehrere Enden am Gipfel der Stangen hat, so heißt es ein Kronengehörn; ist es baselbst breit und mit mehreren Enden an den Seiten besetzt, ein Handgehörn, und haben endlich die Enden mancherley unregelmäßige Krümmungen, ein widersinniges Gehörn. Obgleich die Alten den Hirsch aus mancherley fabelhaften Gründen für unsterblich hielten, so haben doch neuere Beobachtungen gelehrt, daß er sein Lebensziel in 30 bis 40 Jahren erreicht hat. Das Thier kann vielleicht, da es nicht den heftigen Affecten unterliegt, älter werden. In Ansehung des Aufenthalts, und der Farbe giebt es unter den Hirschen folgende Varietäten: 1. Der Bergirsch. Er wohnt in tiefen Gebirgen, ist gemeiniglich kürzer, stärker, schwerer, schwärzlicher oder dunkelbrauner, und hat einen längern behaarten Kopf, niedrige und dunklere Geweyhe, stumpfere Schaalen, größere Fährten, und ein schwächeres Wildpret, als 2) der Landirsch, welcher in ebenen, besonders sandigen Wäldern wohnt, und langgestreckter, leichter, rothbrauner ist, und ein größeres und schöneres Gehörn erhält. 3) Der

Brandhirsch. Er hat lange, schwarze, zottige Haare am Halse, oder auch nur eine dunkelbraune Brust, und hält sich gern an Kohlstätten auf. In den Böhmischen Wäldern trifft man ihn vorzüglich an. 4) Der weiße Hirsch. Man trifft ihn in manchen Menagerien in Menge an, in der Wildniß aber nur selten. Man hat die Bemerkung gemacht, daß wenn sich weiße Hirsche und Thiere zusammen vermischen, nur oft der sechste, ja der zehnte Theil der Nachkommenschaft wieder weiß wird, dahingegen bey der Begattung der weißen Hirsche mit rothen Thieren, mehr weiße als rothe Kälber ausfallen. Da diese Varietät von weit zarterer Organisation ist, so sind dergleichen Hirsche auch in der Wildniß weit zahmer, und haben ein weit feineres und zarteres Wildpret als die rothen. 5) Der silberfarbene Hirsch. Er ist bald heller, bald dunkler. Hat er einen schwarzen oder dunkelbraunen Rückenstreifen, und weiße Läufe, so ist er außerordentlich schön, aber auch selten. Zu Bernigerode im Thiergarten befinden sich viele derselben. 6) Der Blässhirsch, mit oder ohne weiße Läufe. Er hat von der Stirn bis zur Nase eine Blässe, die bald größer, bald kleiner ist, und an den Keulen vorne herab weiße Streifen. Man hat die Bemerkung gemacht, daß sich das Bläswildpret im Alter zuweilen ins silberfarbene färbt. 7) Der gefleckte Hirsch. Mit unordentlich gestellten weißen Flecken.

ten. Von Natur ist der Hirsch gutmüthig, friedfertig und gesellig und nur unter gewissen Umständen, z. B. wenn er verwundet wird, oder in der Brunstzeit, geräth er in Affect, und wird oft gar wüthend. Er hat scharfe Sinne, ein ziemlich Gesicht, leises Gehör, und einen überaus feinen Geruch. Seine Feinde verräth ihn gewöhnlich einer derselben, kommen sie ihn aber zu nahe, so sucht er ihnen anfangs durch die Behendigkeit seiner Läufe, und, versägen ihm diese den Dienst, durch mancherley schlaue Wendungen und Wiedergänge, durch Schwimmen über Ströme und Teiche, und durch Verbergen in Viehheerden, zu entgehen; befreyt ihn auch dieß nicht, so bemüht er sich, sie durch die Stärke seiner bewaffneten Stirn und schnellenden Läufe zu überwältigen. Jeder Jäger, der einen Rothwild-Stand hat, wird von seinem Borne, den er an ihm, seinen Jagdleuten oder Hunden ausgelassen hat, Beispiele aus Erfahrung anzugeben wissen. Auch Neugierde und List verräth er. Wenn man ihm pfeift oder ruft, so bleibt er stehen, besieht Vieh und Wagen, die ihm begegnen, scheut auch die Menschen nicht, wenn sie keine Hunde und Flinte bey sich haben, und wandert gelassen und stolz vor ihnen vorbey. Starke Hirsche pflegen oft Jahre lang sich in den kleinsten Feldhölzern, wo man kaum einen Hasen vermuthet, aufzuhalten; lassen stets, wenn ihrer mehrere beisammen sind, die jüngern vorangehen,

treiben diese sogar, wenn sie Gefahr ahnden, mit Gewalt vor sich her, und wissen bey Treibjagden, durch listiges Verstecken oder Zurückgehen, die besten Jägerpläne zu vereiteln. Größere Rudeln Wildpret hingegen, haben gewöhnlich das älteste und erfahrendste Thier an ihrer Spitze und zu ihrem Anführer, welches dabey ganz Auge, Ohr und Nase zu seyn scheint. Zur Beförderung ihrer Reinlichkeit putzen sie sich nicht nur, wie alle wiederläuende Thiere, immer die Nasenlöcher mit der Zunge, sondern brauchen auch diesen schlüpfrigen Schleim zur Bestreichung und Abglättung der Haare, und wahrscheinlich auch zur Verdauung. Man giebt den Hirsch auch für einen großen Liebhaber der Musik aus; denn man hat bemerkt, daß er auf den Klang des Waldhorns, der Schallmeyer und Flöte, selbst bey Jagden herbeigekommen, und zum Stillstehen gereizt worden ist; und daher haben auch vielleicht die Hühner ihren Ursprung. Das Geschrey des Hirsches gleicht dem Brüllen des Ochsen, nur daß es anhaltender und heller ist; sonst läßt auch der Hirsch und das Thier, wenn sie einen Menschen oder sonst etwas auffallendes gewahr werden, einen klaffenden abgebrochenen Laut hören, welches man schmälen oder melden nennt. Der Hirsch ist nicht bloß in Deutschland zu Hause, sondern in mehreren Ländern beyder Welttheile. Vom 64 Grad der Breite an, findet er sich in ganz Europa bis nach

nach Griechenland hinunter. In Asien lebt er bey Kusnez, Ustkamenojarskoi, in der Mongoley, Tatarey, Sina, Persien, Siam, Taba, auf Ceylon, in Bengalen u. s. w. In Afrika ist er etwas kleiner z. B. auf Guinea, in der Barbarey, auf der Insel Frankreich, in Abyssinien u. s. w. In Amerika soll man dieselbe Art auch von der Hudsonsbay an, bis nach Mexiko, Peru, Paraguan und Brasilien hinab finden. Der eigentliche Wohnplatz des Hirsches ist eine Dichtung im Walde, wo er auch sein Ruhelager hat. Den Bezirk, in dem er sich aufhält, ändert er der Witterung, Nahrung, Aufsehung des Gehörns und der Brunst halber. Im Winter, wenn im hohen Gebirge der Schnee sehr tief liegt, zieht er sich in die Vordergebirge, bey Anfange des Frühlings aber geht er wieder zurück. Aus seinem bestimmten Aufenthalte können ihn, außer jenen Veranlassungen, bloß Holzfällen und harte Verfolgungen treiben. Im Frühjahr, wenn das Gehörn wächst und weich ist, hält er sich im niedrigen Gebüsch oder Schwarzhölze auf, durch welches er ohne Anstoß trollen kann. Außer der Begattungszeit lebt er gesellschaftlich und friedlich in großen Truppen oder Rudeln versammelt. Gewöhnlich theilt er sich in drey Gesellschaften. Die alten Hirsche, welche wenigstens fünf Jahr alt sind, machen nämlich die eine aus, die Thiere

mit den Jungen bis ins dritte Jahr, männlichen und weiblichen Geschlechts, die andere, und die Hirsche von drey bis vier Jahren die dritte. Nur im Winter trifft man zuweilen größere vermischte Gesellschaften an; doch sondern sich die Hirsche bald wieder von dem übrigen Wilde ab, um theils einzeln, theils in kleinen Rudeln zu leben; die alten Thiere hingegen sieht man, außer der Sehzzeit, selten ganz allein und ohne Begleitung. In ihren Ruhelager deckt bey kalter Witterung ein Hirsch den andern, um sich zu wärmen. Die Nahrung oder Nefung der Hirsche ist nach Beschaffenheit der Jahreszeit und anderer Umstände ihrer Lebensart verschieden. Gewöhnlich gehen sie derselben des Abends bey'm Untergange der Sonne nach, und zwar in einem kurzen Trabe, welches die Jäger Trollen nennen. Sie bleiben die ganze Nacht, und ziehen in der Morgendämmerung erst wieder zu Holze. Im Frühjahr suchen sie, so bald die Erde vom Schnee entbloßt ist, die junge Saat von Roggen, Waizen, Spelt und Einkorn, die Brunnenkresse, die zarten Saamenblätter der Buche und Ahornarten, die jungen Triebe der Weiß- und Rothtanne, des Lerchenbaums, der Esche, Hasel, Aspe und mehrerer Weiden, der Binsenpfrieme, Heide, des Wachholder, rothen Hollunders, Sauerdorns, der Heidelbeeren, Brombeeren, Eberwurz, die Frühlings-erwe, Luzerne, Esparsette, Wogelweide, Bimbernelle, Wiesen- und

und Steinklee u. s. w. auf, und verschaffen sich dadurch in kurzer Zeit ihre Kräfte wieder. Nach Verlust ihrer Kopffierbe suchen sie in der Nähe ihres Aufenthaltes ihre Nahrung. Diejenigen, welche nicht ruhig in den Bucholzern leben können, ziehen nun in den Hochwald zurück, wo sie dann Gras, Laub und Kräuter genug finden, um sich zu sättigen. Diejenigen aber, welche eine Heege genießen, gehen nach allen Arten von reifen und reisenden Getraide, nach Him- und Brombeeren, Erbsen, Wicken, Linsen, Pferdebohnen, Flachs, besonders den Knoten derselben, Kraut und Rüben, junges Erdäpfelkraut, Waldangelika, Liebstöckel, Sauerampfer, Wasserdost, Meisterwurz, Johanniskraut, und besuchen auch die Grummetwiesen, wo sie dann endlich ihre größte Festigkeit und Stärke erhalten, um mit Muth und Kraft auf die Brunst zu treten. Wintern sie jenseits eines Strohmies gute Aesung, so schwimmen sie alle Nacht hinüber. Während der Brunst genießen sie wenig, und suchen nur, um den höchsten Hunger zu stillen, Kraut-Rüben- und Erbsenacker und die Brunnquellquellen auf, und die Champignons, Eierschwämme, Fliegenschwämme und Rühbilze scheinen ihnen dann sehr angenehm zu schmecken. Im Herbst bedienen sie sich der Eicheln, des wilden Obstes, der Bucheckern, Kastanien, Zwetschen, Pflaumen, der Speierlings- und Vogelbeeren, Aels- und Nehlbaums-

beeren, der Weintrauben, der milchigen Kolben des türkischen Weizens, der Kartoffeln u. dgl. Im Winter suchen sie die Saat, wenn der Schnee nicht zu tief liegt, die Knospen und jungen Zweige des Nadelholzes, der Buchen, Birken und der meist weichen Holzarten, vorzüglich der Aspe, Saalweide, Dotterweide, des rothen Hollunders, die Mistel an Windfällen, Brombeerblätter, Kresse, Epheu u. s. w., wenn sie nicht von den Jägern auf den sogenannten Wildraufen gefüttert werden. In dieser Jahreszeit wagen sie sich in den Walddörfern auch in die Gärten, schälen die jungen Obstbäume, und lesen wohl gar vor den Scheunen und Ställen das verstreute Stroh und Heu auf. Sie äßen langsam, und wo möglich mit Wahl, und suchen nach der Sättigung allezeit einen Ruheplatz zum Wiederläuen. Dieß geschieht wegen des langen Halses nicht mit der Leichtigkeit, wie beym kurzhältigen Rindvieh, sondern durch ein heftiges Aufstoßen, das man von weitem sehr deutlich wahrnehmen kann. Nicht nur in Thiergärten, sondern auch in Wildnissen bereitet man ihnen im Frühjahr und Sommer Salzlecken, indem man in ein Behältniß aus zusammengefügtten Säulen (einen Schrank), ohngefähr drey Fuß im Quadrat, einige Karren Lehm führt, unter denselben schichtweise ein halb Viertel Salz streuet und einen stumpfen Keil aus dieser gemengten Masse bildet. Man umzäunt zuweilen einen solchen Platz mit Pfählen und Latten so hoch, daß die

die andern Thiere nicht herbey kommen, die Hirsche aber diesen Zaun leicht überspringen können, und sie finden sich des Abends und Morgens sehr gern dabey ein. Im Frühjahre, Herbst und Winter trinken sie wegen ihrer saftigen und feuchten Nahrung sehr wenig, allein in der hitzigen Brunstzeit und im Sommer suchen sie die kühlen Bäche oft auf. Sie fühlen sich auch zu der Zeit in denselben, und in flachen Teichen (fühlen sich), baden sich zuweilen und lieben überhaupt in schwülen Tagen die kühlen Dörter sehr. — Der balsamische Duft der Ameisen muß ihnen ein angenehmer und stärkender Geruch seyn, denn so oft sie einen Haufen antreffen, zerscharren sie ihn, stehen stundenlang dabey, und ziehen diesen Balsam mit wollüstigen Mienen in sich. Wenn der Hirsch gute Nahrung gehabt hat, so geht er zu Anfange des Septembers dem Thiere nach, oder wie die Jäger sagen: er tritt Alt-Aegidii (Tag) auf die Brunst. Er verküert dann seine angebohrne Schüchternheit, und fängt an dreist und wilb zu werden. Mächtiger als in jedem andern Thiere wirkt in ihm der unwiderstehliche Begattungstrieb. Mit trotzigem Ansehen und niedergebücktem Kopfe durchstreift er rastlos von der Abend- bis zur Morgendämmerung die Wälder und Fluren, und sucht wie ein Spürhund mit der Nase auf dem Boden, dem Winde entgegen, eine Geliebte auszuspähen. Erreicht er seinen Zweck nicht bald, so muß der bemoochte Stamm seine Wuth und selbst der

Boden die Stärke seiner Vorderläufe und Augensprossen fühlen. Gewöhnlich sucht er die Plätze wieder auf, wo er das vorige Jahr die Freuden der Liebe genossen hat. Die ganze Brunstzeit dauert ohngefähr 5 bis 6 Wochen, von dem ersten September an gerechnet; bey jungen Hirschen aber fängt sie einen halben oder ganzen Monat später an. Das Weibchen läßt den hitzigen Hirsch, nach einer oft mehrere Tage langen spröden Begegnung, vorzüglich des Morgens zu, und er bleibt demjenigen, das er zuerst antrifft, die ganze Brunstzeit über vorzüglich gewogen; doch begnügt er sich gewöhnlich nicht an einem, sondern vermischt sich auch wechselseitig mit andern, und man hat Beispiele, daß ein rüstiger Hirsch sich wohl mit 20 Thieren abgegeben hat. Jetzt vergift das männliche Geschlecht die gewöhnlichen Gesellschaftspflichten ganz, und ein Hirsch verfolgt den andern, oder wüthet vielmehr gegen den andern, durch Eifersucht gedrun-gen. Sobald ein Hirsch auf ein Rudel Wild stößt, so ist sein erstes Geschäft alle junge Männchen, die sich in dieser Gesellschaft befinden, zu verschrecken, welche dann bloß verstoßener Weise, oder wenn der große furchtbare Nebenbuhler weggeschossen ist, mit einem einsamen Thiere sich begatten können. Treffen aber bey dieser Gesellschaft ein Paar starke Hirsche zusammen, so beginnen traurige Austritte. So wie sie sich einander begegnen, starrten sie einander grimmig an, werfen die Erde mit den Vorderläufen

ten

ten in die Höhe, erheben ein entsetzliches Geschrey (welches also nicht bloß ein Zeichen des Begattungstriebes ist) und fallen sich dann ins Gehörn mit einem Schalle, als wenn starke Stangen zerbrochen würden, wobey sie sich zuweilen mit den scharfen Spizen der Enden todtspielen, oder so in einander verwickeln, daß sie nicht loskommen, und so auf dem Kampfsplatz Hungers sterben müssen. In diesem mörderischen Gefechte empfängt mancher eine Wunde, die ihn auf lange Zeit oder auf immer zu einem Kränker, oder wie die Jäger sagen, zu einem Kümmerer macht. Es scheint in der That, als wenn sie zu diesen blutigen Schlachten vor der Brunst und während derselben die Spizen ihres Gehörns an den Bäumen scharfen, wie Farbe und Politur anzeigen. Das Weibchen sieht diesen Kämpfen nicht nur gelassen, sondern wie es scheint, mit Wohlgefallen zu, und überläßt sich dann dem Sieger um desto williger. Nicht nur das schon mehrmals erwähnte heftige Geschrey, das man in der Morgen- und Abenddämmerung, ja oft die ganze Nacht durch hört, und das nach dem Grade des Begattungstriebes an Heftigkeit und Stärke zu- und abnimmt, sondern auch durch Aufscharrung des Bodens mit den Vorderläufen und Tannensprossen, welches man den Brunstplan machen heißt, kündigen die Hirsche ihr Verlangen an. Durch ihr Schreyen, das man bey stiller Nacht über eine Stunde weit

hören kann, ziehen sie sich die Hälse, ja zuweilen Kröpfe zu. Es schreyen aber nur die Alten; denn diejenigen, welche noch nicht ihr viertes Jahr erreicht haben, lassen sich entweder gar nicht hören, oder geben, wiewohl nur selten, einen hohen abgebrochenen Laut von sich. Ueberhaupt können die Jäger an der Größe oder hellern Stimme das Alter des Hirsches erkennen; wiewohl auch hier Ausnahmen statt finden. Nur selten lassen die Hirsche im Jänner und Hornung diese in unvermutheter Nähe Grausen erweckenden Töne hören, und es wird, wenn es geschieht, für eine Vorbedeutung großer Kälte angesehen. Zur Brunstzeit bekommt der Unterleib durch die Schärfe des Saamens eine schwarze Farbe, den sogenannten Brand, der sich erst bey der Herbstverfärbung wieder verliert. Man legt auch auf bequemen Orten, auf Grummetwiesen und Haiden, welche mit Hafer und Rüben bepflanzt werden, Brunstplätze an, die mit einem tiefen Graben, der nach innen aufgeworfen ist und Zwischengänge hat, oder mit einer dichten Hecke, die Oeffnungen hat, umgeben werden. Hier kann der Liebhaber der Jagd die Hirsche belauschen, und nach Gefallen sich den besten schießen. In mehreren Gegenden Deutschlands hat man, wie z. B. im Herzogthum Altenburg, auf dem sogenannten Kiefeneck bey Cahlä, noch künstlichere Anstalten. Nach der Brunst sucht jeder Hirsch und jedes Thier sel-

ne

ne verlassene Gesellschaft wieder auf. Das Thier trägt acht und einen halben Monat, oder vierzig Wochen, schleicht sich bey bemerkter Endigung der Schwangerschaft von der Gesellschaft weg in junge Schlage, oder finstres Gehölz, und setzt in einem Bette von Moos ein, selten zwey, und noch seltner drey Kälber. Diese liegen hier oft zwey bis vier Tage still; dann laufen sie aber mit der Mutter weg; anfangs gehen sie derselben nach, wenn sie aber stärker werden, voran. Sie werden nicht bloß vor Gefahr geschützt, sondern auch so lange gesäugt, bis sich die Alte wieder tragbar fühlt, zu welcher Zeit sie sich auch schon für sich ohne Milch forthelfen können. Bis zum dritten Monate sind sie weißgelb und braungefleckt. An einigen Orten nennt man sie bis Michaeli, an andern bis zum kommenden März, Kalb, männlich Hirschkalb, weiblich Wildkalb. Von dieser Zeit an bekommt das Wildkalb bis zur Begattung im zweyten oder dritten Jahre den Namen eines Schmalthieres; das Hirschkalb aber nach dem ersten Jahre, wenn es nur einzelne Spieße aufgesetzt hat, welche nach dem sechsten Monate hervorsprossen, den Namen eines Spießers, oder Spießhirschens, und im zweyten Jahre, wenn es an den Spießen die Augensprossen bekommt, den eines Gabelers oder Gabelhirschens. Wenn der Hirsch dreijährig ist, so heißt er ein Hirsch vom zweyten Kopfe, im vierten Jahre ein

Hirsch vom dritten Kopfe und im fünften Jahre ein Hirsch vom vierten Kopfe, im sechsten Jahre ist er ein schlecht jagdbarer Hirsch und im siebenten ein jagdbarer. Er wächst bis ins achte Jahr, und wird von der Zeit an ein Kapitalthirsch genannt. Andre Benennungen hat er nach der Anzahl der Enden. Die Kälber lassen sich zähmen, saugen an Kühen, oder auch, durch eine leichte Gewöhnung, aus Geschirren Kuh- und Ziegenmilch. Sie lernen ihren Fütterer bald kennen, und kommen nach seinem Rufe, oder nach dem Tone eines Instrumentes, herber. Man zieht sich Thiere auf, um die Hirsche zur Brunstzeit auf bestimmte Plätze zu locken. Sonst bedienten sich die spätern römischen Kaiser und die alten Deutschen derselben zum Zuge. August II. König von Pohlen fuhr noch mit acht Hirschen; der verstorbene Herzog von Zweybrücken hatte auch einen Zug, so wie sonst der Herzog von Meiningen. Sind es weiße Hirsche, so ist ein solches Gespann von außerordentlicher Pracht. Man verschneidet sie zuweilen, um Unglück zu verhüten, allein es muß geschehen, wenn sie vollkommen aufgesetzt haben. Zum Reiten sind sie selten zu gebrauchen. Sonst schmiedete man die Wildddiebe auf Hirsche, und ließ sie auf eine grausame Art im Gehölze in Stücke zerreißen. Die Hirsche werden von vielen Krankheiten befallen: 1) Die Knotenkrankheit, welche auch

auch das Rindvieh im Sommer befällt, und sich durch große, eine gelbe Feuchtigkeit enthaltende, Knoten an verschiedenen Theilen des Leibes zeigt, richtet oft eine ganze Wildbahn zu Grunde. Da das Rothwild dabei hinkt, so läßt dieß der Jäger durch Hunde fangen; schneidet die Knoten auf und wischt die Wunde mit Essig und Salz aus. Dieß hilft zuweilen. Da die Krankheit ansteckend ist, so muß das gesunde Wildpret in andere Reviere getrieben werden. 2) Die Leberfäule, welche die Auszehrung verursacht; richtet auch oft große Niederlagen unter diesem Wildpret an. Sie soll aus schädlichen Thauen, der vorzüglich die Kleearten befällt, entstehen. 3) Die Ruhr erfolgt nach anhaltenden kalten Wintern, wenn das Hirschwildpret zu gierig junge Knospen und Keime frisst. Das Heufüttern im Winter verhindert diese Niederlage. 4) Zu viele Engerlinge über der Gurgel, oder Drossel, sind auch tödlich. Allein es scheint, als wenn die vielen Engerlinge eine Folge von einer vorhergegangenen Krankheit wären, da mehrentheils Kümmerer so sehr damit überladen sind, daß sie die Klumpen derselben nicht ausniesen können, sondern daran ersticken. Ich habe es bey Schafen eben so gefunden. 5) Das Verhalten des Harns bey männlichen Hirschen, besonders in der Brunst, ist ihnen sehr schmerzhaft. 6) Sie leiden auch zuweilen an Zahnweh. Wenigstens habe ich bey aufge-

brochenen Hirschen, die elend waren, keine andere Ursache entdeckt, als fast ausgefallene Backzähne. Vielleicht ist langes Hezen und nach der Hitze ins Wasser springen, oder an einem kalten Orte sich niederthun, die Ursache dieses Uebels. 7) Nicht bloß die Haarbällen, welche aus abgeleckten Haaren, oder andern faßrigen Dingen, im Magen entstehen, sondern auch die Hirschfugeln, welche gelblich aussehen und eine steinartige Rinde haben, machen sie kränklich, ja verursachen ihnen zuweilen den Tod. Unter ihren Feinden ist der unbarmherzigste, der Mensch, nicht als edler Weidmann, der den Hirsch seines wohlschmeckenden Wildprets halber jagt, sondern als unedler Kennjäger (Parforcejäger), der sein Vergnügen bey dieser Jagdmethode nicht zu mäßigen weiß, sondern dieß Wildpret so martert, daß er sich den Vorwurf zuzieht, als finde er nicht sowohl an dieser Jagd, als vielmehr an der Angst und Quaal eines zu Tode gehehten Hirsches Freude. Wölfe und Luchse, Erbfeinde des Rothwildes, können ihnen in den cultivirten Gegenden Deutschlands nicht viel mehr anhaben. Allein dafür sind sie von mehreren Insekten geplagt. Die Ochsenbremse, (Oestrus bovis), eine rauhhaarige, wie eine Hummel gestaltete, Fliegenart mit gelblichbraunen, am Ende schwarzen Hinterleibe und braun bandirten Flügeln, von der Größe einer Schweißfliege,

fliege, schwebt über dem Rothwilde herum und läßt seine Eyer auf die Haare desselben fallen. Im Herbst kriechen die Larven aus, bohren sich unter die Haut, werden da die großen weißen mit zwey Hälchen am Kopfe versehenen Engerlinge, die große Beulen auf dem Rücken verursachen. Diese sind im Frühjahr ausgewachsen, haben alsdann die Haut durchfressen und fallen an die Erde oder ins Moos um sich zu verpuppen. Daher sind die Wildhäute bloß im Julius und August, wo die Löcher wieder verwachsen sind, ganz gut und brauchbar. Schlechtes Rothwildpret ist mehr damit geplagt als gutes, weil jenes seinen Feind durch Springen zu entgehen sucht, daß die Eyer nicht auf dasselbe fallen. Die Nasenbremse, (*Oestrus nasalis*: Linn.) ist fast eben so groß, hat einen schwarzen mit gelben Haaren besetzten Hinterleib und ungefleckten Flügel. Sie legt diesen Thieren im Schlafe ihre Eyer an die Nase. Hier werden sie eingeschlürft, kriechen aus, und begeben sich in zwey mit einem zähen Schleim angefüllte Beutel unter der Zunge über der Gurgel. Es sind eben so, wie die vorhergehenden, gestaltet, nur nicht so große Engerlinge, die im Junius ausgewachsen sind, von den Thieren ausgekostet werden, und sich in der Erde oder im Moose verpuppen. Kränklichen Thieren werden sie oft tödtlich. Die Hirschlaus (*Pediculus cervi*: Linn.), eine Art breiter brauner Läuse, plagt be-

sonders die Kümmerer. Die große Holzwespe (*Sirex Gigas*: Linn.), die wie eine Hornisse aussieht, und deren Weibchen einen sägeförmigen Peggstachel hat, womit sie die Eyer in die gefällten oder verwundeten Nadelbäume legt, soll die Ursache der Knotenkrankheit seyn, welches aber gegen meine Ueberzeugung ist. In den Eingeweiden findet man Blasenbandwürmer (*Taenia*), Egelwürmer (*Fasciola*) und Splitterwürmer. Unter den vielen Merkwürdigkeiten, die von Jägern kommen und Jäger interessieren, und davon nicht wenige fabelhaft sind, zeichnen wir nur einige vorzügliche aus. 1) Man hat bemerkt, daß die Hirsche freylich bloß gezähmte, das Jahr mehr als einmal ihr Gehörn aufgesetzt und abgeworfen haben. So hatte Prinz Maximilian von Dessau in seinem Reitsalle 1721 einen Hirsch fünf Jahre, dreymal aufsetzte und abwarf, als den 15ten Jänner, 17ten May, und 18ten December. Vielleicht war die überflüssige und gute Nahrung und der Mangel an Verlust der Saamenfeuchtigkeit daran Schuld. Er starb an einer Entkräftung. Das Gehörn hatte seine völlige Stärke, war auch gesetzt, aber nicht völlig veredelt. 2) Nicht bloß monströse, das heißt, im Wachsthum gestörte, vieleckige Geweihe haben Cabinette und Jäger auffurwies. Man hat Hirsche von zwanzig bis 26 Enden geschossen, und im Jahr 1740 sollen in der

Ehrz

Churmark die sechs und zwanzig Enden nicht selten gewesen seyn. Auch weiß man von Hirschen, die zwey und dreißig, sechs und dreißig und zwey und vierzig Enden aufgesetzt hatten. Das Merkwürdigste unter allen hatte aber doch wohl der Hirsch, welchen Friedrich I. König von Preußen in dem sogenannten Cartheuser, oder Jacobsdorfischen, zum Amte Fürstenwald gehörigen Forste schoß. Er hatte sechs und sechzig Enden und der Hirsch selbst wog fünf Centner 35 Pfund. Er machte mit demselben Friedrich August König von Pohlen und Churfürst von Sachsen ein Geschenk, und man sieht es noch jetzt als eine Seltenheit in der Moritzburg. Oben in der Krone ist ein Becher angebracht, aus welchem fremde fürstliche Personen tranken. Auf der Stelle, wo der Hirsch geschossen wurde, ist ein Denkmal von Werkstücken errichtet mit dem ganzen Hirschkopfe auf der einen, und der Nachricht dazu in goldenen Buchstaben auf der andern Seite. 3) Das Rothwild hat, so wie die ganze Gattung, zu der es gehört, keine Gallenblase. Da, aber nach dem Tode die Blume oder der Schwanz desselben gallengrün wird, und sehr bitter schmeckt, so halten die Jäger diesen Theil für den Sitz der Galle. Vielleicht daß die Gallengänge mit dieser Extremität des Körpers Gemeinschaft haben. 4) Unter allen den vielen Wundergeschichten, die von tödtlich verwundeten und

doch noch sehr weit gelaufenen oder gar entlaufenen Hirschen erzählt werden, ist die merkwürdigste und wahreste diejenige, welche sich 1796 den 26sten October im Meiningschen zutrug. Ein Hirsch, dem das ganze Gescheide vorne am Schlunde und hinten am After abgerissen, und verlohren war, lief von der Stelle an, wo er lag, noch 567 Schritte, Berg auf, Berg ab, ehe er liegen blieb. In der Brunstzeit, wo die Lebensgeister in der heftigsten Wallung sind, hat man Beispiele, daß Hirsche nach einem schleunig tödtenden Schusse noch unglaublich lange, oft Tage ausgehauert haben. 5) Den 27sten Januar 1798 wurde zu Waltershausen ein Stück Wild, das ein Hirschkalb bey sich hatte, mit zwey Kugeln und etlichen Schrotten in die linke Seite des Kopfes geschossen, daß es todt zur Erde stürzte. So wie es aufgebrochen wurde, so hatte das Kalb gerade an der nämlichen Stelle, zwey etwas mehr als kugelgroße blaue mit Schweiß unterlaufene Flecken, und da, wo die Schrotten an der Mutter hingen waren, auch blaue Punkte. Ein offener Beweis, daß bey trächtigen Thieren die gleichnamigen Theile in steter Gemeinschaft stehen. 6) Wenn der Jäger im Sommer das Rothwild immer unruhig und unflät findet, so ist aller Wahrscheinlichkeit nach, ein Wolf oder Luchs in dem Revier. 7) Die Raschhaftigkeit des gezähmten Rothwildes ist jedem Jäger bekannt;

kann; allein daß es Fenster-scheiben einstoße, sie zerknirsche und verschlucke, ist wohl etwas auffallender. Ein gezähmtes Thier, daß dieß that, nahm keinen Schaden davon. 8) Der Hirsch beißt die jungen Zweige queer durch, das Thier nicht, sondern es freifelt Rinde und Blatt des jungen Zweiges ab. An dem verschiedenen Schalle, den dieß Abbeißen und Streifeln giebt, kann der auf einem jährigen Schläge von Laubholz ansetzende Jäger unterscheiden, ob sich ihn in der Dämmerung ein Hirsch oder Thier näherte. 9) Wenn ein Hirsch nach mancherley reizenden Veranlassungen so stark nach der Salzlecke geht, daß er viel Lehm mit verschluckt, so giebt er eine Menge Lehmentloosung von sich, die gerade die Gestalt und Form der Loosung von der gewöhnlichen Aesung mit Grübchen und Bäßchen hat. Wenn dieser ausgetrocknet von einander fällt, so sieht es wie eine Menge Schuß- oder Schnellkugeln aus, womit die Knaben spielen. Zur Jagd des Rothwildes, als des ersten und vorzüglichsten Jagdthieres, ist genaue Kenntniß der Fährte nothwendig; doch ist nicht nöthig, daß ich hier alle zwei und siebenzig in den alten Jagdbüchern angegebenen Kennzeichen aufzähle; sondern nur auf die vorzüglichsten hinweise. So viel ist gewiß, daß ein hirschgerechter Jäger nicht nur die Fährte des Spießers bis zum Kapitulhirsche, durch alle Alter hindurch im Gange, Trabe und der Flucht

kennet, sondern auch die der alten, trächtigen und gelten Thiere von den Fährten alter Hirsche, und die der jungen tragenden Thiere von den jungen Hirschen zu unterscheiden wisse, ja sogar ihre Schwere anzugeben im Stande seyn muß. Es ist dieß in der That auch so schwer nicht, da sich ein aufmerkamer Beobachter nur die Spur sehr genau und deutlich aufzuzeichnen, und sich eine Sammlung von Läusen zur Wiederholung zu machen braucht. Hier nur das wesentliche von der Hirschfährte, da die Anschauung in dieser Sache besser als die genaueste Beschreibung belehrt. Eines jagdbaren Hirsches Fährte ist ohngefähr drei und einen halben Zoll lang und zwei und einen halben Zoll breit, die Schalen sind breiter und stumpfer als des Thiers ihre, die schmal und spizig zulaufen; die Ballen sind länger, breiter, stärker, drücken sich tiefer ein, und zwar in Gestalt eines Herzens, da hingegen jener ihre nur gerade und schmal auslaufen und auch vor den Ballen nicht die gewöhnliche Erhöhung den sogenannten Burgstall verursachen; er tritt auch gar nicht in die Vorderfährte, sondern einige Fingerbreit dahinter, dahingegen das Thier in die Vorderfährte tritt. Die Spießer haben kleine scharfe Spizen an den Klauen, und die Ackerklauen stehen hoch und sind sehr spizig; bey andern jungen Hirschen wird alles nach und nach stumpfer und die Ackerklauen stehen nach und nach niedriger, Im Schnee

San

Sande, Thone, Thau und Gra-
se lassen sich die Fährten beob-
achten. Genauer sind die Haupt-
zeichen des edlen Hirschens, wo-
durch er von den Thieren zu
unterscheiden ist, folgende 27.:
1) Der Hirsch zwingt und zieht
mit den Schaalen das Erdbreich
fest an sich und zurück, und dieß
heißt der **Zwang** oder das
Zwingen. 2) Er drückt die
Ballen fest ein- und vorwärts.
Wenn dann 3) in der Mitte
ein erhabener Hügel entsteht, so
ist dieß der **Burgstall**, oder
das **Grimmen**. 4) Er macht
den **Bevtritt**, wenn er den
hintern Lauf neben den vordern
etwa einen Finger breit entfernt
setzt, und also zwey Fährten ne-
ben einander sichtbar werden.
Dieß thun die feisten Hirsche
gewöhnlich, die tragenden Thiere
nur zuweilen. Es geschieht nur,
wenn er vertraulich geht. 5)
Der **Kreuztritt** oder die
Kreuzfährte macht der Hirsch,
wenn er mit der hintern Fähr-
te, so in die Vordere eintritt,
daß sich drey Ballen zeigen und
also eine halbe Fährte ins Kreuz
abgetreten ist. 6) Das **Hin-
terlassen**, die **Erfüllung**
oder das **Zurückbleiben** ist,
wenn feiste und alte Hirsche
mit dem hintern Laufe zurück-
bleiben. Je weiter die Erfül-
lung, desto älter und besser ist
der Hirsch. 7) Das **Ueberei-
len** oder die **Uebereilung**
heißt, wenn junge oder diejeni-
gen Hirsche, die gering vom Lei-
be sind, mit dem Hinterlaufe
über die Vorderfüße hintreten.
Dieß geschieht gern bergab, und

und meist so regelmäßig, daß
8) die vier Ballen sehr genau
zu sehen sind. Dieß kann das
Thier nicht. 9) Der Hirsch tritt
auch zuweilen in die vorderste
Fährte, macht sie aber etwas
länger oder breiter und dieß wird
das **Blenden** genannt. Hier
hat man sich in Acht zu neh-
men, daß man nicht einen schlech-
ten Hirsch für einen guten an-
spreche, es geschieht nur, wenn
er vertraulich geht. 10) Er
kommt auch wohl gerade mit
den vordern und hintern Scha-
len so in einander, daß die Fähr-
te wie von einem Laufe gemacht
aussieht. Dieß ist der **Schluß**.
Das Thier kann dieß nicht oder
doch gar selten. 11) Wenn man
beym Schluß im guten Boden,
da wo die Schaalen und Ballen
zusammenstoßen, ein kleines Hü-
gelchen gewahrt wird, wobey man
aber wohl aufzumerken hat, so
ist dieß der **Bürzel**. 12) Den
Schrank oder das **Schrän-
ken** macht der Hirsch, wenn er
so auseinander geht, daß die
Fährten, nämlich die rechte und
linke nicht gerade hinter einan-
der kommen. Dieß thut das
Thier selten und ohne Fortdauer.
An dem weiten Schranke er-
kennt man die Weite und Feiste
des Hirschens. 13) Es ist beson-
ders auf den Schritt zu merken,
denn der Hirsch, der sein drit-
tes Gehörn trägt, schreitet schon
weiter als ein Thier. Wenn
ein Hirsch zwey und einen hal-
ben Schuh schreitet, so ist er
schon als jagdbar anzusprechen,
und kann 10 Enden tragen.
Die eine von zwey hintereinan-

der folgenden Fährten wird allezeit mit zum Schuhmaaß gerechnet. Dieß und das vorhergehende Zeichen sind die vorzüglichsten und müssen daher geübt werden. 14) Der Hirsch macht den Abtritt, Abschnitt oder das Gräslein, wenn er das Gras oder grüne Getraide wie abgeschnitten mit den Schaalen abtritt. Hierbey muß man Acht geben, ob das Gras oder Getraide dünne oder frisch ist. 15) Behält der Hirsch das Gras oder grüne Getraide in den Schaalen und läßt es auf freyen Wege oder Boden in der Fährte liegen, so ist dieß der Einschlag, Auswurf oder das Mitnehmen. 16) Wenn der Hirsch in lehmigen Boden flüchtig geht, oder nach einem kleinen Regen auf Dürre wieder vom Felde gen Holze zieht, so behält er den Boden zwischen und an den Schaalen, und läßt ihn oft einen Keller groß vor dem Holze fallen; dieß ist das Inseigel. 17) Wenn der Hirsch vertraulich geht und auf weichem Boden zuweilen die hintere Schaale in die vordere Fährte so bringt, daß etwas zwischen beyden Schaalen vorn wie ein Laubblättchen in der Fährte steht, so ist dieß das Näslein oder Näschelein. 18) Wenn der Hirsch so gezwungen und geschlossen geht, daß ihm zwischen den Schaalen ein Strich vom Boden, wie ein Faden dick in die Höhe geht, so wird dieß das Fädlein genannt. Von einem Thiere bleibt viel Erdbreich zwischen den Ballen stehen. 19) Es zwinget auch der Hirsch bey

hartem Boden, und schneidet Gras und Erdbreich ganz ab, und läßt es in der Fährte liegen. Es ist dieß so breit als die Fährte, und so abgeschnitten, daß man es ganz herausnehmen kann, und heist das Scheibel. 20) Wenn er mit der hintern Schaale in die vordere tritt, so bleibt oft ein Reiflein darin stehen; ist dieß bey hartem Boden fein und niedrig, so heist es Kränzgen. 21) Da durch die Schwere und das Zwingen die Schaalen des Hirschens stümpfer werden oder sich abstumpfen, so heist dieß die Stümpfe. 22) Der Hirsch tritt vorn und hinten gleich tief in den Boden, das Thier aber schiebet nur ein, fast wie eine Sau. 23) Wenn der Hirsch das Erdbreich mit dem Geßter berührt, so ist es, als wenn zwey Daumen eingedrückt wären. Beym Thier aber drücken sich die Geßter schmal und spizig ab, und kommen nahe an die Ballen. Je weiter es der Hirsch auswärts setzt, desto besser ist er. 24) Wenn der Hirsch die Ballen recht eindrückt und solche in reinem Boden stehen, so stellen sie ein Herz vor. Beym Thiere sind sie gleichaus schmal und es bleibt viel Erdbreich zwischen ihnen stehen. 25) Die Fährte des Hirschens bleibt bey dem Regen im Sande gewöhnlich rein stehen; bey dem Thiere aber fällt sie wieder zu. Dieß ist die reine Fährte. 26) Das Wenden oder Himmelszeichen macht der Hirsch mit seinem Gehörn, wenn er zu Holze zieht, und das Laub

um:

umwendet, oder kleine Reiser abbricht. 27) Das Schlagen oder Fegen, auch bey alten Weibleuten die Himmelspur genannt, ist das auffallendste Kennzeichen. Die Jagdarten sind folgende: Die gewöhnlichste Art sich des Edewildes zu bemächtigen ist das Wirschen, Bürschen- oder Pürschengehen, der Anstand und das Treibjagen; weniger gewöhnlich die Befästigungsjagd, Kesseljagd, selten die Haupt- und Wasserjagd, in Hirschnezen fangen und jetzt am seltensten die Rennjagd (Parforcejagd). Der Jagdregel nach werden die guten jagdbaren Hirsche vom May an bis in die Mitte des Septembers geschossen, Schmalthiere und Kälber aber bis Weyhnachten; nur die Leckerhaftigkeit der Menschen kann hier eine Ausnahme verursachen. Ueberhaupt aber muß der Jäger immer nach Maassgabe seines Wildstandes jagen. Ist der Wildstand nicht besetzt genug, so daß noch mehrere Stücke ohne Schaden der Feld- und Waldwirtschaft sich nähren können, so darf er nur das alte abständige Wildpret schießen; ist kein Mangel da, so schießt er nur jährlich so viel alte Hirsche, als zur Fortpflanzung unnöthig sind; hat er wenig Hirsche und mehrere Thiere, so benutzt er von diesen diejenigen, welche alt sind, oder gelte gehen u. s. w. Das Ansehen, in welchem der Hirsch von jeher (doch ehemals mehr als jetzt) bey den Großen und Reichen gestanden, hat gemacht, daß

man alles, was an ihm ist, nicht bloß in der Oekonomie, sondern auch in der Medicin benutzte. In der That aber ist in den Apotheken wenig von ihm brauchbar. Das Fleisch oder Wildpret ist nach Alter, Geschlecht und Jahreszeit von verschiedenem Werthe. Von den Hirschkalbern ist es sehr gut, von Spießern mittelmäßig, von Schmalthieren schon besser; dann folgen die jungen Hirsche von 3 bis 4 Jahren; vom vierten bis zum siebenten ist es schon härter; vom weiblichen Geschlechte ist es auch immer besser als vom männlichen. Alte Hirsche sind in der Feistzeit von Jacobi bis zur Brunst am schmachhaftesten. Das derbe Wildpret, vorzüglich der Theil von der Blume bis an die kurzen Rippen, welcher Zimmer heist und der Rücken selbst geben nebst den beyden Keulen den besten Braten. Dann folgen die Rehbraten, zwey Streifen am Halse über Gurgel und Schlund, hierauf die Mehrbraten oder Jungfernbraten, zwey Streifen, die über den Nieren und am Rückgrat liegen, und zuletzt kommt das Rothwildpret. Aus den klein geschnittenen Hirschohren macht man Frikasse und aus den Läusen Sülzen. Die Haut giebt weiß gegerbt sehr dauerhafte Beinkleider, starke Handschuhe, Degenkoppel, Reitkoller u. s. w.; roth gegerbt Stiefeln. Die Haare dienen zum Auspolstern. Die Ge-
weide zieren die Jagdhäuser,
die-

bienen als Haaken, und werden roh oder gebalzt als Handgriffe zu Messern und Hirschfängern benutzt. Die Röhre machen eine Gallerte daraus; und gebranntes und pulverisirtes Hirschhorn klärt Kaffee und Bier auf. Es giebt auch eine Hirschhornschwärze. In den Apotheken bereitet man den Hirschhornspiritus, und sonst war ein Hirschhornmagisterium, Hirschhornliquor, Hirschhornöl, Hirschhornsalz und Hirschhornsalbchen in denselben als Medicamente, die aber vorzüglich durch den Glauben wirkten, bekannt. Die Hirschkolben geben, auf mancherley Art zubereitet, ein Ferkelgericht; sonst zog man auch für die Apotheke einen Spiritus daraus. Die Klauen wirkten bey unsern Vorfahren, in Ringe verarbeitet, gegen Krämpfe. Das Mark hält Eisenrost ab, heilt aufgesprungene Hände, und macht sonst auf mehrere Art geschmeidig. Das Unschlitt braucht der Lichtzieher und Seifensieder, auch der Wundarzt. Dem Hirschkreuz, oder dem röthlichen Weichen im Herzen an der linken Seite, schreibt man nur aus Aberglauben bey mehreren Krankheiten eine gute Wirkung zu; allein es wirkt eben so wenig, als der gedörrte Schweiß, die Hirschknochen, Hirschklauen, Hirschthranen, die Blase, Geilen, Ruthe und das Laab aus dem Magen ungebohrner Kälber. Die Eckzähne sind aus Aberglauben ein Amulet geworden, und sehen in

Ringe gefaßt, nicht übel aus. Bey zu starker Hegung schaden die Hirsche der Feld- und Waldökonomie. Letzterer vorzüglich im kalten Winter, wenn sie keine Fütterung haben. Von den Kohlgärten hält man sie ab, wenn man eine Linie über die Bäume hinzieht, und im Felde, wenn man etliche Fagreise nimmt, die untere Seite mit Teufelsbrot in Bergöl zerlassen bestreicht und sie in die Erde steckt. Dieser verschauende Geruch erhält sich lange Zeit. Um sie von den Kräutern und Kohtpflanzen abzuhalten, steckt man diese in eine zerlassene Masse von alten Schmeer und Schießpulver. So wie jede Kunst und Wissenschaft seine eigene Terminologie hat, so ist es auch bey der Jagdkunde. Der achte Weidmann nennt daher die Hörner — Geweyh, Gehörn, Gewicht, Gefänge; an denselben den Hauptstamm — die Stange; das untere auf den Kopf sitzende gefranzte Ende — den Rosenstock; den untern gefranzten Theil der Stange — die Rosen, die krausen Knöpfchen an der Rose und der Stange — die Perlen; die untersten Zinken — Ausprossen; die nächsten daran — Eißpreßsel; die obersten — die Krone; alle Zinken — Enden und die Anzahl derselben wird dadurch bestimmt, daß man sie an derjenigen Stange, wo die meisten stehen, zählt und verdoppelt. Wenn das Geweyh seine vollkommen harten Spitzen hat, so ist es — vereckt. Die rauhe Haut an denselben ist — der Bass.

Bast. Dieß wird geschlagen. Das ganze Gehörn abgeworfen und aufgesetzt. Das junge hervorsprossende Gehörn — Kolben. Das Geweih ist nicht dick und schön, sondern stark, schwer, gut, brav, prächtig. Jagdbar oder auch schlecht jagdbar ist ein Hirsch von zehn Enden; gut oder jagdbar — von mehrern; so er dabei alt ist — ein recht guter oder starker Hirsch, auch ein Capitalhirsch. In einigen Gegenden muß ein jagdbarer Hirsch, nach dem Gewicht, wenigstens dreihundert Pfund wiegen. Wenn ich über die Größe und Stärke des Leibes oder Gehörns urtheile — so heißt dieß ansprechen. Ein **Platzhirsch** ist derjenige, der zur Brunstzeit alle andern weggejagt hat. Der **Mund** — **Gaß.** Die **Zunge** — **Weidmesser** oder **Weidlöffel**, **Graber** und **Lecker**. Die **Ohren** — das **Gehör**, **Luser** oder **Schüffeln**. Die **Augen** — **Leuchten**, **Spiegel**, oder **Seher**. Die **Beine**, wie bey allen wilden Thieren — **Läufe**; oben vorne — die **Blätter** oder **Buge**; hinten — die **Schlägel** oder **Keulen**; die **gespaltenen Klauen** — **Schaalen**; die **Asterklauen** — **Ober Rücken**, **Gedster**, **Astern**, **Obern**, **Oberklauen**, auch **Sparren**. Sie stehen im Alter niedriger — sind kürzer gefesselt. Der **Ort**, wo er hingetreten — **Fährte**. Der **Hirsch** macht eine gute **Fährte**; in der **Pfalz**, **Oesterreich** u.

f. w. aber, er macht und zeigt einen guten **Fuß**. Der **Hintertheil** — **Scheibe**, **Schirm**, **Schurz**. Der **Aster** **Weidloch**; die **Zusammensfügung des Knochens** unter dem **Weidloche** — das **Schloß**. Der **Unrath** — **Loosung** (bey einigen **Loßung**, **Gelöß** und **Gebahn**); das **Harnen** — **Nässen**. Das **männliche Glied** — **Brunst-Ruthe**; die **Hoden** — **Kurzwildpret** auch bey einigen **Geschröte**. Das **weibliche Glied** — **Feigenblatt** oder besser **Feuchtblatt**. Das **Thier** **seuchet**, nicht **es stallet**. Die **schwarze Farbe** vom **männlichen Saamen** am **Bauche** — der **Brand**. Der **Schwanz**, **Blume**, **Ende**, **Sturz**, **Feder**, **Bürzel**, **Wedel** und **Galle**; das **Fell** — **Haut**, auch **Decke** mit **Haaren**. Die **Dünnungen** — **Wammen** oder **Flanken**. Die **viden Knoten** hinten am **Halße** am **Ende** der **Zunge** — **Drossel**. **Herz**, **Lunge** und **Leber** — **Geräusch**, **Geschlingge**, **Gelänge**, **Lunze** oder **Bäuschel**. Die **Gedärme** — **Geschmeide**, und daran der **große Magen** — **Wanst**. Der **Brustknochen** — **Brustkern**. Die **Gegend** der **Nieren** — **Nierenstall**. Die **Harnblase** — **Feuchtblase**. Das **Fleisch** **Wildpret**. Das **Blut** — **Schweiß**, **Fasch**, **Faisch**, auf den **Boden** auch **Färth** oder **Gemerl**. Die **Rippen** — **Federn**, auch **Wände**, **Krielen**, **Wimmern**. Er geht zur **Begattung** — tritt auf die **Brunst**. Er hat ab- oder aus-

ausgebrunftet, wenn die Fortpflanzungszeit vorbey, oder wenn er dabey sehr schmal geworden ist. Er schreyet, nicht er brüllt. Der Act der Begattung — das Beschlagen. Das Thier ist befruchtet — es ist beschlagen, es geht hoch beschlagen, ist tragend, tragbar oder schwer; es setzt das Kalb, und zwar auf ein Bette, nicht es kalbet; geht niedrig, nicht hat geworfen. Der Aufenthalt — Stand. Das Lager Bette. Sie werden aus ihrem Stand gesprengt, nicht gesagt. Der Hirsch geht vertraulich, nicht langsam; trollet, nicht trabet; ist flüchtig, nicht läuft; greift stark in Boden, nicht tritt tief in die Erde. Wenn man ihn wohin gehen sieht oder spürt — er ist da übergezogen. Er steht oder nimmt die Weide an. Er zieht zu Holze oder nach Einigen hält den Rischgang. Aus- und Eingang — Wechsel; er hat dahin gewechselt. Er steckt im Revier, nicht er liegt darin. Er rinnt durchs Wasser, nicht er schwimmt durch. Er geht hoch, wenn er völlig verdeckt hat und gut von Feinde ist, und niedrig, wenn er abgeworfen hat. Er hat sich niedergethan, nicht niedergelegt; er thut sich auf, nicht steht auf. Wo er sich niedergethan hat, da sitzt er. Das Bleyzeichen macht der Hirsch, wenn er mit den Schaalenspißen auf einen Fels oder andern Stein greift, und einen Strich wie mit Bleystift macht. Nah-

runge — Gedäse. Er dset oder aaset sich, nimmt Gedäse oder Weide, nicht er frist. Er zieht auf das Gedäse, nicht auf die Weide. Er trinkt oder schöpft, nicht er säuft. Er tritt zur oder auf die Salzlecke u. nicht er geht oder verfügt sich dahin. Er fällt ins Garn, nicht er springt hinein. Er fällt über das Zench, nicht er springt darüber. Sie kämpfen, nicht sie stoßen sich. Sie forkeln, wenn sie einem Menschen oder Thiere eine Wunde beibringen. Sie färben, nicht häaren sich. Sie nehmen den Jäger wahr, wenn sie ihn in den Wind oder zu Gesichte bekommen. Man sagt aber auch von dem Gesichte allein: Sie haben den Jäger oder Gegenstand gewahr geworden; und vom Gehör: Sie haben ihn oder den Gegenstand vernommen. Sie werden gebirset, nicht geschossen. Weidewund geschossen — in den Wanst oder die Gebärmere, daß er nicht schweift, oder nicht gut geschossen. Schweissen, gehen Fährte und Geruch, nicht sind verwundet. Der Hirsch wird abgesaugen, nicht erstochen. Er ist krank, wenn er angeschossen ist und sich bald steckt, oder nach dem Wasser eilet. Er stürzt nach dem Schusse, nicht er fällt; er endet, nicht er stirbt; er ist verendet, nicht er ist gestorben. Er nimmt oder macht sich zusammen, geht flüchtig, stark, oder fliehet, nicht er steht wieder auf und läuft

läßt davon. Er wird auf-
gebrochen, dann ausgewirkt
oder gerwirkt (auch die Decke
abgenommen oder abgedeckt), oder
zerlegt, nicht aufgeschritten und
zerhackt. Er ist gut, schlecht
oder gering bey, von oder
am Leibe, nicht schön, häßlich,
dürr oder mager. Er ist schad-
haft, nicht krank oder beschä-
digt. Ein Kümmerer. — ein
kranker Hirsch, vorzüglich wenn
er nicht recht aufgesetzt oder ab-
geworfen hat. Er ist feist,
nicht fett, hat Feist oder Weis-
ses, nicht Fett oder Unschlitt.
Er ist anbrüchig, nicht stinkt;
ist verdorben, nicht versaut.
Wenn das Thier Menschen merkt,
so giebt es einen hellen Laut
von sich — es schmälet,
schreckt oder meldet sich.
Mehr Hirsche und Wild bey-
sammen — ein Rudel, Trupp.
Baden oder abkühlen — sich
sühlen. Der Hirsch sieht
gut aus, ist gut, recht gut,
ein starker, Kapital-
Hirsch, nicht ein schöner. Die
Feistzeit oder die Hirsch feis-
te fängt sich an, wenn das Ge-
traide reift, und dauert bis zur
Brunst.

Nothwildpret nennet man,
im Gegensatze des Schwarzwild-
press, mit einem Worte die Hir-
sche beyder Geschlechter.

Rotte nennet man eine An-
zahl beyammen befindlicher Wölfe.

Rücken heist, wenn auf dem
Vogelheerde die Wände oder Gar-
ne mittelst der Rückleine ge-

schwind in die Höhe gezogen und
die eingefallenen Vögel mit dem
Garne bedeckt werden.

Rücken nennen manche die
Asterklauen des Hirschens und
Rehbocks, f. Asterklauen.

Rücken ist ein Ausdruck,
den man vom Haasen braucht,
wenn er aus dem Holze ins
Feld, oder umgekehrt, gehet, f.
Fahren.

Rübecknecht ist ein beson-
ders zu den Saurüben angestell-
ter Hundeknecht.

Rüstung heißen mit einem
Worte alle, zu einem Vogel-
heerde nöthigen Geräthschaften.

Rudel nennet man eine
Gesellschaft mit einander laufen-
der wilder Schweine. Man sagt
es auch an manchen Orten von
einer Gesellschaft Hirschen, doch
werden diese gewöhnlich ein Trupp
genennet.

Ruf heist 1) bey dem Auer-
hahne, wenn er fället. Desglei-
chen bey dem Kuckuck und den Reb-
hühnern, wenn sie ihre Stimme
hören lassen. 2) Bey dem Vogel-
fange, wo man die Vögel durch
lebendige Lockvögel oder Nachah-
mung deren Stimme mittelst
einer Pfeife u. herbeylodet. 3)
Bey dem Wachtelfange der Contra-
ruf.

Rufen nennt man vorzüg-
lich das Geschrey der Rebhühner,
womit sie sich zusammenrufen;
aber

aber auch bey andern Thieren wird dieser Ausdruck gebraucht.

Ruhrschnur ist eine dünne Schnur, welche an die Ruhrvögel gebunden wird.

Ruhrvogel, Rohrvogel ist ein Vogel, der auf dem Vogelheerde, an ein langes, dazu bereitetes Hölzchen, dergestalt angebunden wird, daß es durch einen langen, in die Hütte reichenden Faden gezogen, und der Vogel dadurch auf und nieder zu fliegen, bewogen werden kann. Wenn man merkt, daß fremde Vögel angefliegen kommen, zieht man den Faden an, worauf der Ruhrvogel etwas in die Höhe fliegt. Wenn dieses die, in der Luft befindlichen Vögel sehen, eilen sie auf die hiezu bereiteten Anfälle, wo sie die Vorläufer zu sehen bekommen, und bald zu ihnen auf den Heerd fallen. Man muß der Ruhrvögel mancherley auf dem Heerde haben, und allezeit denjenigen anziehen, dessen Art man in der Luft bemerkt. Man findet sie gewöhnlich auf allen Heerden. Sie zu blenden ist ein eben so grausames als unnöthiges Verfahren, denn wenn sie auch sehend sind, so gewöhnen sie sich doch in wenig Tagen das Flattern ab. Die Ruhrkerchen schleift man nur an das

linke Bein, doch muß man sie nicht zu schnell anziehen und wieder niederfallen lassen, weil sie dergleichen Verfahren bald tödten würde.

Runder Lauf ist ein Lauf der eine ovale Rundung hat.

Rundung, Zirkelstück ist ein runder Weg, der in einem Holze rund herum ausgehauen und ohngefähr diese Gestalt \oplus hat. Wenn deren mehrere in einem Holze sind, so werden sie mit der Nummer bezeichnet, z. B. \oplus No. 1. Eine halbe Rundung ist ein Weg, der in Gestalt eines halben Zirkels gehauen ist. Eine Jagungsrundung ist der Bogen, der hinten in einem Jagen gestellt wird. S. Jagdrundung.

Ruppan, Männchen ist ein Kunstwort bey der Falknerey, man brauchet es, um den Falken aufzumuntern, einen vorgehaltenen Staub anzubeißen.

Ruthe heißt beym Hirsche auch Siemen, Zimmel oder Pinzel, und bedeutet bey Hirschen, Rehen und Säuen das männliche Glied, s. Zimmel. 2) Beym Fuchse die Standarte, Lunte und bedeutet beym Wolfe den Schwanz.

G.

Gaatgans, kleine wilde Anas Segetum — auch kleine Gans oder Moorgans — ne graue Gans, Schneegans.

gans, kleine Schneegans, Suggans, Bohnengans, wilde Gans und Roggengans genannt; gehört mit der gemeinen wilden Gans zu einer Gattung und Familie als besondere, die sich also unterscheidet: Der Oberleib ist schwarzbraun, der Unterleib blässer; der Steiß ganz weiß; der Schnabel in der Mitte etwas eingedrückt, an der Wurzel und am Nagel schwarz; in der Mitte orangefarben; die zusammengelegten Flügel über die Schwanzspitze hinausreichend. Diese Gans ist der Regel nach kleiner, als die große wilde Gans, und also auch kleiner als unsere zahme; doch giebt es Exemplare, die fast so groß und schwer sind, aber man hat auf der andern Seite auch solche gefunden, die fast noch einmal so klein sind. Die gewöhnliche Länge ist zwey Fuß acht Zoll und die Breite der Flügel fünf und einen halben bis fünf und drey Viertel Fuß; sie liegen ein und einen halben Zoll über die Spitze des sechs Zoll langen Schwanzes hinaus. Das Gewicht ist 6—10 Pfund. Der Schnabel ist wie ein gewöhnlicher Gänsechnabel, doch in der Mitte etwas eingedrückt, zwey und einen Viertel Zoll lang, von Farbe schwarz; nur in der Mitte mit einem breiten orangerothen Streifen, der oben fast bis an die Wurzel desselben reicht; die Augenlieder sind befiedert und weißgrau; der Augenstern dunkelbraun oder graubraun; die Füße gelb-

roth, die Nagel schwarz; die Fußwurzel zwey und einen Viertel Zoll hoch, das Knie fast einen halben Zoll hoch kahl, die Mittelzehe drey Zoll lang. Kopf und Hals sind dunkeläschgrau schmutzig rostgelb gemischt, der Vorderhals, wie bey den Gänsen gewöhnlich gestreift und etwas heller; oft ist über, auch wohl unter den Augen ein merklicher weißer Streifen; der Oberleib schwarzbraun mit röthlichweißen Federkanten; der Unterrücken schwarzgrau; die Brust aschgrau mit grauweiß gewölkt, oft auch rostgrau überlaufen; die Schenkel braungrau; die Seiten schwarzbraun mit röthlichweißer und auch ganz weißer Einfassung der Federn; Bauch und After weiß; die kleinen Deckfedern der Flügel sind schön silbergrau; ober helläschgrau, die größern und die untersten Schwungfedern wie der Rücken und die Schulterfedern; die vordern Schwungfedern sind dunkelbraun mit schwärzlichen Spizen, weißen Schäften und aschgrauer Wurzel; die Schwangfedern schwarzgrau mit weißen Schäften, Spizen und Rändern, die äußern werden immer heller. Das Weibchen hat einen etwas dünneren Schnabel, Kopf und Hals, ist am Unterleibe heller und am Halse nicht so rostgelb. An den jüngern Vögeln bemerkt man mehr weißliche Ränder an den mehr aschgrauen Federn des Oberleibes und die Füße und Schenkel sind nicht so tief gefärbt, wie an sehr Alten, die oft ganz siegellackroth an Schenkel und Füßen sind. Die Moorgänse sind scheue, furchtsame und vorsichtige Vögel. Ihr

Gr

Geruch ist sehr fein. So schwer sie sind, so gut können sie fliegen, und besonders lange in einem Weg. Sie formiren auf ihren Füßen einen Winkel, an dessen Spitze immer der Anführer, wenigstens der größte und grobstimmigste Gansert fliegt. Wenn sie von einem Felde oder Teiche zum andern ziehen, so fliegen sie nicht in jener Ordnung, sondern unter einander, schreyen aber immer ihr unsern zahmen Gänsen ähnliches Gaak, Gaak, Tabbatdat! und ein etwas abbrechendes Kei-jaja! welches die vorzügliche Stimme der Ganserte ist; die Gänse hingegen rufen höher und feiner, Klirrha, Gickick und Keikleick! dazu. Nicht nur die Jungen, sondern auch die Alten lassen sich leicht zähmen. Die Moorgänse scheinen allgemeine Bewohner der Erde zu seyn, da man sie in allen Weltgegenden, auch in der Südsee angetroffen hat. Ihr Sommeraufenthalt ist vorzüglich der Norden. Tiefer als England brüten sie nicht. Sie halten sich dann an den Küsten in großen sumpfigen Brüchen auf. Wenn im Norden der erste Schnee fällt, so kommen sie heerdenweise in Deutschland an, überwintern da in nahen Gegenden z. B. in Thüringen in großen Schaaren und im März gehen sie, je nachdem der Schnee bald oder spät wegschmilzt, wieder in ihre Heimath zurück. Sie liegen Anfangs (denn sie kommen oft schon im September an) in den Haferstoppeln, und gehen dann auf die grüne Winterfaat, des Nachts fliegen sie nach den Flüssen, Tei-

chen oder Seen, auch wenn sie zugefroren sind. Ihre Nahrung besteht in mehreren Arten von Wasserkräutern und Gräsern, besonders Schilfwurzeln, Getraide und der Winterfaat von Roggen. Die gezähmten füttert man wie die zahmen Gänse, und sie befinden sich bey diesem Futter wohl. Die Gänse brüten im Norden in den großen morastigen Brüchen, machen von Schilf und Gras ein Nest, das mit ihren Federn ausgefüttert wird, und legen sieben bis acht Eyer wie unsere Gänseeyer groß, die das Weibchen in vier Wochen ausbrütet. Sie leben paarweise; und man sieht sie schon im März bey uns, wenn der Schnee lange liegt, zwey und zwey gepaart im Felde besammen stehen und sitzen. Die Jungen laufen und schwimmen gleich mit den Alten davon. Man kann sie leicht fangen und zähmen. Nur der Adler wagt sich an die Alten; ob die Brut in ihrem Sommeraufenthalt Feinde hat, ist unbekannt. Auf ihrer Haut sitzt die Gänselaus, die man auch auf den zahmen antrifft. Als Jägerbeobachtungen gelten: 1) Im Winter hat der Haupttrupp, der auf der Saat liegt, auf den Ecken Wachen von etlichen Gänsen ausgestellt, die sie vor jeder Gefahr warnen, damit die andern unterdessen ruhig sich rüsten können. So bald ein Jäger etliche hundert Schritte einem solchen Posten nahe kommt, so steigt derselbe mit Geschrey auf, fliegt nach der Schaar zu, kündigt dieser die Gefahr an, und diese

diese nimmt dann auf der entgegen gesetzten Seite die Flucht. Sind sie umstellt, so suchen sie durch Schwankungen in die Höhe zu kommen, damit sie ausser dem Schuß über ihren Nachstellern hinstreichen können. 2) In Thüringen sind diese Gänse Wetterpropheten, wenn sie von Westen über den Thüringerwalb gezogen kommen, so bedeutet es anhaltendes Wetter; wenn sie aber dahin ziehen, so ist allezeit den folgenden Tag Sturm oder Schnee zu erwarten. Sie gehören zur niedern Jagd, und eine leichte, sichere und allgemäße anwendbare Art, sie zu fangen oder zu schießen, gehört noch unter die unerfüllten Jägerwünsche. In Thüringen schießt man sie gewöhnlich des Nachts an einem Flusse oder Teiche, wo sie einfallen. Liegen sie auf einem zugestornen Teiche, so zieht man sich ganz weiß mit Haarschuhen an; schleicht sich schußrecht dahin, wo der dunklere Schwarm liegt und schießt mit Posten unter sie; sonst läßt sich auch eine Gesellschaft mit den Schlitten an sie fahren, oder ein einzelner schleicht sich mit dem Saattuch oder einem Korbe an sie. Gewöhnlich pflegt man mit dem Schießpferde oder dem Wische an sie zu ziehen. Mit einer zahm gemachten Moorgans lockt man sie auch an ein Teichufer, an welchem man sich in einer Schießhütte verborgen hat. Man wirft der Lockgans Hafer vor und zieht an einer Schnur, daß sie schreyen muß; worauf die

vorüberfliegenden auffallen. Es werden auch in sumpfigen Gegenden ordentliche Heerde auf sie gerichtet, an welche Plätze man sie vorher firret und durch gezähmte herbeyplockt. Man schießt sie auch mit der Karrenbüchse, die zwey Ränste hat, und die man mit einem Schirm entweder auf einem Pferdekarren oder auf einem Schiebkarren fahren läßt. Das Wildpret der Jungen, die sich leicht an dem mattern Schwanz und Füßen erkennen lassen, ist wohlschmeckend, und ein guter Braten; die Alten muß man vorher einbaizen. Die Federn und Dunen werden eben so, wie vom zahmen, gebraucht, und sind noch vorzüglicher. Die nördlichen Völker sammeln auch die Eyer und erhalten sie das ganze Jahr hindurch im Fischeöle. In Deutschland thun sie nicht sowohl an dem reifen Getraide als an der grünen Saat Schaden. Letzteres besonders in solchen nassen Wintern, wo die Saat heym Abreissen sich mit der Wurzel herauszieht. Bloß durch Lärmen und Schüsse lassen sie sich verschrecken.

Saatträhe — *Corvus Frugilegus* — gehört mit dem Kollkraben in eine Ordnung, und Gattung, und macht darinnen eine besondere Art mit folgenden Kennzeichen aus: sie ist ganz schwarz mit einem Purpur glanze überzogen; die Schnabelwurzel und die Nasenlöcher ohne Borsten und grauschäbig, und der Schwanz etwas zugerundet. Sie führt

führt auch die Namen: schwarze Krähe, Acker- und Feldkrähe, schwarze Saatkrähe, schwarze Feldkrähe, schwarze Kran, schwarze Krabe, Pommerscher Kabe, Saatkrabe, Kranveitl, Karchel, Rucke, Roobe, Rouch, Rooste, Rauch, Karock, Haaserucke, Roock, Roud, Nackschnabel und Grindschnabel. Wenn diese Krähe die aschgrauartige schäbige Schnabelwurzel nicht hätte, so würde man sie kaum von der Rabenkrähe unterscheiden können. Sie ist etwas kleiner und schlanker gebaut, Flügel und Schwanz scheinen daher etwas länger und der Kopf dünner und spitziger zu seyn. Die Länge beträgt einen Fuß fünf Zoll, und die Breite drey Fuß; der Schwanz sieben Zoll und die Flügel reichen bis fast ans Ende des Schwanzes; der zwey Zoll lange Schnabel ist dünne, schwächer, grade und bläßer als bey der Rabenkrähe, an der Wurzel, über den Nasenlöchern bis zur Kehle herab kahl mit einer räubigen, schuppigen grauweißlichen Haut, in welcher einzelne unvollkommene, im Aufkeimen erslickte Federkeile stecken, die vermuthen lassen, daß die Stammeltern dieser Krähenart, wie andere, borstenartige Federn an diesem Theile gehabt haben, die aber durch das beständige Scharren und Graben in der Erde immer abgestoßen und so nach und nach zum Erbfehler geworden sind, so daß die Jungen aus dem Ey schon an diesen Theilen so aussehen. Der

Augenstern ist dunkelbraun; die Füße glänzend schwarz; die geschilderte Fußwurzel zwey und ein Viertel Zoll hoch. Der ganze Leib ist schwarz, fast überall purpurfarben glänzend, außer an den Schwanzfedern und den vordern Schwungfedern, die ins Grüne schimmern. Das Weibchen ist bloß etwas kleiner. In ihrem Betragen zeigt sie weniger Muth und Stärke als die Rabenkrähe, ist ihr aber sonst in der Lebensart ziemlich gleich. Ihr Geschrey, das sie unaufhörlich hören läßt, klingt tiefer und heiserer, als das der Rabenkrähe, und Krä, Krä! Sie spielt gern, und schwingt sich daher des Abends in der Gegend ihres Aufenthalts gesellschaftlich in einem Zirkel herum, neckt und jagt sich mit ihren Kameraden, und schreyt aus Leibeskräften dargu. Die Saatkrähe wohnt in Europa und im nördlichen Sibirien. In Deutschland ist sie in manchen Gegenden sehr gemein, in andern aber sieht man sie bloß im Winter. Da diese Vögel furchtsamer als die meisten andern dieser Gattung sind, so halten sie sich auch stets in großen Gesellschaften zusammen. Sie ziehen daher im Herbst nicht nur in Schaaren weg, sondern leben auch in der Brutzeit so nahe beyammen, als wenig andere Vögel. Die Feldhölzer, Baumreihen um Dörfer und Städte herum, Gärten mit hohen wilden Bäumen, auch alte Thürme und hohe steinerne Gebäude sind ihr Sommeraufenthalt; denn gebirgige und waldis-

ge Gegenden lieben sie nicht. Im Oktober verlassen sie meist alle, in Gesellschaft der Dohlen, das nördliche Deutschland, im südlichen aber bleiben sie mehrtheils das ganze Jahr hindurch, und halten sich in Dörfern, besonders auf solchen Wiesen auf, die durch warme Quellen immer von Schnee und Eis entblößt sind. Im Herbst besteht ihre Nahrung aus Gras und Graswurzeln, aus Insekten und Mist; auch gehen sie auf Aas. Im Sommer folgen sie, in Gesellschaft der Dohlen, dem Pfluge, und lesen alle ausgepflügten Insekten und Würmer, als Maykäfer, Maykäferlarven u. und die Regenwürmer auf, verfolgen sonst Krokodile, Heuschrecken, Raupen, Schnecken u.; fressen aber auch, wenn sie diese lebendige Nahrung nicht haben können, allerhand ausgesäetes, reifes und keimendes Getraide, als Roggen, Weizen, Gerste, Heidekorn und die frischgesteckten Kohl- und Krautpflanzen. Im März kommen diejenigen, die ihre Heimath im Winter verlassen haben, wieder zurück. Sie suchen ihre verlassenen Nester wieder auf, und die Jungen bauen sich neue. Diese findet man in den Feldhölzern von hohen Nadel- und Laubholz, auf den Bäumen, die um die Dörfer und Kirchhöfe stehen, als auf Erlen und Eschen; allemal aber auf solchen, die unten fast glatt, und mit keinem oder wenig Unterholz bewachsen sind. Vielleicht fürchten sie auf denjenigen Bäumen, die unten Nester haben,

Feinde, die sich da verstecken, oder sie leichter besteigen könnten, als Kagen u. Auf einem Baume findet man oft, wie bey den Rabenkrähen, sechzehn und mehrere Nester, die durch kleine Zweige, Dornen und anderes Genist, als Grundlage mit einander verbunden sind, und oft unter sich mehrere Bäume, die neben einander stehen, vereinigen. Diese gemeinschaftliche Grundlage der Nester wird mit vielem Geschrey und Sang vervollständigt, und jedes Paar scheint über die Wahl des Platzes des andern neidisch zu seyn. Alle suchen aber, soviel als möglich, ihre Stelle zu behaupten, indem ein Gatte um den andern wechselseitig Wache hält, umlegen sich ein Plätzchen mit Dornen und Reisern rund um, füttern es mit Moos, Wolle und Haaren aus, und wohnen dann, wenn sie ihren Bau vollendet haben, ruhig bey einander. Sie scheinen deswegen so gesellschaftlich beyammen zu nisten, um mit gemeinschaftlichen Kräften (da sie einzeln zu schwach sind), wenigstens durch ein betäubendes Geschrey die Raubvögel, die ihrer Brut so sehr nachstellen, zu verschrecken. Sie vermehren sich des Jahrs zweymal, und schon zu Ende des März legen sie zum erstenmal Eyer. Diese sind grünlich mit vielen blauen Flecken, besonders am stumpfen Ende, bezeichnet, und der Anzahl nach drey bis fünf. Zu Ende des May und zu Anfange des Junius fliegen daher die ersten Jungen schon aus; und zu dieser Zeit

ist

ist das Geschrey, das die Alten und Jungen, besonders des Morgens und Abends, verursachen, so unaussprechlich groß, daß sie dadurch denjenigen Personen, die einer solchen Kolonie nahe wohnen, gar sehr beschwerlich werden. So lange sich nicht Rabenkrähen oder Elstern an einem solchen Plage einnisten, oder das Holz gefällt wird, verlassen sie einen einmal erwählten Wohnort nicht, und wenn sie von Menschen noch so sehr verfolgt würden. Sie nisten auch, wie die Dohlen, zwischen die kleinen Säulen und Thürmchen, auf Kirchen und andern Gothischen Gebäuden. Marder, Raben und mehrere Raubvögel stellen ihrer Brut nach. Mit den Rabenkrähen und Elstern leben sie immer im Streite, und mit erstern können sie sich nur im Winter und auf ihren Reisen vertragen. Sie sind nicht so scheu als die Raben- und Nebelkrähen, und können daher leichter als diese mit dem Schießgewehr erlegt werden. Ihren Nutzen und Schaden kann man aus der Nahrung derselben am besten beurtheilen; und sie sind daher mehr nützlich als schädlich. Wenn sie den gesäeten Erbsen und andern Getraide zur Regenzeit, wo ihnen die Insecten und Würmer fehlen, nachtheilig werden wollen, so muß man sie durch Scheufale und Klappern zu verjagen suchen. In England läßt man daher die frischbestellten Acker durch Kinder bewachen, schießt aber keinen von diesen nützl-

chen Vögeln. Nicht nur das Fleisch der Jungen, sondern auch das der Alten wollen einige wohlschmeckend finden. Die Eyer sollen ebenfalls gut schmecken. Die Schwungfedern haben fast gleichen Werth mit denen von der Rabenkrähe. Das Fleisch der Jungen ist nicht nur den Falken eine gute, sondern auch eine gesunde Speise, wenn sie kränkeln.

Sackfalle s. Falke.

Sackgarn, Garnsack ist eine Art von Netzen zum Fange der Kaninchen und Schnepfen.

Säger — Mergus macht in der Ordnung der Schwimmvögel eine eigene Gattung mit nachstehenden Kennzeichen aus. Schnabel: Durch spitzige Zäken gezähnt, spitzig zulaufend, an der Wurzel etwas niedergedrückt, die Nabelspitze hakensförmig. Nasenlöcher: In der Mitte der Kinnlade, klein und eyförmig. Füße: Die hintere Zehe frey, die äußeren vordern länger als die mittlere, und die innere auf der inwendigen Seite mit einer lappigen Haut besetzt. Diese Vögel halten sich mehr im Meere und in dessen Nähe auf, als im Innern des Landes auf Seen, Teichen und Flüssen. Ihre Nahrung besteht vorzüglich aus Fischen. Da diese Vögel in der Farbe sehr ändern; so ist daraus viel Verwirrung entstanden, und Einige machen so viel Arten als Farbenverschiedenheiten daraus; wie z. B. neu-

sich wieder Herr v. Paula Schrank in seiner Fauna boica I. S. 236. Andere aber ziehen sie zusammen. Beobachtungen im Kabinette können hier nicht entscheiden, besser die in der Natur selbst, und da haben wir denn keine genauere, als die vom Herrn Professor Otto, denen wir denn auch folgen werden. Ausser dem bereits oben genannten Gänse-Säger gehören noch folgende Arten zu dieser Gattung, als: 1) Langschnäbelicher Säger oder Meerrachen — *M. serrator*, Linn. heißt auch rothbrüstiger Säger, mittlere Tauchente, Langschnabel, langschnäbelicher Säger, wahrer Sägertaucher oder Seetaucher, Sägeschnäbler, gemeiner und gezopfter Säger, Tauchente, Schreckvogel, Scharbeje, Mörk, Fischtreiber, Tauchergans, Taucher-Kiewitz, gezopfter Kneifer, Schlichtente, langschnäblicher Seerachen, größerer rothbrüstiger Taucher, weißlicher Taucher, gemeiner Seerachen, rothbrüstige Tauchente, braunköpfiger Meerrachen, schwarzer, großer Taucher, Rache, schwarzer, bunder Meerrachen, große geschädte Ente, Mantelhalbente und langschnäblische Halbente. Die Kennzeichen dieser Art sind: der Schnabel ist lang und dünn; der Federbusch herabhängend; der Spiegel weiß mit zwey schwarzen Strichen; am

Männchen ist Kopf und Federbusch entenhalsig, um den Hals ein weißer Ring und die Brust röthlichbunt; am Weibchen Kopf und Oberhals dunkelrostfarben; die Kehle weiß und Vorderhals und Brust tief aschgrau marmorirt. Die Länge ist ein Fuß neun Zoll, wovon der Schnabel zwey und drey Viertel Zoll und der Schwanz drey und einen halben Zoll wognimmt; die Breite zwey Fuß sieben Zoll und die Flügel legen sich über der Mitte des Schwanzes zusammen. Das Gewicht ist 2 Pfund. Der Schnabel ist lang, schmal, dünn, starkgezähnt, an der Spitze übergekrümmt, oben roth mit einem schwarzen Streifen längs dem Nacken hin, unten roth mit schwarzen Flecken; der Augenstern purpurroth; die Füße orangefarben mit weißlichen Nägeln und dunkler Schwimmhaut; die Fußwurzel ein und drey Viertel Zoll hoch. Der Kopf mit dem bis über den Nacken hangenden, aus schmalen langen Federn bestehenden, und beweglichen Federbusch und ein Theil des Halses ist entenhalsig; der übrige Hals ist weiß, und macht ein weißes Halsband, nur hinten läuft ein schmaler schwarzer Strich auf die Schultern; der obere Rücken schwarz; die äußern Schulterfedern schwarz, die innern weiß; der untere Rücken und die Seiten aschgrau mit schmalen schwarzen Linien gestreift; die obere Brust rostfarbig, schwarz und weiß gefleckt; der übrige Unterleib weiß; die obern Deckfedern der Flügel schwarz

schwarz, die untern weiß; die vordern Schwungfedern dunkelbraun, die hintern weiß, schwarz eingefast; der Spiegel weiß mit zwey schwarzen Querstichen; die achtzehn Schwanzfedern braun am äußern Rande aschgrau und weißgefleckt, und spizen sich zusammengelegt zu. Das Weibchen hat fast eben die Größe, ist aber in der Farbe verschieden. Der Kopf und Obertheil des Halses ist dunkelrostfarbig; die Kehle weiß; der Vordertheil des Halses und die Brust tief aschgrau marmorirt; der Rücken, die Schultern, Deckfedern der Flügel, und der Schwanz braungrau. Man findet auch von diesem Vogel sehr merkwürdige Abweichungen in der Farbe bey beyden Geschlechtern. Es giebt Männchen, die an einigen Stellen des Kopfes schwarz sind ohne Glanz; andere haben zweymal so viel Weißes am Halse als andere, und das Weiße an den Flügeln ist ungleich reiner. Auch die Weibchen variiren durch ein weit lebhafteres Colorit. Folgendes scheinen Hauptvariationen des Alters zu seyn.

1) Der Säge schnäbler. *Mergus serratus* Gmelin. Linn. I. c. 2. Scheitel und Federbusch, sind dunkelbraun; die Kehle weißbraun; die hintere Hälfte des Halses und Oberbrust weißbraun gefleckt; Oberleib, Schwanz und Seiten braungrau; Unterleib weiß; Schnabel und Füße roth. Ein altes Weibchen oder junges Männchen. 2) Der braunköpfige Meerrochen — *M. cristatus*

— Kopf und Hals sind braun; die Seiten braun und hellgrau gewellt; Schnabel und Füße roth. Ein junges Männchen. 3) Der schwarze Meerrochen. *Mergus serratus niger*. Gmelin. Linn. Oben schwarz unten weiß; Hals kastanienbraun; Schwanz schwarz. Einjähriges Männchen. 4) Der bunte Meerrochen. *Mergus serratus leucomelas*. Gmelin. Linn. I. c. 7. Oben schwarz unten weiß; die meisten Deckfedern der Flügel und die kleinen Schwungfedern weiß; der Schwanz dunkelbraun. Ein sehr altes Männchen. Dieser Säger ist ein sehr geschickter Taucher und Schwimmer. Er ist überhaupt in allen seinen Bewegungen schnell, und dabey sehr scheu. Bloß auf seinen Wanderungen fliegt er hoch, sonst sehr dicht über Erde und Wasser hin. Man trifft sie in ganz Europa, besonders in den nördlichen Gegenden bis nach Grönland häufig an; auch im nördlichen Asien, auf den großen Flüssen Sibiriens und am See Baikal. Im Sommer sind sie gewöhnlich auf den Inseln und an den Küsten. Sie leben außer der Paarungszeit immer gesellig, ziehen, wenn sie nicht tief im Lande wohnen, nach der Heidezeit längs den Flüssen hinauf in die Seen und treiben da gesellschaftlich den bey der Tauchergang angegebenen künstlichen Fischfang. Im kalten Winter gehen sie weiter nach Süden zu, und man trifft sie dann auf Seen, Teichen und Flüssen an. Die Nahrung ist wie

wie bey der Tauchergans, oder dem Gänsefäger. Das Weibchen legt zu Ende des Aprils auf einer Insel, an einem Ufer oder einer Küste, in einem aus trockenem Gras und ihren eignen Federn verfertigten Neste acht bis dreyzehn schmutzigweiße Eyer, die es in vier Wochen ausbrütet. Er hat seine Feinde, die verschiedene Arten des Fanges und der Erlegung, so wie Nutzen und Schaden mit der Tauchergans gemein. In bey Schwedischen Scheeren werden sie ihres Fleisches und ihrer Federn halber in Menge geschossen und gefangen. 2) Weißer Säger oder weiße Nonne — M. Albellus — heißt auch weiße Tauchente, Wasserentchen, kleiner Merker, kleiner Sägertaucher, Wieselzopf, Ungarische Tauchente und gefleckte Tauchente, kleine Tauchente, Merck, Merchente, Eisenze, Eistaucher, Nonnentchen, Elserentchen, Winterente, Rheintaucher, Rheinente, Straßburger Taucher, Schekente, Kreuzente, weißer Sägertaucher, Weißzopf, Meventaucher, Mevendäcker, Niederländisches Entchen, kleiner weißköpfiger Säger, geschüttetes Entlein, Sternente und Pfeilschwanz. Die Kennzeichen der Art sind: Der Federbusch hängt herab; der Leib ist weiß; zwischen Schnabel und Augen ein schwarzer eyrunder Fleck; die Flügel

sind schwarz und weißbunt; am Männchen ist der Hinterkopf schwarz, so wie der Rücken; am Weibchen ist der Federbusch kleiner, der Kopf rostfarben und der Rücken dunkel- aschfarben. Sie ist etwas größer als eine Krickente, siebenzehn Zoll lang und zwey Fuß zwey Zoll breit. Der Schnabel ist ein und drey Viertel Zoll lang; der Schwanz drey und einen Viertel Zoll, und die gefalteten Flügel endigen sich auf zwey Dritttheile desselben. Der Schnabel ist lang, schmal, rund, an der Spitze übergekrümmt und schwarz; der Augenstern kastanienbraun; die Füße sind bläulichgrau; die Nägel schwärzlich; die Fußwurzel ein und einen Viertel Zoll hoch. Die Hauptfarbe des Gefieders ist weiß; von der Stirn bis ins Genick herab hängt ein schöner, aus schmalen langen Federn bestehender Federbusch, der oben weiß, unten aber schwarz ins Grüne spielend ist; die Augen umgiebt ein großer eyförmiger, schwarzer ansehnlicher Fleck, welcher sich bis zur Wurzel des Schnabels erstreckt; die Augenringe sind weiß; der Hals und die ganze untere Seite des Körpers schön weiß; die Seiten zwischen den Flügeln und dem Bauche weiß und fein gewellt; der Rücken schwärzlich; die Steißfedern bläulich; auf beyden Seiten gehen zwey schwarze Bogentlinien von der Schulter nach der Brust zu, über deren untere noch eine kleinere liegt; die Flügel sind schwarz, an den Achseln nach der Länge

der Flügel wellenförmig weiß; nahe am Oberarm machen die kleinen schwarzen Deckfedern ein großes Dreieck mit gezackten Schenkeln; die größern Deckfedern haben weiße Spitzen, so daß sie einen schwarzen Spiegel mit zwey weißen Bändern machen; die vordern Schwungfedern sind dunkelbraun mit schwarzen Schäften, die kleinern bläulich; der Schwanz zugespitzt und tief aschgrau. Das Weibchen, welches man in den naturhistorischen Werken wohl auch als eine eigene Art unter dem Namen Sternente (*Mergus stellatus*) aufgeführt findet, ist am Kopfe rostfarbig und hat einen kleinen Federbusch; die Augen umgiebt ein Fleck von eben der Gestalt und Farbe als beim Männchen; der Hals ist grau, hinten am dunkelsten; die Füße sind schön grau. Wegen ihres steten Untertauchens sind diese Säger dem Jäger bekannt genug. Sie können sehr weit unter dem Wasser fortgehen, ohne nur einmal empor zu kommen. Auch bey dieser Tauchentenart giebt es mancherley Varietäten: 1) Die kleine Tauchente. *Mergus minutus*. Gmelin. Lin. Sie ist kleiner; der Kopf und Hinterhals dunkelrostfarben mit einem kleinen Federbusch; Kinn, Kehle, Vorderhals und Seiten zur Hälfte weiß und rostfarbig; der untere Theil des Halses und die Brust dunkelbraun und weiß gesprenkelt; der übrige Unterleib weiß; die Flügel wie oben; die Füße dunkelbraun. Rücken, Schultern und

Schwanz dunkelbraun. Es ist ein junges Weibchen. Andere Naturforscher machen eine besondere Art daraus. 2) Der Wieselkopf. *Mergus mustelinus*. Der Kopf ist braun und weiß, und unter den Augen ein schwarzer Fleck; der Unterleib ist ganz weiß; der Rücken und der Schwanz aschgrau; ein doppelter Spiegel, oder auf den Flügeln ist erst ein großer weißer Fleck, dann ein schwarzer, hinter diesem ein schmaler weißer, dahinter ein fingerbreiter schwarzer und alsdann ein weißer, welcher von den zweyten Deckfedern gebildet wird. Ein junges Männchen. 3) Die Ungarische Tauchente. *Mergus Pannonicus*. Sie hat entweder einen glatten oder nur wenig gehaubten, rostfarbenen Kopf ohne schwarze Flecken unter den Augen. Sie ist weiß mit schwarzen Rücken, Schwingfedern, Schwanz und einer aschgrauen Brust. — Es ist ein junges Weibchen. 4) Die gefleckte Tauchente. *Mergus Abellus maculatus*. Weiß und blaugrau gefleckt; ein hinterliegender Federbusch, rother Schnabel mit schwarzer Einfassung. Bemerkenswerth ist, daß sich immer die gleichgefärbten Männchen und Weibchen von diesen Varietäten zusammen paaren und hierin den Tauben gleichen. Deshalb darf man sie aber nicht als Arten gleich trennen. Obgleich diese Tauchente nicht so scheu ist als die obige, so erfordert sie doch wegen des steten und schnellen Untertauchens beim Schließen große Aufmerksamkeit vom

vom Jäger. Sie geht auch sehr weit unter dem Wasser weg, ohne nur einmal empor zu kommen. Sie bewohnt die nördlichen und nördlichsten Gegenden von Europa, Asien und Amerika; und in Deutschland trifft man sie vom October bis zum März einzeln auf allen offenen Wassern an. Ausser dieser Zeit aber bewohnt sie die größern Flüsse, Seen und den Meeresstrand. Ihre Nahrung besteht aus Fischen, Insekten und Pflanzen. Das aus kurzem Geniste an den Ufern und Küsten gebauete mit den eigenen Federn ausgepolsterte Nest findet man immer mit acht bis zwölf weislichen Eiern. Man fängt und erlegt sie wie die vorige. Da sie bey dem Blinken des Feuers untertaucht, so muß man entweder mit der Flinte etwas unter dem Wasser abhalten, oder einen Schirm vor die Pfanne machen, welcher das Feuer deckt. Sonst sind sie eben nicht scheu, und man schießt sie auch gern im Aufsteigen vom Wasser. Weil einige Menschen den thranigen Fleischgeschmack lieben, so wird dieser Vogel auch unter den wilden Enten mit verkauft und gegessen. Die Federn braucht man zum Ausstopfen. Bey uns sind sie bloße Zugvögel und thun daher sehr wenig Schaden. 3) Schwarzeblinder Säger oder Fischereihalbente, *M. nigricollis* Bechst. — ist nicht größer als der vorhergehende, und hat einen Federbusch; ist oben grau unten röthlich weiß; der Kopf, Hals und die Schultern sind schwarz, der Schnabel und die Füße aber

roth. Man trifft ihn in Bayern um Beyerberg an.

Sänger — *Sylvia Lath. Motacilla Lin.* — ist in der Ordnung der Singvögel eine weitläufige Gattung mit folgenden Unterscheidungskennzeichen: der Schnabel ist gerade, ziemlich dünn, pfriemenförmig mit fast gleichen Kinnladen, mit unbedeckten Nasenlöchern; der bogenförmige Nagel der Hinterzehe ist nicht länger, als sie selbst. Die Vögel dieser Gattung lieben vorzüglich das Gebüsch, und nähren sich von Insekten und Beeren, auch mehrere von Würmern. Zur bessern Uebersicht werden die verschiedenen Arten in drey Familien abgetheilt, als: 1) die Grasmücken s. oben. 2) die Laubvögel s. gelbbäuchigen Säger; und 3) die Wurmfresser, s. blaukehligen und rothkehligen Säger.

Salzlecke oder Sulze ist ein Platz, wo man Salz zum Lecken für das Wildpret hinhut. Sie sind von großem Nutzen in Thiergärten, Gesehen und an Grenzen, in Wäldern, wo Wildpret wechselt. Das Rothwildpret nimmt solche jährlich zweymal an, nemlich im Frühjahr, wenn das Laub ausschlägt, und der Hirsch sein Geweih wieder aufsetzt, das Thier aber, wenn es ihr Kalb zu ernähren hat, dann wieder im Herbst nach der Brunst, da man denn die Lecken ohngefähr 4 Wochen vorher in Stand setzt, damit sie nicht so neu scheinen, und das Wildpret dennoch frische Witterung davon hat. Das Wildpret nimmt sie des

Salz

Salzes wegen an, welches ihm so gesund als wohlschmeckend ist. Das Geweihe vereckelt an Orten, wo Salzlecken sind höher, auch sind die Häute reiner als da, wo keine Salzlecken sind. Wo viele Salpetererde zu finden ist, nimmt aber das Wildpret die Salzlecken nicht leicht an. Den Vasallen ist nicht erlaubt, Salzlecken in der Nähe der landesherrlichen Reviere zu halten, damit sich nicht das Wildpret aus diesem in die Vasallenreviere ziehe. Man legt die Salzlecken an solchen Orten an, wo man große Dämme und Wasser in deren Nähe findet. Sie werden folgendergestalt bereitet: Man macht einen Kasten 2 Ellen ins Gevierte von Schalholz, so daß er eine Elle tief in, und eben so hoch über die Erde komme. In diesen schlägt man die Salzmasse ein, welche aus alten Backofenlehm, Heringslade, Kampferöl, Eberwurzel, Liebstöckel, und wenn man es haben kann, dem Harne aus dem Blatte eines Thieres nebst dessen Feigblatte bestehet, und steckt in die Mitte einige Brüche oder Reiser von Tannen- und Fichtenholze. Ist Viehhütung in der Gegend, so wird der Platz mit Stangen umgeben, welche an Pfähle 3 Fuß hoch gebunden sind, über diese gehet kein Vieh, das Wildpret aber setzt darüber.

Sammentente — *Anas fusca* — gehört in der Gattung Ente mit dem stummen Schwan als besondere Art in die Familie und heißt auch braune

Seeente, Moderente, braune, schwarzbraune wilde, wilde braune, nordische braune oder schwarze Ente, Moor- und Mohrente, Fliegenente, oder Turpane. Sie hat hinter den Augen einen weißen Fleck, und auf den Flügeln einen weißen Strich; das Männchen ist sammetschwarz und mit einem Schnabelhöcker, einen gelben Schnabel, der in der Mitte schwarz ist; das Weibchen dunkelbraun und ohne Nasenhöcker. Die Länge beträgt 20 Zoll. Ihr Wohnort ist der Norden beider Welttheile. Sie zieht aber weg, und kommt dann zuweilen einzeln nach Deutschland. Ihre Nahrung besteht aus Fischen, Muscheln und Seegras. Das Nest findet man auf dem Lande mit 4 bis 10 weißen Eiern.

Sanct Huberts fest ist ein Jagdfest, welches an den Orten, wo die Parforcejagd üblich ist, alljährlich am 2ten November, als am St. Hubertstage, durch eine solenne Parforcejagd und darauf folgende anderweite Lustbarkeiten gefeiert, und damit zugleich die Parforcejagd für das laufende Jahr beschlossen wird.

Sandhuhn — *Glareola* — macht in der Ordnung der Sumpfvögel eine eigene Gattung aus mit nachstehenden Kennzeichen: Schnabel, kurz, vorne etwas zusammengedrückt, mit erhabenem Rücken, nach der Spitze zu gebogen, und wie ein Hühnerschnabel überschlagend; der Na-

hen weit. Nasenlöcher: klein, länglich eckund, und krumm. Füße: nicht hoch; die Vorderzehen mit einer kleinen Haut an der Wurzel verbunden. Schwanz: gabelförmig. Die Gestalt dieser Vögel ähnelt zwar den Schwalben; doch gehören sie nach der Lebensart und andern Kennzeichen mehr noch zu den Sumpfvögeln. Bey uns kommen folgende Arten vor: 1) Gemeines Sandhuhn, *G. austriaca*, Gmelin. Linn., heißt auch: Grieshuhn, Wiesen-
schwalbe, Oesterreichisches Sandhuhn, Koppengerlein, Kobelregerlein, schwalbenschwänzige Steppenralle, Sandvogel schlechtweg, und Sandvogel mit dem Halsbande. Der Schnabel schwarz, an der Wurzel roth; Kehle und Bauch röthlich weiß, erstere mit einem schmalen, unter der Mitte der Augen anfangenden, schwarzen Bande eingefast; die Gurgel und die Oberbrust röthlich grau; Schnabeleden, Augenlieder und Füße roth. Es wählt sich zum Wohnort die südlichen Flüsse und Seen Deutschlands, z. B. die Donau — zieht im Herbst weg. Die Nahrung besteht in Wasserinsekten. Entweder gehören die folgenden Arten, als Altersverschiedenheiten hierher, oder sind gar aus andern Gattungen nach ihren unvollkommenen Beschreibungen hierher gekommen. 2) Schwarzköpfiges Sandhuhn, *G. torquata*, hat auch die Namen: Wiesen-
schwalbe mit dem Halsbande, Sand-

regerlein, Kiegerlein, Sandhuhn mit dem Halsbande, Tullfiß. Oben graubraun, unten weißlich; auf dem Vorderkopfe ein schwarzer Fleck; um den Hals ein brauner Ring. Es könnte vielleicht auch ein junger Regenpfeifer mit dem Halsbande seyn. Bey so unvollkommenen Beschreibungen thut die Verschiedenheit der Füße nichts. Sein Wohnort ist Schlessen und die Lausitz. 3) Geflecktes Sandhuhn, *G. naevia*, Gmelin. Linn., heißt auch: geflecktes Seerebhuhn, Rothknuffel, Rothknüllis, und rothes Wasserhuhn mit schwarzen Füßen. Schnabel und Füße schwarz; Bauch und After rothweiß und schwarz gefleckt. Oberleib braun mit dunklern, undeutlichen Flecken, und die Wurzel des Schwanzes ist weißlich. Es hat mit vorigem gleichen Wohnort.

Sandläufer — *Arenaria* — macht in der Ordnung der Sumpfvögel eine besondere Gattung mit folgenden Kennzeichen aus: Schnabel, wie bey der Strandläufergattung. Füße, eben so, nur ohne Hinterzehe. Bey uns kommt nur vor 1) Gemeiner Sandläufer, *A. vulgaris*, Bechst., auch Strandläufer und Sandregerlein genannt, und bey Linne *Tringa arenaria*. Schnabel und Füße schwärzlich: der Oberleib weißgrau, schwärzlich gefleckt, der Unterleib weiß; vom Schnabel bis zu den Augen eine graue Linie. Man darf ihn nicht

nicht mit dem jungen Charadrius Hiaticula verwechseln, dem er in der Farbe ähnlich sieht, von welchem er aber im Habitus gar merklich verschieden ist. Er wählt sich zum Wohnort: die sandigen Meeres- und Flußufer des Nordens — zieht im Herbst in Menge, doch sieht man ihn im mittlern und südlichen Deutschland nur einzeln.

Sangheerd ist eine Art von Vogelheerd, den man nur auf die größern Sangvögel stellet. Es giebt deren drei verschiedene Arten: 1) Der Sommerheerd, welcher mit verhaltenem Gesange gestellt wird, 2) der Herbstheerd auf die Zugvögel, als Weindroßeln, Meeramseln ic. und 3) der Winterlagerheerd auf Krammetsvögel. Hier ist nur von der ersten Art die Rede. Auf solchen großen Sangheerden muß man die Büsche ganz leicht und einzeln, und nicht so dick, wie auf den Herbstheerden, stecken. Auch wird vor die Gräbchen der Nege, so lang diese sind, auf jede Seite eine schwanke runde Stange, kaum vier Quersfinger hoch von der Erde gemacht, worauf die ankommenden Vögel gern sitzen und dem Gesange zuhören. Zu den Läufern und statt der Büsche, die man zu den Herbstheerden brauchet, spannet man eine feine Leine nach der Länge der Nege, scharf an, an, oder in diesem gehet ein kleiner Ring, woran der Läufer angemacht wird, so daß er bequem daran

hin und her laufen kann. Demohngeachtet aber besefliget man noch einen Läufer an einem Büschel in der Mitte des Busches. Der beste Platz zu so einem Heerde ist ein Wiesengrund in einem Walde, dahin stellet man den Heerd, wo möglich an den Anfang einer Höhe. Ist kein Wasser in der Nähe, so muß man ausgehölte Klößchen oder Scherben in die Erde graben, und von Zeit zu Zeit etwas Wasser hinein gießen. Einen solchen Heerd muß man fleißig abwarten, und früh vor Tage ausgehen, um noch vor Tage aufstellen, die Lockvögel zurecht setzen, die Läufer anbinden und füttern zu können. Wenn viel Zugvögel im Anzuge sind, so braucht man um einiger wenigen, etwa einsallenden willen, nicht sogleich zu ziehen, um die andern nicht zu verschlagen, wenn sie aber nicht fort wollen, nimmt man mit, was man bekommen kann. Die größern Sangvögel singen auf solchen Sangheerden höchstens sechs Wochen. Wenn man sie nur im Sommer stellen will, so setzt man wenigstens 12 oder mehrere Lockvögel ein, und wenn diese nach einigen Wochen mit ihrem Gesange nachlassen, wieder andere an deren Stelle, so kann man einen solchen Heerd fast bis zum Herbst brauchen. Weil sie aber anfänglich gewöhnlich traurig sitzen, und nicht singen, so muß man ihnen Ameisenopfer, ingl. gestoßenen Hanf und Mohn unter das Futter, auch oft frisches Wasser in ein Näpfschen geben, damit

Damit sie nicht allein saufen, sondern sich auch baden können. Man hängt dabey aber allezeit jede Gattung gegen einander über auf, als Droseln gegen Droseln, Amseln gegen Amseln.

Sattel ist eine Vorrichtung auf einer Rüstung oder Schnepper, dergleichen man zum Abschießen auf Stangen befestigter hölzerner Vögel und sonst gebraucht; er ist von Elfen- oder andern Beine und wird quere über die Rüstung, dahin wo die Sehne hinschlägt, eingeschoben, und in der Mitten etwas ausgeleitet. Sein Endzweck ist, daß der Volzen etwas höher von der Brust ab zu liegen komme, und mit seinen Federn, besonders an der Säule nicht anstreifen könne, wenn losgeschossen wird. Man verhindert dadurch das Flattern der Volzen, und bewirkt einen accuraten Schuß. Es bedeutet aber auch eine Art Stellung nach Raubvögeln, welche aus einem zwey Finger breiten und etwa 6 Zoll langen, mit mehreren Pferdehaardornen versehenen ledernen Riemen besteht, der einer Taube über den Rücken gebunden wird, damit der auf sie stoßende Raubvogel sich in den aufgestellten Pferdehaardornen fängt.

Satz, nennen die Jäger eine Pause, wenn nämlich bey einem Hauptjagen in währendem Zuge drey mal geblasen, und dazwischen drey mal inne gehalten wird.

Satzhase heißt die Häslein oder das Weibchen des Hasen.

Saufinder, Sauheller ist ein Jagdhund, der ein Schwein in seinem Lager auffucht, und durch Herumspringen und Bellen es so lange aufhält, bis sich der Jäger zum Schusse hinan schleichen kann. Er muß von mittler Größe seyn, man nimmt gewöhnlich einen Schweißhund dazu. Man muß sie von Jugend an auf schwarze zahme Sauen abrichten, und ihnen von Zeit zu Zeit etwas Schweiß von wilden Sauen genießen lassen. Auch muß man sie von den Färthen anderer Thiere, als Wildpret, Rehe, Füchse, Hasen u. abhalten.

Saugarten, Saufang ist ein ziemlich großer, mit starken Pfählen eingezäunter Platz im Walde, worinnen die Sauen gefirret und dergestalt eingesperret werden, daß sie nicht wieder heraus können. Er wird auf folgende Weise angelegt: Wenn man einen Ort im Walde hat, in dessen Nähe Erdmast, warme Brüche, große Dickigte, Ameisenhausen, Farenkraut und allerley Wurzeln, vorzüglich auch warme Quellen befindlich sind, und der von allerley recht verwachsenen Gebüsch ganz düstert ist; so hat man den rechten Platz dazu gefunden, den man nun nach beliebiger, oder von der Natur vorgeschriebener Größe ins Gevierte auf obige Art verjähnet. Wo aber die Flügel zusammen gehen, muß man auswendig einen flachen Berg aufführen, inwendig aber die Planken glatt hobeln und den Platz ab-

abhängig machen. Um die Sauen an diesen Ein- und Ausgang zu gewöhnen, muß man über den Einsprung Brücken von Schalholze, dem flachen Bogen gleich legen, und die Sauen mit Eichel und Bucheckern auf den Flügeln firren, in den Garten aber Gerste oder ander Getraide, auch Matz oder wildes Obst streuen. Wenn man nun im Herbst merkt, daß die Sauen die Körnung angenommen haben, so thut man ein Paar gezähmte wilde Bachen in den Garten, und nimmt die Brücke weg. Wenn nun ein Rudel Sauen über die Flügel wechselt, und die Eicheln findet, gehen sie den Flügeln nach zum Einsprünge, und wenn sie auf den Berg kommen und die Bachen darin wittern, auch vor sich den niedrigen Absprung sehen, so springen sie hinein; hat nun einmal eines den Anfang gemacht, so folgen die übrigen alle nach, können aber nicht wieder heraus, weil sie auf den eichenen Pfosten bey'm Eingange nicht Fuß fassen können, und werden also entweder in aufgestellten Netzen gefangen, oder sonst getödtet. Inwendig muß vor die eichenen Pfosten ein zwey Ellen tiefer Graben gemacht, und mit allerley Buschwerk verblendet werden.

Saugloch ist bey'm Dachs ein Loch zwischen dem Weidloche und dem Schwanz, wodurch er im Winter, wo er im Bau bleibet, das im Sommer angelegte Fett zu seiner Nahrung aussauget s. Dachs.

Sauhage, Sauhehen heißt das Verfolgen und Fangen der wilden Schweine mit den Saurüben oder Hahhunden.

Sauhunde sind Saurüben und bloß auf Schwarzwild abgerichtet.

Saujagd ist eine Schweinejagd, wenn mit dem Zeuge gestellt wird.

Saukasten ist ein Behälter, um lebendige Schweine von einem Orte zum andern zu bringen. Er wird nach verhältnißmäßiger Größe eines Keulers, eben so bereitet, wie ein Hirschkasten, nur vorn und hinten mit Zughüren, damit ein, auf dem Kasten stehender, Mann, wenn er das darinnen steckende Schwein herauslassen will, dieselben aufziehen, und dabey vor aller Beschädigung sicher seyn kann.

Saunetze, Schweineneze, Saugarne sind besonders zur Saujagd gestrickte Netze, jedes 80 doppelte, oder 160 einfache Wadschritte lang. Ein solches Netz muß wenigstens 30 Maschen hoch gemacht, und dieselbe über der Rückbank fest angezogen werden. Die Maschen halten 6 Zoll ins Gevierte. Die Forkeln müssen so stark seyn, wie zu Hirschnetzen, aber nur $2\frac{1}{2}$ Elle hoch. Sie werden gleich den Hirschnetzen gerade, mitten auf die Flügel gestellt. Zu jedem Flügel gehören zwey Zeugknechte und acht Mann, wovon 2 das Netz im Abfahren abschla-

gen,

gen, 2 die Hefel mit Schlägeln einschlagen, 2 mit Pfahleisen Löcher machen, und 2 die Forkeln einsetzen. Die Ober- und Unterleinen müssen stark angezogen, und wo möglich an Bäume gebunden werden, damit die Säuen im Einbrechen nicht die Hefel aus der Erde reißen und durchbrechen. Wenn die Säuen bey einem Jagen in die Enge getrieben sind, stellet man diese Neze inwendig an den Luchern herum, und legt sie oben auf die Forkeln, doch muß man den Busen glatt anziehen, damit die Neze an den Luchern steif stehen, und die Säuen durchschlagen können.

Saurüden sind eine Art starker Jagdhunde, die man zur Sauhaze braucht. Man kann dazu jeden Fleischer, oder Hirtenhund brauchen, doch thut man besser, schon abgerichtete, als ganz junge Hunde dazu zu nehmen, denn sie fallen gewöhnlich zu unvorsichtig an. Weil sie oft von Reulern beschädiget werden, so ist wohlgethan, daß die Jäger allezeit Zwirn nebst schneidenden Rehnadeln bey sich führen, um in diesem Falle die Wunde sogleich heilen zu können. Wie diese Wunden ferner zu heilen, s. Hundekrankheiten, No. 4. Die besten sind die sogenannten Pommerischen Saurüden, welche langhärig, rauh, dauerhaft sind, gut packen, und dem Belieben des Jägers sehr gut folgen.

Schäften die zerrissenen Leinen im Jagdgarne, s. Leinen

anbinden. Allein bey dem Büchsenmacher bedeutet es den eiserne Lauf der Flinte ins Holz legen, welches alsdenn der Schaft genannt wird.

Schärfen heißt bey dem Jäger so viel, als ab- und aufschneiden.

Schaukel heißt bey dem Dammhirsche das obere breite Ende des Gehörns.

Schaukelhirsch ist der Name des starken Dammhirsches.

Scheerenschnäblicher Kernbeißer, *L. Pytiopsittacus*, gehört zur Gattung Kernbeißer, s. oben als eine besondere Art, die auch großer Kernbeißer oder Kreuzschnabel, Krummschnabel, großer Krummschnabel und Tannenpapagey genannt wird. Schnabel stark, kürzer als die Mittelzehe, an der Spitze kreuzweis vor einander hingebogen, doch so, daß die untere Kinnlade nicht über den Rücken der oberen hinreicht; Männchen: Hauptfarbe mennigroth und graulichgrün; Weibchen graugrün gelblich gemischt. Größe des Seitenschwanzes, 7 Zoll lang. Variirt in der Farbe: a) Jung, aschgrau mit gelbem Steiße; Kopf hell und dunkelgrau gewellt. b) Die Einjährigen sind wohl wie bey dem vorhergehenden die rothen; dann werden sie eldengrün und unten röthlichgelb. Dieser Vogel bewohnt die Kie-

ferwälder Deutschlands, von Pommern, Brandenburg, Sachsen, Franken zc. und streicht vom November an den ganzen Winter durch. Seine Nahrung besteht in Holzsaamen, vorzüglich Kiefern- und Eulensaamen. Das Nest findet man allemal auf den Spizen der Kiefern, und bisweilen auch in niedrigem Buschwerwerke im May mit vier weißen blutroth gesprengten Eiern.

Scherzen sagt man, wenn die jungen Wild- und Rehkälber mit einander spielen und sich herum jagen. Allein auch das alte Wildpret scherzet, besonders wenn es früh zu Holze zieht.

Scheubel oder Scheibel ist ein Kennzeichen in der Hirschfärthe, das auf hartem Boden entsteht, wo der Hirsch die Oberfläche mit dem Grase abschiebet, daß man es, so groß als die Färthe ist, ausheben kann.

Scheuchen, Scheuchung heißt, das Wildpret durch angezündete Feuer, und sonst von Feldern und Wiesen abhalten. Nach der Chursächf. Landesverordn. v. 1. Oct. 1555. T. v. Jag. C. A. I. S. 60. ist verordnet, daß den Leuten, die an und innerhalb der Wildbahn ansäßig sind, nachgelassen seyn soll, mit Hunden, die keine Jagdhunde sind, das Wild abzuschrecken. Wie man Vögel scheuchet, s. Scheusal.

Scheusal, Scheusel ist ein, auf dem Felde oder in ei-

nem Garten, aufgestelltes, von alten Lumpen zc. verfertigtes Zeichen, um Vögel und Wildpret abzuhalten, daß sie den Früchten keinen Schaden thun.

Schießen und Virschen sind Jägerausdrücke, wovon ersterer eigentlich vom kleinen Weibwerke als Hasen, Hühnern zc. und allem, was mit der Klinte erlegt wird, ausschließlich gilt; letzterer oder Virschen hingegen, wenn mit der Büchse ein Stück Wildpret geschossen worden ist.

Schießen lassen spricht der Jäger, wenn er den Leithund in der Arbeit vorwärts am Hängefelle fortläuft, und das Hängefelle durch die Hand ebenfalls ein Stück fortläuft, s. Leithund.

Schießgeld, Schußgeld, Virschgeld, Fanggeld, Virschgeld ist dasjenige Geld, für erlegtes, oder gefangenes Wildpret aller Art, sowohl als für Raubthiere und Raubvögel, welches der Jäger erhält. Ich kann nicht unterlassen hier folgende Anmerkung einzuschalten: An manchen Orten bekommen die Jäger für die Raubthiere kein Schießgeld, sondern an dessen Stelle die Wälge, da sie denn, wie natürlich, das Schießen und Fangen derselben verschieben, bis die Wälge gut sind, wodurch aber weit weniger erlegt werden, als wenn man sie im Sommer, wenn sie noch jung sind, umbringeret. Es ist daher besser, die Raubthiere mit Gelde auszulö-

zulösen, weil dadurch die Jäger eher veranlaßt werden, ihre Vertilgung zu rechter Zeit zu betreiben.

Schießheerd ist wie *Pantera*, eine Art Vogelheerd.

Schießhütte ist eine auf einem Baume oder andern erhabenen Orte bey Salzlecken, Luderplätzen errichtete Hütte, um Wildpret, Raubthiere und Raubvögel darinnen unbemerkt schießen zu können.

Schießhund ist so viel als vorstehender Hund.

Schießkarren ist so viel als Schießwagen und Katrenbüchse.

Schießpferd, **Schupferd**, **Treibpferd**, ist ein zur Jagd abgerichtetes Pferd, das vor- rück- und seitwärts, bloß durch Berührung mit den Beinen zu lenken ist, auch nach Erfordern, ganz stille steht, ohne sich zu rühren, sich auch vor dem Schusse so wenig, als vor herauspressendem Wildpret scheuet, damit man auf diesem Pferde sitzend, sich heranschleichen, und das Wildpret vom Pferde schiessen kann.

Schiffen heißt bey der Falknerey, dem Falken frische Schwungfedern aufsetzen, wenn er die Alten zerstoßen hat.

Schild ist ein Stück Leinwand, worauf eine Kuh, ein Pferd

ic. gemahlt ist, und welches die Jäger bey dem Rebhühnerfange mit dem Treibezeuge brauchen. Allein **Schild** heißt auch der breite, dicke Knorpel, welchen die starken Keuler und Hauptschweine über den Blättern oben auf dem Rücken im Harbste bekommen, wenn sie feist werden. Endlich nennt man auch an Haselhühnern die schwarzen, an Rebhühnern die rothen und an Enten die grünblauen Federn auf der Brust ein **Schild**.

Schilffänger, *Sylvia phragmitis*, Bechst. — hat auch die Namen: **Rohrschmäher**, **kleinster Rohrschirf**, **Wasserweißflehchen**. Dunkel olivengrün mit schwarzen Längsflecken; der Steiß rostfarben; über den Augen ein gelblichweißer Streifen; der Unterleib gelblichweiß; der Schwanz so wie seine Federn abgerundet, $5\frac{1}{2}$ Zoll lang. Er hat Aehnlichkeit mit dem Rohrsänger, unterscheidet sich aber schon durch den Schwanz hinlänglich. Er kommt in manchen Werken unter jener Beschreibung mit vor. Dieser Vogel wählt sich zum **Wohnort**: Geröhrig busch- und schilfreicher Seen und Teiche — zieht vereinzelt weg, und hat zur Nahrung Wasserinsekten, Würmchen und Beeren. Man findet sein Nest im Schilf und an Weidenbüschen.

Schirm ist so viel als Jagdschirm.

Schlägel, **Schlegel** heißt 1) die hölzerne Keule, womit die

die Hefstel eingeschlagen werden.
2) Der Hinterlaust oder die Hinterkeule des Rehbo.

Schlagbär nennet man die wütendsten und stärksten Bäre, die eine solche Stärke in ihren Vordertagen haben, daß sie einen Reuter sammt dem Pferde darnieder schlagen können. Man findet sie vorzüglich in den Alpen.

Schlagbauer ist ein, ohngefähr 3 Fuß langer, aus 3 Abtheilungen bestehender Vogelbauer in dessen mittelsten Theil der Lockvogel gethan wird. Die beyden Seitenabtheilungen hingegen, in welche etwas Futter gestreuet wird, haben Fallgitter, die man durch Stellhölzer und eine in den Bauern befestigte Zunge so aufstellt, daß der nach dem Lockvogel und Futter gehende fremde Vogel darauf tritt, wodurch die Stellhölzer umfallen und die Fallthüre zufällt.

Schlagbaum ist eine Falle für Raubthiere, welche folgender Gestalt bereitet, und im Walde aufgestellt wird. Man legt nemlich zwey Stangen neben einander in die Erde, daß nichts davon zu sehen ist, läßt aber so viel Raum, daß eine dritte dazwischen gelegt werden kann. Dann nimmt man eine dazwischen einpassende lange Stange, schlägt vorne zu beyden Seiten zwey starke Gabeln von eichenem oder birkenem Holze, und darüber ein Querholz. Hierzu flechtet man einen Kranz von zähen Weiden, und befestiget da-

mit die mittlere lange Stange in der Höhe. So läßt man ihn den Sommer durch stehen, damit die Thiere sich daran gewöhnen. Die Stellhölzer müssen ihre Rinde, und wo möglich auch etwas Laub behalten, damit es ein natürliches Ansehen gewinne. Auf den Seiten verweist man es mit Ästen oder Reißholz, und suchet alle Wege zu verhindern. Wenn man nun bald den Fang damit einrichten will, so schleppet man erst einige Tage durch, diese Baume mit Luder, Haasengestheide, oder gebratenem Hering u. über die Bäume weg, und wenn man merket, daß Raubthiere dieser Spur nach, und fleißig über den Schlagbaume gehen, so stellet man ihn fangisch, d. h.: Man setzet in der Mitten der Schlagstange eine Stütze, legt hinten ein, nach Beschaffenheit des Thieres, das man fangen will, schweres Gewicht, steckt über das Querholz durch den Kranz ein Stellholz vorn kurz an, bindet mit dem andern Ende inwendig eine doppelte oder dreyfach gedrehte, pferdehärne Schnur, oder doppelten messingenen Drath um das Unterquerholz, das genau aufgestellt. und die Schnur quer über gezogen, und nach des Thieres Größe hinten angebunden wird.

Schlagen heißt 1) wenn der Hirsch und Rehbock das rauhe Häutchen von ihren neuaufgesetzten Gehörn abschlagen, 2) wenn eine Sau mit ihrem Gewehr, oder ein Bär mit seinen Zähnen

Töten einen Menschen oder Hund beschädiget, 3) der Gefang mancher Vögel, z. B. der Wachtel, der Nachtrigall, 4) das Fangen des Raubes von den Raubvögeln.

Schlagen mit dem Weidemeßer, s. Weidemeßer.

Schlagheftel ist so viel als Schwangheftel.

Schlagwand ist ein Garn, das sich auf den Heerden mit Schlagstäben auf- und niederziehen läßt.

Schlechtbehangen nennt man Hunde, die keine langen und breiten Schlappohren, so wie auch keine großen Lefzen an den Mäulern haben.

Schlechte Nase heißt, wenn der Leithund nicht bald Fährten findet, und die Spuren leicht übergeht.

Schlechter Hirsch ist so viel als geringer Hirsch und Espieser.

Schlechter Jäger ist ein solcher Jäger, der seine Kunst nicht versteht.

Schleichen heißt, gegen den Wind auf die unbemerkbarste Art den zu schießenden Thieren und Vögeln sich nähren.

Schleife, Schlinge ist ein, oder mehr zusammengebrochete Pferdehaare, dessen eine

Ende man zu einer Schleife knüpft, und durch diese das andere ziehet, auch so in die Mündung richtet, daß ein Vogel sich darinnen fangen muß. Man kann sie auch aus seidenen oder andern Fäden machen. Wenn sie so eingerichtet sind, daß sich die Vögel am Halße fangen, heißen sie Schlingen, geschieht aber der Fang an den Füßen, so werden sie Schleifen genannt. Zum Rebhühner und Wachtelfange macht man 3 oder 4 Schleifen an einen Bügel, der an jedem Ende eine Spitze hat, womit man ihn in die Erde steckt. Man bringet sie in Büsche und auf ihren Gängen so neben einander an, daß, wenn sie einen Vögel verfehlen, sie doch in eine andere laufen. Schnellschleifen macht man auf folgende Art: Man macht Kerben in zwey hölzerne Pföcke, spizet diese zu, und steckt sie bergestalt in die Erde, daß eine Kerbe dieß, die andere jenseits gekehrt steht. Dazu schneidet man ein rundes Hölzchen an beyden Enden viereckigt, daß es in der in beyden Pföcken gemachten Kerbe genau einpaßt, und macht daran 3 oder 4 Schleifen. Dieses macht man an eine lange schwache Ruthe, die in der Mitte mit einem starken Bindfaden angebunden ist. Diese Ruthe spizet man am dicken Ende, und steckt sie fest in die Erde, daß sie, wenn sie gebogen wird, recht in die Kerbe der eingeschlagenen Pföcke reiche. Das Rebhuhn, die Schnepfe &c. komme nun, woher sie wolle, so

so lauft es das Hölzchen von der schwanken Ruthe ab, und schnellet die Ruthe in die Höhe, daß es eine Schleife bey dem Kopfe oder Füßen ergreife.

Schleppen ist eine Verrichtung, die man vornimmt, um einen Fuchs oder ein anderes Raubthier auf den Platz zu bringen, wohin man ihn können und in der Folge ein Eisen, um ihn zu fangen, legen will. Man bratet nemlich eine Kage, der man das Gescheide ausgenommen, oder einen Hering, oder man nimmt ein bloßes Hasengescheide, und schleppet dieses im Walde herum, bis dahin, wohin man das Eisen legen will, ist es aber ein Schlagbaum, so schleppet man auch darüber weg, S. Fuchsfang.

Schloß heißt 1) der Knochen bey den meisten Thieren weiblichen Geschlechts, der sich aus einander giebt, wenn sie ihre Jungen zur Welt bringen. Weil das Auseinandergeben bey den Bären nicht geschieht, so kommen ihre Jungen so klein auf die Welt, daß sie dieser Oeffnung nicht bedürfen, 2) s. Flintenschloß.

Schloßtritt oder Schlußtritt ist derjenige Tritt, den man allezeit in der Mitte eines Hirschbettes findet, wenn er aus demselben aufgestanden. Er entsteht dadurch, daß er im Aufstehen sich auf den rechten Fuß stemmet. Bey dem Thiere ist dieses der Fall nicht, sondern es

bedienet sich dazu des linken Fußes zur Seite des Bettes.

Schluff, Schlupf heißt der gewöhnliche Weg eines Thieres durch eine Hecke, nach einem Felde, Weinberge, Garten ic.

Schluff heißt, wenn der Hirsch mit der Hinterschaale so gerade in die Vorderschaale tritt, daß es das Ansehen gewinnt, als wenn es nur mit einem Laufte geschehen wäre. Das Thier thut es selten oder nie.

Schmalreh ist eine jährige Rinde.

Schmalthier ist ein Wildkalb weiblichen Geschlechts, das das erste Jahr seines Alters erfüllet hat. An manchen Orten bekommt es schon im ersten Jahre nach der Brunst und Verhärung diesen Namen.

Schmehlen, Schmählen, Schrecken, sagt man vom Rehe, wenn es einen lauten Schrey hören läßt. Wenn ein Reh unvermuthet einen Menschen, Hund, ein Raub- oder anderes Thier gewahr wird, und noch nicht weiß, was es ist, zieht es unter beständigen Schmählen immer von fern herum. Sobald es aber seinen vermeynten Feind gewiß kennt, flieht es schnell, ohne zu schmählen.

Schmeissen sagt man, wenn die Raubvögel ihre Exkremente von sich lassen.

Schmiel.

Schmälente — *Anas Jancea*; Frisch — heißt auch **Schmalente**, **Bisamente**, **kleine Mittelente** und **Weißhäfchen**. Kopf und Hals sind stark; der Schnabel mit einem schmalen haakenförmigen Nagel ist so wie die Füße schwarz. Beim Männchen ist der Kopf und Hals entenhalbig; Spiegel schwarzgrün; weiß eingefast; die Brust schwarz mit Purpurglanz; das Weibchen ist lechengeau. An Größe gleicht sie der Krickente. Sie hat ihren Wohnort auf deutschen Seen, ausgetretenen Flüssen und großen Teichen, wo man sie hauptsächlich im Spätherbste auf ihrem Zuge antrifft. Ihre Nahrung sind Insecten, Frösche, Fische und Wasserkräuter.

Schnabel ist 1) der harte Theil am Kopfe eines Vogels, wodurch er seine Nahrung einnimmt. 2) Eine Gabel, die man den Hühnerhunden, wenn sie mausen, oder sonst tief suchen, so anschnallet, daß sie gerade vor der Nase, wie ein Schnabel steht, und den Hund verhindert, die Nase zur Erde zu bringen.

Schnatterente, *A. Strepera* Linn., heißt auch **Schnarr** und **Lärmente**, graue und braune Ente; **Mittelente**, **Leiner**, **Scheerentlein** und **Weißspiegel**. Die blattartigen Zähne (Lamellen) des schmalen Schnabels sehr lang, fast so lang, wie an der Löffelente. Daran wird auch das

Weibchen dem minder praktischen Ornithologen leicht kenntlich; der Flügelspiegel weiß; das Männchen am Schnabel schwarz, am Oberücken und an der Brust mit bogigen schwarzen und weißlichen Linien gezeichnet; das Weibchen am Schnabel bräunlich; auf dem Rücken schwarzbraun mit rostgelben Federkanten und an der Brust röthlichbraun, schwarz gestreift, 19 Zoll lang. Die Jäger nennen sie **Mittelente**, weil sie in der Größe das Mittel zwischen der gemeinen wilden Ente und der Krickente hält. Ihr weißlicher Spiegel macht sie von weitem kenntlich, und dieß ist auch das Hauptkennzeichen, wodurch sie der Jäger von der wilden Ente unterscheidet. Sie lebt vorzüglich in der Brutzeit auf Seen und großen Flüssen im Norden von Europa und Asien; auf ihrem Zuge im Herbst und Frühlinge aber einzeln und in großen Heerden in Deutschland auf Seen, Brüchen, großen Teichen und seichten sumptigen Flußufern. Ihre Nahrung sind Insecten, Schnecken, Fische und Wasserpflanzen.

Schneckenrundung, **Schneckenordnung** ist bei der Jagd ein, wie andere Flügel, gehauener Weg, der aber schneckenförmig, und daher immer enger zusammen läuft, und nirgends zusammen trifft.

Schneefink — *Fringilla nivalis* — macht in der Gattung, und zwar in der ersten

D

Fami.

so lauft es das Hölzchen von der schwanken Ruthe ab, und schnellet die Ruthe in die Höhe, daß es eine Schleife bey dem Kopfe oder Füßen ergreife.

Schleppen ist eine Verrichtung, die man vornimmt, um einen Fuchs oder ein anderes Raubthier auf den Platz zu bringen, wohin man ihn kören in der Folge ein Eisen, um zu fangen, legen will.

bratet nemlich eine Kröte man das Gescheide, das hy-men; oder einen Fagelgang man nimmt ein, genannt, gescheide, und so Familie der Waide herum, eine eigene Art hin man das, im Norden ist es aber, im Norden Welt wohnt, schleppet, Winter zuweilen in S. Fuß durch Deutschland zieht.

die Schneehaube ist orange-gelb; die Füße sind gelblich; die Hauptfarbe ist schneeweiß; die Schwungfedern aber sind von der Spitze an bis zur Mitte schwarz; die Länge beträgt drittehalb Fuß. Allein sie wechselt in der Farbe ungemein ab.

Schneehaube ist eine Art von Regen, die man besonders zum Rebhünnerfange braucht, und folgendergestalt bereitet: Man strickt ein Stück spiegellicht Garn von Bindfaden, das man mit einer Masche anfängt, und bis auf 20 Maschen zunimmt; dann strickt man es auf beyden Seiten zunehmend fort, bis es 12 Ellen lang ist. Sodann strickt man die beyden Enden zusammen, daß es viereckig wird, und

bedienet sich der Nacht, die man fest zur Seite, daß in jede Ecke der Spieß einge-

Sch Hierüber strickt man ein viereckiges Stück, falls spiegellicht, von Breite und Breite, daß dem erstern wie eine Decke

Diese befestiget man eben so daran. Aus den Seitenenden schneidet man einige Maschen, und strickt dagegen in jede eine Einkehle, wie in einem Garnsacke. An der Decke bindet man in der Mitten einen Bindfaden mit einem kleinen Hestel an. Diese Schneehaube stellet man auf den Schnee dahin, wo sich Rebhüner aufhalten. Man steckt nämlich die vier Spieße, als ein gleichseitiges Viereck, in die Erde, so, daß das Garn recht straff stehe. Auch befestiget man den Hestel am Himmel in der Erde, damit die in der Schneehaube befindlichen Hüner mit dem Himmel nicht so hoch fliegen können. Vorher aber körnet man die Rebhüner durch ausgestreuten Weizen, Gerste, dahin, wohin man die Schneehaube stellen will; macht im Schnee glatte Steige nach den Einkehlen zu, und streuet in diese auch etwas Getraidkörner. Endlich stellt man die Haube, mit mehr eingestreuten Körnern, thut auch einen Büschel Weizenähren hinein. Wenn nun die Hüner diesem Futter nach, durch die Einkehlen hinein kriechen, so können sie, weil diese inwendig ganz enge sind, nicht wieder heraus, und sind gefangen.

Schnee:

Rebhuhn, ist das harte
Waldhuhn.

4. Schneegarn
man bey star-
kebhünersange,
den Tirasß,
demselben

daß es wei-

und von sei-

weißen Zwirne

Man zieht es nach

ge in seinen Säumen,

an beyden Enden wenig-

30 und mehr Ellen her-

gehen müssen. Diese Säume

werden mit einer besondern Schleife

zusammen gewunden, damit

es sich nicht verwirre. Wenn

man nun bey großem Schnee

ein Volk Rebhüner von fern lie-

gen siehet, so breiten ihrer zwey

das Netz aus, fassen die Säu-

me so lang sie können; und ge-

hen damit gerade auf die Reb-

hüner los. Diesem folgt ein an-

derer, der den Vorhergehenden

ein Zeichen giebt, wenn sie zu

weit rechts oder links abweichen.

Wenn sie an die Hüner kom-

men, decken sie dieselben zu, da

bey den die Hüner aufstehen, und

sich im Netze verwickeln. Man

führt das Netz wie den Tiras

niedrig, und wie man die Hand

von sich streckt. Wenn das

Schildwacht stehende Huhn sich

schnell unter dem Schnee ver-

steckt, so halten die Hüner gut

aus, wenn es aber anfängt zu

schreyen, so stäuben sie bald auf,

Die beste Zeit dazu sind die

Morgenstunden, ehe die Hüner

aus ihrem Nachtlager aufstehen,

da sie noch fest liegen, und am

besten halten. So geht es auch
Abends gut, wenn sie ihr Nach-
lager machen; bey Tage aber und
überhaupt, wenn der Schnee
schreyet, gehtes nicht gut. Wenn
sie aber aufstäuben, und man
sie wieder einfallen, und sich
ein Lager machen siehet, so kann
man den Fang mehrmal des Ta-
ges vornehmen. Bey flachem
Schnee und wehendem Winde
ist es ebenfalls nicht zu brau-
chen, auch liegen sie zu solchen
Zeiten mehr an Hecken und Bü-
schen, als auf freyem Felde.

Schnellen ist eine Strafe

1) mit dem Hängeseile, für den

Leithund, wenn er auf der Fär-

the laut wird, 2) mit der Dres-

sirleine für den Hünerhund, wenn

er nicht auf den Ruf höret.

Schneller ist eine Feder

am Schlosse einer Kugelbüchse,

oder auch eines Schwaneneisens,

zur Beförderung des geschwin-

den Losgehens; dergestalt, daß

das Schloß, wenn der Schneller

gestochen ist, bey der geringsten

Berührung des Abzuges losgeht.

Schellfalle ist eine mit

einer gebogenen Stange derge-

stalt gestellte Falle, daß sich nach

dem Wegziehen des Rödels das

Thier fängt.

Schnepfe — Scolopax —

ist eine zur Niederjagd gehören-

de Federwild - Gattung in der

Ordnung der Cumpfvögel, und

enthält mehrere Arten, wovon

aber bey uns nur die Wald-

Mittel - Heer - und Haar-

D 2 schne-

nicht mit dem jungen Charadrius Hiaticula verwechseln, dem er in der Farbe ähnlich sieht, von welchem er aber im Habitus gar merklich verschieden ist. Er wählt sich zum Wohnort: die sandigen Meeres- und Flußufer des Nordens — zieht im Herbst in Menge, doch sieht man ihn im mittlern und südlichen Deutschland nur einzeln.

Sangheerd ist eine Art von Vogelheerd, den man nur auf die größern Sangvögel stellet. Es giebt deren drei verschiedene Arten: 1) Der Sommerheerd, welcher mit verhaltenem Gesange gestellt wird, 2) der Herbstheerd auf die Zugvögel, als Weindrosseln, Meeramseln etc. und 3) der Winterlagerheerd auf Krammetsvögel. Hier ist nur von der ersten Art die Rede. Auf solchen großen Sangheerden muß man die Büsche ganz leicht und einzeln, und nicht so dick, wie auf den Herbstheerden, stecken. Auch wird vor die Gräbchen der Neze, so lang diese sind, auf jede Seite eine schwache runde Stange, kaum vier Quersfinger hoch von der Erde gemacht, worauf die ankommenden Vögel gern sitzen und dem Gesange zuhören. Zu den Läufern und statt der Bügel, die man zu den Herbstheerden brauchet, spannet man eine feine Leine nach der Länge der Neze, scharf an, an, oder in diesem gehet ein kleiner Ring, woran der Laufer angemacht wird, so daß er bequem daran

hin und her laufen kann. Dem ungeachtet aber besetzt man noch einen Laufer an einem Bügel in der Mitte des Busches. Der beste Platz zu so einem Heerde ist ein Wiesengrund in einem Walde, dahin stellet man den Heerd, wo möglich an den Anfang einer Höhe. Ist kein Wasser in der Nähe, so muß man ausgehölte Klöbchen oder Scherben in die Erde graben, und von Zeit zu Zeit etwas Wasser hinein gießen. Einen solchen Heerd muß man fleißig abwarten, und früh vor Tage ausgehen, um noch vor Tage aufstellen, die Lockvögel zurecht setzen, die Läufer anbinden und füttern zu können. Wenn viel Zugvögel im Anzuge sind, so braucht man um einiger wenigen, etwa einfallenden willen, nicht sogleich zu ziehen, um die andern nicht zu verschlagen, wenn sie aber nicht fort wollen, nimmt man mit, was man bekommen kann. Die größern Sangvögel singen auf solchen Sangheerden höchstens sechs Wochen. Wenn man sie nur im Sommer stellen will, so setzt man wenigstens 12 oder mehrere Lockvögel ein, und wenn diese nach einigen Wochen mit ihrem Gesange nachlassen, wieder andere an deren Stelle, so kann man einen solchen Heerd fast bis zum Herbst brauchen. Weil sie aber anfänglich gewöhnlich traurig sitzen, und nicht singen, so muß man ihnen Ameiseneper, ingl. gestoßenen Hauf und Mohn unter das Futter, auch oft frisches Wasser in ein Näpfschen geben, damit

damit sie nicht allein saufen, sondern sich auch baden können. Man hänget dabey aber allezeit jede Gattung gegen einander über auf, als Droseln gegen Droseln, Amseln gegen Amseln.

Sattel ist eine Vorrichtung auf einer Rüstung oder Schnep- per, dergleichen man zum Abschießen auf Stangen befestigter hölzerner Vögel und sonst gebraucht; er ist von Eisen- oder anderm Meise und wird qucer über die Rüstung, dahin wo die Sehne hinschlägt, eingeschoben, und in der Mitten etwas ausgefeilet. Sein Endzweck ist, daß der Bolzen etwas höher von der Mündung zu liegen komme, und mit seinen Federn, besonders an der Säule nicht anstreifen könne, wenn losgeschossen wird. Man verhindert dadurch das Flattern der Bolzen, und bewirkt einen accuraten Schuß. Es bedeutet aber auch eine Art Stellung nach Raubvögeln, welche aus einem zwey Finger breiten und etwa 6 Zoll langen, mit mehreren Pferdehaardornen versehenen ledernen Riemen besteht, der einer Taube über den Rücken gebunden wird, damit der auf sie stoßende Raubvogel sich in den aufgestellten Pferdehaardornen fängt.

Satz, nennen die Jäger eine Pause, wenn nämlich bey einem Hauptjagen in währendem Zuge drey mal geblasen, und dazwischen drey mal inne gehalten wird.

Satthase heißt die Häs- tin oder das Weibchen des Hasen.

Saufinder, Saubeller ist ein Jagdhund, der ein Schwein in seinem Lager auffuchet, und durch Herumspringen und Bellen es so lange aufhält, bis sich der Jäger zum Schusse hinan schleichen kann. Er muß von mittler Größe seyn, man nimmet gewöhnlich einen Schweißhund dazu. Man muß sie von Jugend an auf schwarze zahme Sauen abrichten, und ihnen von Zeit zu Zeit etwas Schweiß von wilden Sauen genießen lassen. Auch muß man sie von den Färthen anderer Thiere, als Wildpret, Rehe, Füchse, Hasen etc. abhalten.

Saugarten, Saufang ist ein ziemlich großer, mit starken Pfählen eingezäunter Platz im Walde, worinnen die Sauen gekirret und dergestalt eingesperret werden, daß sie nicht wieder heraus können. Er wird auf folgende Weise angelegt: Wenn man einen Ort im Walde hat, in dessen Nähe Erdmaß, warme Brüche, große Dickigte, Ameisenhaufen, Farrenkraut und allerley Wurzeln, vorzüglich auch warme Quellen befindlich sind, und der von allerley recht verwachsenen Gebüsch ganz düstet ist; so hat man den rechten Platz dazu gefunden, den man nun nach beliebiger, oder von der Natur vorgeschriebener Größe ins Gevierte auf obige Art verzeichnet. Wo aber die Flügel zusammen gehen, muß man auswendig einen flachen Berg auf- führen, inwendig aber die Plan- ken glatt hobeln und den Platz ab-

abhängig machen. Um die Sauen an diesen Ein- und Ausgang zu gewöhnen, muß man über den Einsprung Brücken von Schalholze, dem flachen Bogen gleich legen, und die Sauen mit Eichel und Bucheckern auf den Flügeln firren, in den Garten aber Gerste oder ander Getraide, auch Malz oder wildes Obst streuen. Wenn man nun im Herbst merkt, daß die Sauen die Körnung angenommen haben, so thut man ein Paar gezähmte wilde Bachen in den Garten, und nimmt die Brücke weg. Wenn nun ein Rudel Sauen über die Flügel wechselt, und die Eichel findet, gehen sie den Flügeln nach zum Einsprünge, und wenn sie auf den Berg kommen und die Bachen darin wittern, auch vor sich den niedrigen Absprung sehen, so springen sie hinein; hat nun einmal eines den Anfang gemacht, so folgen die übrigen alle nach, können aber nicht wieder heraus, weil sie auf den eichenen Pfosten bey'm Eingange nicht fußen können, und werden also entweder in aufgestellten Netzen gefangen, oder sonst getödtet. Inwendig muß vor die eichenen Pfosten ein zwey Ellen tiefer Graben gemacht, und mit allerley Buschwerk verblendet werden.

Saugloch ist bey'm Dache ein Loch zwischen dem Weidloche und dem Schwanze, wodurch er im Winter, wo er im Bau bleibet, das im Sommer angelegte Fett zu seiner Nahrung aussauget s. Dachs.

Sauhage, Sauhehen heißt das Verfolgen und Fangen der wilden Schweine mit dem Saurüben oder Hahhund.

Sauhunde sind Saurüben und bloß auf Schwarzwild abgerichtet.

Saujagd ist eine Schweinsjagd, wenn mit dem Zeuge gestellt wird.

Saukasten ist ein Behältniß, um lebendige Schweine von einem Orte zum andern zu bringen. Er wird nach verhältnißmäßiger Größe eines Keulers, eben so bereitet, wie ein Hirschkasten, nur vorn und hinten mit Zugthüren, damit ein, auf dem Kasten stehender, Mann, wenn er das darinnen stehende Schwein herauslassen will, dieselben aufziehen, und dabey vor aller Beschädigung sicher seyn kann.

Saunetze, Schweinsnetze, Saugarne sind besonders zur Saujagd gestricke Netze, jedes 80 doppelte, oder 160 einfache Wadschritte lang. Ein solches Netz muß wenigstens 30 Maschen hoch gemacht, und dieselbe über der Rückbank fest angezogen werden. Die Maschen halten 6 Zoll ins Gevierte. Die Forkeln müssen so stark seyn, wie zu Hirschnetzen, aber nur $2\frac{1}{2}$ Elle hoch. Sie werden gleich den Hirschnetzen gerade, mitten auf die Flügel gestellt. Zu jedem Flügel gehören zwey Zeugknechte und acht Mann, wovon 2 das Netz im Abfahren abschlagen,

gen, 2 die Hefstel mit Schlägeln einschlagen, 2 mit Pfahleisen Löcher machen, und 2 die Forkeln einsetzen. Die Ober- und Unterleinen müssen stark angezogen, und wo möglich an Bäume gebunden werden, damit die Sauen im Einbrechen nicht die Hefstel aus der Erde reißen und durchbrechen. Wenn die Sauen bey einem Jagen in die Enge getrieben sind, stellet man diese Neze inwendig an den Luchern herum, und legt sie oben auf die Forkeln, doch muß man den Busen glatt anziehen, damit die Neze an den Luchern steif stehen, und die Sauen durchschlagen können.

Saurüben sind eine Art starker Jagdhunde, die man zur Sauhaze braucht. Man kann dazu jeden Fleischer, oder Hirtenhund brauchen, doch thut man besser, schon abgerichtete, als ganz junge Hunde dazu zu nehmen, denn sie fallen gewöhnlich zu unvorsichtig an. Weil sie oft von Reulern beschädiget werden, so ist wohlgethan, daß die Jäger allezeit Zwirn nebst schneidenden Mehnadeln bey sich führen, um in diesem Falle die Wunde sogleich heilen zu können. Wie diese Wunden ferner zu heilen, s. Hundekrankheiten, No. 4. Die besten sind die sogenannten Pommerischen Saurüben, welche langhärig, rauh, dauerhaft sind, gut packen, und dem Belien des Fingers sehr gut folgen.

Schäften die zerrissenen Leinen im Jagdarte, s. Leinen

anbinden. Allein bey'm Büchsen-schäfter bedeutet es den eiser-nen Lauf der Flinte ins Holz legen, welches alsdenn der Schaft genannt wird.

Schärfen heißt bey'm Jäger so viel, als ab- und aufschneiden.

Schaukel heißt bey'm Dammhirsche das obere breite Ende des Gehörns.

Schaukelhirsch ist der Nahme des starken Dammhirsches.

Scheerenschnäblicher Kernbeißer, *L. Pytiopsittacus*, gehört zur Gattung Kernbeißer, s. oben als eine besondere Art, die auch großer Kernbeißer oder Kreuzschnabel, Krummschnabel, großer Krummschnabel und Tannenpapagey genannt wird. Schnabel stark, kürzer als die Mittelzehe, an der Spitze kreuzweis vor einander hingebogen, doch so, daß die untere Kinnlade nicht über den Rücken der oberen hinreicht; Männchen: Hauptfarbe mennigroth und graulichgrün; Weibchen graugrün gelblich gemischt. Größe des Seitenschwanzes, 7 Zoll lang. Variirt in der Farbe: a) Jung, aschgrau mit gelbem Steiße; Kopf hell und dunkelgrau gewellt. b) Die Einjährigen sind wohl wie bey dem vorhergehenden die rothen; dann werden sie elbengrün und unten röthlichgelb. Dieser Vogel bewohnt die Kiefer.

abhängig machen. Um die Sauen an diesen Ein- und Ausgang zu gewöhnen, muß man über den Einsprung Brücken von Schalholze, dem flachen Bogen gleich legen, und die Sauen mit Eichel und Bucheckern auf den Flügeln firren, in den Garten aber Gerste oder ander Getraide, auch Malz oder wildes Obst streuen. Wenn man nun im Herbst merkt, daß die Sauen die Körnung angenommen haben, so thut man ein Paar gezähmte wilde Bachen in den Garten, und nimmt die Brücke weg. Wenn nun ein Rudel Sauen über die Flügel wechselt, und die Eichel findet, gehen sie den Flügeln nach zum Einsprünge, und wenn sie auf den Berg kommen und die Bachen darin wittern, auch vor sich den niedrigen Absprung sehen, so springen sie hinein; hat nun einmal eines den Anfang gemacht, so folgen die übrigen alle nach, können aber nicht wieder heraus, weil sie auf den eichenen Pfosten beim Eingange nicht fußen können, und werden also entweder in aufgestellten Netzen fangen, oder sonst getödtet. Wenig muß vor die eichenen Pfosten ein zwey Ellen Graben gemacht, und mit ley Buschwerk verblendet.

Saugloch ist bey dem ein Loch zwischen dem Kopf und dem Schwanz, welches im Winter, wo er im Bett, das im Sommer Fett zu seiner Nahrung get. f. Dachs.

Sauhage, heißt das Verfolgen der wilden Schweine Sauräden oder Sa

Sauhunde und bloß auf E gerichtet.

Saujagt jagd, wenn stellt wird.

Sauke niß, um einem D gen. E mäßiger eben f kasten Zugt! Kast das her zi f

ggeld, ggeld, wenige Geld, er gefangenes art, sowohl als und Raubvögel. Jäger erhält. Ich unterlassen hier folgende Anmerkung einzuschalten: In manchen Orten bekommen Jäger für die Raubthiere kein Wiegeld, sondern an dessen Stelle die Bälge, da sie denn, wie natürlich, das Schießen und Fangen derselben verschieben, bis die Bälge gut sind, wodurch aber weit weniger erlegt werden, als wenn man sie im Sommer, wenn sie noch jung sind, umbringt. Es ist daher besser, die Raubthiere mit Gelde auszulö-

die Jäger
re Ver-
be.

ic. gemahlt ist, und welches die
Jäger bey dem Rebhünerey fange
mit dem Treibezeuge brauchen.
Allein Schild heißt auch der
dicke Knorpel, welchen die
Keuler und Hauptschwei-
den Blättern oben auf
im Harbste bekom-
meist werden. End-
auch an Hasel-
warzen, an Reb-
rothen und an En-
anblauen Federn auf
ein Schild.

Schuf-

, ist ein

Pferd, das

wärts, bloß

mit den Bei-

t, auch nach Er-

stille stehet, ohne

n, sich auch vor dem

wenig, als vor her-

ndem Wildpret scheuet,

man auf diesem Pferde

, sich heranschleichen, und

Wildpret vom Pferde schief-

an kann.

Schiffen heißt bey der
Falknerey, dem Falken frische
Schwungfedern aufsetzen, wenn
er die Alten zerstoßen hat.

Schild ist ein Stück Lein-
wand, worauf eine Kuh, ein Pferd

Schilffänger, Sylvia
ragmitis, Bechst. — hat
auch die Nahmen: Rohrs-
schmüger, kleinster Rohrs-
schirf, Wasserweißkehlchen.
Dunkel olivengrün mit schwar-
zen Längsflecken; der Steiß rost-
farben; über den Augen ein gelb-
lichweißer Streifen; der Untera-
leib gelblichweiß; der Schwanz
so wie seine Federn abgerundet,
5½ Zoll lang. Er hat Aehnlich-
keit mit dem Rohrsänger, un-
terscheidet sich aber schon durch
den Schwanz hinlänglich. Er
kömmt in manchen Werken un-
ter jener Beschreibung mit vor.
Dieser Vogel wählt sich zum
Wohnort: Geröhrig busch-
und schilffreicher Seen und Tei-
che — zieht vereinzelt weg, und
hat zur Nahrung Wasserinsekten,
Würmchen und Beeren. Man
findet sein Nest im Schilf und
an Weidenbüschen.

Schirm ist so viel als Jagd-
schirm.

Schlägel, Schlegel heiße
1) die hölzerne Keule, womit
die

ferwälder Deutschlands, von Pommern, Brandenburg, Sachsen, Franken ic. und streicht vom November an den ganzen Winter durch. Seine Nahrung besteht in Holzsaamen, vorzüglich Kiefern- und Erlenisaamen. Das Nest findet man allemal auf den Spizen der Kiefern, und bisweilen auch in niedrigem Buschwerk im May mit vier weißen blutroth gesprengten Eiern.

Scherzen sagt man, wenn die jungen Wild- und Rehkälber mit einander spielen und sich herum jagen. Allein auch das alte Wildpret scherzet, besonders wenn es früh zu Holze zieht.

Scheubel oder Scheibel ist ein Kennzeichen in der Hirschfärthe, das auf hartem Boden entsteht, wo der Hirsch die Oberfläche mit dem Grase abschiebet, daß man es, so groß als die Färthe ist, ausheben kann.

Scheuchen, Scheuchung heißt, das Wildpret durch angezündete Feuer, und sonst von Feldern und Wiesen abhalten. Nach der Chursächf. Landesverordn. v. 1. Oct. 1555. T. v. Jag. C. A. I. S. 60. ist verordnet, daß den Leuten, die an und innerhalb der Wildbahn ansäßig sind, nachgelassen seyn soll, mit Hunden, die keine Jagdhunde sind, das Wild abzuschrecken. Wie man Vögel scheuchet, s. Scheusal.

Scheusal, Scheusel ist ein, auf dem Felde oder in ei-

nem Garten, aufgestelltes, von alten Lumpen ic. verfertigtes Zeichen, um Vögel und Wildpret abzuhalten, daß sie den Früchten keinen Schaden thun.

Schießen und Birschen sind Jägerausdrücke, wovon ersterer eigentlich vom kleinen Weibwerke als Hasen, Hühnern ic. und allem, was mit der Flinte erlegt wird, ausschließlich gilt; letzterer oder Birschen hingegen, wenn mit der Büchse ein Stück Wildpret geschossen worden ist.

Schießen lassen spricht der Jäger, wenn er den Leithund in der Arbeit vorwärts am Hängefeile fortläuft, und das Hängefeil durch die Hand ebenfalls ein Stück fortläuft, s. Leithund.

Schießgeld, Schußgeld, Birschgeld, Fanggeld, Vürschgeld ist dasjenige Geld, für erlegtes, oder gefangenes Wildpret aller Art, sowohl als für Raubthiere und Raubvögel, welches der Jäger erhält. Ich kann nicht unterlassen hier folgende Anmerkung einzuschalten: An manchen Orten bekommen die Jäger für die Raubthiere kein Schießgeld, sondern an dessen Stelle die Wälge, da sie denn, wie natürlich, das Schießen und Fangen derselben verschieben, bis die Wälge gut sind, wodurch aber weit weniger erlegt werden, als wenn man sie im Sommer, wenn sie noch jung sind, umbringeret. Es ist daher besser, die Raubthiere mit Gelde aus-

zulö-

zulösen, weil dadurch die Jäger eher veranlaßt werden, ihre Vertilgung zu rechter Zeit zu betreiben.

Schießheerd ist wie *Pantera*, eine Art Vogelheerd.

Schießhütte ist eine auf einem Baume oder andern erhabenen Orte bey Salzlecken, Luderplätzen errichtete Hütte, um Wildpret, Raubthiere und Raubvögel darinnen unbemerkt schießen zu können.

Schießhund ist so viel als vorstehender Hund.

Schießkarren ist so viel als Schießwagen und Karrenbüchse.

Schießpferd, **Schußpferd**, **Treibepferd**, ist ein zur Jagd abgerichtetes Pferd, das vor- rück- und seitwärts, bloß durch Berührung mit den Beinen zu lenken ist, auch nach Erfordern, ganz stille stehet, ohne sich zu rühren, sich auch vor dem Schusse so wenig, als vor herauspressendem Wildpret scheuet, damit man auf diesem Pferde sitzend, sich heranschleichen, und das Wildpret vom Pferde schiessen kann.

Schiffen heißt bey der Falknerey, dem Falken frische Schwungfedern aufsetzen, wenn er die Alten zerstoßen hat.

Schild ist ein Stück Leinwand, worauf eine Kuh, ein Pferd

z. gemahlt ist, und welches die Jäger bey dem Rebhühnerfange mit dem Treibezeuge brauchen. Allein **Schild** heißt auch der breite, dicke Knorpel, welchen die starken Keuler und Hauptschweine über den Blättern oben auf dem Rücken im Harbste bekommen, wenn sie feist werden. Endlich nennt man auch an Haselhühnern die schwarzen, an Rebhühnern die rothen und an Enten die grünblauen Federn auf der Brust ein **Schild**.

Schilffänger, *Sylvia phragmitis*, Bechst. — hat auch die Nahmen: **Rohrschmäher**, **kleinster Rohrschirf**, **Wasserweißkehlchen**. Dunkel olivengrün mit schwarzen Längsflecken; der Steiß rostfarben; über den Augen ein gelblichweißer Streifen; der Unterleib gelblichweiß; der Schwanz so wie seine Federn abgerundet, $5\frac{1}{4}$ Zoll lang. Er hat Aehnlichkeit mit dem Rohrsänger, unterscheidet sich aber schon durch den Schwanz hinlänglich. Er kommt in manchen Werken unter jener Beschreibung mit vor. Dieser Vogel wählt sich zum **Wohnort**: Geröhrig busch- und schilfreicher Seen und Teiche — zieht vereinzelt weg, und hat zur Nahrung Wasserinsekten, Würmchen und Beeren. Man findet sein Nest im Schilf und an Weidenbüschen.

Schirm ist so viel als Jagdschirm.

Schlägel, **Schlegel** heißt 1) die hölzerne Keule, womit die

die Hestel eingeschlagen werden.
2) Der Hinterlaust oder die Hinterkeule des Rehbockes.

Schlagbär nennet man die wüthensten und stärksten Bäre, die eine solche Stärke in ihren Vorderzähnen haben, daß sie einen Reuter sammt dem Pferde darnieder schlagen können. Man findet sie vorzüglich in den Alpen.

Schlagbauer ist ein, ohngefähr 3 Fuß langer, aus 3 Abtheilungen bestehender Vogelbauer in dessen mittelften Theil der Lockvogel gethan wird. Die beyden Seitenabtheilungen hingegen, in welche etwas Futter gestreut wird, haben Fallgitter, die man durch Stellhölzer und eine in den Bauern befestigte Zunge so aufstellt, daß der nach dem Lockvogel und Futter gehende fremde Vogel darauf tritt, wodurch die Stellhölzer umfallen und die Fallthüre zufällt.

Schlagbaum ist eine Falle für Raubthiere, welche folgender Gestalt bereitet, und im Walde aufgestellt wird. Man legt nemlich zwey Stangen neben einander in die Erde, daß nichts davon zu sehen ist, läßt aber so viel Raum, daß eine dritte dazwischen gelegt werden kann. Dann nimmt man eine dazwischen einpassende lange Stange, schlägt vorne zu beyden Seiten zwey starke Gabeln von eichenem oder birkenem Holze, und darüber ein Queerholz. Hierzu stecket man einen Kranz von zähem Weiden, und befestiget da-

mit die mittlere lange Stange in der Höhe. So läßt man ihn den Sommer durch stehen, damit die Thiere sich daran gewöhnen. Die Stellhölzer müssen ihre Rinde, und wo möglich auch etwas Laub behalten, damit es ein natürliches Ansehen gewinne. Auf den Seiten verwirft man es mit Aesten oder Reißholz, und suchet alle Beywege zu verhindern. Wenn man nun bald den Fang damit einrichten will, so schleppet man erst einige Tage durch, diese Baume mit Luber, Haafengestheide, oder gebratenem Hering u. über die Bäume weg, und wenn man merket, daß Raubthiere dieser Spur nach, und fleißig über den Schlagbaume gehen, so stellet man ihn fangisch, d. h.: Man setzet in der Mitten der Schlagstange eine Stütze, legt hinten ein, nach Beschaffenheit des Thieres, das man fangen will, schweres Gewicht, steckt über das Queerholz durch den Kranz ein Stellholz vorn kurz an, bindet mit dem andern Ende inwendig eine doppelte oder dreyfach gedrehte, pferbehärne Schnur, oder doppelten messingenen Drath um das Unterqueerholz, das genau aufgestellt. und die Schnur quer über gezogen, und nach des Thieres Größe hinten angebunden wird.

Schlagen heißt 1) wenn der Hirsch und Rehbock das rauhe Häutchen von ihren neu aufgesetzten Gehörn abschlagen, 2) wenn eine Sau mit ihrem Gewehr, oder ein Bär mit seinen Zähnen

Tagen einen Menschen oder Hund beschädiget, 3) der Gefangmacher Vögel, z. B. der Wachtel, der Nachtigall, 4) das Fangen des Raubes von den Raubvögeln.

Schlagen mit dem Weidemeßer, s. Weidemeßer.

Schlagheftel ist so viel als Schwangheftel.

Schlagwand ist ein Garn, das sich auf den Heerden mit Schlagstäben auf- und niederziehen läßt.

Schlechtbehangen nennt man Hunde, die keine langen und breiten Schlappohren, so wie auch keine großen Lefzen an den Müulern haben.

Schlechte Nase heißt, wenn der Leithund nicht bald Fährten findet, und die Spuren leicht übergeht.

Schlechter Hirsch ist so viel als geringer Hirsch und Spieser.

Schlechter Jäger ist ein solcher Jäger, der seine Kunst nicht versteht.

Schleichen heißt, gegen den Wind auf die unbemerkbarste Art den zu schießenden Thieren und Vögeln sich nähren.

Schleife, Schlinge ist ein, oder mehr zusammengebündelte Pferdehaare, dessen eine

Ende man zu einer Schleife knüpft, und durch diese das andere zieht, auch so in die Rundung richtet, daß ein Vogel sich darinnen fangen muß. Man kann sie auch aus seidenen oder andern Fäden machen. Wenn sie so eingerichtet sind, daß sich die Vögel am Halse fangen, heißen sie Schlingen, geschieht aber der Fang an den Füßen, so werden sie Schleifen genennet. Zum Rebhüner- und Wachtelfange macht man 3 oder 4 Schleifen an einen Bügel, der an jedem Ende eine Spitze hat, womit man ihn in die Erde steckt. Man bringet sie in Büsche und auf ihren Gängen so neben einander an, daß, wenn sie einen Vögel verfehlen, sie doch in eine andere laufen. Schnellschleifen macht man auf folgende Art: Man macht Kerben in zwey hölzerne Pföcke, spizet diese zu, und steckt sie dergestalt in die Erde, daß eine Kerbe dieß- die andere jenseits gekehrt steht. Dazu schneidet man ein rundes Hölzchen an beyden Enden viereckigt, daß es in der in beyden Pföcken gemachten Kerbe genau einpaßt, und macht daran 3 oder 4 Schleifen. Dieses macht man an eine lange schwanke Ruthe, die in der Mitte mit einem starken Bindfaden angebunden ist. Diese Ruthe spizet man am dicken Ende, und steckt sie fest in die Erde, daß sie, wenn sie gebogen wird, recht in die Kerbe der eingeschlagenen Pföcke reiche. Das Rebhuhn, die Schnepfe &c. komme nun, woher sie wolle,

so läuft es das Hölzchen von der schwanken Ruthe ab, und schnellet die Ruthe in die Höhe, daß es eine Schleife bey dem Kopfe oder Füßen ergreife.

Schleppen ist eine Verrichtung, die man vornimmt, um einen Fuchs oder ein anderes Raubthier auf den Platz zu bringen, wohin man ihn können und in der Folge ein Eisen, um ihn zu fangen, legen will. Man bratet nemlich eine Raze, der man das Gescheide ausgenommen, oder einen Hering, oder man nimmt ein bloßes Hasengescheide, und schleppet dieses im Walde herum, bis dahin, wohin man das Eisen legen will, ist es aber ein Schlagbaum, so schleppet man auch darüber weg, **S. Fuchsfang.**

Schloß heißt 1) der Knochen bey den meisten Thieren weiblichen Geschlechts, der sich aus einander giebt, wenn sie ihre Jungen zur Welt bringen. Weil das Auseinandergeben bey den Wären nicht geschieht, so kommen ihre Jungen so klein auf die Welt, daß sie dieser Deffnung nicht bedürfen, 2) s. **Klinschloß.**

Schloßtritt oder **Schlußtritt** ist derjenige Tritt, den man allezeit in der Mitte eines Hirschbettes findet, wenn er aus demselben aufgestanden. Er entsteht dadurch, daß er im Aufstehen sich auf den rechten Fuß stemmet. Bey dem Thiere ist dieses der Fall nicht, sondern es

bedient sich dazu des linken Fußes zur Seite des Bettes.

Schluff, Schlupf heißt der gewöhnliche Weg eines Thieres durch eine Hecke, nach einem Felde, Weinberge, Garten etc.

Schluff heißt, wenn der Hirsch mit der Hinterschaale so gerade in die Vorderschaale tritt, daß es das Ansehen gewinnt, als wenn es nur mit einem Laufe geschehen wäre. Das Thier thut es selten oder nie.

Schmalreh ist eine jährige Rüde.

Schmalthier ist ein Wildkalb weiblichen Geschlechts, das das erste Jahr seines Alters erfüllt hat. An manchen Orten bekommt es schon im ersten Jahre nach der Brunft und Verhäurung diesen Namen.

Schmehlen, Schmählen, Schrecken, sagt man vom Rehe, wenn es einen lauten Schrey hören läßt. Wenn ein Reh unvermuthet einen Menschen, Hund, ein Raub- oder anderes Thier gewahr wird, und noch nicht weiß, was es ist, ziehet es unter beständigen Schmählen immer von fern herum. Sobald es aber seinen vermeynten Feind gewiß kennt, schieht es schnell, ohne zu schmählen.

Schmeissen sagt man, wenn die Raubvögel ihre Exkremente von sich lassen.

Schmiel.

Schmientente — *Anas Jancea*; Frisch — heißt auch **Schmalente**, **Bisamente**, **kleine Mittelente** und **Weißbäckchen**. Kopf und Hals sind stark; der Schnabel mit einem schmalen haakenförmigen Nagel ist so wie die Füße schwarz. Beim Männchen ist der Kopf und Hals entenhäufig; Spiegel schwarzgrün, weiß eingefast; die Brust schwarz mit Purpurglanz; das Weibchen ist lechengeau. An Größe gleicht sie der Krickente. Sie hat ihren Wohnort auf deutschen Seen, ausgetretenen Flüssen und großen Teichen, wo man sie hauptsächlich im Spätherbste auf ihrem Zuge antrifft. Ihre Nahrung sind Insecten, Frösche, Fische und Wasserkrauter.

Schnabel ist 1) der harte Theil am Kopfe eines Vogels, wodurch er seine Nahrung einnimmt. 2) Eine Gabel, die man den Hühnerhunden, wenn sie mausen, oder sonst tief suchen, so anschnallet, daß sie gerade vor der Nase, wie ein Schnabel steht, und den Hund verhindert, die Nase zur Erde zu bringen.

Schnatterente, *A. Strepera* Linn., heißt auch **Schnarr** und **Lärmente**, graue und braune Ente; **Mittelente**, **Leiner**, **Scheerentelein** und **Weißspiegel**. Die blättrigen Zähne (Lamellen) des schmalen Schnabels sehr lang, fast so lang, wie an der Löffelente. Daran wird auch das

Weibchen dem minder praktischen Ornithologen leicht kenntlich; der Flügelspiegel weiß; das Männchen am Schnabel schwarz, am Oberücken und an der Brust mit bogigen schwarzen und weißlichen Linien gezeichnet; das Weibchen am Schnabel bräunlich; auf dem Rücken schwarzbraun mit rostgelben Federkanten und an der Brust röthlichbraun, schwarz gefleckt, 19 Zoll lang. Die Jäger nennen sie **Mittelente**, weil sie in der Größe das Mittel zwischen der gemeinen wilden Ente und der Krickente hält. Ihr weißlicher Spiegel macht sie von weitem kenntlich, und dieß ist auch das Hauptkennzeichen, wodurch sie der Jäger von der wilden Ente unterscheidet. Sie lebt vorzüglich in der Brutzeit auf Seen und großen Flüssen im Norden von Europa und Asien; auf ihrem Zuge im Herbst und Frühlinge aber einzeln und in großen Heerden in Deutschland auf Seen, Brüchen, großen Teichen und seichten sumpfigten Flußufern. Ihre Nahrung sind Insecten, Schnecken, Fische und Wasserpflanzen.

Schneckenrundung, **Schneckenordnung** ist bey der Jagd ein, wie andere Flügel, gebauener Weg, der aber schneckenförmig, und daher immer enger zusammen läuft, und nirgends zusammen trifft.

Schneefink — *Fringilla nivalis* — macht in der Gattung, und zwar in der ersten Gami.

nicht mit dem jungen Charadrius Hiaticula verwechseln, dem er in der Farbe ähnlich sieht, von welchem er aber im Habitus gar merklich verschieden ist. Er wählt sich zum Wohnort: die sandigen Meeres- und Flußufer des Nordens — zieht im Herbst in Menge, doch sieht man ihn im mittlern und südlichen Deutschland nur einzeln.

Sangheerd ist eine Art von Vogelheerd, den man nur auf die größern Sangvögel stellet. Es giebt deren drei verschiedene Arten: 1) Der Sommerheerd, welcher mit verhaltenem Gesange gestellt wird, 2) der Herbstheerd auf die Zugvögel, als Weindroßeln, Meeramseln u. und 3) der Winterlagerheerd auf Krammetsvögel. Hier ist nur von der ersten Art die Rede. Auf solchen großen Sangheerden muß man die Büsche ganz leicht und einzeln, und nicht so dick, wie auf den Herbstheerden, stecken. Auch wird vor die Gräbchen der Neze, so lang diese sind, auf jede Seite eine schwanke runde Stange, kaum vier Quersfinger hoch von der Erde gemacht, worauf die ankommenden Vögel gern sitzen und dem Gesange zuhören. Zu den Läufern und statt der Bügel, die man zu den Herbstheerden brauchet, spannet man eine feine Leine nach der Länge der Neze, scharf an, an, oder in diesem gehet ein kleiner Ring, woran der Läufer angemacht wird, so daß er bequem daran

hin und her laufen kann. Dem ungeachtet aber besetzt man noch einen Läufer an einem Bügel in der Mitte des Busches. Der beste Platz zu so einem Heerde ist ein Wiesengrund in einem Walde, dahin stellet man den Heerd, wo möglich an den Anfang einer Höhe. Ist kein Wasser in der Nähe, so muß man ausgehölte Klöbchen oder Scherben in die Erde graben, und von Zeit zu Zeit etwas Wasser hinein gießen. Einen solchen Heerd muß man fleißig abwarten, und früh vor Tage ausgehen, um noch vor Tage aufstellen, die Lockvögel zurecht setzen, die Läufer anbinden und füttern zu können. Wenn viel Zugvögel im Anzuge sind, so braucht man um einiger wenigen, etwa einsallenden willen, nicht sogleich zu ziehen, um die andern nicht zu verschlagen, wenn sie aber nicht fort wollen, nimmt man mit, was man bekommen kann. Die größern Sangvögel singen auf solchen Sangheerden höchstens sechs Wochen. Wenn man sie nur im Sommer stellen will, so setzt man wenigstens 12 oder mehrere Lockvögel ein, und wenn diese nach einigen Wochen mit ihrem Gesange nachlassen, wieder andere an deren Stelle, so kann man einen solchen Heerd fast bis zum Herbst brauchen. Weil sie aber anfänglich gewöhnlich traurig sitzen, und nicht singen, so muß man ihnen Ameisenoper, ingl. gestoßenen Hanf und Mohn unter das Futter, auch oft frisches Wasser in ein Näpfschen geben, damit

Damit sie nicht allein sausen, sondern sich auch baden können. Man hängt dabey aber allezeit jede Gattung gegen einander über auf, als Droseln gegen Droseln, Amseln gegen Amseln.

Sattel ist eine Vorrichtung auf einer Rüstung oder Schnep- per, vergleichen man zum Abschießen auf Stangen befestigter hölzerner Vögel und sonst gebraucht; er ist von Eisen- oder andern Beine und wird qucer über die Rüstung, dahin wo die Sehne hinschlägt, eingeschoben, und in der Mitten etwas ausgefeilet. Sein Endzweck ist, daß der Bolzen etwas höher von der Nuß ab zu liegen komme, und mit seinen Federn, besonders an der Säule nicht anstreifen könne, wenn losgeschossen wird. Man verhindert dadurch das Flattern der Bolzen, und bewirkt einen accuraten Schuß. Es bedeutet aber auch eine Art Stellung nach Raubvögeln, welche aus einem zwey Finger breiten und etwa 6 Zoll langen, mit mehreren Pferdehaardohnen versehenen ledernen Riemen besteht, der einer Taube über den Rücken gebunden wird, damit der auf sie stoßende Raubvogel sich in den aufgestellten Pferdehaardohnen fängt.

Satz, nennen die Jäger eine Pause, wenn nämlich bey einem Hauptjagen in währendem Zuge drey mal geblasen, und dazwischen drey mal inne gehalten wird.

Satzhase heißt die Häs in oder das Weibchen des Hasen.

Saufinder, **Saubeller** ist ein Jagdhund, der ein Schwein in seinem Lager auffuchet, und durch Herumspringen und Bellen es so lange aufhält, bis sich der Jäger zum Schusse hinan schleichen kann. Er muß von mittler Größe seyn, man nimmt gewöhnlich einen Schweißhund dazu. Man muß sie von Jugend an auf schwarze zahme Sauen abrichten, und ihnen von Zeit zu Zeit etwas Schweiß von wilden Sauen genießen lassen. Auch muß man sie von den Färthen anderer Thiere, als Wildpret, Rehe, Füchse, Haasen u. abhalten.

Saugarten, **Saufang** ist ein ziemlich großer, mit starken Pfählen eingezäunter Platz im Walde, worinnen die Sauen gefirret und dergestalt eingesperrt werden, daß sie nicht wieder heraus können. Er wird auf folgende Weise angelegt: Wenn man einen Ort im Walde hat, in dessen Nähe Erdmast, warme Brüche, große Dickigte, Ameisenhausen, Farenkraut und allerley Wurzeln, vorzüglich auch warme Quellen befindlich sind, und der von allerley recht verwachsenen Gebüsch ganz düster ist; so hat man den rechten Platz dazu gefunden, den man nun nach beliebiger, oder von der Natur vorgeschriebener Größe ins Gevierte auf obige Art verjünet. Wo aber die Flügel zusammen gehen, muß man auswendig einen flachen Berg aufführen, inwendig aber die Planken glatt hobeln und den Platz ab-

abhängig machen. Um die Sauen an diesen Ein- und Ausgang zu gewöhnen, muß man über den Einsprung Brücken von Schalholze, dem flachen Bogen gleich legen, und die Sauen mit Eichel und Bucheckern auf den Flügeln kitzeln, in den Garten aber Gerste oder ander Getraide, auch Malz oder wildes Obst streuen. Wenn man nun im Herbst merkt, daß die Sauen die Körnung angenommen haben, so thut man ein Paar gezähmte wilde Bachen in den Garten, und nimmt die Brücke weg. Wenn nun ein Rudel Sauen über die Flügel wechselt, und die Eichel findet, gehen sie den Flügeln nach zum Einsprunge, und wenn sie auf den Berg kommen und die Bachen darin wittern, auch vor sich den niedrigen Absprung sehen, so springen sie hinein; hat nun einmal eines den Anfang gemacht, so folgen die übrigen alle nach, können aber nicht wieder heraus, weil sie auf den eichenen Pfosten beim Eingange nicht fußen können, und werden also entweder in aufgestellten Netzen gefangen, oder sonst getödtet. Inwendig muß vor die eichenen Pfosten ein zwey Ellen tiefer Graben gemacht, und mit allerley Buschwerk verblendet werden.

Saugloch ist beym Dachse ein Loch zwischen dem Weidloche und dem Schwanze, wodurch er im Winter, wo er im Bau bleibt, das im Sommer angelegte Fett zu seiner Nahrung aussauget s. Dachs.

Sauhage, Sauhegen heißt das Verfolgen und Fangen der wilden Schweine mit den Saurüben oder Hahhunden.

Sauhunde sind Saurüben und bloß auf Schwarzwild abgerichtet.

Saujagd ist eine Schweinejagd, wenn mit dem Zeuge gestellt wird.

Saukasten ist ein Behältniß, um lebendige Schweine von einem Orte zum andern zu bringen. Er wird nach verhältnißmäßiger Größe eines Keulers, eben so bereitet, wie ein Hirschkasten, nur vorn und hinten mit Zugthüren, damit ein, auf dem Kasten stehender, Mann, wenn er das darinnen stekende Schwein herauslassen will, dieselben aufziehen, und dabey vor aller Beschädigung sicher seyn kann.

Saunetze, Schweinsetze, Saugarne sind besonders zur Saujagd gestrickte Netze, jedes 80 doppelte, oder 160 einfache Walschritte lang. Ein solches Netz muß wenigstens 30 Maschen hoch gemacht, und diese über der Rückbank fest angezo-gen werden. Die Maschen halten 6 Zoll ins Gevierte. Die Forkeln müssen so stark seyn, wie zu Hirschnetzen, aber nur 2½ Elle hoch. Sie werden gleich den Hirschnetzen gerade, mitten auf die Flügel gestellt. Zu jedem Flügel gehören zwey Zeugknechte und acht Mann, wovon 2 das Netz im Abfahren abschla-gen,

gen, 2 die Hefel mit Schlägeln einschlagen, 2 mit Pfahleisen Löcher machen, und 2 die Forkeln einsetzen. Die Ober- und Unterleinen müssen stark angezogen, und wo möglich an Bäume gebunden werden, damit die Sauen im Einbrechen nicht die Hefel aus der Erde reißen und durchbrechen. Wenn die Sauen bey einem Jagen in die Enge getrieben sind, stellet man diese Neze inwendig an den Tüchern herum, und legt sie oben auf die Forkeln, doch muß man den Busen glatt anziehen, damit die Neze an den Tüchern steif stehen, und die Sauen durchschlagen können.

Saurüden sind eine Art starker Jagdhunde, die man zur Sauhaze braucht. Man kann dazu jeden Fleischer, oder Hirtenhund brauchen, doch thut man besser, schon abgerichtete, als ganz junge Hunde dazu zu nehmen, denn sie fallen gewöhnlich zu unvorsichtig an. Weil sie oft von Reulern beschädiget werden, so ist wohlgethan, daß die Jäger allezeit Zwirn nebst schneidenden Rehnadeln bey sich führen, um in diesem Falle die Wunde so gleich heilen zu können. Wie diese Wunden ferner zu heilen, s. Hundekrankheiten, No. 4. Die besten sind die sogenannten Pommerischen Saurüden, welche langhärig, rauh, dauerhaft sind, gut packen, und dem Belieben des Jägers sehr gut folgen.

Schäften die zerrissenen Leinen im Jagdnetze, s. Leinen

anbinden. Allein bey dem Büchsenhäfter bedeutet es den eiserne Lauf der Flinte ins Holz legen, welches alsdenn der Schaft genannt wird.

Schärfen heißt bey dem Jäger so viel, als ab- und aufschneiden.

Schaukel heißt bey dem Dammhirsche das obere breite Ende des Gehörns.

Schaukelhirsch ist der Name des starken Dammhirsches.

Scheerenschäblicher Kernbeißer, *L. Pytiopsittacus*, gehört zur Gattung Kernbeißer, s. oben als eine besondere Art, die auch großer Kernbeißer oder Kreuzschnabel, Krummschnabel, großer Krummschnabel und Tannenpapagey genannt wird. Schnabel stark, kürzer als die Mittelzehe, an der Spitze kreuzweis vor einander hingebogen, doch so, daß die untere Kinnlade nicht über den Rücken der oberen hinreicht; Männchen: Hauptfarbe mennigroth und graulichgrün; Weibchen graugrün gelblich gemischt. Größe des Seitenschwanzes, 7 Zoll lang. Variirt in der Farbe: a) Jung, aschgrau mit gelbem Steiße; Kopf hell und dunkelgrau gewellt. b) Die Einjährigen sind wohl wie bey dem vorhergehenden die rothen; dann werden sie elbengrün und unten röthlichgelb. Dieser Vogel bewohnt die Kiefern.

ferwälder Deutschlands, von Pommern, Brandenburg, Sachsen, Franken ic. und streicht vom November an den ganzen Winter durch. Seine Nahrung besteht in Holzsaamen, vorzüglich Kiefern- und Eulensaamen. Das Nest findet man allemal auf den Spitzen der Kiefern, und bisweilen auch in niedrigem Buschwerk im May mit vier weißen blutroth gesprengten Eiern.

Scherzen sagt man, wenn die jungen Wild- und Rehtälber mit einander spielen und sich herum jagen. Allein auch das alte Wildpret scherzet, besonders wenn es früh zu Holze zieht.

Scheubel oder Scheibel ist ein Kennzeichen in der Hirschfärthe, das auf hartem Boden entsteht, wo der Hirsch die Oberfläche mit dem Grase abschiebet, daß man es, so groß als die Färthe ist, ausheben kann.

Scheuchen, Scheuchung heißt, das Wildpret durch angezündete Feuer, und sonst von Feldern und Wiesen abhalten. Nach der Chursächs. Landesverordn. v. 1. Oct. 1555. T. v. Jag. C. A. I. S. 60. ist verordnet, daß den Leuten, die an und innerhalb der Wildbahn ansäßig sind, nachgelassen seyn soll, mit Hunden, die keine Jagdhunde sind, das Wild abzuschrecken. Wie man Vögel scheuchet, s. Scheusal.

Scheusal, Scheusel ist ein, auf dem Felde oder in ei-

nem Garten, aufgestelltes, von alten Lumpen ic. verfertigtes Zeichen, um Vögel und Wildpret abzuhalten, daß sie den Früchten keinen Schaden thun.

Schießen und Virschen sind Jägerausdrücke, wovon ersterer eigentlich vom kleinen Weidwerke als Hasen, Hühnern ic. und allem, was mit der Flinte erlegt wird, ausschließlich gilt; letzterer oder Virschen hingegen, wenn mit der Büchse ein Stück Wildpret geschossen worden ist.

Schießen lassen spricht der Jäger, wenn er den Leithund in der Arbeit vorwärts am Hängeseile fortläßt, und das Hängeseil durch die Hand ebenfalls ein Stück fortläßt, s. Leithund.

Schießgeld, Schußgeld, Virschgeld, Fanggeld, Virschgeld ist dasjenige Geld, für erlegtes, oder gefangenes Wildpret aller Art, sowohl als für Raubthiere und Raubvögel, welches der Jäger erhält. Ich kann nicht unterlassen hier folgende Anmerkung einzuschalten: In manchen Orten bekommen die Jäger für die Raubthiere kein Schießgeld, sondern an dessen Stelle die Wälge, da sie denn, wie natürlich, das Schießen und Fangen derselben verschieben, bis die Wälge gut sind, wodurch aber weit weniger erlegt werden, als wenn man sie im Sommer, wenn sie noch jung sind, umbringt. Es ist daher besser, die Raubthiere mit Gelde aus-

zulö-

zulösen, weil dadurch die Jäger eher veranlaßt werden, ihre Beteiligung zu rechter Zeit zu betreiben.

Schießheerd ist wie Pantera, eine Art Vogelheerd.

Schießhütte ist eine auf einem Baume oder andern erhabenen Orte bey Salzlecken, Luderplätzen errichtete Hütte, um Wildpret, Raubthiere und Raubvögel darinnen unbemerkt schießen zu können.

Schießhund ist so viel als vorstehender Hund.

Schießkarren ist so viel als Schießwagen und Karrenbüchse.

Schießpferd, Schußpferd, Treibpferd, ist ein zur Jagd abgerichtetes Pferd, das vor- rück- und seitwärts, bloß durch Berührung mit den Beinen zu lenken ist, auch nach Erfordern, ganz stille stahet, ohne sich zu rühren, sich auch vor dem Schusse so wenig, als vor herauspressendem Wildpret scheuet, damit man auf diesem Pferde sitzend, sich heranschleichen, und das Wildpret vom Pferde schießen kann.

Schiffen heißt bey der Falknerey, dem Falken frische Schwungfedern aufsetzen, wenn er die Alten zerstoßen hat.

Schild ist ein Stück Leinwand, worauf eine Kuh, ein Pferd

u. gemahlt ist, und welches die Jäger bey dem Rebhühnerfange mit dem Treibezeuge brauchen. Allein Schild heißt auch der breite, dicke Knorpel, welchen die starken Keuler und Hauptschweine über den Blättern oben auf dem Rücken im Harbste bekommen, wenn sie feist werden. Endlich nennt man auch an Haselhühnern die schwarzen, an Rebhühnern die rothen und an Enten die grünblauen Federn auf der Brust ein Schild.

Schilfsänger, Sylvia phragmitis, Bechst. — hat auch die Nahmen: Rohrschmäger, kleinster Rohrschirf, Wasserweißkehlen. Dunkel olivengrün mit schwarzen Längsflecken; der Steiß rostfarben; über den Augen ein gelblichweißer Streifen; der Unterleib gelblichweiß; der Schwanz so wie seine Federn abgerundet, $5\frac{1}{4}$ Zoll lang. Er hat Aehnlichkeit mit dem Rohrsänger, unterscheidet sich aber schon durch den Schwanz hinlänglich. Er kommt in manchen Werken unter jener Beschreibung mit vor. Dieser Vogel wählt sich zum Wohnort: Geröhrig busch- und schilfreicher Seen und Teiche — zieht vereinzelt weg, und hat zur Nahrung Wasserinsekten, Würmchen und Beeren. Man findet sein Nest im Schilf und an Weidenbüschen.

Schirm ist so viel als Jagdschirm.

Schlägel, Schlegel heißt 1) die hölzerne Keule, womit

dis

die Hefstel eingeschlagen werden.
2) Der Hinterlaust oder die Hinterkule des Rehbock.

Schlagbär nennet man die wütendsten und stärksten Bäre, die eine solche Stärke in ihren Vordertagen haben, daß sie einen Reuter sammt dem Pferde darnieder schlagen können. Man findet sie vorzüglich in den Alpen.

Schlagbauer ist ein, ohngefähr 3 Fuß langer, aus 3 Abtheilungen bestehender Vogelbauer in dessen mittelsten Theil der Lockvogel gethan wird. Die beyden Seitenabtheilungen hingegen, in welche etwas Futter gestreuet wird, haben Fallgitter, die man durch Stellhölzer und eine in den Bauern befestigte Zunge so aufstellt, daß der nach dem Lockvogel und Futter gehende fremde Vogel darauf tritt, wodurch die Stellhölzer umfallen und die Fallthüre zufällt.

Schlagbaum ist eine Falle für Raubthiere, welche folgender Gestalt bereitet, und im Walde aufgestellt wird. Man legt nemlich zwey Stangen neben einander in die Erde, daß nichts davon zu sehen ist, läßt aber so viel Raum, daß eine dritte dazwischen gelegt werden kann. Dann nimmt man eine dazwischen einpassende lange Stange, schlägt vorne zu beyden Seiten zwey starke Gabeln von eichenem oder birkenem Holze, und darüber ein Querholz. Hierzu flechtet man einen Kranz von jungen Weiden, und befestiget da-

mit die mittlere lange Stange in der Höhe. So läßt man ihn den Sommer durch stehen, damit die Thiere sich daran gewöhnen. Die Stellhölzer müssen ihre Rinne, und wo möglich auch etwas Laub behalten, damit es ein natürliches Ansehen gewinne. Auf den Seiten verwirft man es mit Aesten oder Reißholz, und suchet alle Wege zu verhindern. Wenn man nun bald den Fang damit einrichten will, so schleppet man erst einige Tage durch, diese Blume mit Luder, Haasengescheide, oder gebratenem Hering u. über die Bäume weg, und wenn man merket, daß Raubthiere dieser Spur nach, und fleißig über den Schlagbaume gehen, so stellet man ihn fangisch, d. h.: Man setzet in der Mitten der Schlagstange eine Stütze, legt hinten ein, nach Beschaffenheit des Thieres, das man fangen will, schweres Gewicht, steckt über das Querholz durch den Kranz ein Stellholz vorn kurz an, bindet mit dem andern Ende inwendig eine doppelte oder dreyfach gedrehte, pferdebährne Schnur, oder doppelten messingenen Drath um das Unterquerholz, das genau aufgestellt. und die Schnur quere über gezogen, und nach des Thieres Größe hinten angebunden wird.

Schlagen heißt 1) wenn der Hirsch und Rehbock das rauhe Häutchen von ihren neuaufgesetzten Gehörn abschlagen, 2) wenn eine Sau mit ihrem Gewehr, oder ein Bär mit seinen Klauen

Töten einen Menschen oder Hund beschädiget, 3) der Gesang mancher Vögel, z. B. der Wachtel, der Nachtigall, 4) das Fangen des Raubers von den Raubvögeln.

Schlagen mit dem Weidemeßer, s. Weidemeßer.

Schlagheftel ist so viel als Schwangheftel.

Schlagwand ist ein Garn, das sich auf den Heerden mit Schlagstäben auf- und niederziehen läßt.

Schlechtbehangen nennt man Hunde, die keine langen und breiten Schlappohren, so wie auch keine großen Lefzen an den Müulern haben.

Schlechte Nase heißt, wenn der Leithund nicht bald Fährten findet, und die Spuren leicht übergeht.

Schlechter Hirsch ist so viel als geringer Hirsch und Spießer.

Schlechter Jäger ist ein solcher Jäger, der seine Kunst nicht versteht.

Schleichen heißt, gegen den Wind auf die unbemerkbarste Art den zu schießenden Thieren und Vögeln sich nähren.

Schleife, Schlinge ist ein, oder mehr zusammengebrochene Pferdehaare, dessen eine

Ende man zu einer Schleife knüpft, und durch diese das andere ziehet, auch so in die Rundung richtet, daß ein Vogel sich darinnen fangen muß. Man kann sie auch aus seidenen oder andern Fäden machen. Wenn sie so eingerichtet sind, daß sich die Vögel am Halse fangen, heißen sie Schlingen, geschieht aber der Fang an den Füßen, so werden sie Schleifen genannt. Zum Rebhühner- und Wachtelfange macht man 3 oder 4 Schleifen an einen Bügel, der an jedem Ende eine Spitze hat, womit man ihn in die Erde steckt. Man bringet sie in Büsche und auf ihren Gängen so neben einander an, daß, wenn sie einen Vögel verfehlen, sie doch in eine andere laufen. Schnellschleifen macht man auf folgende Art: Man macht Kerben in zwey hölzerne Pföcke, spizet diese zu, und steckt sie dergestalt in die Erde, daß eine Kerbe dieß- die andere jenseits gekehrt steht. Dazu schneidet man ein rundes Hölzchen an beyden Enden viereckigt, daß es in der in beyden Pföcken gemachten Kerbe genau einpaßt, und macht daran 3 oder 4 Schleifen. Dieses macht man an eine lange schwanke Ruthe, die in der Mitte mit einem starken Bindfaden angebunden ist. Diese Ruthe spizet man am dicken Ende, und steckt sie fest in die Erde, daß sie, wenn sie gebogen wird, recht in die Kerbe der eingeschlagenen Pföcke reiche. Das Rebhuhn, die Schnepfe &c. komme nun, woher sie wolle, so

so lauft es das Hölzchen von der schwanken Ruthe ab, und schnellet die Ruthe in die Höhe, daß es eine Schleife bey dem Kopfe oder Füßen ergreife.

Schleppen ist eine Ver- richtung, die man vornimmt, um einen Fuchs oder ein anderes Raubthier auf den Platz zu bringen, wohin man ihn können und in der Folge ein Eisen, um ihn zu fangen, legen will. Man bratet nemlich eine Rage, der man das Gescheide ausgenommen; oder einen Hering, oder man nimmt ein bloßes Hasengescheide, und schleppet dieses im Walde herum, bis dahin, wohin man das Eisen legen will, ist es aber ein Schlagbaum, so schleppet man auch darüber weg, **S. Fuchsfang.**

Schloß heißt 1) der Knochen bey den meisten Thieren weiblichen Geschlechts, der sich aus einander giebt, wenn sie ihre Jungen zur Welt bringen. Weil das Auseinandergeben bey den Wären nicht geschieht, so kommen ihre Jungen so klein auf die Welt, daß sie dieser Oeffnung nicht bedürfen, 2) s. **Klinschloß.**

Schloßtritt oder **Schluftritt** ist derjenige Tritt, den man allezeit in der Mitte eines Hirschbettes findet, wenn er aus demselben aufgestanden. Er entsteht dadurch, daß er im Aufstehen sich auf den rechten Fuß stemmet. Bey dem Thiere ist dieses der Fall nicht, sondern es

bedienet sich dazu des linken Fußes zur Seite des Bettes.

Schluff, Schlupf heißt der gewöhnliche Weg eines Thieres durch eine Hecke, nach einem Felde, Weinberge, Garten etc.

Schluf heißt, wenn der Hirsch mit der Hinterschaale so gerade in die Vorderschaale tritt, daß es das Ansehen gewinnt, als wenn es nur mit einem Laufe geschehen wäre. Das Thier thut es selten oder nie.

Schmalreh ist eine jährige Rüde.

Schmalthier ist ein Wildkalb weiblichen Geschlechts, das das erste Jahr seines Alters erfüllt hat. An manchen Orten bekommt es schon im ersten Jahre nach der Brunst und Verhärtung diesen Namen.

Schmehlen, Schmählen, Schrecken, sagt man vom Rehe, wenn es einen lauten Schrey hören läßt. Wenn ein Reh unvermuthet einen Menschen, Hund, ein Raub- oder anderes Thier gewahr wird, und noch nicht weiß, was es ist, ziehet es unter beständigen Schmählen immer von fern herum. Sobald es aber seinen vermeynten Feind gewiß kennt, flieht es schnell, ohne zu schmählen.

Schmeissen sagt man, wenn die Raubvögel ihre Exkremente von sich lassen.

Schmiel.

Schmälente — *Anas Jancea*; Frisch — heißt auch **Schmalente**, **Bisamente**, **kleine Mittelente** und **Weißbäckchen**. Kopf und Hals sind stark; der Schnabel mit einem schmalen haakenförmigen Nagel ist so wie die Füße schwarz. Beim Männchen ist der Kopf und Hals entenhalbig; Spiegel schwarzgrün, weiß eingefäßt; die Brust schwarz mit Purpurglanz; das Weibchen ist lechengerau. An Größe gleicht sie der Kriente. Sie hat ihren Wohnort auf deutschen Seen, ausgetretenen Flüssen und großen Teichen, wo man sie hauptsächlich im Spätherbste auf ihrem Zuge antrifft. Ihre Nahrung sind Insecten, Frösche, Fische und Wasserkräuter.

Schnabel ist 1) der harte Theil am Kopfe eines Vogels, wodurch er seine Nahrung einnimmt. 2) Eine Gabel, die man den Hühnern, wenn sie mausen, oder sonst tief suchen, so anschnallt, daß sie gerade vor der Nase, wie ein Schnabel steht, und den Hund verhindert, die Nase zur Erde zu bringen.

Schnatterente, *A. Strepera* Linn., heißt auch **Schnarr** und **Lärmente**, graue und braune Ente; **Mittelente**, **Leiner**, **Scheerentlein** und **Weißspiegel**. Die blättrigen Zähne (Lamellen) des schmalen Schnabels sehr lang, fast so lang, wie an der Löffelente. Daran wird auch das

Weibchen dem minder praktischen Ornithologen leicht kenntlich; der Flügelspiegel weiß; das Männchen am Schnabel schwarz, am Ober Rücken und an der Brust mit bogigen schwarzen und weißlichen Linien gezeichnet; das Weibchen am Schnabel bräunlich; auf dem Rücken schwarzbraun mit rostgelben Federkanten und an der Brust rötlichbraun, schwarz gestreift, 19 Zoll lang. Die Jäger nennen sie **Mittelente**, weil sie in der Größe das Mittel zwischen der gemeinen wilden Ente und der Kriente hält. Ihr weißlicher Spiegel macht sie von weitem kenntlich, und dieß ist auch das Hauptkennzeichen, wodurch sie der Jäger von der wilden Ente unterscheidet. Sie lebt vorzüglich in der Brutzeit auf Seen und großen Flüssen im Norden von Europa und Asien; auf ihrem Zuge im Herbst und Frühlinge aber einzeln und in großen Heerden in Deutschland auf Seen, Brüchen, großen Teichen und seichten sumppigten Flußufern. Ihre Nahrung sind Insecten, Schnecken, Fische und Wasserpflanzen.

Schneckenrundung, **Schneckenordnung** ist bey der Jagd ein, wie andere Flügel, gehauener Weg, der aber schneckenförmig, und daher immer enger zusammen läuft, und nirgends zusammen trifft.

Schneefink — *Fringilla nivalis* — macht in der Gattung, und zwar in der ersten Fami.

Familie, eine besondere Art aus, von der Größe einer Feldlerche mit aschgrauem Kopfe, graubraunem Rücken und weißen hintern Schwungfedern, dergleichen Deckfedern der Flügel und äußern Schwanzfedern. Er bewohnt die süblichen deutschen Alpen, selten kommt er auf dem Striche in die mittlern Gegenden von Deutschland und bis nach Sachsen. Seine Nahrung sind Nadelholzsaamen und Insecten.

Schneegans — *Anas hyperborea* — auch **Hagelgans** und **nordische Gans** genannt, macht in der ersten Familie der Entengattung eine eigene Art aus, die eigentlich im Norden der alten und neuen Welt wohnt, aber im Winter zuweilen in Heerden durch Deutschland zieht. Der Schnabel ist orangegelb; die Stirn gelblich; die Füße sind roth; die Hauptfarbe ist schneeweiß; die Schwungfedern aber sind von der Spitze an bis zur Mitte schwarz; die Länge beträgt drittelhalb Fuß. Allein sie wechselt in der Farbe ungemein ab.

Schneehaube ist eine Art von Netzen, die man besonders zum Rebhünnerfange braucht, und folgendergestalt bereitet: Man strickt ein Stück spiegellicht Garn von Bindfaden, das man mit einer Masche anfängt, und bis auf 20 Maschen zunimmt; dann strickt man es auf beyden Seiten zunehmend fort, bis es 12 Ellen lang ist. Sodann strickt man die beyden Enden zusammen, daß es viereckig wird, und

vier Wände ausmacht, die man so eintheilt, daß in jede Ecke ein daumensdicker Spieß eingebunden wird. Hierüber strickt man wieder ein viereckiges Stück Garn ebenfalls spiegellicht, von solcher Weite und Breite, daß es auf dem erstern wie eine Decke liegt. Diese befestiget man ebenfalls daran. Aus den Seitenwänden schneidet man einige Maschen, und strickt dagegen in jede eine Einkehle, wie in einem Garnsack. An der Decke bindet man in der Mitten einen Bindfaden mit einem kleinen Hestel an. Diese Schneehaube stellet man auf den Schnee dahin, wo sich Rebhüner aufhalten. Man steckt nämlich die vier Spieße, als ein gleichseitiges Viereck, in die Erde, so, daß das Garn recht straff stehe. Auch befestiget man den Hestel am Himmel in der Erde, damit die in der Schneehaube befindlichen Hüner mit dem Himmel nicht so hoch fliegen können. Vorher aber körnet man die Rebhüner durch ausgestreuten Weizen, Gerste, dahin, wohin man die Schneehaube stellen will, macht im Schnee glatte Steige nach den Einkehlen zu, und streuet in diese auch etwas Getraidkörner. Endlich stellt man die Haube, mit mehr eingestreuten Körnern, thut auch einen Büschel Weizenähren hinein. Wenn nun die Hüner diesem Futter nach, durch die Einkehlen hinein kriechen, so können sie, weil diese inwendig ganz enge sind, nicht wieder heraus, und sind gefangen.

Schnee:

Schneehuhn, ist das ha-
senfüßige Waldbuhn.

Schneenez, Schneegarn
ist ein Netz, das man bey star-
kem Schnee zum Rebhünnersange,
so wie im Sommer den Tiras,
brauchet. Es gleicht demselben
in der Gestalt, nur daß es wei-
tere Maschen hat, und von sei-
nem, doch festem weißen Zwirne
gestrickt ist. Man zieht es nach
seiner Länge in seinen Säumen,
welche an beyden Enden wenig-
stens 30 und mehr Ellen her-
vorgehen müssen. Diese Säume
werden mit einer besondern Schlei-
fe zusammen gewunden, damit
es sich nicht verwirre. Wenn
man nun bey großem Schnee
ein Volk Rebhüner von fern lie-
gen siehet, so breiten ihrer zwey
das Netz aus, fassen die Säu-
me so lang sie können, und ge-
hen damit gerade auf die Reb-
hüner los. Diesem folgt ein an-
derer, der den Vorhergehenden
ein Zeichen giebt, wenn sie zu
weit rechts oder links abweichen.
Wenn sie an die Hüner kom-
men, decken sie dieselben zu, da
benn die Hüner aufstehen, und
sich im Netze verwickeln. Man
führt das Netz wie den Tiras
niedrig, und wie man die Hand
von sich strecket. Wenn das
Schildwacht stehende Huhn sich
schnell unter dem Schnee ver-
stecket, so halten die Hüner gut
aus, wenn es aber anfängt zu
schreyen, so stäuben sie bald auf.
Die beste Zeit dazu sind die
Morgenstunden, ehe die Hüner
aus ihrem Nachtlager aufstehen,
da sie noch fest liegen, und am

besten halten. So geht es auch
Abends gut, wenn sie ihr Nacht-
lager machen; bey Tage aber und
überhaupt, wenn der Schnee
schreyet, gehtes nicht gut. Wenn
sie aber aufstäuben, und man
sie wieder einfallen, und sich
ein Lager machen siehet, so kann
man den Gang mehrmal des Ta-
ges vornehmen. Bey flachem
Schnee und wehendem Winde
ist es ebenfalls nicht zu brau-
chen, auch liegen sie zu solchen
Zeiten mehr an Hecken und Bü-
schen, als auf freyem Felde.

Schnellen ist eine Strafe
1) mit dem Hängeseile, für den
Leithund, wenn er auf der Kar-
the laut wird, 2) mit der Dres-
sirleine für den Hünerhund, wenn
er nicht auf den Ruf hört.

Schneller ist eine Feder
am Schlosse einer Kugelbüchse,
oder auch eines Schwaneneisens,
zur Beförderung des geschwin-
den Losgehens; dergestalt, daß
das Schloß, wenn der Schneller
gestochen ist, bey der geringsten
Berührung des Abzuges losgeht.

Schellfalle ist eine mit
einer gebogenen Stange derge-
stalt gestellte Falle, daß sich nach
dem Wegziehen des Rödels das
Thier fängt.

Schnepfe — Scolopax —
ist eine zur Niederjagd gehören-
de Federwild- Gattung in der
Ordnung der Cumpfvögel, und
enthält mehrere Arten, wovon
aber bey uns nur die Wald-
Mittel-Heer- und Haar-
schne-

schne pfe vorkommen. Diese Gattung hat nachstehende Unterscheidungskennzeichen: der Schnabel ist ohne tiefen Einschnitt im Kopfe, weich, fast rund, dünne, gegen die weiche, kolbige Spitze meist mit höckerigen Erhabenheiten versehen, gerade und sehr lang, d. i. über zweymal länger als der Kopf; die Nasenlöcher sind röhrenförmig; die Zunge ist spizig; die Augen liegen hoch am Kopfe und sind groß; die Füße weniger hoch, über der Ferse nur wenig nackt; die Zehen unverbunden, und die hintere aus mehrern Gelenken bestehend und tiefer sitzend. Ihre Nahrung besteht aus Insekten und Würmern, die sie in der Dämmerung auf Riethen und Sümpfen suchen. Sie verstecken sich vor Menschen und Thieren.

Schnepfenfalle ist eine Art des Schnepfenfanges, welcher die Art und Weise ist, sich der Schnepfen zu bemächtigen. Dieses geschieht 1) durch Schießen, zu der Zeit wenn sie ziehen, und zwar a) im Frühjahr. Die rechte Zeit dazu ist, wenn um die Mitte des März der Horbel- und einzelnen Krammetsvögel kommen, so finden sich auch einzelne Schnepfen mit ein, die man mit einem guten vorstehenden Hunde in birkenen und ellernen Büschen, und im Nadelholze suchen, auch Abends auf dem Anstande an Holzrändern schießen kann, welches letztere eine sehr angenehme Jagd ist: denn so

ungewiß der Flug einer auf gejagten Schnepfe am Tage ist, so stete ist er, wenn sie des Abends am Holze hergezogen kommen, wo man sie schon von fern an einem gewissen knurrenden Laute, der einige Aebrlichkeit mit dem Worte Quark hat, hören kann. Und wenn bey hellem Wetter ihrer mehrere zusammen kommen, so stehen sie auf einander, und fliegen unter einem, wie Pschi, Pschi klingenden Laute, immer zusammen, wobey sie sehr leicht zu schießen sind. Wenn nun in der Folge die Weindroseln zahlreich ankommen, dann ist die rechte Zeit des Schnepfenstreiches, und da läßt man die Hölzer mit Klappern durchtreiben, wobey man aber lauter kurze und schmale Treiben machen muß, die auch nicht breiter seyn dürfen, als man sie mit Schüssen bestellen kann; auch muß man Achtung geben, wo die aufgejagten und nicht geschossenen Schnepfen einfallen, um sie sogleich wieder auffuchen zu können. Im Herbst, wo der Hauptzug von der Mitte des Oktobers bis gegen Martini dauert, kann man eben so verfahren, nur ist dann der Anstand nicht so angenehm, wie im Frühjahr, weil sie mehrentheils stille ziehen, und auch nicht auf einander stehen. 2) Mit Lauffschlingen, s. Laubhühner. 3) Mit der Schnepfenfalle, die beynähe wie eine Schneehaube für Rebhühner gemacht ist. Diese beyden Fangarten sind jedoch bloß im Nadelholze anwendbar, weil in Laub-

höl-

hölzern das viele darauf fallende Laub den Fang erschweret. 4) Mit Hünere-Steckgarnen, die man in Felbhölzern aufstellt, aber fleißig abtrocknen muß, damit sie nicht verstocken. 5) Mit Klebnetzen, wie die zum Lerechenfange, nur von stärkern Zwirn, und mit höhern Forkeln, auch ziehet man durch die untersten Maschen einen Bindfaden, mit welchen man sie, jedoch nicht zu straff anbindet, damit sie Bufen zum Fange der Schnepfen behalten. Von diesen stellet man, wenn die Schnepfen ihren Zug haben, eine Wand in einiger Entfernung vom Holze, da die Abends heraus und früh hineinziehenden Schnepfen sich darinnen fangen. Dieses sind die Fangarten der Waldschnepfen. Die Wasser- und Sumpfschnepfen schießt man ebenfalls vor dem Hunde, sie sind aber, wegen ihres schnellen und haakenförmigen Fluges, schwer zu schießen. Man kann sie auch in Schlingen und Schlagnetzen, die man dahin legt, wo sie ihre Gänge haben, mit Moos und Schlamm bedeckt, und zur Lockspeise Regenwürmer oder Hafer vorlegt, fangen.

Schnepfenpfeife ist ein Pfeifchen von Messing 1 Zoll lang und eines Fingers dick, woran oben ein Röhrchen eines Strohhalmes dick, und unten wo es angelötet wird, spitziger ist, als oben, an der Seite aber ein kleines Loch hat; damit macht man die Stimme der Schnepfe zweystimmig nach, und lockt damit die Schnepfen.

Schneus, die im Walde in schmalen geraden und geschlängelten Gängen an den Bäumen aufgestellten Biegelbohnen mit einer Beerenkörnung, um Drosseln, Seitenschwänze u. d. arinnen zu fangen.

Schnippen, nennen die Hühnerfänger, wenn die Feldhühner beim Eintreiben in die Garne mit dem Schwänze auf- und niederschlagen; aber auch die Warnungstöne der Schwarzdrossel bey Annäherung eines Feindes heißen Schnippen.

Schnüren oder Schnürren, nennet man das Laufen der Wölfe, Füchse und Luchse im Trabe, weil sie mit den Hinterklauen so genau in die Tritte der vordern treten, daß alle Tritte in schnurgerader Linie hinter einander stehen.

Schöpfen heißen die Falkeniere, wenn sie den Falken an einen Bach zum Baden oder Tränken stellen.

Schonzeit, Heegezeit, ist die Zeit, in welcher das Schießen und Fangen des Wildprets nach den Gesetzen verboten ist. In Chursachsen ist solche in Rücksicht der hohen Jagd vom Sonntage Invocavit bis den ersten Sonntag nach Trinitatis bey der Mittel- und Niederjagd aber vom Sonntage Invocavit bis den 21sten August. Dagegen dauert die Jagdzeit der hohen Jagd vom ersten Sonntage nach Trinitatis, und die der

Mittel- und Niederjagd vom 1sten Septbr. bey beyden aber bis den Sonntag Inveavit. Die Niederjagd fängt auch an manchen Orten den Tag Bartholomäi, den 24sten August an, und im Stifte Merseburg dauert erstere vom 4ten Septbr. bis den 4ten März. Die Mitteljagd hingegen gehet in manchen Ländern zu Trinitatis, in andern auch erst den 16ten Oktober an. Man erlaube mir hier folgende Anmerkungen einzuschalten: 1) Der Anfang der hohen Jagd ist 14 Tage nach Pfingsten zu zeitig anberaumet, weil um diese Zeit die, kaum ein paar Wochen alten, Wildkälber ihrer Mütter oft viel zu zeitig beraubt werden, und daher nicht selten zu Grunde gehen würden. 2) Ist der Anfang der Mitteljagd um eben diese Zeit aus eben diesem Grunde, auch in Rücksicht der jungen Frischlinge und Rehkitze, zu zeitig; den 1sten Septbr. oder 16ten Oktbr. hingegen zu spät angesetzt, weil man dadurch nicht allein das Vergnügen des Rehplattens einbüßt, sondern auch von der letzten Hälfte des Julius bis zu Anfange des Septembers, oder gar bis in die Mitte des Oktobers, von Rehen und Sauen viel Feldschaden verursacht wird. Daher es wohl zu wünschen wäre, daß die Hohen- und Mitteljagd beyde zugleich in der Mitte des Julius ihren Anfang nähmen. 3) Fängt auch die Niederjagd um die oben genannten Tage zu zeitig an, denn es gi et um diese Zeit noch trachtige Häs-

sen, und eine Menge ganz junger Haasen, die zum Essen noch ganz unbrauchbar, nicht sowohl geschossen, als gemeiniglich von den mitlaufenden Hunden zerissen werden. Auch findet man noch viel junge Oeebhürter, die noch nicht verschilbert haben; und kaum so groß, als Wachteln sind. Daher wäre wohl die beste Anfangszeit der Niederjagd, der Tag Kreuz Erhöhung, oder der 14te September, denn der um diese Zeit anfangende Strich der Zugvögel ladet schon die Liebhaber der Jagd zu diesem Vergnügen ein. Auch sollte aus eben diesen Gründen da, wo die Koppeljagden noch nicht abgeschafft sind, die Vorhase erst um diese Zeit, und die Koppeljagd zu Michaelis ihren Anfang nehmen. Nicht minder würde es auch 4) zur Erhaltung der Jagden ein Großes beitragen, wenn das, an vielen Orten erlaubte, Schießen der Ocker- und Pfingsthaasen gänzlich verboten würde, denn man bekommt doch nur trachtige oder säugende Häsinnen, oder abgerammelte dürre Kammeler; äußerst selten aber etwa zu Pfingsten einen halbwüchsigem Haasen zum Schuß, und welcher Schade wird dadurch der Wildbahn verursacht!

Schrecken heißt 1) der Vogelfang auf dem Schreckheerde. 2) s. Schmehlen.

Schreckheerd ist eine Art von Vogelheerden. Man legt ihn an einem Vorholze in einem dicken Busche an, wo ein guter

guter Vogelzug ist. An die vier Ecken des Plazes werden Säulen gesetzt, 9 Ellen lang, 8 Zoll breit und 6 Zoll stark. In diesen Säulen werden oben und unten zwei Rollen dicht an einander befestiget, die in einem Bolzen gehen, und in deren eine die Haupt- in die andere aber die Zugleine kömmt. Dicht unter diesen werden auch Rollen zu den Querwänden, quer durch die Säulen angebracht. An einem Ende steht eine bedeckte Hütte so hoch als die Säulen, nicht weit vom Gesträuche. Die Oberleinen werden an Hefeln, welche 6 bis 7 Schritte von den Säulen stehen, die Unterleinen aber an andern ganz nahe bey den Säulen stehenden scharf angezogen und angebunden. Die Decke wird mit den Seitenwänden bis an die hinterste Querwand zurückgeschoben, alles aber gehörig mit grünem Reifig verblendet. Achzehn Schritte von den Seitenwänden werden 10 bis 12 Haakreiser gesetzt, die 12 Ellen hoch sind, und wenn man stellet, werden 2 Raubvögel in Kästen auf hohen Stangen dabey aufgestellt. Dieser Kasten bestehet aus einem 2 Fuß 3 Zoll langen, und 12 Zoll breiten Bodenbrette. An diesem sind zwey, 12 Zoll hohe Seitenbretter, mit gebrochenen eisernen Bändern, nebst der Decke so verbunden, daß sich alles mittelst der Zugleinen öffnen und wieder verschließen läßt. Im Kasten ist eine Sprungstange, worauf der Sperber sitzt, und mit Riemen so befestiget ist, daß wenn der

Kasten aus einander gehet, sich die Sprungstange etwas hebet, und sich also der Sperber regem muß. Wenn nun nächst diesem alles, was zu einem andern Vogelheerde gehört, bereit ist, auch die Raubvögel an Ort und Stelle sind, und der Vogelsteller in der Hütte bemerkt, daß Vögel im Anzuge sind, so ziehet er das Schweberohr, und wenn Vögel anfliegen, die Keinen der Kästen, die sich alsbald öffnen, und den Vögeln die Raubvögel zeigen, die denn alsbald vor Furcht auf den Heerd fallen, und berückt werden.

Schranken, Geschrenke, Schränken, Schrank ist eines der vornehmsten Unterscheidungszeichen der Hirschfärthe von der Thierfärthe, da der Hirsch im geschwinden und langsamen Gange weit rechts und links schwanket, welches das Thier nicht thut.

Schreyen nennet man das Brüllen des Hirschkes in der Brunft, den Laut der Haasen, Feldhühner, Gänse, Enten und Eulen.

Schritt des Hirschkes ist vom Thiere genau unterschieden, und der Jäger beurtheilt daraus das Alter des Hirschkes.

Schroth, Hagel sind ganz kleine von Blei gegossene Kugeln oder Körner, die man zum Schießen des kleinen Wildprets und der Vögel brauchet. Sie werden Pfund- und Centnerweise nach ihren verschiedenen Sorten

Sorten gekauft, wovon No. 1. die größte Sorte ist; die kleinste heißt Vogelkugeln.

Schütze heißt einer, der eine Fertigkeit im Schießen erlangt hat; ingleichen einer, der eine Stelle bekleidet, wo er bloß mit der Jagd, nicht aber mit dem Holze zu thun hat. Z. B. Grenzschütze, der bey einem Grenztroie vier angestellt ist, um das wechselfelnde Grenzwildpret zu schießen. Bey einer Jagd werden alle die, welche die Jagd mit machen, und mit Schießgewehr versehen sind, Schützen genennet. So hat man auch in Städten ganze privilegirte Schützen-Compagnien, die sich im Schießen nach der Scheibe und dem Vogel üben.

Schußmäßig ist, wenn ein Thier oder Vogel so nahe ist, daß ihn der Jäger mit Gewißheit erreichen und fällen, oder erlegen kann.

Schwalbe — Hirundo — oder Tagsschwalbe, macht in der Ordnung der schwalbenartigen Vögel eine eigene Gattung aus, mit einem kleinen an der Spitze krummen und spitzigen Schnabel; mit einer Mundöffnung ohne Borsten; mit runden und offenen Nasenlöchern; mit einer kurzen, breiten und gespaltenen Zunge und mit Füßen, die fast immer bis an die Ferse mit Federn bedeckt sind. Das Fressen, Trinken und Baden dieser Vögel geschieht im Fluge; und da ihre Nahrung vorzüglich in Fliegen, Mücken,

Schnaken, Hasen und Wasser-motten besteht, so halten sie sich immer bey Wasser auf. Die bey uns vorkommenden 5 Arten, als die Rauch-Haushälter, Thurm- und Alpen-schwalben, sind in zwey Familien abgetheilt.

Schwan, oder Stummer Schwan — Anas Olor — gehört in der Gattung Ente zur ersten Familie, mit an der Wurzel höckerigem Schnabel, wo er eine besondere Art ausmacht, und auch gemeiner Schwan, zahmer Schwan und Schwanente genannt wird. Als Kennzeichen seiner Art hat der Stumme Schwan nachstehende: An der Stirn ist auf der Schnabelwurzel ein runder schwarzer Auswuchs, und das Gefieder ist rein weiß. Dieser Schwan ist einer der größten Vögel, denn er wiegt 20 bis 30 Pfund; die Länge ist vier und einen halben Fuß, wovon der Schwanz sieben Zoll wegnimmt; die Breite sieben und ein Viertel Fuß, und die Flügel legen sich auf zwey Drittheile des Schwanzes zusammen. Der Schnabel ist über drey Zoll lang, unten platt, oben halbwalzenförmig, dunkelroth, an der Spitze ein gekrümmter schwarzer Nagel, an der Wurzel oben ein knotiger runder schwarzer Auswuchs und zwischen Schnabel und Augen eine dreieckige schwarze nackte Haut; die Füße sind gewöhnlich aschgrau, bey alten aber auch gelb und fleischroth; die

die Nägel schwarz; die Schienbeine sind drey und einen Viertel Zoll hoch. Das ganze Gefieder ist rein weiß. Das Weibchen ist etwas kleiner als das Männchen, hat einen weniger dicken fleischigen Auswuchs, und einen dünnern Hals. Es ist ein schöner, muthiger und reinlicher Vogel. Er schwimmt auf dem Wasser mit dem schönsten Anstande, biegt den Hals krumm, wie ein lateinisches S, und trägt dabey die Flügel etwas erhaben. Besonders schießt das Männchen zur Zeit der Begattung mit der größten Schnelligkeit über das Wasser, legt dabey den Hals auf den Rücken, und schlägt die Flügel in die Höhe. Er fliegt eben nicht öfterer, als er geht, fliegt aber ziemlich schnell und sanft, und gleitet gleichsam in der Luft hin. Die Natur hat ihn deswegen mit einem langen Halse, der aus achtzehn Gelenken besteht, versehen, damit er im Stande sey, auf den Grund des Wassers zu kommen, um seine Nahrung zu suchen, weil er sich mit seinem Körper nicht ganz untertauchen kann. Er liebt die Gesellschaft seines Gleichen, und thut keinem andern Wasservogel, der neben ihm wohnt, etwas zu Leide, wenn er immer hinlänglich Nahrung findet, ohngeachtet er in seinem Schnabel und besonders in seinen Fittigen eine außerordentliche Stärke besitzt, denn wenn es ein Adler oder Geyer wagt, ihn oder seine Jungen anzufallen, so weiß er sich so gut zu wehren, daß er oft Herr über seinen Feind wird. Da er

keine gebogene Luftröhre wie der Sing schwam hat, so kann man nur ein Schnurren, Brummen und leises Gequackele von ihm hören. Man spricht, er werde dreßsig, ja hundert Jahre alt. Man trifft ihn in ganz Europa eben so wie in gemäßigten und nördlichen Rußland an. In Deutschland sieht man ihn allenthalben auf Seeen, Teichen und Flüssen, und wo er nicht ganz wild ist, da findet man ihn, entweder gehegt oder gar gezähmt, als eine Zierde der Gewässer. Den zahmen baut man hölzerne Steigen oder auf Steine errichtete Höhlen, wo sie zuweilen trocken sitzen und sich bequem mausern können. Wenn man mehreres Wassergeflügel hat, so kann man sie im Winter auf dem Wasser lassen, und sie erhalten dann durch die stete Bewegung, wenn die Kälte nicht gar zu streng ist, das Wasser offen und befinden sich weit besser, als wenn man genöthiget ist, sie in einen Stall zu treiben. Die ungezähmten ziehen gewöhnlich im Oktober weg, und kommen zu Ende des März wieder. Viele, besonders die gehegten, streichen auch bloß von einem offenen Gewässer zum andern, und sind so bald wieder auf ihrem Teiche, als derselbe vom Eise entblößt ist. Seine Nahrung besteht aus mehreren Arten von Wassergräsern und Kräutern, die er tief vom Boden herauf holet, aus den Samereyen der Wasserpflanzen, den großen Wasserkäfern, andern Insekten, Schnecken

len, und, wie man sagt, auch aus Kröschén. Fische rühren sie nicht an. Die gehegten und gezähmten gehen Brod und allerhand Getraide an, und letztere füttert man im Winter mit gewöhnlichem Gänse- und Entenfutter. Wie bey allen Vögeln, also zeigen sich auch bey den Schwänen mancherley artige Auftritte zur Paarungszeit. Das befruchtete Weibchen macht im April an das Ufer ein großes Nest aus Halmen, Schilf- und andern Pflanzenstängeln, füttert es mit einigen Federn aus und legt sechs bis acht schmutzig olivengrüne undeutlich und einzeln olivenbraun gefleckte Eyer, die es in fünf Wochen ausbrütet. Die wolligen Jungen sehen anfänglich grünlichgrau aus, und schreyen wie die jungen Gänse. Sie bleiben bey den Alten bis sie wegziehen, sehen bis zum zweyten Mausern aschgrau braun aus, und haben bis zum dritten dunkle Schenkel und Füße. Will man sie gezähmt haben oder erhalten, so muß man sie, ehe sie ganz flügge werden, fangen, und das erste Flügелgelenk zerknicken oder besser abschneiden. Nur Adler, z. B. der Fischadler, können sich an diesen starken Vogel wagen. Zwey Arten Läufe, eine gefleckte und gestreifte, findet man auf seiner Haut, die den Jungen zuweilen tödtlich werden. Der Schwan gehört zur hohen Jagd. Sie sind nicht schwer zu schießen. Zu den Jungen hat man, ehe sie ganz flügge sind, indem man sie mit Rähnen ans Ufer oder ans

Schilf treibt, Apportiren und, die sie unbeschädigt fangen. Man treibt sie auch in Stellnetze, welche sich durch Reinen leicht zuschlagen, wenn sie sich zwischen denselben befinden. In Dänemark gehört das Schwanschießen nahe an den Inseln zu den größten Jagdlustbarkeiten. Sie sind für den Menschen höchst nutzbar. Denn das Wildpret von Jungen kommt vorzüglich in Pasteten auf die Tafeln großer Herren, das der Alten aber ist zähe und schmeckt thranig. Das Fett braucht man in der Apotheke. Die Häute mit den Flaumfedern sind ein kostbares Pelzwerk, und dienen auch zu Puderquasten. Die Federkiele dienen zum Schreiben und aus den Flügel- und Schwanzfedern, macht man Federhütze und Sultane. Die übrigen Federn und vorzüglich die Dunen, dienen zum Ausstopfen der Betten und Canapees, und sind sehr kostbar. Die gezähmten werden deshalb in manchen Gegenden, z. B. auf der Spree und Havel, wie die Gänse gerupft, und zu Frankfurth an der Oder ist dieß ein wichtiger Handelsartikel. Die andere im Winter und Frühjahr auf dem Zuge aus dem Norden der ganzen Erde, zuweilen in Deutschland vorkommende Art Schwane ist der zur zweyten Entenfamilie mit an der Wurzel glatten Schnabel gehörende Singeschwan, A. Cygnus, Gmelin. Linn., auch schlechtweg, Schwan, wilder Schwan

Schwan, und **Schnabel-**
schwan genannt. Mit schwar-
 zem, halb walzenförmigem Schna-
 bel, gelber Wachsheit und weis-
 sem Körper. Nach Herrn G.
 Beckers an 6 Vögeln dieser
 Art, die er 1800 am Rheine
 geschossen, gemachten Beobach-
 tungen, ist der *Anas Cygnus*
 beträchtlich größer als *Anas Olor*,
 mithin gerade das Gegentheil der
 bisher bestandenen Meinung in
 gedachter Rücksicht. Im ma-
 gern Zustande wiegt er 18 Pfund
 und bey fettem Leibe wiegt er
 wohl mehr als 25 Pfund. Eine
 Art Wachsheit, die sich von der
 Wurzel des Schnabels bis über
 die Nasenlöcher herab zieht, so
 wie die in den scheerenförmigen
 Unterkiefer schmal einziehende
 Kehlhaut, haben die reine gelbe
 Welschkornfarbe; die außeror-
 dentlich breiten Schwimmbäute
 zwischen den Beinen, so wie die
 starken Fußwurzeln, sind schwärz-
 lich mit mattem dunkelgrünem
 Schiller. Der lebende Schwan
 gab einigemal des Tags einen
 lauten und sehr scharfen Ton
 von sich, der mit dem aus einer
 schlecht gespannten Violine
 mittelst eines Bogens hervorge-
 lockten Tone viele Aehnlichkeit
 hatte. Im Magen befanden sich
 halbverbaute Winsen und Was-
 serkräuter, und aus dem Schlun-
 de zog Herr Becker noch Winsen
 in ihrer ganzen Länge hervor.
 Weiß ist zwar das ganze Gefie-
 der, doch aber nicht reinweiß.
 Man muß es schmutzig weiß nen-
 nen. Da er mehrere Stellen
 des Gefieders absichtlich wusch,
 und die gelblichweiße Farbe den-

noch unwandelbar blieb, so kann
 er behaupten, daß kein Roth
 diese Farbe hervorbrachte. Ueber-
 dieß aber, so waren Kopf und
 Nacken mit einer gelblichbraunen
 Farbe (Büffellederfarbe) überzo-
 gen, und nur einem Grem-
 place fehlte sie, welches gerade
 ein jüngerer Vogel war. Männ-
 chen und Weibchen sind in An-
 sehung der Farben nicht zu un-
 terscheiden; nur ist letzteres etwas
 kleiner, und seine Beinen und
 Schwimmbäute sind nicht so groß
 und breit. Dies ist der einzige ihm
 im Aeußern bemerkbare Geschlechts-
 unterschied. — Am jungen Vo-
 gel — deren er einen sah —
 war das ganze Gefieder aschgrau,
 gerade so, wie es bey dem Jungen
 des stummen Schwans aus-
 sieht. — Das Fleisch bleibt eine
 trockne und magere Speise, auch
 wenn es noch so gut zubereitet
 wird. Der Balg, sammt den Fe-
 dern und herrlichen Dunen, war
 an drey Zoll dick, und verbarg
 man die Hand nur zwey Mi-
 nuten in dieses Federkleid, so
 empfand man brennende Hitze.
 Er bauet sein kunstloses Nest
 an den Ufern, und das Weib-
 chen legt fünf bis sieben oliven-
 grünlichweiße Eyer, die in fünf
 Wochen ausgebrütet sind.

Schwannenhals, s. Fuch-
 sang No. I.

Schwangheftel, **Schlag-**
heftel ist eine Art von Hef-
 teln, die man bey einem Vo-
 gelheerde mit dem hohen Strau-
 che braucht.

Schwanz

Schwanz nennet man bey einer Parforcejagd die hintersten Hunde.

Schwanzmeise — *Parus Caudatus* — gehört mit der Kohlmeise als eigene Art zu einer Gattung, und heißt auch *Moor-Mohr*; *Belz*; *Schnee-Mehl*; *Berg*; *Vogel*; *Zahl*; und *Spiegelmeise*, lang-geschwänzte Meise, Teufelsbolzen, Teufelsbelzchen, Pfannenstiel, Weinzapfen, Pfannenstieglitz, Backofendrescher und Pfannenstielen. Sie unterscheidet sich von den übrigen Arten durch den sehr kurzen und zusammengebrückten Schnabel, durch den weißen Scheitel und den sehr langen Schwanz. Der eben erwähnte lange Schwanz und der durch die aufgesträubten und dichten Federn dick erscheinende Körper giebt dieser Meise ein ganz eigenes Ansehen; denn von der ganzen sechs Zoll betragenden Körperlänge kommen drey und drey Viertel Zoll auf den Schwanz. Der schwarze Schnabel ragt kaum zwey Linien aus den Federn hervor; die großen Augen sind schwarzbraun mit einem gelben Liederande; die Füße schwarzbraun, und acht Linien hoch. Der Kopf ist weiß; der übrige Leib schwarz mit einigen durchstehenden mattrosenrothen Flecken am Rücken und Steiße; auch auf den Schultern stehen dergleichen Federn; der Unterleib weiß, am Bauche ins mattrosenrothe übergehend; die Deckfedern der Flügel schwarz,

so wie die Schwung- und Schwanzfedern; von den letztern sind die drey äußern Federn heller und mit keilförmigen weißen Flecken auf der äußern Fahne. Das Weibchen hat über den Augen einen schwarzbraunen breiten Streifen bis in den Nacken. Wegen ihres langen Schwanzes und dicken Gefieders kann diese Meise nicht schnell fliegen, und wenn sie über eine kleine Ebene fliegen muß, wo die Bäume nicht dicht besammen stehen, so macht sie ein ängstliches Geschrey *Ti, Ti, Ti* und *Ge, Ge, Ge*, geh! Sonst ist ihre Lockstimme: *Tzirrerr!* Sie singt auch einige leise, aber unbedeutende Strophen. Es ist ein sehr zärtlicher und ängstlicher Vogel. Sie hat ihre Heymath in ganz Europa und in Sibirien, und bewohnt die Berge und Wälder, die mit lebendigem Holze bepflanzt sind. Am liebsten ist sie in Feldhölzern. Im Herbst ziehen kleine Familien allenthalben umher, die sich im Winter in größere Flüge vereinigen. Man sieht sie dann auch häufig in Gärten. Wenn in Thüringen sehr starke Winter einfallen, die besonders die Bäume lange mit Duft überziehen, daß sie nicht zu ihren Nahrungsmitteln kommen können, so sterben ihrer viel. Ihre Nahrung besteht aus kleinen Insekten. Im Winter sucht sie die Insekteneyer zwischen der Rinde der Bäume und Stauden und zwischen den Knospen hervor. Man findet das Nest gewöhnlich auf dem Aste eines Baumes an den Stamm

Stamm angelegt, und es ist mit Wolle, Haaren und Baummoos äußerlich befestigt und angeklebt, inwendig mit Federn dicht ausgelegt, oben zugebaut, und hat an der Seite eine Oeffnung zum Aus- und Einkriechen. Selten steht es auf der Gabel eines niedrigen Busches, und nur dann, wenn es etlichemal zerstört ist, in einem oben offenen alten faulen Baumstamme. Das Weibchen legt zehn bis funfzehn weiße, am obern Ende mit röthlichen Punkten, die auch zuweilen zusammengestoßen sind, versehene Eier. Die Jungen werden mit kleinen Raupen und Nachtfaltern gefüttert. Sie sind am Kopfe mehr gefleckt, und haben nicht die glänzend schwarze Rückenfarbe der Alten. Baummarbet, Wieseln und Hasen im Hause zerstören zuweilen die Brut, und im Winter verfolgt der Sperber die Alten. Sie fliegen nach dem Raue und gehen häufig auf den Trankbeerd. Sie sind so wenig scheu, daß man sie leicht mit den Blasrohre erlegen, ja mit Reimruthen, die an einen Stock gebunden sind, berühren kann. Ihr Fleisch schmeckt angenehm. Den vorzüglichsten Nutzen leisten sie in Gärten und Wäldern durch Vertilgung schädlicher Insekteneger.

Schwanzschraube ist eine Schraube, die in den hintersten Theil des Laufes an einem Schießgewehre geschraubt wird, auf welcher das in den Lauf geschüttete Pulver liegt. Bey den

nach alter Art gemachten Schwanzschrauben hat das Pulver so eine Lage, daß zuerst die hintersten Körner entzündet werden, die sodann immer vorwärts wirken, und die übrigen nach und nach anbrennen. Daher ist die neuere Erfindung, die Schwanzschrauben hohl zu machen, weit besser, denn da fällt ein Theil des Pulvers in die Schwanzschraube, das Pulver entzündet sich in der Mitten, und das Feuer greift gleich vor- und rückwärts, folglich gehet auch die Entzündung weit geschwinder von Statten, welches zu dem schärfern Schießen des Gewehres ein Großes beiträgt; dieses letztere wird noch vermehrt, wenn die Hohlung der Schwanzschraube eine trichterförmige Gestalt hat, wodurch das Pulver eine längere und gedrücktere Lage, und folglich weit mehr Kraft bekommt.

Schwarzmer heißt ein Leithund, der mit der Nase nicht an der Erde bleibt, sondern sie in der Höhe trägt und daher die Fährte nicht richtig hält.

Schwarzbüchiger Säniger oder Hausrothschwanzchen — S. Thyris, Latham — heißt auch Rothschwanz, Rothschwanzchen, Schwarzkehlchen, Röthling, Stadtröthling, Stadtrothschwanz, Stadtrothschwanzchen, Walbrothschweif, Hausröthel, schwarzkehlige Mauernachtigall, schwarzer und blauer Rothschwanz, Rothzahl, Rogagel, Rogagel,

ägel, Sommerrotele; Huting, Rothstiert, Wald- u. Gartenrothschwänzen, Rothsturz, Sauloder, Saulecker, Garten-schwarzkehlchen u. Schwarzbrüstchen; und gehört in die dritte Familie der Säuergattung als besondere Art. Männchen: Oberleib biskulichgrau; Unterleib bis zur Brust schwarz; Schwanz gelbroth, die zwey mittleren Federn dunkelbraun; die großen und kleinen Schwungfedern weiß kantirt: wodurch auf den Flügeln ein weißer Fleck entsteht. Weibchen: Oberleib dunkelashgrau; Unterleib aschgrau, rüthlich überlaufen; das Uebrige wie bey dem Männchen. $5\frac{1}{2}$ Zoll lang. Die jungen Männchen sehen bis zum zweiten und dritten Jahre dem Weibchen noch ähnlich, werden aber alle Jahre schwärzer und dunkler, daher man diesen Vogel auch unter verschiedenen Nahmen im System aufgeführt findet. Ueberhaupt ist bey diesem, so wie bey dem blauehligen und schwarzkehligen Sänger oder Rothschwanz; zu bemerken, daß sie in naturhistorischen Schriften nicht nur sehr verwirrt, sondern auch wegen der Alters- und Geschlechts-Verschiedenheit in der Farbe, als mehrere besondere Arten vorkommen. Er wählt sich zum Wohnort die höchsten und ältesten Gebäude in Städten und Dörfern, Mauern u. s. w. — wandert gesellschaftlich, wie das Rothkehlchen. Es besteht auch seine Nahrung in Fliegen und andern Insecten, selten Hohlunderbeeren. Man findet sein

Nest auf Gebäuden mit 5 bis 6 glänzend weißen Eiern.

Schwarzkehliger See-taucher (C. arcticus, Linn): gehört in die Gattung See-taucher — Colymbus — als eine besondere Art: Kopf und Hinterhals aschgrau, Seiten des Halses weißlich mit herablaufenden schwarzen Strichen; Kehle und Vorderhals violetschwarz; der schwarze Rücken mit viereckigen weißen Flecken. 2 Fuß lang. Auch dieser Vogel variirt in der Farbe; denn die jungen haben außer den viereckigen weißen Rückenflecken, auch noch weiße Federränder, und an der Seite der Brust stehen schwarze Striche. Bey seinen Wanderungen verbreitet er sich aus dem hohen Norden herab in alle Theile des nördlichen Europas, und wird daher auch in Deutschland im Winter auf Seen und Flüssen einzeln gesehen. Er wählt sich zur Nahrung Fische und Wasserinsecten, und das Nest findet man an Ufern mit 2 großen braunen Eiern. Dieser Vogel führt auch noch folgende Nahmen: Schwarzkehliger Taucher, Lumme, Lomme, Lumb, Lumpe, Polarente, Polartaucher, Polarthal-ente, bunte Tauchente, großer Seetaucher, Seehahn, Himbrine, Hymber großer nördlicher Taucher.

Schwarzkehliger Stein-schmäger ist unter der Gattung Stein-schmäger eine besondere Art.

Schwarz

Schwarzköpfiger Sän-
ger. — *Sylvia s. Motacilla*
atricapilla — oder **Mönch**,
heißt auch **Platten-Mönch**,
s. **Schwarzköpfige Gras-**
mücke.

Schwarznachtige Ente —
Anas torrida, Gmelin. Lin.
— hat einen Schnabel, wie die
Bisamente, einen weißen Kopf,
einen schwarzen Hals und Na-
ken, und die Größe der Hauben-
ente.

Schwarzschwänzige En-
te — *Anas melanura*, Gmel.
Lin. — ist vielleicht ein junges
Männchen von der Pfeifente,
und hat einen orangefarbenen
Schnabel und Beine; einen
fuchstrothen Scheitel; schwarze
Schwung- und Schwanzfedern,
und ist etwas kleiner als die
Hausente.

Schwarzspecht — *Picus*
martius — macht in der zur
zweiten Ordnung, welche die
spechtartigen Vögel — *Pici* —
enthält, gehörigen Gattung die
erste Art aus, welche sich von
den übrigen dadurch unterschei-
det, daß sie ganz schwarz ist und
einen hochcarmoisinrothen Schei-
tel hat. Er führt auch noch folgen-
de Nahmen: **Großer Schwarz-**
specht, **gemeiner Specht**,
tapfeter Specht, **Krähen-**
specht, **Luderkrähe**, **Specht-**
krähe, **Holzkrähe**, **Loch- und**
Hohlkrähe, **Holzhuhe**, **gro-**
ßer schwarzer gemeiner
Specht, **Baumhacker**, **gro-**

ßer europäischer schwarzer
Baumhacker, und **Füsilier**.
Er ist der größte deutsche Specht
und fast so groß, wie eine
Dohle, indem er die Länge von
einem Fuß, und fünf Zoll und
eine Breite von dreizehn Zoll
hat. Der Schnabel ist zwey u.
einen Viertelzoll lang, fast kegels-
förmig, hart, groß, an der Wur-
zel weißlich, und nach der Spi-
te zu bläulich hornfarben; der
Schwanz hält sieben Zoll. Die
Flügel reichen bis auf die Mitte
des Schwanzes; der Augenstein
ist weißgelb; die Füße, als wahre
Kletterfüße, sind dunkelbleifarbig,
und die Fußwurzel ist einen und
einen Viertelzoll hoch, vorne halb
besiedert, übrigens aber geschil-
dert. Die Hauptfarbe des gan-
zen Körpers ist schwarz und der
ganze Oberkopf bis in den Na-
sen hochoranienfarbigroth, und
oft mit einer schwarz-grauen
Grundfarbe. Recht alte Männ-
chen sind auch am Bauche roth.
Das Weibchen hat nur im Na-
sen einen rothen Fleck, welcher
sich nur im hohen Alter etwas
weiter auf dem Scheitel herum-
zieht, und die schwarze Farbe ist
nicht so dunkel, ja zuweilen fehlt
der rothe Fleck auf dem Kopfe
ganz. Dieser Specht, so wie auch
die übrigen Spechtarten zeichnen
sich vor allen andern Vögeln
durch das geschickte Auf- und Ab-
klettern an rauen Baumstäms-
men vorzüglich aus. Hierzu dis-
ten ihnen besonders die starken
kurzen Kletterfüße mit ihren gro-
ßen starken Klauen, mit welchen
sie sich auf- ab- und seitwärts
festhalten können. Auch ihr ganz
eigen

eigen gebildeter Schwanz trägt hierzu das Seinige bey. Die Federn desselben sind sehr stark, mit Schäften, die sich von der Wurzel an etwas auswärts biegen, stark, zähe und so elastisch sind, daß sie sich wie Fischbein krümmen und wieder aufschnellen, an der Spitze zugespitzt, zweispaltig, und mit sehr starken gleichsam abgeschliffenen Federfasern versehen, an den Seiten kürzer, und nur die äußerste und kürzeste ganz abgerundet, wie eine gewöhnliche Schwanzfeder an andern Vogelschwänzen. Diese starken Federn dienen nur zur besten Unterstützung, und da die mittlern lang und die Seitenfedern kurz sind, so können sie sich darauf lehnen, und sich ihre Arbeit erleichtern, sie mögen gerade oder seitwärts an einem Stamme hängen. Diese Arbeit besteht in einem unablässigen Bemühen Löcher in die Bäume, Baumstrünke und in die Erde zu machen. Hierzu dient ihnen ihr langer und starker Schnabel. Sie machen sie in der Absicht, um entweder in eine solche Höhle zu nisten, oder Holzwürmer zu ihrer Nahrung in denselben zu suchen; denn sie greifen niemals einen guten gesunden Baum an, sondern allemal einen von Würmern und der Fäulniß angegriffenen, und es ist eine gegründete Erfahrung, daß derjenige Baum, den ein Szecht angebohrt hat, und wenn äußerlich noch so gesund scheint, wenigstens kernfaul ist. Dieß beweist denn auch ihr sehr feiner Geruch, vermittelst dessen sie nicht nur allerhand Insekten, die

zwischen den Rigen sitzen, sondern auch selbst den moderigen Kern des dicksten Baumes riechen, und in demselben mit Recht Insekten vermuthen. Sie brauchen keinen ganzen Tag, um ein ziemlich tiefes und großes Loch in einen Baum einzuhauen, und der Schall davon ist so laut, daß man einen Holzmacher, oder Zimmermann in der Gegend, wo sie arbeiten, vermuthet. Das Geschrey, welches der Schwarzspecht bey dieser Arbeit und im Fluge hören läßt, ist ein sehr weit erlöndendes: Gut, gut! gid, gid, gid, gid! Wegen seines starken Körpers, und starren unbeweglichen Schwanzes fliegt er sehr gezwungen bogenförmig, schnell genug, aber nur kurze Strecken. Er ist der scheueste unter seinen Brüdern, und wegen seines guten Gehörs und Gesichts hat der geschickteste Jäger Mühe, sich ihm zu nähern, und wenn er ihn auch erblickt, so weiß er so geschwind und geschickt sich an die entgegengesetzte Seite des Baumes zu begeben, und sich zu entfernen, daß er ihn doch nur selten zum Schusse bekommt. Wenn er böse ist und zur Zeit der Begattung sträubt er auch seine beweglichen Köpffedern. Er ist übrigens sehr flüchtig, und bald da bald dort zu hören. Er wohnt in Europa und Sibirien. Sein Aufenthalt sind große Wäldungen; in Deutschland ist er immer selten, in denjenigen Wäldern aber soll er häufig seyn, wo es wilde Bienen giebt, denen er in hohlen Bäu-

Bäumen vorzüglich nachgeht. Nach den Jäger = Beobachtungen zieht er die Nadelwälder den Laubwäldern vor, hat aber vorzüglich vermischte Holzungen gern. Er ist, wie alle Spechte, ein Standvogel, und geht nur im Winter zuweilen aus den kalten Gebirgen herab in die Dörfer, und sucht da in den Strohdächern und Lehmwänden seine Nahrung. Er schläft allezeit, wie alle Spechte, in hohlen Bäumen, und erweitert sich dazu seine Wohnung, wenn sie nicht bequem genug ist. Seine Nahrung besteht in Insecten, Käupen und Puppen, die er meist unter den Rinden der Bäume, welche er mit seinem starken Schnabel aufhackt, und mit seiner langen und mit Wiederhakeln versehenen Zunge hervorzieht. Im Winter sucht er diese Nahrung auch zuweilen, wenn das Wetter gar zu rauh ist, in den Dörfern auf. Er klopft an alle lose Rinden, besonders der Baumstrünke und alten Stöcke, an, und sobald die Insecten aus ihren Wohnungen aus Neugierde oder Furcht hervorkommen, werden sie ihm zum Raube. Eine vorzügliche Speise sind ihm die schwarzen großen Kossameisen, die in den alten modrigen Holzstöcken wohnen. In einen solchen von diesen Insecten durchwühlten Strunk steckt er seine Zunge, schlängelt sie darinn hin und her, die Ameisen fallen diesen Feind an, er zieht alsdann die Zunge zurück und verschluckt die daran sitzenden Thierchen. Man trifft ihn deshalb am öftersten in denjenigen Gegenden im Walde an, wo die alten Baumstrünke

von gefällten Bäumen, die den Kossameisen zum Aufenthalte dienen, noch stehen. Er durchwühlt auch die Ameisenhaufen, und hackt die Hummel und Wespen-nester auf, um zu den Puppen und Maden zu kommen. Er geht auch den Buchedern, Haselnüssen und den Fichten- und Kiefern-samen nach. Sein Nest steht in Baumhöhlen, besonders in hohlen Eichen, Buchen, Hornbaum oder Zitterpappeln; wenn es nicht groß und erweitert genug ist, so haut er es vollends zu rechte. Die drey bis vier Eier sind, wie bey allen Spechten, weiß. Die jungen sind anfangs auf dem Kopfe roth und schwarz gesprenzt, und die Hauptfarbe ist mehr schwarzbraun, als schwarz. Die Baumgarder, Iltisse, Wiesel, wilden Katzen und Eulen, zerstören zuweilen seine Brut. Wie alle Spechte, also hat auch er Sängerkäuze und Milben auf seiner Haut. Er ist seiner Schüchternheit und Geschwindigkeit halber schwer zu sehen. Verfolgungssucht und Nahrungseid gegen seine Kameraden bringen ihn noch am ehesten in die Hände des Jägers. Wenn er nämlich einen seiner Kameraden pochen hört, so kommt er gleich herbei, und will ihn wegzagen und seine Beute nehmen. Um ihn also schussrecht zu bekommen, pocht der Jäger versteckt mit einem Meßer auf die Flintenkolbe, er kommt gleich in die Nähe und kann erlegt werden. Diese Methode kann man bey allen Spechten anwenden; sie fliegen auch nach dem Gesäthe.

Vor

Vor ihren Höhlen lassen sie sich auch mit der Schlinge fangen. Bey Häherhütten lassen sie sich auch durch das Eulengescrey auf die Leimgestelle locken. Da dieser Specht in Deutschland an den Bienenstöcken keinen Schaden thut; so ist er wohl seiner Nahrung halber, wie alle Spechte, aus der Anzahl der schädlichen Vögel auszuschließen. Er wird vielmehr dadurch nützlich, indem er viele schädliche Holzinsekten verzehrt. Wenn er einen Baum anhaftet, so ist er gewiß wenigstens kernfaul und enthält Insectenlarven; und er zeigt also dadurch dem Forstmanne an, daß dieser Baum gefällt werden muß. So viel ist gewiß, er haut große Spähne aus, und macht dadurch große Löcher in die Bäume.

Schwarzstirniger Sänger — *Sylvia nigri frons* Bechst. *Motacilla nigri frons* Lin. — heißt auch Weidenzeisig und Weidensänger, und gehört in der Gattung Sänger unter die zweyte Familie als eine besondere Art, mit dunkelzeisiggrünem Oberleibe, gelblich weißem Unterleibe, und mit einem schwarzen Querbande hinter der spizigen Stirne. Die Länge beträgt $5\frac{1}{4}$ Zoll. Seine Wohnung ist immer Gebüsche am Wasser und gegen den Herbst zieht er weg. Er nährt sich von Wasserinsekten und Hollunderbeeren und bauet sein Nest in das dickste und dunkelste Gebüsche am Wasser.

Schwarzwild, oder **Schwarzwildpret** — *Scrofa ferus* — heißt diese Thierart wegen seiner schwarzen Farbe; sonst wildes **Schwein** bey den Jägern aber wilde **Sau**; das Männchen: **Keuler**; das Weibchen: **Bähe**, auch **Lehne**. So wie der Hirsch edel heißt, so wird das wilde Schwein, wegen seines Muthes und seiner Stärke ritterliches Thier genannt. Nach der Linnaischen Eintheilung gehört die wilde Sau in die sechste Ordnung unter die Thiere mit dem Pferdegebiss, nach Blumenbach in die neunte mit gespaltenen Klauen, und nach einer verbesserten Pennantschen in die erste Ordnung zweyten Abschnitt; und die Schweine machen immer, wegen ihrer, von andern Säugethieren ganz abgehenden, Form und Gestalt, eine besondere Gattung aus, deren Kennzeichen der Art sind: Das gemeine Schwein (*Scrofa*) ist vorn auf den Rücken mit stehenden steifen Borsten besetzt, und hat einen haarigen Schwanz; und das wilde unterscheidet sich von dem zahmen durch kürzere abgerundete Ohren, einen mehr gebogenen Vorderkopf und vier größere Eckzähne. Das wilde Schwein ist der Stammvater des zahmen, wie schon der Augenschein bey der Vergleichung beyder Thiere ausweist, und wenn man auch nicht wüßte, daß diese mit jenen sehr leicht frucht-

ruchtbare Jungen zeugten, und, uns Freye ausgeſetzt, leicht in jene Raſſe wieder ausarteten. Nur eine ſehr genaue Vergleichung beyder können uns die kleinen Unterſchiede bemerklich machen, die zwiſchen dem zahmen und wilden Schweine ſtatt finden. Dieß hat nämlich einen längern Kopf, einen größern und ſtärkern Rüſſel, einen etwas gebogenen Vorderkopf, und die vier großen Eckzähne geben ihm hauptsächlich ein eigenes fürchterliches Anſehen; die Ohren ſind kürzer, runder und ſtehen aufrecht; die Läufe ſind ſtärker, die Klauen etwas breiter geſpalten; die Borſten ſteifer, das Haar überhaupt dichter, und unten liegt, beſonders im Winter, eine dicke rauhe Wolldecke; der Schwanz iſt kürzer und hängt faſt gerade hinunter. Die Farbe iſt im allgemeinen ſchwarzlich, nie kohlſchwarz; denn die Borſten ſind zwar ſchwarz, haben aber graue oder röthliche Spizen, und die ſeine wollige Unterlage iſt grau; doch ſehen Ohren, Schwanz und Beine ganz ſchwarz aus, der übrige Leib aber mehrentheils rußſchwarz. Man hat aber auch Farbenverſchiedenheiten angeſehen; denn es giebt dunkelbraune, graue, weiß- und ſchwarzgeſleckte und ganz weiße wilde Schweine; wie ſich vergleichen Abänderungen unter allen Thieren, die ſich ſtark vermehren, finden. Stirn, Rüſſel und Schultern werden im Alter grau. Merkwürdig ſind die zwey großen krummen, ſcharfen Eckzähne in jeder Kinnlade, wovon die un-

tern den Rüſſel ſtetschend aufſperren. Die Thiere bringen ſie mit auf die Welt; die untern wachsen vorzüglich mit zunehmendem Alter immer fort, ragen im vierten Jahre drey Finger breit über den Rüſſel hervor und werden im ſechſten gelblich, ſo daß nur die Spitze weiß bleibt. Da ſie zu Waffen beſtimmt ſind, ſo hant der Keuler gegen ſeine Feinde beſtändig nach der Seite über ſich, und einen liegenden Menſchen kann er damit nicht leicht Schaden zufügen; die Wache aber, die keine hauenden Zähne, ſondern nur kurze Haken hat, ſchlägt mehr unter ſich, reißt und beißt, und wird daher auch dem liegenden fürchtbar. Durch das Anſtreichen an die obern ſind ſie immer ſo ſcharf, wie gewetzt; nach dem ſiebenten Jahre aber kann der Keuler mit denſelben nicht mehr ſonderlich ſchaden, weil alldenn die Spitzen halb mondförmig, einwärts nach den Augen zu, gewachſen ſind. Von der Wache unterſcheidet ſich der Keuler durch die oben angegebenen längern weit herausſtehenden Zähne, wodurch ſich der Rüſſel ſtark in die Höhe wirft, und durch das mit einem Haarbüſchel umwachſene Zeugungsglied; jene hat aber zehn bis zwölf Zigen und überhaupt nicht den wilden und fürchterlichen Anblick. Die Länge eines ausgewachſenen wilden Schweins iſt vier und einen halben bis fünf Fuß und die Höhe drey Fuß; der Schwanz acht Zoll lang. Die Schwere beläuft ſich, nach Verſchiedenheit der Nahrungsmittel

mittel, (denn sie haben die Anlage, leicht sehr stark zu werden), von 2 bis auf 400, ja es sind ihrer schon von 600 Pfund (freilich eine Seltenheit) erlegt worden. Man schätzt ihre Lebensdauer auf 20 bis 25 Jahre. Die Stimme, so wie die Form, ihre Eigenschaften und ihr Betragen sind dem Hausschweine ziemlich gleich. Ihr Naturell ist überhaupt wild und grausam, und mit der Wuth eines gereizten wilden Ebers ist fast nichts zu vergleichen, zumal wenn er verwundet oder angeschossen ist. Das Gesicht ist ihr schwächster Sinn; sie können nicht weit in die Ferne sehen, und diese Kurzsichtigkeit wird noch durch die in die Augen hängenden Haare vermehrt. Desto stärker aber ist ihr Geruch und in Rücksicht des feinen Gehörs übertreffen sie fast alle andere wilden Thiere. Der Unreinlichkeit und Gefräßigkeit sind sie eben so sehr ergeben, als ihre Abkömmlinge, die zahmen Schweine. Ob das wilde Schwein von jeher in Europa einheimisch war, oder ob es von Indien aus, als seinem eigentlichen Stammorte, zahm dahin gebracht, und so wie von Europa aus in Amerika, in seinen wilden Zustand zurückgetreten ist, kann nicht mit Gewißheit entschieden werden. So viel ist sicher, daß sie in allen Welttheilen jetzt verbreitet, aber nirgends bis zum sechzigsten Grade nördlicher Breite gehen, ob man gleich in Norwegen und Bering so zahme antrifft. Alle Wälder sind ihr Aufenthalt, vor-

züglich aber die Buch- und Eichenwälder, und in denselben die recht verwachsenen Dickungen. Am liebsten befinden sie sich in brüchigen Thälern, damit sie sich im Moraste und Schlamme baden können. Sie wechseln aber ihren Aufenthalt nach ihren Nahrungsbedürfnissen, und zwar oft sehr weit. Da sie die Gesellschaft lieben, so sieht man oft ein Rudel Schweine von vierzig Stück beisammen, die sich gegen die Anfälle der Raubthiere gemeinschaftlich vertheidigen. Daß dieß vorzüglich der Grund ihrer Geselligkeit seyn muß, leuchtet dadurch ein, daß, sobald nur eins zu grunzen anfängt, sich die ganze Nachbarschaft zur Gegenwehr stellt. Eine solche Gesellschaft besteht aus etlichen Bachen mit ihren Frischlingen, wie man die Jungen nennt, aus zwey bis dritthalbjährigen männlichen und weiblichen Schweinen, welche Gesellschaft im eigentlichen Verstande eine Rudel Schwarzwildpret heißt, und nur selten trifft man auch einen alten Keuler dabey an. Wenn das männliche Schwein dritthalb Jahr alt ist, so geht es vom Rudel ab, und bekommt den Namen eines angehenden Schweins, sobald es aber drey Jahre zurückgelegt hat, heißt es ein dreijähriger, mit dem vierten ein vierjähriger und mit dem fünften ein fünfjähriger Keuler, oder ein hauernd Schwein; alsdann ist es ein Hauptschwein. Die männlichen Frischlinge nennt man auch Beckerlein und die weiblichen

ichen Bachlein; letzteres führt in einem Alter von drittehalb Jahren den Namen ansehender Bach und nach dreß und vier Jahren heißt sie eine starke oder gute Bach. Die alten Reuler leben alle wie Einsiedler allein, und verachten die jungen Schweine. Das Lager einer Gesellschaft ist ein weit aufgewähltes Loch mit Reifern, Laub und Moos ausgefüllt, und heißt, seiner Tiefe und Rundung halber, ein Kessel. Hierin liegen sie gewöhnlich den ganzen Tag. Im Vorsommer besteht ihre Nahrung, oder ihr Fraß, los in Würmern, Schnecken, Insekten, Gras, Arduern und Wurzeln, z. B. der Erdbnuß, der Spirden u. s. w. denen sie oft tief nachgraben müssen. Wo Kümmer auf Waldbiesen wächst, thun sie großen Schaden. Im Sommer ziehen sie sich in Feldern nach den Bohnen: Erbse: Linse: Wicken: Hafer: Kohl: Rüben: den reisenden Mais: und Roggenäckern, und suchen die abgefallenen Vogelkirschen auf. Im Herbst bekommen sie dann ihr angemessenes Futter, Eicheln, Bucheckern, Kastanien, Haselnüsse, Holgobst, Beeren, Weinbeeren, Pflaumen und Kartoffeln, deren Genuß sie mehrere Meilen weit, sogar durch Flüsse schwimmend, von ihrem Standorte lockt. Alsdann macht sie auch in manchen Jahren die sogenannten Erdmast oder die weißen Maden, die klumpenweise unter dem nassen Moose und faulen Blättern liegen, und sich in eine gewisse Art von

Raubfliegen (Asilus) verwandeln, und welche in nassen Jahren häufiger sich findet, als in trocknen, sehr fett. Im Winter fressen sie, was vom Herbst übrig geblieben ist, graben den Farrenkrautwurzeln nach, und suchen die Trisseln auf. Im Nothfalle gehen sie auch auf die Aasplätze, die man im Holze für die Füchse bereitet. Die Vegetationszeit fällt in das Ende des Novembers und den Anfang des Decembers und dauert fast fünf Wochen. Die alten Reuler gesellen sich alsdann zu den Bachchen, und jagen die jungen vom Rudel weg, wobei es hitzige und blutige Kämpfe giebt. Sie sind alsdann in einer Art von Wuth und geben einen süßlichen Geruch von sich, den die Hunde sehr weit wittern. Ihr unbiegsamer Körper macht, daß sie in ihren Kämpfen eine ganz eigene Stellung annehmen müssen. Sie streifen sich mit den Schultern und Rücken fest aneinander und wenden den kurzen Hals so, daß der Kopf des einen die Schultern des andern mit den Zähnen berührt, alsdann schlagen sie die Zähne in die Schultern ein, und reißen tiefe und lange Wunden. Die Verblutung stillt und die Heilung bewirkt das Harz der Nadelbäume, an denen sie sich reiben. An den Hauptschweinen, welches die grimmigsten sind, findet man dann, wenn sie geschossen sind, große und harte Narben, als Beweise ihrer ehemaligen Tapferkeit. Die jungen Schweine halten die ordentliche Brunstzeit zuweilen nicht ab,

ab, sondern gerathen entweder früher oder später in Hige, nachdem ihre Nahrung gut oder schlecht ist; auch die alte Sau wird, wiewohl selten, des Jahrs zweymal bigig. Sie trägt 18 bis 20 Wochen, und wirft im Februar und März vier, sechs, acht, ja auch wohl zwölf Junge. Sie verbirgt sich dazu in einem Dickige, und gräbt sich ein besonders mit Moos, Aesten und Laub weich gemachtes Lager unter einem dichten Baume oder Strauche. Dray Tage liegen die Frischlinge bey der Mutter, nach acht Tagen aber entfernen sie sich schon, nach zwey Monaten geht sie mit ihnen zum Rudel, säugt sie 6 Monate, und behält sie so lange um sich, bis sie wieder frischen will. Sie sind anfangs rothgesteckt, mit schwärzlichen, braungelben und weißen Streifen. Sechs Monate heißen sie Frischlinge, alsdann, bis sie drittheil Jahr alt sind, übergegangene Frischlinge. Die Mutter vertheidigt sie mit äußerster Wuth. So bald sie etwas gefährliches bemerkt, so schnaubt und grunzt sie, worauf sich die Frischlinge sogleich in den nächsten Winkel verbergen, und nicht eher wieder hervorkommen, als bis die Alte ruhig ist. Sie lassen sich leicht zähmen. Man fängt sie dazu 8 Tage alt ein, zieht sie mit Kuhmilch, Mehlbrei u. s. w. auf, und bringt sie dann unter die zahmen Ferkel. Sie werden zuweilen so zahm, daß sie in den Wald laufen und wieder heim kommen. Sie sind nicht den

Krankheiten ausgesetzt, denen ihre Abstammlinge, die zahmen, unterliegen, doch sterben oft viele an der Bräune, wie z. B. 1796 im Anhalt: Bernburgischen. Man findet auch keine Finnen in ihnen, und dies sey ein Beyspiel, sagt Herr Blumenbach, daß die Finnenwürmer, als organisirte Körper, offenbar lange nach der ersten Schöpfung, gleichsam nacherschaffen zu seyn scheinen. Im Winter sterben sie zuweilen vor Hunger, welches aber hieher nicht zu rechnen ist. In Gegenden, wo es Wölfe giebt, wagen sich diese wohl an Frischlinge und junge Schweine; allein Bachen und Keuler gehen sie schwerlich an, weil sich diese in Gesellschaft gegen sie zur Wehre setzen. Sonst werden sie innerlich von einem Blasenwurme im Reize, und von Haarwürmern (*Trichocephalos*) geplagt. Der besondern Merkwürdigkeiten sind wegen der Dummheit des Thiers nicht viel, und das meiste ist schon oben hergebracht worden.

1) Wenn die alten Keuler sich in den bigigen Brunsttkämpfen an den Blättern und Keulen verwundet, und an harzigen Fichten und Kiefern gerieben haben, so verwandeln sich diese Stellen durch die dadurch verbundene und gleichsam aneinander geleimte dichte Wollenunterlage in eine Art von Panzer, an welchem Spieße und Kugeln abprallen, und solche Schweine haben den eignen Namen: Panzer- oder Harnischschweine.

2) Bey ihrer Jagd befinden sich Jäger und

nd Hunde in Lebensgefahr. Bey Verwundung rennen sie asend nach dem Orte zu, wo er Schuß herkam, und hauen entweder im Vorbeplausen nach der Seite hin, oder stämmen sich, wo es möglich ist, mit dem Hintertheile des Leibes an einen Baum und fechten so mit der größten Wuth und Verweissung gegen eine Menge Menschen und Hunde. Gegen die Heshunde oder Sauvacker suchen sie ihren Hinterleib in einem Bache, Sumpfe, Dickige oder Dornstrauche zu sichern, und hauen alsdenn mit ihren Zähnen fürchterlich um sich. Sie schließen vielen Hunden den Leib so auf, daß die Eingeweide herausfallen. 3) Eine besondere Eigenschaft dieser Thiere ist, daß sie, wenn sie entweder mit dem kleinsten Zeuge eingelappt, oder sonst von den Hunden gestellt sind, nicht leicht auf einen Menschen losgehen, sondern so lange warten, bis der Jäger mit dem Spieße oder Hirschfänger vortritt und den gewöhnlichen Anruf: *H u y S a u l* hören läßt; auf welchen Laut sie aber wüthend auf ihn zu rennen, und so mit jenen Instrumenten abgefangen werden. Es ist diese eine gewöhnliche Fangart des Schwarzwildprets; auch macht sie, weil wirklich viel Fertigkeit und Stärke dazu gehört, ein besonderes Stück der Jägergeschicklichkeit aus. Wer die Fährte des zahmen Schweins kennt, dem wird die des wilden zu erkennen nicht schwer fallen, nur haben jene abgepumpte Schaaalen und

machen keinen Beytritt. Die Vorderfährte ist allezeit stärker, als die hintere, sie treten allezeit in die Vorderfährte, nur ein wenig mehr auswärts, weil sie hinten breiter als vorne sind. Die Aferklaue setzen sie allezeit ein. Hierdurch, und daß die ungeraden Schaaalen nicht so tief als die Ballen eingedrückt, und die Schritte länger sind, unterscheiden sie sich von den Hirschfährten. Die Jungen haben schärfere Schaaalen, schreiten mit geschlossenen Spizen, drücken aber ebenfalls die weit auseinander gedehnten Aferklauen in den Boden. Die eigentliche Jagdbauert von St. Galli bis heilige drey Könige, also von der Mitte des Octobers bis zu Anfang des Janners. Nach Martini (im November) sind sie am feinsten, aber auch am grimmigsten. Man erlegt sie gewöhnlich, wenn sie des Abends zu Felde ziehen, oder des Morgens zurückgehen, auf dem Anstande; auf der Saukirre und durch Such- oder Laufjagen mit einem Saufinder, vor welchem man die gestellte Sau mit der Büchse wegspürset. Wenn man die Bestätigungsjagen auf sie anstellen will, so dürfen sie nicht zu enge bestätigt werden, sonst gehen sie wegen ihres scharfen Geruchs durch. Auch bey dem eigentlichen Streifjagen werden sie durch Saufinder aufgesucht, vor welchen sie sich stellen, dann durch die losgelassenen Heshunde gepackt und vom Jäger mit dem Hirschfänger abgefangen. Das letztere geschieht

schießt auch mit dem Hirschfänger und den Schweinspießen, wenn sie im kleinen Zuch angelappt sind. Zu den größern Hatzjagden scheucht man sie in aufgestellte Fallgarne, kneipt ihnen mit einer Zange den Rüssel zu, und schafft sie in Sautasten in den bestimmten und gewöhnlich mit einer Mauer eingeschlossenen Hatzgarten. Ob gleich ihr Nutzen nicht so groß ist, als von zahmen Schweinen; so ist er doch beträchtlich genug. Das Wildpret ist gekocht, gebraten, geräuchert nicht übel und auch in seinen Säften gesünder als das zahme Schweinsfleisch. Man macht gute Sälzen und Ribbenbraten aus denselben und Würste aus ihrem Schweisse. Der wilde Schweinskopf gehört, wie bekannt, durch seine Zubereitung zu den Delikatessen. Zur Mäuschzeit aber verdirbt das Wildpret der Keuler in etlichen Stunden, und nimmt einen starken widrigen Geruch an, wenn man ihnen nicht sogleich das Kurzwildpret abhackt. Aus der sehr dicken Haut macht man roh Ransen, Kummte, Decken vor die Thüren und in Chaisen; gegert aber Riemenwerk, Schuhsohlen; Bücherdecken, Siebe u. s. f. auch Pergament. Die Zähne poliren und glätten. Die Porsten dienen zu eben dem Behuf, wie die der zahmen Schweine, und die darunter befindliche Wolle läßt sich zu Seilen und Stricken verarbeiten und auch zum Polstern und Unterfüttern benutzen. Unsere zahme Zucht läßt sich auch durch die wilden

Schweine verebeln. Der Schaden, den die wilden Schweine durch ihr Wühlen und durch Auffuchung ihrer Nahrungsmittel am jungen Holze, auf Wiesen und in Feldern thun, ist sehr groß. Sie verwandeln oft Waldwiesen in etlichen Nächten in umgepflügte Aecker. Sie sind also bloß in Thiergärten oder in die größten Waldungen zu verweisen. Aus vielen Gegenden wie z. B. aus dem Gotha'schen Antheile des Thüringer Waldes sind sie deshalb schon längst verbannt. Die Jägersprache ist die gewöhnliche, als Geräusch, Gescheide, Blätter, Keulen, Läufe, Schaalen, Gefäße, Fährte, Schweiß, Wildpret u. s. w. bleiben. Aldann sind noch folgende zu bemerken. Der Rüssel heißt — Gebrech oder Wurf. Die obern Eckzähne — Gewerft, Gewehr, die untern Hauer, Haberer, oder jenes Obergewehr und dieses Untergewehr; doch hat die Wache nur kurze Haken. Die Waffen sind nicht lang, sondern stark, nicht spizig, sondern scharf, und werden an einander geschärft. Die Ohren von einigen — Gehör. Der Schwanz — Pürzel oder Krüdel. Die Haare — Borsten oder Federn. Das Fell heißt Haut. Die Dünnungen — Wammen, auch das inwendige Weiße heißt so. Das Fett — Weißes auch Feist. Wenn gegen den Winter dem Schwarzwildpret unter den Federn Wolle wächst, so nimmt es die Winterfedern an, diese

iese verliert es gewöhnlich im Junius wieder. Die gesteckten und gestreiften Jungen haben einen bunten Rock. Eine Gesellschaft — Rudel, Schaar, Kotte, Häufel. Wenn die Blieber der Gesellschaft stärker als Frischlinge sind, ein Rudel starke oder grobe Sauen. Einzelne haben ein Lager, und so mehrere zusammen sitzen — einen Kessel. Die sumpfige Gegend, wo sie sind — ein Laug. Die Begattungszeit — Brunst, Rollen, Rauschen, Brunst. Die Bache hält den Schirm sagen einige, wenn die Bache den Keuler zur Brunst steht. Dieser tritt nicht auf die Brunst, sondern tritt zu den Bachen. Junge bringen — Seken oder Frischen. Die Nahrung — Fraß, Geses, Schmitt. Wenn sie Kraut abgestressen haben, so haben sie es abgeschnitten. Die Winterfütterung von Erbsen u. heißt die Kurrung oder Geschütte. Es nimmt sie, nicht frist sie. Sie schlagen die Hunde und schlagen sich durchs Zeug. Sie stellen sich vor die Hunde; schlagen sie ab, oder gehen durch vor denselben; sie werden von denselben eingeholt und gepackt und streiten sich mit den Hunden. Es wird ihnen ein Fang gegeben. Sie springen, gehen oder laufen an, wenn sie auf das Anschreyen wild werden und auf den Jäger losgehen. Wenn sich eine angeschossene Sau niederthut und mit den Zähnen knirscht, so klappert sie, und

wenn sie nun den Boden aufwühlt, so kesselt sie. Hat ein Jäger Schwarzwild bey der Körnung gesehen, so sagt er, er habe es dabey abgenommen. Die Frischlinge legen sich nicht mit der Bache in den Kessel, sondern fallen mit ihr darin zusammen. Wühlen — brechen; aufs Ausgehen — Lubern; und ihnen auf ihrem Wechsel Fraß vorschütten — ankörnen.

Schweberohr nennet man bey dem Vogelheerde den schwarzgewickelten Bindfaden, woran die Ruhrvögel befestiget sind.

Schweinhagzeit ist diejenige Jahreszeit im Herbst um Martini, wo die Schweine recht feist und gut sind, und allenthalben in Europa gejagt, gebirschet, und mit Hakhunden verfolgt werden.

Schweinejagd ist die Art und Weise, die wilden Schweine zu erlegen, es sind folgende Arten davon im Gebrauch: 1) Die Parforcejagd, Laufjagd, welche wie die auf Hirsche bewirkt wird. S. Parforcejagd. 2) Das Kegeljagen, s. dieses Wort. 3) Das Streifjagen, s. d. Wort. 4) Die Schweinschase geschieht auf folgende Art: Man treibet die Schweine in einem, mit Netzen und Lühern umstellten Orte zusammen, wo im Laufe für die, welche schießen oder zusehen wollen, ein Schirm stehet. Die andern aber gehen auf die Schweine los, und

und fangen sie mit Fangeisen, s. d. Wort. Wenn man dabey ein Schwein im Lager bestätiget, muß man den besten Laufplatz beurtheilen, auch zusehen, wo es mit dem Kopfe zuliegt. Wo ein Bruch oder Morast in der Nähe ist, muß man die Lächerlappen vorstellen, nun stellet man Saurüben und leichte Laufhunde in die Nähe, die schweren gepanzerten Hunde aber in einiger Entfernung. Alle Jäger müssen zu Pferde seyn, und gute Hirschfänger bey sich haben. Nun wird der Sausfinder hineingelassen, wenn dieser nun das Schwein verbellt, fährt es entweder heraus, oder bleibt liegen; im letzten Falle muß man einen mäßigen Saurieden anhehen. Sobald es ausreißet, heget man es mit leichten Hunden, die es bald einholen und herumwerfen, und dadurch nach und nach ermüden, und aufhalten, wobey bisweilen einer zu Schanden geschlagen wird. So geht es fort, bis die gepanzerten Hunde kommen, das Schwein an beyden Ohren festhalten, bis der Herr der Jagd kommt, vom Pferde absteiget und ihm den Gang mit dem Hirschfänger hinter dem dicken Vorderblatte giebt, während es die Hunde bey den Ohren und die Jäger bey den Hinterläufen halten. 5) Durch Schießen, dieses geschiehet a) auf dem Anstande des Abends, wenn sie zu Felde, oder des Morgens, wenn sie wieder zu Holze ziehen; b) auf der Körnung, da man Kartoffeln oder Erbsen an einen bequemen Ort schüttet, und wenn die Sauen solche angenommen, in der Nähe (am besten auf einem

Baume, welches auch auf dem Anstande am sichersten ist, um, wenn man eine angeschossen, der Gefahr zu entgehen) sich versteckt, und auf sie lauert; c) mit dem Sausfinder, da man sich, wenn er das Schwein stellet, anschleicht und schießt. Die beste Zeit zu allen Sausjagden ist im Herbst bis zur Brunst, da sie am feihesten sind. Uebrigens gehören die wilden Schweine zur Mitteljagd.

Schweiß heißt das Blut der wilden Thiere, daher

Schweissen, wenn ein solches blutet.

Schweißhund ist ein, dem Jäger sehr nöthiger und nützlicher Hund, den er braucht, wenn ein Wild angeschossen ist, da er ihn, an der Leine, wie den Leithund führend, auf die Fährte führt, wo er Schweiß findet, der er so lange nachgehet, bis er dahin kommt, wo das kranke Wild sich niedergehan hat, daß der Jäger sich hinan schleichen, und es vollends todt schießen kann.

Schwerdstangen sind bey einem Vogelheerde Stangen, die so stark als ein Arm, und $3\frac{1}{2}$ Elle über der Erde stehend, oben oben breit und ganz dünne geschnitten sind. An diese müssen die Oberleinen mit den Stäben anschlagen.

Schwere Jaghunde heißen die englischen Doggen, Danziger und Brabanter Varen, und Bullenbeißer, welche wegen der Größe

kröße und Schwere ihres Körpers zum Laufen nicht tüchtig, so besser aber zum Fangen und Bürgen sind.

Schwingen heißen die Flügel des Federwildprets, und die äußersten ihrer größten Federn

Schwing- oder Schwungfedern.

Schwingen sagt man vom Falken, wenn er in die Luft steigt, und sich lange in der Höhe hält.

Sechsständer heißen beim Vogelfange die alten Finken, die man zu Lockvögeln brauchet, und welche sechs weiße Federn im Schwanz haben.

Seetaucher — Colymbus — sind eine eigene Vogelgattung unter den Schwimmvögeln, mit einem starken, fast walzenförmigen und weniger spitzigen Schnabel, dessen Rand der Kinnladen eingehogen und die obere etwas länger als die untere ist; mit Nasenlöchern, die am Schnabelrunde sehr schmal und oben durch in Zwischenhäutchen getheilt sind; mit einer langen, spitzigen, und am Grunde auf beyden Seiten gegigten Zunge; an den Füßen sind vier Zehen, wovon die äußerste die längste und die hintere mit er innern durch eine kleine Haut verbunden ist; mit einem kurzen und zwanzigfederigen Schwanz. Sie halten sich in nördlichen Meeren und Seen auf, gehen aber auch im Herbst und Winter

auf die deutschen Seen, Teiche und Flüsse. Der Stand ihrer Füße macht, daß sie geschwinde schwimmen und tauchen, als gehen können.

Seitenschwanz, europäischer Seitenschwanz, gemeiner Seidenschwanz, Seidenschwänzchen, Seidenschweif, Seidenschweifl, Böhmer, Böhmerl, Pfeffervögelchen, Pest-Kreuz- und Schneevogel, böhmische Haubendrossel, Züsserl, Zingirelle, Ziccerelle, Winterdrossel, Wipsterz, Schwäger, Goldhähn und Schneeschke, Böhmlin, Pfeffervogel, Sterbevogel, Haubendrossel — *Ampelis garrulus* — ist eine besondere Art in der Gattung Seidenschwanz, mit einem geraden, kurzen erhabenen Schnabel, woran die obere Kinnlade länger und etwas gekrümmt ist; die Nasenlöcher sind mit Vorsten bedeckt; die Zunge ist spitzig, gespalten und knorpelig; und an den Füßen ist die mittlere Zehe an der Wurzel mit der äußern vereinigt. Die Kennzeichen unserer Art sind: Auf dem Scheitel steht ein kleiner zurückgelegter Federbusch, und die hintern Schwungfedern haben pergamentartige scharlachrothe Spitzen. Die Größe hat er fast mit der Rothdrossel gemein; die Länge ist acht Zoll; die Breite vierzehn und einen halben Zoll; der Schnabel ist fünf Linien lang und der Schwanz zwey und drey Viertel

tel Zoll. Die Flügelspitzen reichen bis über die Hälfte desselben. Das Gewicht ist zwey Unzen. Der Schnabel ist kurz, gerade, oben gewölbt, an der Wurzel breit, so daß der Mund sich weit aufsperrt, und schwarz; der Augenkern rothbraun; die Füße sind schwarz und die Schienbeine ein Zoll hoch. Der ganze Vogel hat ein zartes seltenartiges Gefieder; die Federn auf dem Scheitel bilden einen Federbusch; der Kopf und alle obern Theile sind röthlich aschgrau, am Steiße ins Graue übergehend; von den Nasenlöchern geht über jedes Auge weg ein schwarzer Streifen nach dem Hinterkopfe; das Kinn ist schwarz; die Stirn kastanienbraun, so wie der After; Brust und Bauch sind hellpurpurkastanienbraun; die kleinern Deckfedern der Flügel braun, die größern, am weitesten vom Körper entfernten, schwarz, mit weißen Spitzen, und dies bildet einen Streifen; die Schwungfedern sind schwarz, die dritte und vierte hat an den äußern Rändern weiße, an den fünf folgenden gelbe Spitzen, die kürzern sind aschfarben, am äußern Rande mit weißen Spitzen; außerdem laufen bey verschiedenen dieser Federn die Enden der Schäfte in einen glatten, hornartigen, eprunden Fortsatz, von zinnoberrother Farbe aus, das Weibchen hat höchstens fünf derselben, das Männchen aber von fünf bis neun auf jeder Seite; der Schwanz ist schwarz mit Schwefelgelben Spitzen; und bey sehr alten Männchen findet man auch

oben einige schmale, hornartige, zinnoberrothe Fortsätze. Das Weibchen hat eine kleinere schwarze Kehle, und eine schmälere und hellgelbe Schwanzspitze, nur gelblichweiße Flügelspitzen, und höchstens fünf kleine, schmale, zinnoberrothe Fortsätze an den Schwungfedern, zuweilen auch gar keine. Es ist ein trager, dummer Vogel, der den Jäger ganz nahe kommen läßt. Seine Lockstimme ist ein wiederholtes, und zischendes Rhiß, rhiß, rhiß! und im Affecte schnarpt er laut mit dem Schnabel. Sein Gesang gleicht dem der Rothdrossel, ist aber noch leiser, und er bewegt die Haube beständig dazu, schlägt sie auf und nieder. Er ist leicht in der Stube zu erhalten und ist ein außerordentlich starker Fresser. Im Fluge gleicht er dem Staar. Sein Sommeraufenthalt ist der arktische Kreis in Europa und Amerika. Von da geht er im November mit den Wachholderdrosseln in die südlichen Gegenden und überwindet auch in Deutschland, ist aber bald da, bald dort, so daß man ihn nicht alle Jahre in einer und derselben Gegend antrifft. Sie sind alldank gern in Feldhölzern, und in den mit Laubholz bestandenen Vorbergen der Kettengebirge, und in Gärten, wo es Beere giebt. Wenn es in Thüringen nicht zu kalt und nicht zu gelinde ist, so sind sie jährlich in Menge da. In der ersten Hälfte des Aprils gehen sie wieder in den Norden zurück. Sie sind sehr gesellschaftlich und leben daher in großen Flü-

Flügen bespammen. In Böhmen muß er am öftersten überwintern, welches mehrere Namen von ihm anzeigen. Seine Sommernahrung müssen Insekten, vorzüglich Schmetterlinge, Bremsen und Bremsen seyn, wie ich im Frühjahr an ihm bemerkt habe, denn er setzt sich auf den Gipfel eines Baums und fliegt dann, wie ein Fliegenfänger, in die Höhe, und schnappt diese Insekten weg. Im Winter frisst er Beeren von aller Art, Vogelbeeren, Wacholderbeeren, Mistel- Kreuzdorn- Eßlingbaumbeeren u. Im Nothfalle auch Knospen von Buchen, Ahorn und Obstbäumen. In der Stube frisst er am liebsten Semmel und Gerstenschrot mit Milch vermischt. Er ist ein erstaunender anflätziger Fresser, der die geschnittenen Wacholderzweige mehrmals verschluckt. Wärme kann er nicht vertragen, welches sein kaltes Vaterland zu erkennen giebt. Nach der Begattung soll dieser Vogel sein Nest in Felsenhöhlen bauen. Die zu uns kommenden jungen Weibchen haben noch keine pergamentartige Anheftung an den Flügeln; und überhaupt sind die Jungen in allen Farben heller. Bey uns werden auch viele von dem Sperber und andern Winterraubvögeln gestreift. Bey ihren Zügen kann man im Winter von einem Vogelbeerbäume, oder einem mit Vogelbeeren behangenen Baume, oft 20 und mehrere mit Leichtigkeit auf einen Schuß erlegen, weil sie gar keine Gefahr scheuen. In der Schneuschneise fängt er sich

häufig, und auf den Vogelheerd fällt er häufiger ein, als jeder andere Vogel. Das Fleisch ist zart, gesund, und schmeckt gewürzhaltig, daher auch der Name Pfeffervogel. Die Feder schmücker wußten sonst aus den schönen Federn Pus zu machen; übrigens frisst dieser Vogel auch schädliche Insekten.

Selbstschuß ist ein, aus einem oder mehreren kurzen Läufen, die in ein längliches Holz geschäftet, und deren Zündlöcher zusammengefüget, und mit einem kleinen Feuerschloße versehen sind, bestehendes Gewehr, das man dahin leget, wo ein Raubthier seinen Wechsel hat, und es so vorrichtet, daß sich dieses Thier bey Berührung desselben selbst tödtet. Man ladet nemlich dieses Gewehr, legt es an den bestimmten Ort, wohin man das Raubthier gekörnet hat, befestiget eine, 5 bis 6 Ellen lange, Schnur mit einem Ende an den Brocken, oder die Lockspeise, und mit dem andern an den Abzug des Gewehres, legt solches gerade mit der Mündung nach dem Brocken, und zwar so, daß diese gerade so hoch liegt, als die mittlere Höhe des Raubthieres beträgt. Wenn man nun mit allem fertig ist, so schüttet man Pulver auf die Pfanne, legt den Faden um einen hinter dem Gewehre eingeschlagenen Stift, zieht den Hahn auf, und bedeckt alles mit einer starken Holzrinde vor der Nase. Wenn nun das Thier in der Nacht dahin kommt, und den Faden berührt, und anziet,

het, so ziehet dieser vermöge des Stiftes, um den er gelegt ist, den Abzugsfaden ab, der Schuß gehet loß, und trifft das Thier. Am Tage muß man den Hahn niederlassen, um nicht Menschen oder zahme Thiere zu tödten.

Sehen heißt bey Haasen und Rehen so viel, als Junge zur Welt bringen.

Sezeit heißt diejenige Zeit, in welcher die Haasen, Rehe und anderes Wildpret ihre Jungen zur Welt bringen, und säugen. Weil man nach den Gesetzen gewöhnlich den Monat Junius dafür annimmt, so darf in diesem Monate niemand, wenn er nicht durch besondere Verträge dazu berechtiget ist, in den Hölzern, welche landesherrliches Revier sind, irgend eine Arbeit vornehmen, grasen, Vieh hinein treiben, um das Wild in seiner Fortpflanzung nicht zu stören.

Sie, Sie, nennet man das Weibchen bey den Vögeln.

Sieb ist ein bekanntes wirtschaftliches Werkzeug, das man aber auch zum Vogelfange braucht. Man stellet es nemlich in die Höhe, so, daß der Rand auf einem Pflocke ruhet, an welchen man einen Bindfaden gebunden; unter das so schräg lehrende Sieb streuet man allerley Körner, da denn die Sperlinge,ammerlinge u. kommen, um sie zu fressen; sind ihrer nun einige unter dem Siebe, so ziehet man mittelst des Bindfadens den

Pflock um, das Sieb fällt nieder, und die darunter befindlichen Vögel sind gefangen.

Sille heißt ein dreyeckig zusammen geschlungenes starkes Band, oder ein schwacher Riemen, mit einer Nestel, worinnen ein kleiner brätherner Ring mit eingeschlungen. Wie man sich dieses Werkzeuges zum Vogelfange bedient, s. Ansellern.

Singvögel — Oscines — machen die fünfte Ordnung der Vögel aus, und unterscheiden sich durch folgende Kennzeichen: Schnabel: kegelförmig, bey einigen dem walzenförmigen sich nähernd, meist schwach, zugespitzt, und mit unbeweglicher oberer Kinnlade. Füße: (zum Hüpfen) bis über die Ferse erstreckt, schwach mit freyen Zehen. Diejenigen, die Saamen fressen, verschlucken ihn entweder ganz, oder schlagen die Spelzen an harten Körpern ab. Sie singen fast alle schön.

Sitzen sagt man vom Rothwild, wenn es sich auf seinem Bette niedergethan hat, vom Haasen, wenn er in seinem Lager ist, und von Hühnern und Fasanen, wenn sie zu Bette gehen.

Sommerstand heißt der Aufenthalt und die Nahrung des Wildprets im Sommer, wo es Dickigte sucht, um vor der Sonnenhitze, vor Fliegen und Mücken sich zu verbergen.

Sor heißt bey der Falknerey in Vogel, der noch kein Jahr alt ist, und noch seine ersten Federn at, deren Farbe roth ist. Doch versteht man darunter bloß die Pasagiers. s. Pasagier.

Spannpflock ist ein starker Pflock, woran die Leinen am Ende eines aufgestellten Netzes gehunden werden. Er muß stark seyn, weil das Garn darauf mit Gewalt in seinem Stande erhalten wird.

Spatelente — *Anas Clauion* — gehört in der Entengattung mit der Kriekente unter eine Familie und heißt auch Breitschnabel, Löffelente, Leppelschnute, eisengraue, grauköpfige, breitschnabelige und blaueugige Ente, blaueugige Schall- und Schellente. Ihr Schnabel ist in der Spitze breit und rund, und ein wenig übergebogen; der Spiegel weiß; am Männchen der Kopf rostbraun; oben am Halse ein weißes und unter demselben ein graues Halsband; das Weibchen aber am Kopfe gelbbraun, etwas schwarzgesteckt, sonst erdengrau. Die Länge beträgt unsehn Zoll. Sie wohnt im Norden von Europa, Asien und auch an deutschen Küsten, Seen und Flüssen, im Winter aber treicht sie ihrer Nahrung wegen, welche in Schalthieren und Wasserkrautern besteht, umher.

Spechtartige Vögel — *Pici* — bilden in der Classe der Vögel eine eigene Ordnung

und unterscheiden sich von den übrigen Ordnungen durch den meist geraden, selten etwas gekrümmten, nicht bläuen und mittelmäsig langen Schnabel und durch ihre Füße, welche meist Kletter- doch aber auch Gang- und Schreitfüße, bis über die Knie, oder vielmehr Fersen herab, besiedert sind. Es gehören darunter sieben Gattungen, als: die Specht- und Wendehals, Gattung mit Kletterfüßen; die Kleiber- Wiedehopf- und Baumläufer- Gattung mit Gangfüßen; und die Wiefenfreßer- nebst der Eißvogelgattung mit Schreitfüßen. Die unter die Gattung Specht gehörigen Arten, nämlich: Schwarz-, grün-, grauköpfiger-, bunt-, weiß-, Elster-, Gras- und dreyzehriger Specht, siehe unter diesen Worten.

1) **Sperling**, **Hausperling** oder **Hausfink** — *Frinilla domestica* — gehört mit dem gemeinen Finken in eine Gattung und Familie als besondere Art, und heißt auch noch Feld-, Gersten-, Kern- und Speicherdieb, Spag, Hauspag, Hof-, Rauch-, Dorf- und Kornsperrling, Luning, Lep, Kornwerfer, Spar, Hauspat und Spert. Die Kennzeichen der Art bestehen in folgenden: Er ist braungrau und schwarzbunt; der Scheitel grau; Schwung- und Schwanzfedern dunkelbraun; über die Flügel eine einfache weiße Binde. Er

Er ist ein allenthalben in Deutschland gemeiner und hinlänglich bekannter Vogel. Er ist fünf und drey Viertel Zoll lang, wovon der Schwanz zwey Zoll und der Schnabel einen Zoll mißt. Die Breite ist acht und drey Viertel Zoll, und die Flügel legen sich auf der Mitte des Schwanzes zusammen. Der dicke Schnabel ist im Sommer schwarz, im Winter hellbraun; der Augenfleck kastanienbraun; die Füße acht Linien hoch und grau-braun. Scheitel und Wangen sind aschgrau; hinter den Augen ist ein breiter rothbrauner Streifen; um die Augen schwarz; der Hinterhals grau; der Rücken rothbraun und schwarz gefleckt; die Kehle bis zur Brust schwarz, letztere weißgewölkt; der Unterleib graulich weiß; die kleinern Deckfedern der Flügel rothbraun, die vorlegte Reihe der großen mit weißen Ränntchen, diese mit rothbrauner Einfassung; die Schwungfedern dunkelbraun, so wie die Schwanzfedern. Das Weibchen ist am Oberleibe rothgrau, auf dem Rücken schwarz gefleckt; der Unterleib schmutzig weißgrau. Die Jungen männlichen und weiblichen Geschlechts sehen bis zum ersten Mausern, wie die Weibchen aus. Varietäten: 1) Der weiße Hausperling. Entweder rein weiß, oder gelblichweiß, oder grauweiß. 2) Der gelbe Hausperling. Gelb, am Oberleibe ins Rothbraune sich ziehend, auch loh- oder semmelgelb. 3) Der schwarze Hausperling. Entweder kohlschwarz oder braunschwarz. 4) Der blaue

Hausperling. Schwarzblau oder dunkelashgrau. 5) Der aschgraue Hausperling. Hellashgrau mit dunkelbraunen Flecken von der Zeichnung des gemeinen Vogels. 6) Der bunte Hausperling. Gewöhnlich gefärbt mit weißen Theilen, oder Flecken. Wie fast alle Vögel, die in der Nähe der Menschen wohnen und es aus Erfahrung wissen, wie gern er auch den unschuldigen nachstellt, so ist der Hausperling ungemein scheu, und flieht vor ihm, wenn er nur von weitem sieht, daß seine Augen auf ihn gerichtet sind; ja er ist durch die so häufigen Verfolgungen so schlaue geworden, daß man Mühe hat, ihn zu hinterlisten. Er fliegt schnell, trägt sich aber sitzend und hüpfend schlecht. Seine einzeln abgebrochenen Töne, die er im Frühjahr hören läßt, kann man keinen eigentlichen Gesang nennen. Sein Lockton ist Dief. Er bewohnt ganz Europa, so weit es mit Getraide angebaut ist, Asien von Persien bis Sibirien, und so wie der Anbau des Getraides weiter rückt, in Afrika, Aegypten und die Gegenden des Flusses Senegal. Sie halten sich in Dörfern und Städten auf, die in bebauten Feldern liegen. In der Erndte schlagen sie sich in große Flüge zusammen und gehen nahe an den Städten und Dörfern in die Hecken, welche an den Getraidefeldern liegen. Nur die Fortpflanzungszeit über leben sie einzeln, sonst immer familienweise und in kleinen und großen Gesellschaften. Im Winter halten sie sich auf den Miststätten und vor

vor den Scheunen auf. Durch ihre Nahrung werden sie wohlthätig und schädlich. Im Frühjahr und Sommer legen sie alle Raupen von den Obstbäumen ab, tödten eine Menge Maykäfer, Heuschrecken und schädliche Obstschmetterlinge. Wenn die Insekten nicht mehr häufig sind, gehen sie nach reisender und eifer Gerste, Weizen, Hirsen und Hafer, nach den Kirschen, Wein- und Johannisbeeren, auch nach den Zuckereichen. Im Winter müssen sie mit verlohren gelenden Getreidekörnern und andern Gesämen vorlieb nehmen. Alte Sperlinge nisten des Jahres zweimal, und machen schon im März ihr Nest zurecht. Dieß ist ein Klumpen Stroh, Gras, Halmen, Werg, Wolle, Papier, der inwendig ausgehöhlt und mit Federn dicht ausgefüllt ist. Es steht in Löchern, unter den Dächern, zwischen den Dachparren, unter den Ziegeln, in Mauerlöchern, in Schwalbennestern, hohlen Blumen, auf den großen Nesten der Obstbäume und Linden. Sie legen auf einmal fünf bis sieben Eier, die grünlichweiß, mit vielen dunkelashgrauen und braunen Punkten besetzt sind. Doch variiren sie auch, indem sie eine reine weiße Grundfarbe haben und mit viel weniger braunen Punkten besetzt sind. Sie werden vierzehn Tage bebrütet, und die Jungen mit Raupen, Heuschrecken, Maykäfern und Schmetterlingen aufgefüttert. Sie sehen vor dem ersten Mausern der Mutter gleich. Daß die Begat-

tung bey diesen, so wie bey dem Feldsperling und einigen andern Vögeln, so oft hinter einander wiederholt wird, ist bekannt. Das große und kleine Wiesel verfolgt die Brut, und der Sperber und Baumfalk die Alten. Im Herbst schießt man sie mit Dunst in Menge in den Feldern auf der Hecke oder auf einem Baume. Weiß man den bestimmten Baum, wo sie aus der Frucht allezeit aufstiegen, so darf man diesen nur mit vielen Leimruhen bestücken, so fängt man sie auch in Menge. Im Winter sucht man sie in Gärten mit Spreu und Hafer auf einem langen Flecke zum Schusse oder unter eine Schlagwand zu locken. In Scheunen und auf Böden fängt man sie in Netzen, welche man vor die Oeffnungen macht. In einigen Thüringischen Gegenden werden sie des Abends in Kirschbäumen mit einem Garn, das den Fischhaaren gleicht und an einen Stock befestigt ist, gefangen. Fast in jeder Gegend hat man eigene Methoden sich dieses schlaun Vogels zu bemächtigen. Ob gleich das Fleisch in mehreren Gegenden verachtet wird, so schmeckt es doch eben so gut als Finkenfleisch. Die Jungen sind besser als die Alten, und um diese zu erhalten, ist es in mehreren Gegenden gewöhnlich kleine Töpfe mit einem engen Loche an die Häuser zu befestigen, damit sie da hinein nisten, und ausgenommen werden können. Sie vertilgen eine große Menge schädliche Garten-

Q

insek.

insekten. Wie die Nahrung anzeigt, so thun sie in Feldern und Gärten Schaden. Durch Schießen sind sie vielmehr zu verschrecken, als durch Scheussale, die sie bald, als ihnen unschädlich, kennen lernen. Ich halte ihn nach vieljährigen Beobachtungen doch für einen mehr nützlichen als schädlichen Vogel.

2) Sperlingsartige Vögel — *Passeres* — machen unter den Vögeln eine aus der Gattung Kernbeißer, der Gattung Fink, wo unsere Sperlinge hin gehören, und der Gattung Ammer bestehende Ordnung aus, welche sich durch folgende Kennzeichen von den übrigen Ordnungen unterscheidet: Der Schnabel ist kegelförmig zugespitzt, meist stark, beyde Kinnladen beweglich, um die Saamenkörner zu schälen, wodurch sie sich vor allen Vögeln auszeichnen. Ihre zum Hüpfen gebauten Füße sind bis über die Ferse befiedert, dünn und mit freyen Zehen versehen. Fast alle Vögel dieser Gattungen sind kleiner als die meisten der Gattungen der übrigen Ordnungen.

Sperlingsfang ist die Art und Weise, die Sperlinge zu vertilgen: Es geschieht auf folgende Arten: 1) mit Leimspindeln, wovon man einige hundert nach Michael, wenn die jungen Sperlinge auf den Strich gehen, und oft zu Tausenden auf die, nahe an bewohnten Orten liegenden Felder fallen, auf

die, nahe dabey gelegenen, Wische und Stauden steckt, um die Sperlinge vom Felde auf dieselben zu, auftreibet, da sie denn in großer Anzahl darauf fallen und kleben bleiben; 2) mit dem Korbe. Man macht nemlich einen durchsichtigen Korb von feinem Reißig oder Binsen, oben mit einer ziemlich engen Öffnung, setzt darauf einen kleinen trichterförmigen Korb, in den untern legt man ein Nest voll junger Spetlinge, und stellt ihn so auf den Hof, da die Sperlinge haufenweise kommen, durch die Öffnung hinein kriechen, aber nicht wieder heraus können. 3) Auf dem Schnee mit der Horde. Man macht nemlich eine rund erhabene Horde, in Gestalt eines Kofferbells Fig. 12 fünf Ellen lang und drey Ellen breit, deren Länge und Querbäume 6 Zoll breit, und 4 Zoll stark sind, in diese bohret und verkeilet man zehn starke fichtene, saalweidene oder háselne Bügel, von gleicher Höhe, außer den beyden äußersten, welche etwas niedriger seyn können. Diese Bügel zäunet man mit schwanken weidenen oder háselnen Ruthen aus, welches auch an beyden Seiten auf das genaueste geschieht; nur bey A läßt man eine Öffnung, um die gefangenen Vögel heraus zu lassen. Diese Horde stellet man nicht weit von der Scheune, am besten im Garten auf. Hinten schlägt man ein paar starke Pfähle daran, damit sie im Aufheben nicht wankt. Die Öffnung A verstopfet man mit einem

nem Strohwiſche, hebt ſobann die Horde empor, ſtemmt einen $\frac{1}{4}$ Elle langen, etwas ſtarken Strecken bey B unter den Vorverbaum, und ſetzt deſſen unterſten Theil auf ein Bret C, weil onſt die Horde von der Laſt in ie Erde gedrückt würde. An aß unterſte Ende dieſes Stellolzes bindet man eine lange hwanke Stange D, und an ieſe noch eine oder mehrere, enn für eine Leine fürchten ſich ie Vögel gemeinlich. Unter r Horde räumt man den chnee weg, körnet die Spernge durch unter geſtreuetes Futr und einen Büſchel Haferren. Haben ſich nun die Spernge darunter gewöhnet, ſo ruht man mit der Stange den itecken weg, daß die Horde einziehet, und die darunter beidlichen Sperlinge gefangen id. Nun ziehet man ein Netz r die Oeffnung A, ſtößt den trohwiſch weg, und pocht auf r andern Seite an die Horde,

denn die Sperlinge aus der orde, durch die Oeffnung in s Netz fliegen, und ſich fanen. 4) Mit dem Siebe, ſ. ieb. 5) Mit einem Netze, s man vor ihre Nester dicht leget, und ſobann hinter demben durch Pochen Lärm macht, denn die Sperlinge heraus d ins Netz fahren, 6) mit n Schlagbauer, in weln man einen Sperling als Vvogel ſetzt, 7) in Fallen r vier auf die ſchmale Seite ; Viereck geſetzten und genau aſten Ziegeln, über welche n noch einen andern viereckig-

ten Ziegel ſtellt, welchen zwey oder drey innerhalb der Falle angebrachte Stäbchen halten. In dieſe ſtreuet man Getraidkörner, wenn nun die Sperlinge nach deſſelben in die Falle gehen, und eines dieſer Stäbchen berühren, ſo fällt es um, und der aufgeſtellte Ziegel fällt nach, 8) durch Schießen mit Bogeldunſt. Um ſie da recht in Menge auf einmal zu ſchießen, muß man ohnweit eines Fenſters eine 10 bis 12 Ellen lange Reihe Spreu, und auf dieſe Getraidkörner ſtreuen, da man denn, wenn ſie in Menge darauf ſallen, aus dem Fenſter auf den vorderſten hält, und gewiß beym Loſſchießen die meiſten der in der Reihe liegenden Vögel tödtet, oder verwundet.

Spiegel kommt beym Lerchenfange vor; und man verſteht darunter auch den weißlichen Fleck hinten am Hirsche und die Abzeichen bey Enten u.

Spiegelgarn, Spiegelnetz, ſpiegeliche Netze, ſ. Prellnetz.

Spiegelleine iſt die beym Lerchenfange mit dem Spiegel, an dem Spiegel befeſtigte Leine. Deren Gebrauch ſ. Lerchenſtreichen No. 3.

Spieße bey den Hirschen ſind Geweihe, ohne Enden.

Spießbock iſt der Rehbock, wenn er zum erſtenmale aufgeſetzt hat.

Spießente — *Anas Acuta* — gehört mit der Krickente unter eine Familie, und heist auch Pfeilschwanz, Nadel-
schwan, Spießschwanz, Langhals, Pfeisente, Pylstnert, Pfriemenente, spießschwänzige Ente, Fasanenente, und graue Mit-
telente. Sie hat einen lan-
gen und zugespizten Schwanz, einen langen Schnabel und Hals, und aschgraue Füße. Das Männ-
chen von den Ohren an am Hal-
se herab, eine weiße Linie; der
Spiegel besteht aus einem gelb-
rothen, breiten, kupferfarbenen,
schwarzen und weißen Streifen;
am Weibchen aber ist derselbe
blaß strohfarben, oben mit einem
röthlichgelben und unten mit ei-
nem schwarzen und weißen Strei-
fen, die Hauptfarbe aber ist bey
beyden lechchengrau, und die Län-
ge beträgt zwey Fuß. Uebri-
gens wechselt auch diese Ente
sehr in der Farbe ab: denn an
dem alten Männchen ist der
Kopf und halbe Hals bald rost-
braun mit Purpurglanz, bald
entenhalbig, und die Jungen se-
hen bis zum ersten Frühjahr
graubunt aus, wie die Weib-
chen. Diese Ente hält sich im
Norden der ganzen Welt, so
wie auch an den deutschen Kü-
sten, Seen und schilfreichen Lei-
chen, Brüchen und Flüssen auf,
und auf ihren Wanderungen
findet man sie in Deutschland
fast auf allen Seen, Teichen und
Flüssen einzeln. Ihre Nahrung
besteht aus Fischen, Schnecken
und Sumpfsgras. Das Nest
bauet sie an das Ufer oder auf

Binsenstöcke, worauf das
hen 8 bis 10 blaugrünlich
hineinlegt. Das Fleisch
wohlschmeckend.

Spießer, Spiessie,
ist ein junger Hirsch im
ten Jahre seines Alters, nach
erstes Geweihe, ohne zu
den, wie ein paar Spießer
noch auf dem Kopfe stehen,
nicht abgeworfen hat, s. Hirsch.

Spionhund nennt man
einen Hünerehund, der mit
wol auf dem Felde vor Hüh-
ern und Hünern steht, als
wenn er auf dem Felde lau-
ret, die angeschossenen Hüh-
ner verfolgt, die getödteten ap-
portirt, im Holze Hasen, Füchse
und Rehe laut jaget, Scher-
verbillt. Im Wasser jaget, und
daraus apportirt.

Sprenkel, Sprengel,
gel ist ein Werkzeug zum
ge kleiner Vögel. Man nennt
nemlich eine schwache Ruthe,
oder ellersne Ruthe, bindet an
das eine dünne Ende, einen
pelten Faden, oder eine
härne Schnur, diese zieht man
durch ein, in das dicke Ende
der Ruthe gemachtes Loch, und
bindet einen kleinen Knoten
an, welcher bey'm Losschneppen,
zwar an gedachtes Loch an, aber
nicht durchfähret. Bey'm
len des Sprenkels nimmt man
ein kleines Schnelholz,
Klippholz, richtet es zwischen
der, rund ausgebreiteten Schnur
oder Faden, und hängt einen
Büschel Hollunder, oder
eigere

nenbeeren daran. Wenn nun Vogel nach diesem Gefäße eingeht und das Holz nur ein wenig mit dem Fuße berührt, so läßt der Bogen loß, und fängt den Vogel am Fuße. Die beste Zeit zu diesem Fange ist im September und Oktober, am besten fängt man Rothkehlchen und dergleichen kleine Vögel damit.

Sprengen heißt, wenn ein Hirsch oder Schwein aus dem Lager gejagt, und flüchtig gemacht wird, oder wenn ein wildes Wildpret oder Sauen durch einen Schuß aus einander gejagt wird.

Springen heißt, wenn das Wildpret über die Garne springt.

Sprossen nennet man auch die Enden am Hirschgeweihe.

Sprünge nennet man gewisse Knochen in den Läufen mancher Thiere, vorzüglich der Hasen, auch nennet man die ganzen Hasenläufe so.

Spüren nennet man die Spur des Wildprets mit Spürhunden auffuchen und verfolgen.

Spürhund ist ein jeder Jagdhund, der das Wildpret auf der Spur verfolgt. Man rechnet dazu die eigentlich sogenannten Jagdhunde, die Bassets, Spionhunde, auch die Leithunde, nur mit dem Unterschiede, daß letztere dabey am Hängeleile geführt werden, die andern aber frey laufen.

Spur ist die Fährte, Fußtapfen, und andere Zeichen, woran man den Gang des Wildprets erkennen, und es darnach auffuchen kann.

Spurgang, **Spurtritt** ist das Geschäft, im Schnee einen Weg oder Flügel zu umgehen, oder zu umreiten, um zu sehen, ob man Wölfe oder anderes Wildpret spüret, und wohin sie die Köpfe gewendet.

Spurschneiden heißt die Spur im Treibeheerde machen.

Staar oder gemeiner Stahr, Starl, Wiesenstahr, Rinderstahr, Schaafstahr, Sprabe, Spree, Sprehm, Spreuwe, Sprue und Staarmaz, macht in der Singvögel-Ordnung eine eigene Gattung aus, deren Kennzeichen sind: ein gerader, etwas stumpfer, eckiger, niedergedrückter Schnabel, an der obern Kinnlade mit einem etwas klaffenden Rande; die Nasenlöcher sind offen und gerändert; die Zunge ist ausgerändert; und an den Füßen ist die mittlere Zähe mit der äußern bis aufs erste Gelenke verbunden. Sie nähren sich vorzüglich von Insekten und nisten in Höhlen. Unser Staar macht eine besondere durch folgende Kennzeichen sich unterscheidende Art aus: Der Schnabel ist gelblich; der Körper schwärzlich, purpurroth und grünglänzend mit weißen kleinen Flecken. An Größe gleicht er einer Rothdrossel, ist acht und einen halben

ben Zoll lang, funfzehn Zoll breit, wovon der Schwanz zwey und einen halben Zoll, und der Schnabel ein Zoll mißt; die gefalteten Flügel bedecken über zwey Drittheile des Schwanzes; das Gewicht ist drey Unzen. Der Schnabel ist gerade, nach den länglichen Nasenlöchern zu befiedert, etwas stumpf und breit, im Sommer grüngelb, an der Spitze und an den Enden blau; im Winter schwärzlich; die Füße fast dunkelfleischfarben; die Nägel schwärzlich; die geschilderten Schienbeine einen Zoll hoch. Der ganze Leib schwärzlich, oben bis zur Hälfte des Rückens, und unten bis zur Hälfte der Brust ins glänzend purpurrothe und am übrigen Ober- und Unterleibe, auch an den Deckfedern der Flügel ins glänzend Grüne spielend; Schwung- und Schwanzfedern sind schwarz, wie mit einem aschgrauen Staube überzogen, und so wie alle Deckfedern derselben hellrothfarben eingefast; die Federn des Kopfes und Halses mit röthlichweißen, die am Rücken mit hellfarbenen und die am Unterleibe mit weißen Spitzen, wodurch der Staar das gesprenkelte Ansehen erhält. Am Weibchen ist der Schnabel mehr schwarzbraun als gelb, die hellen Flecken am Ober- und besonders am Unterleibe viel größer; daher er auch von weiten weißer und nicht so glänzend aussieht. Varietäten. 1) Der weiße gemeine Staar. Rein weiß, gelblich weiß, oder graulich weiß. 2) Der bunte gemeine Staar. Er ist bunt

wie eine Elster, d. h. einige Theile mit großen weißen Flecken, oder ganz weiß. 3) Der weißköpfige Staar. Man kann ihn mit zur vorhergehenden Varietät rechnen. 4) Der schwarzköpfige gemeine Staar. Ganz weiß mit schwarzem Kopfe. 5) Der aschgrau gemeine Staar. Der Staar gehört unter die geselligen und verträglichen Vögel, der nicht nur auf seinen Wanderungen die Gesellschaft der Vögel sucht, sondern auch zur Brutzeit sich nicht so weit wie andre trennt; denn oft wohnen in einen kleinen Feldholze auf hundert Paar beisammen. Sein Flug ist schnell; sein Gang aber bloß bedächtig, schreitend oder watschelnd. Er wird im Zimmer sehr leicht kitzig, ist dabey listig und so gelehrig, daß er nicht bloß Lieder nachpfeifen, sondern auch sogar Worte nachsprechen lernt. Er ist der Affe unter den Vögeln, der alles nachahmen will, was ihm vorgesungen und gesagt wird. Sein Gesang ist eben nicht reizend, doch wegen ganz eignen schnurrenden Töne sonderbar genug. Einen Lockton hört man nicht von ihm; nur wenn er böß wird, ein tiefes Graß! Auch das Weibchen hat einen tiefen leperförmigen Gesang, nur nicht so abwechselnd, wie das Männchen. Man findet den Staar in der ganzen alten Welt, bis Drontheim hinauf, in Sibirien und am Vorgebirge der guten Hoffnung. Sie ziehen die ebenen Gebirge, wo Wiesen und Fel-

in der Nähe sind, den gerügigen Waldungen, besonders in Kettengebirgen weit vor, eben die Laubhölzer den Nadelhölzern, weil sie immer zu ihrer Brut hohle Bäume haben müssen. Im October verlassen sie uns in großen Schaaren; man trifft sie alsdann schon im September in Heerden auf den Triften häufig an. Im März kommen sie wieder zurück; oft schon, wenn warme Witterung einfällt, Ende des Februars, alsdann müssen sie oft, wenn viel Schnee fällt, wieder von hier wegziehen, und es gehen ihnen viele drauf. Sie retiriren sich dann in Städten und Dörfern des Nachts in die Taubenschläge. Auf ihren Reisen ruhen sie, wo möglich, der Witterung und Nahrung halber, im Schilf und Rohr aus. Insekten und ihre Larven, die auf der Erde und in derselben, besonders hinter dem Flügel, gefunden werden, machen seine Hauptnahrung aus, auch Würmer, und wie man sagt, Kirschen, Weintrauben und andere Beeren. Man sieht sie oft bey Viehherden, wo sie sich auf die Schaafe setzen und ihnen die Becken ablesen, oder die Breiten wegfangen. Er geht auch auf Luder. Im Zimmer nimmt er mit allem Vorliebe, was man ihm vorwirft, muß aber abwechselnd besonders Fleischspeisen bekommen, wenn er lange dauern soll. Sie nisten in hohlen Bäumen, besser in hohlen Buchen, Eichen und Bitterpappeln, sogar in hölzernen Kästchen, die man ihnen an die Bäume nagelt,

und in thönerne angebundene Gefäße. Auch findet man das Nest auf Thürmen, alten Mauern und in Felsenlöchern, ja in alten Drossel- und Eichhornnestern. Sie legen 4-7 Eier, welche länglich und hellaschgrün sind. Sie werden 14 Tage in einem Neste bebrütet, das bloß aus einer Unterlage von trocknen Blättern, Graßhalmen und Federn besteht. Die Jungen sehen vor den ersten Mausern mehr rauchfahl als schwarz aus, und sind ohne Flecken. Die Alten besuchen das alte Nest jährlich wieder, wenn es ihnen bequem genug ist. Steinmarder, Iltis und Wieseln verfolgen die Brut; die alten sieht man nicht leicht von Raubvögeln verfolgt; sollte ihnen etwa ihr Fleisch zu bitter seyn? Sie sind nicht so scheu, daß man sich nicht mit einer Flinke im Herbst einem Fluge nähern und mehrere mit Vogelbunt auf einmal erlegen könnte. In einigen Gegenden ist es Mode, ihnen breitere oder thönerne Gefäße an die Bäume zu befestigen, und die Jungen, wenn sie flügge sind, wie die Tauben, auszunehmen. Im Rohr fängt man sie mit mehrern Garnarten zur Zugzeit auf verschiedene Weise. Man theilt dem Staarenfang in den bey Nacht und bey Tage ein. Sie werden dann in großer Menge gefangen. Er gehört, wie alle kleinen Jagdvögel, zur niedern Jagd. Junge Staare sind eine gute Speise; die alten aber schmecken bitter, und man will ihnen daher

baher an mehrern Orten diesen Geschmack dadurch benehmen, daß man ihnen die Haut abzieht. Durch Vertilgung mancherley schädlicher Insecten werden sie besonders im Haushalte der Natur nützlich. Der Schaden, den er in Gärten und Weinbergen thun soll, wird von wenig Bedeutung seyn.

Staarenfang fängt im Julius an, und wird theils bey Tage, theils bey Nacht vorgenommen, 1) am Tage geschieht es mittelst zweyer verdeckter und grüner Wände, zweyer lebendiger Ruhrstaare, und ausgestopfter Wälge von todtten Staaren, die man neben die Wände stellet. So bald man einen Flug Staare merket, zieht man die Ruhrstaare an, da denn die fliegenden Staare bald einfallen, 2) bey Nacht braucht man ein großes Reh, das man wie einen Himmel auf zwey Seitenwänden befestigen kann, dieses stellet man des Abends auf 4 Stangen, welche durch Stricke leicht abgezogen werden können. Wenn nun die Staare im Schiffe ihr Nachtlager genommen haben, treibet man sie durch Lärm, den man an der entgegengesetzten Seite macht, auf die Wände zu, und wenn sie darunter sind, zieht man geschwind die Stangen ab, daß die Rehe über den Staaren zusammenschlagen.

Stand nennet man die Orte, wo sich roth-schwarze oder Rehwildpret aufhält.

Standvögel heißen diejenigen, welche das ganze Jahr an einem Orte bleiben.

Stange heist jedes einzelne Horn am Hirschgeweih und bey'm Rehbode.

Stechen sagt man von Finken, wenn sie auf einander fliegen und sich abbeißen; aber bey'm Dachs bedeutet es das Graben desselben in der Erde nach Wurzeln, und bey der Bißse heist es die Feder stellen, welche den Hahn losdrückt bey'm Schusse.

Stecken sagt man vom größern Wildpret, wenn man das kleinere Gebüsch oder Dickigt weiß, worinnen es ist.

Stehen ist ebenfalls ein Ausdruck, den man brauchet, um den Aufenthaltsort des großen Wildprets anzuzeigen.

Steige ist ein zum Rehbühnerfange gebräuchliches grün angestrichenes Bret, von der Größe eines mittelmäßigen Tischblattes und wird auf vier Säulen befestigt.

Steigen braucht man im Weydmännischen Sinne auf dreyerley Art: 1) vom Falken, wenn er sich in die Höhe schwinget, 2) vom Auerhahne, wenn er auf- oder von dem Baume fliehet, 3) vom Fischotter, wenn er aus dem Wasser gehet.

Stein heist das, krauß um das Gehörne der Hirsche, Rehe etc. herumgehende Gewächse.

Steinbock — Capra Ibex — wovon das Männchen auch Alpenbock heist, und das Weib.

Weibchen Alpenziege, Steinbockziege; Ibschen, Ibsch, Geis. Er gehört unter alle die bey der Gemse angeführten Ordnungen, aber unter die Gattung Ziege, und die Kennzeichen der Art sind: Mit mondförmig zugerundeten Hörnern, die oben knotig und nach dem Rücken gebeugt sind, einer dicken Schnauze und aufgeworfenen Nase. Der Steinbock ist weit größer und schwerer als unser Ziegenbock, vier und einen halben bis fünf Fuß lang und über zwey und einen halben Fuß hoch; der Schwanz, oder die Blume, fünf Zoll lang. Der Kopf ist im Verhältniß gegen den übrigen Körper klein; dem Hirschkopfe ähnlicher, als dem Ziegenkopfe; die Schnauze gekrümmt und etwas aufgeworfen; die Augen sind groß, rund, grünlich, hell und feurig; die Ohren kurz, eyrund, gerade auswärts stehend und mit dem Rücken parallel; der Bart sehr lang; die Hörner schwärzlich, gegen den Kopf und Körper sehr groß, oft drey Fuß lang, zwanzig Pfund schwer, und eines drey Maas Wasser haltend, mondförmig gebogen, mit scharfen nach der Länge gehenden Kanten, die gleichsam eine Vorderfläche bilden und an den Seiten mit Knotenringen, woran sich jährlich einer ansetzt, und deren Anzahl oft vier und mehr ist; der Leib ist dick und stark, wie am Ziegenbock gestaltet; die Beine oder Läufe sind schlank; die Klauen rundlich, scharf gerändert, inwendig hohl; die Blume

lang und starrhaarig, unten kahl. Das Haar lang und zottig, röthlichbraun; im Alter grau; der Bart rothbraun oder schwärzlich, längs des Rückens ein dunkelbrauner oder schwärzlicher Streifen, über und unter den Knien des Vorderfußes ein schwärzlicher Fleck; der Schwanz an der Wurzel und an den Seiten weiß, oben und am Ende schwarz. Im Winter wird das Haar verdoppelt, unten ist es dann fein und dicht, und oben spröde. Die Steinbockziege ist viel kleiner, fast um ein Drittheil; aber doch merklich größer, als unsere Hausziege, hat einen kleinen Bart, weit kleinere Hörner, und zwey Zigen. Nach den Abbildungen zu urtheilen, scheint es auch eine Varietät mit einer glatten hirschartigen Haut zu geben. Es sind scheue und flüchtige Thiere, die, ohngeachtet der Schwerfälligkeit ihres Körpers, mit der größten Leichtigkeit Felsenwände hinauf laufen, und von Felsenspitze zu Felsenspitze wie fliegend übersezen. Sie sind die größten Springer unter allen Europäischen Säugethieren; sie stürzen sich auch wohl von jähem Anhöhen herunter, ohne sich zu schaden, weil sie die Hörner allezeit vorhalten. Dieser Steinbock ist von dem Sibirischen als Art verschieden, und bewohnt die Schnee- und Eispipfel der Europäischen Alpen in der Schweiz, in dem Walliserlande, in Savoyen, Tyrol, Salzburg, auf den Pyrenäen und dem Carpatischen Gebirge. Sie sel-

len

len fast allenthalben ausgerottet und nur noch in den unübersteiglichen Gletschern des Thals von Aost in Savoyen in geringer Anzahl vorhanden seyn. Die Ursache dieses Verschwindens findet man in der Gegend, die sie jetzt bewohnen, und die ihnen nicht zum eigentlichen Aufenthalt bestimmt zu seyn scheint; denn viele sterben an der Blindheit, welche durch das zu starke Zurückprallen der Sonnenstrahlen vom Schnee entsteht, oder aus Mangel an Nahrung, und wieder andere werden den Raubvögeln zu Theil. Sie scheinen daher, nach ihrer Größe, und nach der Länge und Schwere ihres Gehörns zu urtheilen, in die subalpinischen Gebirge zu gehören. Um diese Thiere zu erhalten, hält der Erzbischof von Salzburg in seinem Garten Hellbron mehrere, und setzt sie von Zeit zu Zeit in die Gebirge aus. Da die Steinbockziegen ausgegangen waren, so gesellte man den Böcken zahme Ziegen zu, um sich mit ihnen zu begatten. In der dritten Generation wird diese Bastartzeugung den Steinböcken fast ganz gleich, und kann als wilde Steinbocksrasse ausgesetzt werden. Die Steinböcke halten sich gesellschaftlich auf den höchsten und steilsten Bergköpfen auf. Sie lieben vorzüglich die Einöden, scheuen die heftige Sonnenhitze, so wie die übermäßige Kälte. Im Sommer bewohnen sie die Nordseite der Gebirge, im Winter aber suchen sie die Mittagsseite und die Thäler auf. Der

Steinbock äset sich von den mageren Kräutern, die die fast erstorbene Natur auf den Eisbergen wachsen läßt, und aus allerhand wilden Gesträuchen. Welche? läßt sich aus Mangel der Erfahrung nicht bestimmen, da diese Thiere weit schwerer, als die Gemsen zu beobachten sind. Sie lecken beständig an den Steinen, besonders an solchen, welche mit Salpeter und Steinsalz beschlagen, mürbe und kalkartig sind. Der Steinbock tritt im October auf die Brunst, und soll einen ganzen Monat hitzig seyn. Die Ziege trägt 21 Wochen, und wirft nach den neuesten und sichersten Nachrichten auf einmal nicht mehr als ein Junges, das sich leicht zähmen und so weit gewöhnen läßt, daß es mit dem andern Ziegenvieh ausgetrieben werden kann. Es begattet sich auch leicht mit diesem. Noch im ersten Jahre begatten sich die Jungen, allein, da sie jährlich nicht mehr als eins setzen, und sie selbst so viel tödtlichen Gefahren unterworfen sind, so wird ihre Vermehrung nicht leicht wieder beträchtlich werden. Der Blindheit sind sie ausgesetzt, wie oben schon erwähnt worden ist. Ihre Feinde sind die Adler und Geyer; andere Raubthiere wagen sich nicht leicht in jene Höhe und Kälte. Wegen der Seltenheit und der Entfernung des Thiers aus dem gewöhnlichen Gesichtskreise der Beobachter, weiß man wenig oder nichts von ihm zu erzählen. Alles ist schon oben angeführt. In Seb. Mün-
sters

Hers Cosmographie von 1550 p. m. 497. steht. Die Jäger lassen sich mit langen Seilen über die hohen Felsen hinab, wo sie wissen, daß das Thier zu betreten ist und es flucht nicht, sondern wartet ihrer. Es muß der Jäger hart an selbigen Felsen umher zu dem Thiere gehen, und gute Sorge haben, daß zwischen ihm und dem Felsen kein Durchschein von dem Thier erfahen wird; anders läuft es an den Jäger und stößt ihn herab. Sieht es aber nicht zwischen durch, so meynt es, es möge ihn nicht begreifen mit seinen Hörnern, kommt also um sein Leben, oder wird gefangen. Die Steinbocksjagd ist so gefährlich, ja noch gefährlicher, als die Gemsejagd. Sie wird am besten im August und September angestellt, Hunde kann man dabey nicht brauchen. Man schießt sie mit solchen langen Büchsen, wie die Gemse. Wenn sie der Jäger so in die Enge treibt, daß sie nicht ausweichen können, so rennen sie zuweilen mit solcher Gewalt auf ihn zu, daß er in den Abgrund stürzt. Das Wildpret des Steinbocks soll an Geschmack dem des Hirschens fast gleich, aber zähe und schwer zu verdauen seyn. Aus den Hörnern machen sich die Jäger und Hirten Trinkgeschirre. Für große Herren werden sie zierlich ausgeschnitten und mit Gold und Silber eingefaßt. Die Haut wird, rauch gegerbt, zu Kleiderfuttern gebraucht; weißgahr achtet man sie nicht viel, da sie sehr dünn seyn soll. Das Blut oder

der Schweiß wird in ihrem Vaterlande für ein schmerzstillendes Mittel gehalten. Außer daß das Wild dem Jäger zuweilen den Felsen herabstürzt, weiß man keine schädliche Eigenschaft von ihm zu erzählen.

Steinkräh — *Corvus Graculus* — gehört mit dem Kollkraben in eine Ordnung und Gattung, als besondere Art, und heißt auch **Steinrabe**, **Waldrabe**, **Feuerrabe**, **schwarzer Rabe**, **Alpenkräh**, **Steinkrähen** und **Schweizerdohle**, **Steintule**, **Steintahle**, **schwarzer Geiß** mit feurigen Augen. Sie ist violett-schwarz mit einem langen, dünnen starkgebogenen rothen Schnabel, nebst rothen Füßen, und funfzehn Zoll lang. Indessen sind die Vögel dieser Art in der Farbe sehr verschieden, und es giebt sogar ganz weiße. Man sagt, die Jungen hätten schwarze Füße. Sie nährt sich von Insekten, Beeren und Getraide. Ihr Wohnort sind die süblich deutschen Berge und Alpen, aber im Herbst streicht sie im süblichen Deutschlande heerdenweise in den Ebenen umher. Sie macht ihr Nest in die Felsenritzen und das Weibchen legt 4 bis 5 aschgraulichweiße, dunkelbraungestreckte Eyer.

Steinmarder — *Mustela Foina* — auch **Hauß-** und **Dachmarder** genannt, gehört nach dem Linneischen Systeme unter die Raubthiere in die dritte Ordnung; nach dem Blumenbachschen in die sechste Ordnung, unter

Er ist ein allenthalben in Deutschland gemeiner und hinlänglich bekannter Vogel. Er ist fünf und drey Viertel Zoll lang, wovon der Schwanz zwey Zoll und der Schnabel einen Zoll mißt. Die Breite ist acht und drey Viertel Zoll, und die Flügel legen sich auf der Mitte des Schwanzes zusammen. Der dicke Schnabel ist im Sommer schwarz, im Winter hellbraun; der Augenstern kastanienbraun; die Füße acht Linien hoch und grau-braun. Scheitel und Wangen sind aschgrau; hinter den Augen ist ein breiter rothbrauner Streifen; um die Augen schwarz; der Hinterhals grau; der Rücken rothbraun und schwarz gefleckt; die Kehle bis zur Brust schwarz, letztere weißgewölkt; der Unterleib gräulich weiß; die kleinern Deckfedern der Flügel rothbraun, die vorletzte Reihe der großen mit weißen Ränntchen, diese mit rothbrauner Einfassung; die Schwungfedern dunkelbraun, so wie die Schwanzfedern. Das Weibchen ist am Oberleibe rothgrau, auf dem Rücken schwarz gefleckt; der Unterleib schmutzig weißgrau. Die Jungen männlichen und weiblichen Geschlechts sehen bis zum ersten Mausern, wie die Weibchen aus. Varietäten: 1) Der weiße Haussperling. Entweder rein weiß, oder gelblichweiß, oder grauweiß. 2) Der gelbe Haussperling. Gelb, am Oberleibe ins Rothbraune sich ziehend, auch loh- oder semmelgelb. 3) Der schwarze Haussperling. Entweder kohlschwarz oder braunschwarz. 4) Der blaue

Haussperling. Schwarzblau oder dunkelashgrau. 5) Der aschgraue Haussperling. Hellashgrau mit dunkelbraunen Flecken von der Zeichnung des gemeinen Vogels. 6) Der bunte Haussperling. Gewöhnlich gefärbt mit weißen Theilen, oder Flecken. Wie fast alle Vögel, die in der Nähe der Menschen wohnen und es aus Erfahrung wissen, wie gern er auch den unschuldigsten nachstellt, so ist der Haussperling ungemein scheu, und flieht vor ihm, wenn er nur von weiten sieht, daß seine Augen auf ihn gerichtet sind; ja er ist durch die so häufigen Verfolgungen so schlaue geworden, daß man Mühe hat, ihn zu hinterlisten. Er fliegt schnell, trägt sich aber sitzend und hüpfend schlecht. Seine einzeln abgebrochenen Töne, die er im Frühjahr hören läßt, kann man keinen eigentlichen Gesang nennen. Sein Lockton ist Dieb! Er bewohnt ganz Europa, soweit es mit Getraide angebauet ist, Asien von Persien bis Sibirien, und so wie der Anbau des Getraides weiter rückt, in Afrika, Aegypten und die Gegenden des Flusses Senegal. Sie halten sich in Dörfern und Städten auf, die in bebauten Feldern liegen. In der Erndte schlagen sie sich in große Flüge zusammen und gehen nahe an den Städten und Dörfern in die Hecken, welche an den Getraidefeldern liegen. Nur die Fortpflanzungszeit über leben sie einzeln, sonst immer familienweise und in kleinen und großen Gesellschaften. Im Winter halten sie sich auf den Miststätten und

vor den Scheunen auf. Durch ihre Nahrung werden sie wohlthätig und schädlich. Im Frühjahr und Sommer lesen sie alle Raupen von den Obstbäumen ab, tödten eine Menge Maulwürfer, Heuschrecken und schädliche Obstschmetterlinge. Wenn die Insekten nicht mehr häufig sind, so gehen sie nach reisender und reifer Gerste, Weizen, Hirsen und Hafer, nach den Kirschen, Wein- und Johannisbeeren, auch nach den Zuckerebsen. Im Winter müssen sie mit verloren gehenden Getreidekörnern und andern Gesämen vorlieb nehmen. Alte Sperlinge nisten des Jahres dreymal, und machen schon im März ihr Nest zurecht. Dieß ist ein Klumpen Stroh, Grasshalmen, Weich, Wolle, Papier, der inwendig ausgehöhlt und mit Federn dicht ausgefüllt ist. Es steht in Löhern, unter den Dächern, zwischen den Dachsparren, unter den Ziegeln, in Mauerlöchern, in Schwalbennestern, hohlen Bäumen, auf den großen Nesten der Obstbäume und Linden. Sie legen auf einmal fünf bis sieben Eier, die grünlichweiß, mit vielen dunkelashgrauen und braunen Punkten bestreut sind. Doch variiren sie auch, indem sie eine reine weiße Grundfarbe haben und mit viel weniger braunen Punkten besetzt sind. Sie werden vierzehn Tage bebrütet, und die Jungen mit Raupen, Heuschrecken, Maulwürfern und Schmetterlingen aufgefüttert. Sie sehen vor dem ersten Mausern der Mutter gleich. Daß die Begat-

tung bey diesen, so wie bey dem Feldsperling und einigen andern Vögeln, so oft hinter einander wiederholt wird, ist bekannt. Das große und kleine Wiesel verfolgt die Brut, und der Sperber und Baumfalk die Alten. Im Herbst schießt man sie mit Dunst in Menge in den Feldern auf der Hecke oder auf einem Baume. Weiß man den bestimmten Baum, wo sie aus der Frucht allezeit aufstiegen, so darf man diesen nur mit vielen Leimruhen bestücken, so fängt man sie auch in Menge. Im Winter sucht man sie in Gärten mit Spreu und Hafer auf einem langen Flecke zum Schusse oder unter eine Schlagwand zu locken. In Scheunen und auf Böden fängt man sie in Netzen, welche man vor die Oeffnungen macht. In einigen Thüringischen Gegenden werden sie des Abends in Kirschbäumen mit einem Garn, das den Fischhaaren gleicht und an einen Stoc befesligt ist, gefangen. Fast in jeder Gegend hat man eigene Methoden sich dieses schlaun Vogels zu bemächtigen.

Ob gleich das Fleisch in mehrern Gegenden verachtet wird, so schmeckt es doch eben so gut als Finkenfleisch. Die Jungen sind besser als die Alten, und um diese zu erhalten, ist es in mehrern Gegenden gewöhnlich kleine Töpfe mit einem engen Loche an die Häuser zu befestigen, damit sie da hinein nisten, und ausgenommen werden können. Sie vertilgen eine große Menge schädliche Garteninsek-

insekten. Wie die Nahrung anzeigt, so thun sie in Feldern und Gärten Schaden. Durch Schießen sind sie vielmehr zu verschrecken, als durch Scheusale, die sie bald, als ihnen unschädlich, kennen lernen. Ich halte ihn nach vieljährigen Beobachtungen doch für einen mehr nützlichen als schädlichen Vogel.

2) Sperlingsartige Vögel — *Passeres* — machen unter den Vögeln eine aus der Gattung Kernbeißer, der Gattung Fink, wo unsere Sperlinge hin gehören, und der Gattung Ammer bestehende Ordnung aus, welche sich durch folgende Kennzeichen von den übrigen Ordnungen unterscheidet: Der Schnabel ist kegelförmig zugespitzt, meist stark, beyde Kinnladen beweglich, um die Saamenkörner zu schälen, wodurch sie sich vor allen Vögeln auszeichnen. Ihre zum Hüpfen gebauten Füße sind bis über die Ferse besiedert, dünn und mit freyen Zehen versehen. Fast alle Vögel dieser Gattungen sind kleiner als die meisten der Gattungen der übrigen Ordnungen.

Sperlingsfang ist die Art und Weise, die Sperlinge zu vertilgen: Es geschieht auf folgende Arten: 1) mit Leimspindeln, wovon man einige hundert nach Michael, wenn die jungen Sperlinge auf den Strich gehen, und oft zu Tausenden auf die, nahe an bewohnten Orten liegenden Felder fallen, auf

die, nahe dabey gelegenen, Büsche und Stauden steckt, und die Sperlinge vom Felde auf dieselben zu, auftreibet, da sie denn in großer Anzahl darauf fallen und kleben bleiben; 2) mit dem Korb. Man macht nemlich einen durchsichtigen Korb von feinem Reißig oder Binsen, oben mit einer ziemlich engen Oeffnung, sezet darauf einen kleinen trichterförmigen Korb, in den untern legt man ein Nest voll junger Sperlinge, und stellt ihn so auf den Hof, da die Sperlinge haufenweise kommen, durch die Oeffnung hinein kriechen, aber nicht wieder heraus können. 3) Auf dem Schnee mit der Horde. Man macht nemlich eine rund erhabene Horde, in Gestalt eines Kofferdeckels Fig. 12 fünf Ellen lang und drey Ellen breit, deren Längs- und Querbäume 6 Zoll breit, und 4 Zoll stark sind, in diese bohret und verkeilet man zehn starke fichtene, saalweidene oder häselne Bügel, von gleicher Höhe, außer den beyden äußersten, welche etwas niedriger seyn können. Diese Bügel zäunet man mit schwanken weidenen oder häselnen Ruthen aus, welches auch an beyden Seiten auf das genaueste geschieht, nur bey A läßt man eine Oeffnung, um die gefangenen Vögel heraus zu jagen. Diese Horde stellet man nicht weit von der Scheune, am besten im Garten auf. Hinten schlägt man ein paar starke Pfähle daran, damit sie im Aufheben nicht wanke. Die Oeffnung A verstopfet man mit einem

nem Strohwiſche, hebt ſobann die Horde empor, ſtemmt einen $1\frac{1}{2}$ Elle langen, etwas ſtarcken Stecken bey B unter den Vorderbaum, und ſetzt deſſen unterſten Theil auf ein Bret C, weil ſonſt die Horde von der Laſt in die Erde gedrückt würde. An das unterſte Ende dieſes Strohwiſches bindet man eine lange ſchwache Stange D, und an dieſe noch eine oder mehrere, denn für eine Reine fürchten ſich die Vögel gemeinlich. Unter der Horde räumt man den Schnee weg, körnet die Sperlinge durch unter geſtreuetes Futter und einen Büſchel Haferähren. Haben ſich nun die Sperlinge darunter gewöhnet, ſo ruſſet man mit der Stange den Stecken weg, daß die Horde einſchieſet, und die darunter beſindlichen Sperlinge gefangen ſind. Nun ziehet man ein Netz vor die Oeffnung A, ſtößt den Strohwiſch weg, und pocht auf der andern Seite an die Horde, da denn die Sperlinge aus der Horde, durch die Oeffnung in das Netz fliegen, und ſich fangen. 4) Mit dem Siebe, ſ. Sieb. 5) Mit einem Netze, das man vor ihre Nester dicht anleget, und ſobann hinter demſelben durch Pochen Lärm macht, da denn die Sperlinge heraus und ins Netz fahren, 6) mit dem Schlagbauer, in welchen man einen Sperling als Lockvogel ſetzt, 7) in Fallen von vier auf die ſchmale Seite ins Viereck geſetzten und genau gepaßten Ziegeln, über welche man noch einen andern viereckig-

ten Ziegel ſtellt, welchen zwey oder drey innerhalb der Falle angebrachte Stäbchen halten. In dieſe ſtreuet man Getraidkörner, wenn nun die Sperlinge nach deſſelben in die Falle gehen, und eines dieſer Stäbchen berühren, ſo fällt es um, und der aufgeſtellte Ziegel fällt nach, 8) durch Schießen mit Vogelbunſt. Um ſie da recht in Menge auf einmal zu ſchießen, muß man ohnweit eines Fenſters eine 10 bis 12 Ellen lange Reihe Spreu, und auf dieſe Getraidkörner ſtreuen, da man denn, wenn ſie in Menge darauf ſallen, aus dem Fenſter auf den vorderſten hält, und gewiß beym Loſſchießen die meiſten der in der Reihe liegenden Vögel tödtet, oder verwundet.

Spiegel kommt beym Lerchenfange vor; und man verſteht darunter auch den weißlichen Fleck hinten am Hirsche und die Abzeichen bey Enten u.

Spiegelgarn, Spiegelnetz, ſpiegelichte Netze, ſ. Prellnetz.

Spiegelleine iſt die beym Lerchenfange mit dem Spiegel, an dem Spiegel befeſtigte Leine. Deren Gebrauch ſ. Lerchenſtreichen No. 3.

Spieße bey den Hirschſchen ſind Geweihe, ohne Enden.

Spießbock iſt der Rehbock, wenn er zum erſtenmale aufgeſetzt hat.

Spießente — *Anas Acuta* — gehört mit der Krickente unter eine Familie, und heißt auch Pfeilschwanz, Nabelschwan, Spießschwanz, Langhals, Pfeifente, Pylstnert, Pfeifente, spießschwänzige Ente, Fasanente, und graue Mitzelente. Sie hat einen langen und zugespigten Schwanz, einen langen Schnabel und Hals, und aschgraue Füße. Das Männchen von den Ohren an am Halse herab, eine weiße Linie; der Spiegel besteht aus einem gelbrothen, breiten, kupferfarbenen, schwarzen und weißen Streifen; am Weibchen aber ist derselbe blaß strohfarben, oben mit einem röthlichgelben und unten mit einem schwarzen und weißen Streifen, die Hauptfarbe aber ist bey beiden lerchengrau, und die Länge beträgt zwey Fuß. Uebrigens wechselt auch diese Ente sehr in der Farbe ab: denn an dem alten Männchen ist der Kopf und halbe Hals bald rostbraun mit Purpurglanz, bald entenhalfig, und die Jungen sehen bis zum ersten Frühjahr graubunt aus, wie die Weibchen. Diese Ente hält sich im Norden der ganzen Welt, so wie auch an den deutschen Küsten, Seen und schilfreichen Teichen, Brüchen und Flüssen auf, und auf ihren Wanderungen findet man sie in Deutschland fast auf allen Seen, Teichen und Flüssen einzeln. Ihre Nahrung besteht aus Fischen, Schnecken und Sumpfsgras. Das Nest bauet sie an das Ufer oder auf

Binsensstöcke, worauf das Weibchen 8 bis 10 blaugrünliche Eier hineinlegt. Das Fleisch ist sehr wohlschmeckend.

Spießer, Spießhirsch, ist ein junger Hirsch im zweiten Jahre seines Alters, der sein erstes Geweihe, ohne alle Enden, wie ein paar Spieße an noch auf dem Kopfe stehen, und nicht abgeworfen hat, s. Hirsch.

Spionhund nennet man einen Hünerehund, der nicht sowohl auf dem Felde vor Hasen und Hünern steht, als besonders auf dem Felde kurz reviret, die angeschossenen Hasen verfolgt, die getödteten apportirt, im Holze Hasen, Füchse und Rehe laut jaget, Fasanen verbillt. Im Wasser sucht, und daraus apportirt.

Sprenkel, Sprengel, Bügel ist ein Werkzeug zum Fange kleiner Vögel. Man nimmt nemlich eine schwanke weidene oder elterne Ruthe, bindet an das eine dünne Ende, einen doppelten Faden, oder eine pferdhärne Schnur, diese zieht man durch ein, in das dicke Ende der Ruthe gemachtes Loch und bindet einen kleinen Knebel daran, welcher beym Losschnappen, zwar an gedachtes Loch an, aber nicht durchfähret. Beym Stellen des Sprenkels nimmt man ein kleines Schnellholz, Klippholz, richtet es zwischen der, rund ausgebreiteten Schnur oder Faden, und hänget einen Büschel Hollunder- oder Eber-

eschenbeeren daran. Wenn nun ein Vogel nach diesem Gefäße eilet, und das Holz nur ein wenig mit dem Fuße berührt, so schlägt der Bogen loß, und fängt den Vogel am Fuße. Die beste Zeit zu diesem Fange ist im September und Oktober, am meisten fängt man Rothkehlchen und dergleichen kleine Vögel damit.

Sprengen heißt, wenn ein Hirsch oder Schwein aus dem Lager gejagt, und flüchtig gemacht wird, oder wenn ein Rudel Wildpret oder Sauen durch den Schuß aus einander gejagt wird.

Springen heißt, wenn das Wildpret über die Garne setzt.

Sproßen nennet man auch die Enden am Hirschgeweihe.

Sprünge nennet man gewisse Knochen in den Läufen mancher Thiere, vorzüglich der Haasen, auch nennet man die ganzen Haasenläufe so.

Spüren nennet man die Spur des Wildprets mit Spürhunden auffuchen und verfolgen.

Spürhund ist ein jeder Jagdhund, der das Wildpret auf der Spur verfolgt. Man rechnet dazu die eigentlich sogenannten Jagdhunde, die Bassets, Spionhunde, auch die Leithunde, nur mit dem Unterschiede, daß letztere dabey am Hängefelle geführt werden, die andern aber frey laufen.

Spur ist die Fährte, Fußtapfen, und andere Zeichen, woran man den Gang des Wildprets erkennen, und es darnach auffuchen kann.

Spurgang, Spurtritt ist das Geschäft, im Schnee einen Weg oder Flügel zu umgehen, oder zu umreiten, um zu sehen, ob man Wölfe oder anderes Wildpret spüret, und wohin sie die Köpfe gewendet.

Spurschneiden heißt die Spur im Treibeheerde machen.

Staar oder gemeiner Stahr, Starl, Wiesenstahr, Rinderstahr, Schaafstahr, Sprache, Spree, Sprehm, Spreuwe, Sprue und Staarmaz, macht in der Singvögel-Ordnung eine eigene Gattung aus, deren Kennzeichen sind: ein gerader, etwas stumpfer, eßiger, niedergedrückter Schnabel, an der obern Kinnlade mit einem etwas klossenden Rande; die Nasenlöcher sind offen und gerändert; die Zunge ist ausgerändert; und an den Füßen ist die mittlere Zähe mit der äußern bis aufs erste Gelenke verbunden. Sie nähren sich vorzüglich von Insekten und nisten in Höhlen. Unser Staar macht eine besondere durch folgende Kennzeichen sich unterscheidende Art aus: Der Schnabel ist gelblich; der Körper schwärzlich, purpurroth und grünglänzend mit weißen kleinen Flecken. An Größe gleicht er einer Rothdrossel, ist acht und einen halben

ben Zoll lang, funfzehn Zoll breit, wovon der Schwanz zwey und einen halben Zoll, und der Schnabel ein Zoll mißt; die gefalteten Flügel bedecken über zwey Drittheile des Schwanzes; das Gewicht ist drey Unzen. Der Schnabel ist gerade, nach den länglichen Nasenlöchern zu befiedert, etwas stumpf und breit, im Sommer grüngelb, an der Spitze und an den Enden blau; im Winter schwärzlich; die Füße stark dunkelfleischfarben; die Nägel schwärzlich; die geschilderten Schienbeine einen Zoll hoch. Der ganze Leib schwärzlich, oben bis zur Hälfte des Rückens, und unten bis zur Hälfte der Brust ins glänzend purpurrothe und am übrigen Ober- und Unterleibe, auch an den Deckfedern der Flügel ins glänzend Grüne spielend; Schwanz- und Schwanzfedern sind schwarz, wie mit einem aschgrauen Staube überzogen, und so wie alle Deckfedern derselben hellrothfarben eingefärbt; die Federn des Kopfes und Nackens mit röthlichweißen, die am Rücken mit hellfarbenen und die am Unterleibe mit weißen Spitzen, wodurch der Staar das gesprenkelte Ansehen erhält. Am Weibchen ist der Schnabel mehr schwarzbraun als gelb, die hellen Flecken am Ober- und besonders am Unterleibe viel größer; daher er auch von weitem weißer und nicht so glänzend aussieht. Varietäten. 1) Der weiße gemeine Staar. Rein weiß, gelblich weiß, oder graulich weiß. 2) Der bunte gemeine Staar. Er ist bunt

wie eine Elster, d. h. einige Theile mit großen weißen Flecken, oder ganz weiß. 3) Der weißköpfige Staar. Man kann ihn mit zur vorhergehenden Varietät rechnen. 4) Der schwarzköpfige gemeine Staar. Ganz weiß mit schwarzem Kopfe. 5) Der aschgrau gemeine Staar. Der Staar gehört unter die geselligen und verträglichen Vögel, der nicht nur auf seinen Wanderungen die Gesellschaft der Vögel sucht, sondern auch zur Brutzeit sich nicht so weit wie andre trennt; denn oft wohnen in einem kleinen Feldholze auf hundert Paar beisammen. Sein Flug ist schnell; sein Gang aber bloß bedächtig, schreitend oder watschelnd. Er wird im Zimmer sehr leicht kitzig, ist dabey listig und so gelehrt, daß er nicht bloß Lieder nachpfeifen, sondern auch sogar Worte nachsprechen lernt. Er ist der Affe unter den Vögeln, der alles nachahmen will, was ihm vorgesungen und gesagt wird. Sein Gesang ist eben nicht reizend, doch wegen ganz eigner schnurrenden Töne sonderbar genug. Einen Lockton hört man nicht von ihm; nur wenn er böß wird, ein tiefes Graß! Auch das Weibchen hat einen tiefen leyerförmigen Gesang, nur nicht so abwechselnd, wie das Männchen. Man findet den Staar in der ganzen alten Welt, bis Drontheim hinauf, in Sibirien und am Vorgebirge der guten Hoffnung. Sie ziehen die ebenen Gebirge, wo Wiesen und Fel-

der

der in der Nähe sind, den gebirgigen Waldungen, besonders den Kettengebirgen weit vor, eben so die Laubhölzer den Nadelhölzern, weil sie immer zu ihrer Brut hohle Bäume haben müssen. Im October verlassen sie uns in großen Schaaren; man trifft sie alsdann schon im September in Heerden auf den Tristen häufig an. Im März kommen sie wieder zurück; oft schon, wenn warme Witterung einfällt, zu Ende des Februars, alsdann aber müssen sie oft, wenn viel Schnee fällt, wieder von hier weggiehen, und es gehen ihnen viele drauf. Sie retiriren sich dann in Städten und Dörfern des Nachts in die Laubenschläge. Auf ihren Reisen ruhen sie, wo möglich, der Witterung und Nahrung halber, im Schilf und Rohr aus. Insekten und ihre Larven, die auf der Erde und in derselben, besonders hinter dem Pfluge, gefunden werden, machen seine Hauptnahrung aus, auch Würmer, und wie man sagt, Kirschen, Weintrauben und andere Beeren. Man sieht sie oft bey Viehherden, wo sie sich auf die Schaafse setzen und ihnen die Secken ablesen, oder die Brezmen wegfangen. Er geht auch aufs Luder. Im Zimmer nimmt er mit allem vorlieb, was man ihm vorwirft, muß aber abwechselnd besonders Fleischspeisen bekommen, wenn er lange dauern soll. Sie nisten in hohlen Bäumen, besser in hohlen Buchen, Eichen und Bitterpappeln, sogar in hölzernen Kästchen, die man ihnen an die Bäume nagelt,

und in thönerne angebundene Gefäße. Auch findet man das Nest auf Thürmen, alten Mauern und in Felsenlöchern, ja in alten Drossel- und Eichhornnestern. Sie legen 4-7 Eyer, welche länglich und hellaschgrün sind. Sie werden 14 Tage in einem Neste bebrütet, das bloß aus einer Unterlage von trocknen Blättern, Graßhalmen und Federn besteht. Die Jungen sehen vor den ersten Maufern mehr rauchfahl als schwarz aus, und sind ohne Flecken. Die Alten besuchen das alte Nest jährlich wieder, wenn es ihnen bequem genug ist. Steinmarder, Iltis und Wieseln verfolgen die Brut; die alten sieht man nicht leicht von Raubvögeln verfolgt; sollte ihnen etwa ihr Fleisch zu bitter seyn? Sie sind nicht so scheu, daß man sich nicht mit einer Flinte im Herbst einem Fluge nähern und mehrere mit Vogelbunt auf einmal erlegen könnte. In einigen Gegenden ist es Mode, ihnen breterne oder thönerne Gefäße an die Bäume zu befestigen, und die Jungen, wenn sie flügge sind, wie die Lauben, auszunehmen. Im Rohr fängt man sie mit mehrern Garnarten zur Zugzeit auf verschiedene Weise. Man theilt den Staarenfang in den bey Nacht und bey Tage ein. Sie werden dann in großer Menge gefangen. Er gehört, wie alle kleinen Jagdvögel, zur niedern Jagd. Junge Staare sind eine gute Speise; die alten aber schmelzen bitter, und man will ihnen daher

baher an mehreren Orten diesen Geschmack dadurch benehmen, daß man ihnen die Haut abzieht. Durch Vertilgung mancherley schädlicher Insecten werden sie besonders im Haushalte der Natur nützlich. Der Schaden, den er in Gärten und Weinbergen thun soll, wird von wenig Bedeutung seyn.

Staarenfang fängt im Julius an, und wird theils bey Tage, theils bey Nacht vorgenommen, 1) am Tage geschieht es mittelst zweyer verdeckter und grüner Wände, zweyer lebendiger Ruhrstaare, und ausgestopfter Wälge von todtten Staaren, die man neben die Wände stellet. So bald man einen Flug Staare merket, ziehet man die Ruhrstaare an, da denn die fliegenden Staare bald einsinken, 2) bey Nacht braucht man ein großes Reh, das man wie einen Himmel auf zwey Seitenwänden befestigen kann, dieses stellet man des Abends auf 4 Stangen, welche durch Stricke leicht abgezogen werden können. Wenn nun die Staare im Schiffe ihr Nachtlager genommen haben, treibet man sie durch Lärm, den man an der entgegengesetzten Seite macht, auf die Wände zu, und wenn sie darunter sind, ziehet man geschwind die Stangen ab, daß die Rehe über den Staaren zusammenschlagen.

Stand nennet man die Orte, wo sich roth- schwarz- oder Rehwildpret aufhält.

Standvögel heißen diejenigen, welche das ganze Jahr an einem Orte bleiben.

Stange heißt jedes einzelne Horn am Hirschgeweih und bey'm Rehbocke.

Stechen sagt man von Finken, wenn sie auf einander fliegen und sich abbeißen; aber bey'm Dachs bedeutet es das Graben desselben in der Erde nach Wurzeln, und bey der Wüchse heißt es die Feder stellen, welche den Hahn losdrückt bey'm Schusse.

Stecken sagt man vom größern Wildpret, wenn man das kleinere Gebüsch oder Dickigt weiß, worinnen es ist.

Stehen ist ebenfalls ein Ausdruck, den man brauchet, um den Aufenthaltsort des großen Wildprets anzuzeigen.

Steige ist ein zum Rebhühnerfange gebräuchliches grün angestrichenes Bret, von der Größe eines mittelmäßigen Tischblattes und wird auf vier Säulen befestigt.

Steigen braucht man im Weydmännischen Sinne auf dreyerley Art: 1) vom Falken, wenn er sich in die Höhe schwinget, 2) vom Auerhahne, wenn er auf- oder von dem Baume fliehet, 3) vom Fischotter, wenn er aus dem Wasser gehet.

Stein heißt das, Kraut um das Gehörne der Hirsche, Rehe u. herumgehende Gewächse.

Steinbock — Capra Ibex — wovon das Männchen auch Alpenbock heißt, und das Weib.

Weibchen Alpenziege, Steinbockziege; Ibschen, Ibsch, Geis. Er gehört unter alle die bey der Gemse angeführten Ordnungen, aber unter die Gattung Ziege, und die Kennzeichen der Art sind: Mit mondförmig zugerundeten Hörnern, die oben knotig und nach dem Rücken gebeugt sind, einer dicken Schnauze und aufgeworfenen Nase. Der Steinbock ist weit größer und schwerer als unser Ziegenbock, vier und einen halben bis fünf Fuß lang und über zwey und einen halben Fuß hoch; der Schwanz, oder die Blume, fünf Zoll lang. Der Kopf ist im Verhältniß gegen den übrigen Körper klein; dem Hirschkopfe ähnlicher, als dem Ziegenkopfe; die Schnauze gekrümmt und etwas aufgeworfen; die Augen sind groß, rund, grünlich, hell und feurig; die Ohren kurz, eyrund, gerade auswärts stehend und mit dem Rücken parallel; der Bart sehr lang; die Hörner schwärzlich, gegen den Kopf und Körper sehr groß, oft drey Fuß lang, zwanzig Pfund schwer, und eines drey Maas Wasser haltend, mondförmig gebogen, mit scharfen nach der Länge gehenden Kanten, die gleichsam eine Vorderfläche bilden und an den Seiten mit Knotenringen, woran sich jährlich einer ansetzt, und deren Anzahl oft vier und mehr ist; der Leib ist dick und stark, wie am Ziegenbock gestaltet; die Beine oder Läufe sind schlank; die Klauen rundlich, scharf gerändert, inwendig hohl; die Blume

lang und starkhaarig, unten kahl. Das Haar lang und zottig, röthlichbraun; im Alter grau; der Bart rothbraun oder schwärzlich, längs des Rückens ein dunkelbrauner oder schwärzlicher Streifen, über und unter den Knieen des Vorderfußes ein schwärzlicher Fleck; der Schwanz an der Wurzel und an den Seiten weiß, oben und am Ende schwarz. Im Winter wird das Haar verdoppelt, unten ist es dann fein und dicht, und oben spröde. Die Steinbockziege ist viel kleiner, fast um ein Drittel, aber doch merklich größer, als unsere Hausziege, hat einen kleinen Bart, weit kleinere Hörner, und zwey Zigen. Nach den Abbildungen zu urtheilen, scheint es auch eine Varietät mit einer glatten hirschartigen Haut zu geben. Es sind scheue und flüchtige Thiere, die, ohngeachtet der Schwermühsamkeit ihres Körpers, mit der größten Leichtigkeit Felsenwände hinauf laufen, und von Felsenspitze zu Felsenspitze wie fliegend übersehen. Sie sind die größten Springer unter allen Europäischen Säugethieren; sie stürzen sich auch wohl von jähren Anhöhen herunter, ohne sich zu schaden, weil sie die Hörner allezeit vorhalten. Dieser Steinbock ist von dem Sibirischen als Art verschieden, und bewohnt die Schnee- und Eispipfel der Europäischen Alpen in der Schweiz, in dem Walliserlande, in Savoyen, Tyrol, Salzburg, auf den Pyrenäen und dem Europäischen Gebirge. Sie sel-

len

len fast allenthalben ausgerottet und nur noch in den unübersteiglichen Gletschern des Thals von Aost in Savoyen in geringer Anzahl vorhanden seyn. Die Ursache dieses Verschwindens findet man in der Gegend, die sie jetzt bewohnen, und die ihnen nicht zum eigentlichen Aufenthalt bestimmt zu seyn scheint; denn viele sterben an der Blindheit, welche durch das zu starke Zurückprallen der Sonnenstrahlen vom Schnee entsteht, oder aus Mangel an Nahrung, und wieder andere werden den Raubvögeln zu Theil. Sie scheinen daher, nach ihrer Größe, und nach der Länge und Schwere ihres Gehörns zu urtheilen, in die subalpinischen Gebirge zu gehören. Um diese Thiere zu erhalten, hält der Erzbischof von Salzburg in seinem Garten Hellbron mehrere, und setzt sie von Zeit zu Zeit in die Gebirge aus. Da die Steinbockziegen ausgegangen waren, so gesellte man den Böcken zahme Ziegen zu, um sich mit ihnen zu begatten. In der dritten Generation wird diese Bastartzeugung den Steinböcken fast ganz gleich, und kann als wilde Steinbocksrasse ausgelegt werden. Die Steinböcke halten sich gesellschaftlich auf den höchsten und steilsten Bergköpfen auf. Sie lieben vorzüglich die Einöden, scheuen die heftige Sonnenhitze, so wie die übermäßige Kälte. Im Sommer bewohnen sie die Nordseite der Gebirge, im Winter aber suchen sie die Mittagsseite und die Thäler auf. Der

Steinbock äset sich von den mannigern Kräutern, die die fast erstorbene Natur auf den Eisbergen wachsen läßt, und aus allerhand wilden Gesträuchen. Welche? läßt sich aus Mangel der Erfahrung nicht bestimmen, da diese Thiere weit schwerer, als die Gemsen zu beobachten sind. Sie lecken beständig an den Steinen, besonders an solchen, welche mit Salpeter und Steinsalz beschlagen, mürbe und kalkartig sind. Der Steinbock tritt im October auf die Brunst, und soll einen ganzen Monat hiezu seyn. Die Ziege trägt 21 Wochen, und wirft nach den neuesten und sichersten Nachrichten auf einmal nicht mehr als ein Junges, das sich leicht zähmen und so weit gewöhnen läßt, daß es mit dem andern Ziegenvieh ausgetrieben werden kann. Es begattet sich auch leicht mit diesem. Noch im ersten Jahre begatten sich die Jungen, allein, da sie jährlich nicht mehr als eins setzen, und sie selbst so viel tödtlichen Gefahren unterworfen sind, so wird ihre Vermehrung nicht leicht wieder beträchtlich werden. Der Blindheit sind sie ausgesetzt, wie oben schon erwähnt worden ist. Ihre Feinde sind die Adler und Geyer; andere Raubthiere wagen sich nicht leicht in jene Höhe und Kälte. Wegen der Seltenheit und der Entfernung des Thiers aus dem gewöhnlichen Gesichtskreise der Beobachter, weiß man wenig oder nichts von ihm zu erzählen. Alles ist schon oben angeführt. In Seb. Mün-

stern

Sters Cosmographie von 1550 p. m. 497. sieht. Die Jäger lassen sich mit langen Seilen über die hohen Felsen hinab, wo sie wissen, daß das Thier zu betreten ist und es flucht nicht, sondern wartet ihrer. Es muß der Jäger hart an selbigen Felsen umher zu dem Thiere gehen, und gute Sorge haben, daß zwischen ihm und dem Felsen kein Durchsich von dem Thier erfassen wird; anders läuft es an den Jäger und stößt ihn herab. Sieht es aber nicht zwischen durch, so meynt es, es möge ihn nicht begreifen mit seinen Hörnern, kommt also um sein Leben, oder wird gefangen. Die Steinbocksjagd ist so gefährlich, ja noch gefährlicher, als die Gemsejagd. Sie wird am besten im August und September angestellt, Hunde kann man dabey nicht brauchen. Man schießt sie mit solchen langen Büchsen, wie die Gemse. Wenn sie der Jäger so in die Enge treibt, daß sie nicht ausweichen können, so rennen sie zuweilen mit solcher Gewalt auf ihn zu, daß er in den Abgrund stürzt. Das Wildpret des Steinbocks soll an Geschmack dem des Hirsches fast gleich, aber zähe und schwer zu verdauen seyn. Aus den Hörnern machen sich die Jäger und Hirten Trinkgeschirre. Für große Herren werden sie zierlich ausgeschnitten und mit Gold und Silber eingefaßt. Die Haut wird, rauch gegerbt, zu Kleiderfüttern gebraucht; weißgahr achtet man sie nicht viel, da sie sehr dünn seyn soll. Das Blut oder

der **Schweiß** wird in ihrem Vaterlande für ein schmerzstillendes Mittel gehalten. Außer daß das Wild dem Jäger zuweilen den Felsen herabstürzt, weiß man keine schädliche Eigenschaft von ihm zu erzählen.

Steinkrähe — *Corvus Graculus* — gehört mit dem Kollkraben in eine Ordnung und Gattung, als besondere Art, und heißt auch **Steinkrabe**, **Walbrabe**, **Feuerrabe**, **schwarzer Rabe**, **Alpenkräh**e, **Steinkräh**e und **Schweizerdohle**, **Steintulle**, **Steintahle**, **schwarzer Geist** mit feurigen Augen. Sie ist violett-schwarz mit einem langen, dünnen starkgebogenen rothen Schnabel, nebst rothen Füßen, und funfzehn Zoll lang. Indessen sind die Vögel dieser Art in der Farbe sehr verschieden, und es giebt sogar ganz weiße. Man sagt, die Jungen hätten schwarze Füße. Sie nährt sich von Insekten, Beeren und Getraide. Ihr Wohnort sind die südlich deutschen Berge und Alpen, aber im Herbst streicht sie im südlichen Deutschlande heerdenweise in den Ebenen umher. Sie macht ihr Nest in die Felsenritzen und das Weibchen legt 4 bis 5 aschgraulichweiße, dunkelbraungeflechte Eier.

Steinmarde — *Mustela Foina* — auch **Hauf** und **Dachmarde** genannt, gehört nach dem Linneischen Systeme unter die Raubthiere in die dritte Ordnung; nach dem Blumenbachschen in die sechste Ordnung, unter

unter die nagenen Thiere, und nach dem Pennantschen in der zweyten Ordnung unter die Raubthiere. Dieses Raubthier unterscheidet sich von den übrigen Arten seiner Gattung durch den dunkelbraunen Körper mit stark durchstreichendem röthlichem Aschgrau, und durch weiße Kehle, Unterhals und Brust. Alle die Thiere, welche zur Wieselgattung gehören, als Baum- und Steinmarder, großes und kleines Wiesel, Iltis und Frettchen, sind nicht bloß im Gebiß, sondern auch im ganzen äußern Ansehen einander auffallend ähnlich. Der Kopf des Steinmarders ist hinten rund und läuft nach der Schnauze kurz kegelförmig zu; die Schnauze ist spizig und die Nase ragt über die Lippe heraus; der Mund mit steifen schwarzen Bartharen besetzt; die bläulichen Augen liegen weit von einander näher nach der Schnauze als nach den Ohren zu; die Ohren sind kurz und zugerundet; der Hals hat fast gleiche Dicke mit Kopf und Leib; der Leib ist fast cylindrisch und gestreckt; die Läufe kurz, die Vorderfüße länger und breiter als die hintern, alle vier mit vielen Haaren dicht besetzt; die Klauen weiß, kurz, aber scharf; eine haarige Schwimnhaut bis fast zur Mitte der Sehnen; am Rande des Afters zwey eyrunde Drüschchen mit einer widrig bisamartig riechenden Feuchtigkeit; der Schwanz buschhaarig, besonders nach dem Ende zu, und gerade ausgestreckt; der Leib hat eine starke Grundwolle und die Sta-

chelhaare stehen nicht so gedrungen, wie bey andern Thieren. Die Größe ist wie eine mittelmäßige Rake, der Leib etwas über anderthalb Fuß lang; der Schwanz zehn und die Höhe acht Zoll; die Schwere 5 — 7 Pfund; die kurzen Kopfhaare sind röthlich- aschgrau; die Grundwolle des Rückens und der Seiten ist weißlich ins aschgraue sich ziehend, am Unterleibe hellaschgrau; die Stachelhaare im Grunde wie die Wolle, in der Mitte röthlich aschgrau, an der Spitze schwarzbraun oder schwärzlich; daher der Rücken röthlichgrau braun mit durchschimmernden Aschgrau aussieht; das Ende des Rückens, der Schwanz und die Läufe sind wollich schwarzbraun oder schwärzlich, weil hier die Stachelhaare dichter stehen und die Grundwolle nicht so durchscheint; Kehle und Vorderhals bis zur Hälfte der Brust weiß, zuweilen mit einem oder einigen röthlich aschgrauen Flecken; der Unterleib mehr braun als schwarz. Im Sommer ist die Farbe im allgemeinen heller, daher röthlichbraun, im Winter aber dunkler, mehr dunkelbraun. Das Weibchen ist schlanker, etwas niedriger und dunkelglänzender, und hat vier Säugwarzen am Bauche. Varietät. Der weiße Steinmarder. Er ist entweder ganz rein weiß, oder gelblich weiß, auch wohl graulichweiß. Erstere sollen sogar rothe Augen, wie die Kaninchen, haben. Diese würden sich aber wohl nicht selbst nähern können. Man muß sie also bloß im Neste entdeckt haben. List, Gewandtheit, Mun-

Munterkeit und Flüchtigkeit zeichnen diese Marder aus. Sie schlüpfen durch alle Löcher und springen (welches ein leichtes Gallopiren ist) in einer Nacht, ihres Raubes halber, weit herum. Ueber die schmälsten Stangen und Hölzer können sie gehen, an allen rauhen Gegenständen gerade herauf klettern, und über Flüsse und Teiche schwimmen. Wenn sie genöthigt sind von einer großen Anhöhe hinabzuspringen, so machen sie es, wie die Katzen, setzen auf den Bauch mit allen Vieren auf, schütteln sich dabey und laufen gewöhnlich unbeschädigt davon. Geruch und Gesicht sind ihre vorzüglichsten Sinneswerkzeuge. Die Electricität wirkt so sehr auf sie, daß sie bey einem Gewitter, wo sie häufig sind, am hellen Tage wie rasend auf dem Boden herumlaufen, und in dieser Verwirrung oft todt geschlagen werden. Wenn sie schlafen, so legen sie sich rund, wie die Hunde, zusammen, und bedecken ihre kostbaren Augen mit ihrem dicken Schwanz. Sie geben ein kurz abgebrochenes Geschrey und eine Art von Mauen von sich: Au, au! Jäck, jäck! Grausamkeit und Blutdurst machen ihren Hauptcharakter aus. Des Steinmarders Heymath sind die meisten Theile von Europa, sogar die wärmern Gegenden von Rußland, auch Persien. In Deutschland ist er gemein genug. Er liebt nahe an bewohnten Orten liegende Felsenklüfte, Steinrißn, Steinhäufen, und besonders alte Stadt-, Schloß-, Kirchen- und Thurmmauern, weitläufige gro-

ße, mit Winkeln und verborgenen Höhlen und Ecken versehene Häuser, Scheuern, Ställe, Heuböden u. s. w. Am Tage liegt er in seinen Schlupfwinkeln verborgen, und geht nur des Nachts aus. Er ist ein vorzüglicher Freund des Hausgeflügels, der jungen Gänse, der Enten, Hühner, Tauben und ihrer Eier, muß aber doch hauptsächlich mit wilden Vögeln und ihrer Brut, die in der Nähe der menschlichen Wohnungen sich aufhalten, mit Mäusen, Hamstern und großen und kleinen Mäusen vortrieb nehmen. Wenn er in ein Tauben- und Hühnerhaus kommt, so würgt er alles, beißt dem Geflügel die Köpfe ab und frist sie, saugt allen das Blut aus, und wenn er Zeit hat, so trägt er fort, was er fortbringen kann. Man hat ihn zur Zeit, wenn er Junge hat, und also viel Nahrungsmittel braucht, nach den Enten über einen großen Teich schwimmen, und die Jungen heraus holen sehen. Er frist auch als Leckerbissen Sauerkirschen, Herzkißchen, Pflaumen, und Vogelbeeren, ja ich habe ihn im letzten Winter von einem Razzenkopfsbirnbaume die Knospen abstreifen sehen; überhaupt habe ich in seinen Excrementen mehrmalen Knospen von Bäumen angetroffen. In Schnepfenthal hat Herr Bechstein einmal den Schlupfwinkel eines solchen Marders entdeckt, der, wie ein Hund, alle Fleischknochen unter den Fenstern im ganzen Dorfe zusammengetragen hatte. Im Februar regt sich der Begattungstrieb in diesen Raubthieren zuerst; er scheint

scheint aber an keine einmalige und bestimmte Jahreszeit gebunden zu seyn, da man in jedem Monate des Sommers junge Steinmarder antrifft. Im Februar sieht man die Männchen oft auf den Dachforsten, wie die Katzen, hintereinander herlaufen und durch Kämpfe und Schreien viel Lärm machen. Das Weibchen trägt neun Wochen und bringt im April drey, vier und nur höchst selten fünf Junge in einer Kluft auf Heu, Stroh, Lappen und Federn. Die Jungen sind vierzehn Tage blind. Man findet sie drey Monate im Neste, und sie sind weit über halbwüchsig, ehe sie auslaufen und sich selbst zu ernähren suchen. Im zweyten Jahre sind sie vollkommen ausgewachsen und nach zehn Monaten zur Fortpflanzung tüchtig. Es sind possierliche kurzweilige Thiere. Man kann sie so zahm, wie eine Katze, machen. Man erhält sie mit Milch, Brod und Fleisch. Um vor ihren Schaden sicher zu seyn, bricht man ihnen die Eckzähne aus. An den zahmen hat man bemerkt, daß sie Hanfsaamen und Honig vorzüglich gern fressen. An den Hunden haben sie große Verfolger; schade, daß ihnen diese nicht leicht beykommen können. In den Därmen trifft man Bandwürmer und Madenwürmer, und in den Nieren zuweilen Spulwürmer an. Man hat von ihm mehrere Jägerbeobachtungen: 1) Es ist zwar gegründet, daß der Marder das Haus verschont, wo er wohnt, und Hühner und Tauben in Ruhe läßt. Allein gar zu weitläufig darf die

Wohnung nicht seyn. Nicht zehn Schritte über meinem Hühnerhause hat mehrmalen ein Marder seine Jungen gehabt, und den Hühnern nichts gethan, auch nicht einmal die Eyer in dem Gebäude, das er bewohnte, geholt; allein ohngefähr funfzig Schritte davon, wo er über etliche Dächer gehen mußte, hat er mir mehrmalen das Taubenhaus ausgeplündert, und wenn ich auch alle Vorsicht angewendet hatte. 2) In jedem Hühner- und Taubenhause läßt er seinen bisamartigen Unrath zurück, und verursacht dadurch, daß die Bewohner sie nicht wieder besuchen, ehe man sie sehr sorgfältig gereinigt und ausgeräuchert hat. 3) Dieser Geruch wird für Hunde und Jäger sein Verräther, weil man dadurch seinen Aufenthalt auswitte, und ihm Fallen legen kann. 4) Es ist gewiß, daß dieser Unrath den Thieren, denen er nachstellt, zur Warnung dient, aber auch eben so gewiß, daß er ihm zum Wegweiser braucht, seine Gänge dadurch zu sichern. Sobald auf seinen Wegen, die er allenthalben damit bezeichnet, dieser Unrath weggenommen ist, so wird er anfangs stugig und vorsichtig, und wenn er Menschen oder Hunde daselbst wittert, so geht er gar nicht wieder dahin. Wenn er auf seinem Gange das auf der bedeckten Felle befestigte Ey entdeckt, so geht er das erstemal vorbey, legt aber seine Losung in die Nähe; findet er diese die folgende Nacht ungestört wieder, so geht er drauf, wo nicht, so verändert er hinfort seine Straße. 5) Im Winter geht er gewöhnlich von neun

neun bis zehn Uhr und von ein bis vier Uhr des Nachts auf seinen Raub aus. Die Spur ist von der Größe der Kagenspur, nur etwas größer, und die Tritte stehen je zwey und zwey, nur etwas schief, nebeneinander. Nur selten sieht man sie, wie die Hasenfährte, zwey einander gegenüber und zwey hinten schief nachgestellt stehen. Auf seinem Wegen, die gewöhnlich die nämlichen sind, stellt ihm der Jäger seine Zellerfalle, die von aller menschlichen Witterung sorgfältig gereinigt ist. Wenn man sie auf den Sprung stellen kann, so ist der Fang am sichersten. Man fängt ihn auch im Schwanenhalse, an welchem ein Ey befestigt wird, das er abziehen muß. Da er aber listiger als der Fuchs ist, so muß man sehr vorsichtig zu Werke gehen, und an den Abzug noch einen Schneller machen, wodurch das Eisen bey der geringsten Berührung abgezogen werden kann. Hierbey bedient man sich folgender bewährten Witterung: 1 Loth Hühnerfett, über gelinden Feuer in einem Löffel zerlassen; wenn es abgekühlt ist, ein halb Loth Anisöl, 8 Gran Ambra, 8 Gran Bisam, 8 Gran Bibergeil und 4 Gran Kampfer, was nöthig ist klein gemacht, hinzugehan. Der Herr Reichsgraf v. Mellin empfiehlt: ein halb Mäsel Gänsefett in einem neuen Ziegel zerlassen, wovon die Grieben, nebst kleingeschnittenen weißen Zwiebeln und klargeschnittenen Hühnerfleisch so lange gelinde mitbraten, bis die umgerührte Masse gelb wird; wenn diese kalt ist, rührt man einer Zuckererbsen

groß kleingestoßenen Kampfer darunter. Hiermit bestreicht man die Dielen hin und wieder, oder auch kleingeschnittenes Stroh oder Spänchen, bis an den Platz, wo die Eisen liegen. Diese Masse erhält sich in einer steinernen Büchse, mit einer Blase verbunden, etliche Jahre gut. Man schüttet alsdann an einen bequemen Platz einer handhoch Sand, damit das Eisen bedeckt werden kann; auf den Boden legt man ein Papierchen mit etwas Witterung bestrichen und ein Ey, das ebenfalls damit bestrichen ist, steckt man halb hinein. Der Marder wird das Ey gleich wegnehmen. Als dann nehme man einen Schwanenhals, befestige das Ey daran, und der Fang wird nicht fehlen. Schloß- und Gewerbe muß man aber mit Papier belegen, damit kein Sand dazwischen kommt. — Wenn man sie im Hause oder in einer Scheune spürt, so schickt man Jagdhunde hinein, läßt dabei trommeln und lermen, und erschießt sie, wenn sie auf das Dach, oder auf nahe stehende Bäume flüchten. Der Balg ist ein gutes Pelzwerk, und wird roh oder kastanienbraun gefärbt, auch schwarz gebeizt, zu Müssen, Mützen und Kleiderbesetzen angewendet. Er kommt häufig aus Schweden und Rußland. Das Fleisch wird in Deutschland als Unkraut weggeworfen. Der Roth wird als Räuchermittel zur Verfälschung des Rauchwerks und Bismuths gebraucht. Wer keine Tauben und Hühner hat, der kann sie als Mäuse- und Rattenvertilger in seinem Hause hegen; dadurch

durch nugen sie im Haushalte der Natur überhaupt. Freylich thun sie am Hausgeflügel und auch am Obstbau großen Schaden und in kultivirten Gegenden; wo man andere Mittel zur Vertilgung der Mäuse entdeckt hat, können sie nicht mehr auf unsre Duldung rechnen.

Steinschmäher — *Saxicola* Lath. und *Motacilla* Lin. — macht in der Ordnung der Singvögel die letzte Gattung aus, die sich von den übrigen unterscheidet durch einen Schnabel, der an der Wurzel breit ist, nach und nach pfriemenförmig zugespitzt und an der Spitze gekrümmt ist; durch die offenen und eprunden Nasenlöcher; durch eine an der Spitze gefaserte Zunge, und durch einen kurzen Schwanz. Die Vögel dieser Gattung machen den schicklichsten Uebergang zu den Fliegenfängern nach Gestalt und Lebensart. Sie nisten entweder auf bloßem Felde oder in Löchern und fressen bloß Insekten, und zwar Käferarten und Fliegen am liebsten. Bey uns kommen bloß drey Arten vor, als: 1) großer Steinschmäher oder Steinklatsche — *Sax. Oenanthe* — heißt auch Weißschwanz, Weißlehlchen, Steinschmäher, Steinbeißer, großer Steinpöcker, Steinklatsche, Steinklitsche, Steinschwäher, Weißlehlchen mit schwarzen Backen, gelbbüßtiger Vogel mit oberhalb weißen Schwänze, Weißbüzel, Grasmücke mit schwarzen Rücken,

Steinquäcker, gelbbüßtiger Fliegenschmäher, und Steinschnapperl, fahle Grasmücke, weißgeschwänzter Bachstelze und weißgeschwänzter Steinschmäher. Die Kennzeichen der Art sind: Die Stirn ist weiß; der Rücken grau; durch die Augen eine schwarze Binde; der Schwanz weiß mit schwarzem Ende. Von weiten hat er das Ansehen der weißen Bachstelze, ist aber kürzer und in der Brust stärker. In der Länge mißt er fünf Zoll, wovon der Schwanz ein und drey Viertel Zoll, und der Schnabel sieben Linien wegnimmt. Schnabel, Augenstern und Füße schwarz; die Füße einen Zoll hoch. Die Stirn und ein Streifen über den Augen weg ist weiß; von den Nasenlöchern läuft durch die Augen ein schwarzer Streifen, der zur schwarzen Wange wird; der ganze Oberleib ist hellaschgrau; Kehle, Gurgel und Oberbrust sind rothfarben; der übrige Unterleib ist weiß, an den Seiten und am After rostgelb angeflogen; die Flügel sind schwarz, die großen Deckfedern und hintern Schwungfedern mit röthlichen Spitzen; der Schwanz weiß, die Spitze schwarz. Das Weibchen ist auf dem Rücken rothgrau, und am Unterleibe dunkler, als das Männchen; auch sind die kleinern Deckfedern der Flügel röthlich kantirt, und die weiße Schwanzfarbe ist röthlich weiß. Die Jungen sehen vor dem ersten Mausern oben braun und rothfarben gefleckt, und unten roth.

rothgelb und schwarz punktirt aus. Nach dem ersten Mausern behalten auch die Männchen die röthlich graue Rückenfarbe des Weibchens noch. Es ist ein hurtig laufender und schnellfliegender Vogel, der sich im Herbst mit allen kleinen Vögeln, besonders den Nachstelzen, im Felde herumjagt und neckt. Er sitzt immer auf Steinen und Erdschollen. Seine Lockstimme ist *hit, hit*, und und *hittack tack!* Er singt auch einige Strophen. Man kennt ihn in ganz Europa, dem nördlichen Asien und auch in Afrika. Er hält sich allenthalben in steinigten Gegenden auf. Hier sitzt er auf allen Erhabenheiten, auf Grenzsteinen, Steinhäufen, auf einzelnen Erbköthen u. s. w. Man sieht ihn sehr selten auf Büschen oder Bäumen. Im September zieht er weg, und im April, wenn die Nachfröste nachlassen, kommt er wieder. Im Herbst ist er allenthalben auf dem Felde, besonders an Wegen, auf Rieden und den Brachäckern anzutreffen. Seine Nahrung besteht aus Käferarten und Fliegen, die sie alle auf der Erde laufend wegfangen. Im Herbst sind sie sehr fett. Ihr Nest, das sie gewöhnlich des Jahrs nur einmal bauen, steht in Steinbrüchen, Uferlöchern, Mautwurfslöchern u. dgl. Auswendig besteht es aus dürren Grashalmen, und inwendig aus Federn. Das Weibchen legt 5 bis 6 grünllich weiße Eier und brütet sie in Gesellschaft des Männchens in 14 Tagen aus. Die *W i e f e l n* vertilgen ihre

Brut oft; und Sperber und Baumfalken verfolgen die Alten. Sie sind scheu, und man muß sich an sie zu schleichen suchen, wenn man sie mit der Glinte erlegen will. In der Gegend, wo sie im Herbst in Menge herumfliegen, steckt man Stöcke in die Erde, behängt sie mit Spreukeln oder bestreut sie mit Leimrutben und jagt sie sachte dahin. Um Gäßburn in Suffer fängt man jährlich an 1840 Dugend in Haarschlingen, die unter einem langen aufgestellten Raseu gelegt werden. Sie laufen darunter als furchtsame Vögel, oder auch um Insecten zu suchen. Sie werden eingemacht und wie Ortolan in die Stadt verkauft. Ihr Fleisch hat einen angenehmen Geschmack; es ist so gut, wie Lerchenfleisch.

2) Braunkehliger Stein-
schmäker, oder Braunkehl-
chen, S. Rubetra: Kehle und
Brust fuchsrothlich; auf den Flü-
geln ein weißer Fleck; der Schwanz,
die beyden mittlern Federn aus-
genommen, an der Wurzel weiß;
am Ende dunkelbraun; über die
Augen ein weißer Streifen, 4
Zoll 10 Linien lang. Er va-
riirt in der Farbe nach Ge-
schlecht und Alter; denn a) das
Männchen ist am Oberleibe
schwärzlich oder schwarz, fein rost-
grau gefleckt, und an Kehle und
Brust schön fuchsroth; b) das
Weibchen aber oben schwarz-
oder dunkelbraun mit mehr röth-
lich grauen Flecken, und an der
Brust hellfuchsroth mit kleinen
runden schwarzbraunen Flecken.
c) Die Jungen sehen vor der

M

Mau-

Mauferung auf dem Rücken rostfarben und schwärzlich gefleckt; alle Federn mit weißer Einfassung, und am Unterleibe wie die Mutter, nur stärker gefleckt, aus. Das Männchen wird von Jahr zu Jahr am Oberleibe dunkler, an der Brust und Kehle fuchstrotzer, — und die weiße Farbe reiner. Dieser Vogel wählt sich zu seinem Wohnorte vorzüglich steinige Gegenden mit Gärten, Wiesen und Feldbüschen — wandert, und ist im Herbst häufig im Felde im Getraide und Kobl. Seine Nahrung ist wie beim Vorhergehenden. Man findet sein Nest im Grase, unter einem Busche oder Steine mit grünlichen Eiern; und er hat auch noch folgende Nahmen: schwarzbraunes Braunkehlchen, Krautvogel, Krautvögelchen, Koblvögelchen, brauner und bräunlicher Fliegenvogel, Todenvogel, Pfäffchen, Fliegenstecher, Röthling, Braunellert, Krautlerche, kleiner Steinschmäger, Steinflatsche, Nesselfink, Rasselink, Steinpatsche, Steenpicks, kleiner Steinpicks, Fliegenschmäpper, Gelbkehlchen, Gessettenschlager und Fliegenstrecklein. 3) Schwarzkehliger Steinschmäger, oder kleine Steinflatsche, S. Rubicola: Die Brust ist rostroth; auf den Flügeln ein weißer Fleck; der Schwanz schwarz, fein rostgelb gerändert — am Männchen die Kehle schwarz, am Weibchen weiß

und schwarz gefleckt, $4\frac{1}{2}$ Zoll lang. Auch diese Art variiert in der Farbe; denn die Jungen sehen am Oberleibe dunkelbraun und rostgelb gefleckt aus, auch zuweilen an der Brust aschfarben überlaufen. Er wählt seinen Wohnort auf Heiden und Tristen, in steinigen Gegenden; auch an erhabenen Flußufern — wandert weg, und die Nahrung wie die der Vorhergehenden. Man findet sein Nest unter einem Busche, Steine, oder Steinrigen mit 5 bis 6 blaugrauen Eiern; die etwas verloschen gelbroth gefleckt sind. Er hat auch nachstehende Nahmen: Steinpicks, Weißkehlchen, schwarzer Fliegenstecher mit weißem Halstringe, Steinschmäger, Schollenhüpfer; schwarz- und weißer Fliegenschmäpper, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Christöfl.

Steiffuß — Podiceps Lath. und Colymbus Linn. — gehört als besondere Gattung in die Ordnung der Schwimmvögel und zwar in die erste Abtheilung derselben, welche gespaltene Schwimmfüße und einem geraden, ungezähnten, und zugespitzten Schnabel haben. Diese Gattung unterscheidet sich durch einen geraden, an den Seiten etwas gedrückten, pfriemenförmigen, nach und nach zugespitzten Schnabel, durch sehr schmale Nasenlöcher am Grunde des Schnabels; durch einen gezähnten Rachen, durch eine etwas gespal-

tene

tene Zunge und durch Füße, die zusammengedrückt, an der Fußwurzel hinten doppelt gesägt, vierzehig mit gespaltenen Schwimmhaut und platten Nägeln sind; und durch einen Schwanz ohne deutliche Federn. Da bey diesen Vögeln die Füße zu weit hinten am Leibe sitzen, so können sie fast gar nicht gehen, aber desto besser schwimmen und tauchen. Wenn sie auf dem Lande sind, so stehen sie entweder ganz aufrecht, und laufen so mittelst schneller Schwingung ihrer Flügel, hurtig davon; oder sie kavern sich ganz an den Boden nieder, und nur Kopf und Hals sind in die Höhe gerichtet. 1) G e h ä u p t e r Steißfuß oder großer Haubentaucher *P. cristatus* Lath, und *Colymbus cristatus* Lin. — heißt auch Steißfuß schlechtweg, Taucher mit braungelben Riebißschöpfe, Taucher mit dem Schöpf, Meerhaase, Borch, Morike, großer gehaupter Taucher, großer Riebeltaucher, großer Arschfuß, großer Haubensteißfuß, Schlaghahn, Grebe, Merch, Straußtaucher, Meerachsen, gehörnter Seehahn, Seeteufel, Lorch, belappeter oder gehörnter Taucher, großkappiger Seehahn, Wock und Wocks. Die Kennzeichen der Art sind: Der schwärzliche Kopf hat Federohren; der Rücken ist schwarzbraun; der Unterleib silberweiß; die hintern Schwungfedern sind weiß. An Größe gleicht dieser

wegen seiner Kopffedern sehr ausgezeichnete Vogel einer Hausente, ist ein und zwanzig Zoll lang, wovon der Schnabel zwey und ein Viertel Zoll wegnimmt, sechs und zwanzig Zoll breit und zwey und ein halb Pfund schwer; die zusammengelegten Flügel berühren die Steißfedern. Der Schnabel ist gerade; etwas zusammengedrückt und scharf zugespitzt, oben schwarzbraun, an den Seiten und unten fleischfarben und gegen die Spitze weiß; die nackten Augen roth und der Augenstern corallenroth; die belapp- und geschilderten Füße von außen graubraun, von innen grünlich; die zusammengedrückte Fußwurzel zwey und ein Viertel Zoll hoch. Der Oberkopf ist schwärzlich, hinter dem Scheitel mit zwey Federohren, die rückwärts liegen, aber auch aufgerichtet werden können; von Kehle, Schlafen und Genick hängt ein Federkragen herab, der den obern Theil des Halses umgibt, und von der Wurzel an bis an die schwärzliche Spitze schön rostbraun ist; Hinterhals, Rücken, Steiß, Schulterfedern und Deckfedern der Flügel sind schwarzbraun; Augentreiß, Kehle, Vorderhals, Brust, Bauch und After glänzend silberweiß; die Seiten rostgrau, schwärzlich gemischt; die Seiten des Afters aschgrau; die vordern Schwungfedern dunkelbraun; die hintern so wie der Flügelrand weiß, einige der letztern weiß und schwarz, daher auf den Flügeln ein schiefer weißer Fleck entsteht. Das Weibchen hat kleinere Federohren und

der Federtragen am Halse ist kurz und halb weiß; an der Stirne stehen weißliche Flecken, eben so sind auf den Schultern und Deckfedern der Flügel röthliche Flecken und dergleichen Federspitzen. Vor dem zweyten Jahre erlangt dieser Vogel sein vollkommenes Gefieder nicht; daher die Varietäten, die man davon angiebt. Die Jungen sind in ihrer ersten Kleidung an den Seiten des Halses schwärzlich gestreift. Zu Ende des ersten Jahres sind Kopf und Hals ganz glatt und dunkelbraun, und der Unterhals ist dunkelbraun und rostfarben gewölkt. Zu Anfange des zweyten Jahres fangen die Kopffedern an aufzuschwellen; die Scheitelfedern verlängern sich nach und nach; Kehle und Wangen sind rostbraun, auch wohl etwas schwarz gefleckt und gestreift. Endlich erhält der Vogel sein oben beschriebenes vollkommenes Gefieder. In dem ersten Jahre ist auch der Schnabel schwärzlich und die Füße von außen aschgrau und von innen röthlich. Er ist ein sehr furchtsamer und scheuer Vogel, der sich sogleich, wenn er einen Menschen gewahr wird, zwey bis dreyhundert Schritte entfernt, es aber sehr genau weiß, wenn man ihn nicht mehr mit dem Gewehr erreichen kann, denn in dieser Entfernung geht er wieder sicher, obgleich noch behutsam genug, seinen Geschäften nach. Ob er gleich sehr schnell untertauchen kann, so bleibt er doch nicht so lange unter dem Wasser als die andern Taucher, vielleicht, daß

ihn die großen Hals- und Kopffedern im Schwimmen unter demselben hinderlich sind. Er giebt oft, und besonders, wenn er sich in Gefahr bemerkt, ein helles Geschrey von sich. Man sieht ihn selten am Ufer, und nie auf dem Lande, da er wegen der Lage und Gestalt seiner Füße nicht gut gehen kann. Das Vaterland dieses Vogels ist Europa und das nördliche Asien. Er hält sich an den Meeresufern und vorzüglich in den schilfreichen Landseen auf. In Deutschland ist er auf den Seen gemein. Im Oktober geht er als Zugvogel weg, und ich habe ihn alsdann immer nur einzeln auf den Teichen und Flüssen angetroffen. Im März kehrt er wieder in seine Heymath zurück. Seine Nahrung besteht in kleinen Fischen, Wasserinsekten, Wasserkrautern und ihrem Saamen, und vielleicht auch in den Eiern und Jungen, der im Schilf nistenden kleinen Vögel, da ich mehrmalen Vogelfedern in seinem Magen gesehen habe. Die Alten pflanzen sich des Jahres zweymal fort. Das Nest, welches eine Unterlage von Schilfstoppeln und selbst abgebrochenen Schilfstengeln hat, besteht aus zusammengetragenen Wasserpflanzen, Saum, Seeblumen, Hottoinen u. s. w., ist vom Wasser durchdrungen und schwimmt gewöhnlich; ja die Eier scheinen, wie bey allen Vögeln dieser Gattung, zum Ausbrüten Wasser nöthig zu haben. Die Eier, deren das Weibchen gewöhnlich drey bis vier legt, sind weiß, und den großen

großen Taubeneyern gleich. Wenn es hundert und funfzig Schritte weit von dem Neste einen Rahn mit Menschen bemerkt, so steigt es schon von den Eiern auf, bedeckt sie mit den Materialien des Nestes, schwimmt in die See, und geht nicht eher wieder drüber, als bis die Gefahr erst etliche hundert Schritte weit entfernt ist, alsdann schwimmt es wieder mit der größten Geschwindigkeit hin. Auch benachrichtigt es das Männchen, das immer in der Nähe des Nestes sich aufhält, durch ein lautes ängstliches Geschrey, wenn es die Gefahr etwa nicht selbst bald genug gewahr werden sollte. Es brütet drey Wochen, und die haarigen Jungen, deren es aber gewöhnlich nur zwey ausbringt, schwimmen sogleich, nachdem sie ausgekrochen sind, mit ihm auf das Wasser nahe an dem Schilf und in demselben herum, damit sie sich sogleich, wenn es nöthig ist, verstecken können. Wenn es Sturm giebt, so nimmt sie das Weibchen auf den Rücken, und schwimmt mit ihnen an einen sichern Ort. Die Eier werden häufig von den Rabenkrähen weggetragen; und es giebt dann Kriege zwischen dem brütenden Weibchen und der Rabenkrähe; allein letztere siegt gewöhnlich, und dann ist es um die ganze Brut geschehen, indem sie ein Ey nach dem andern holt. Mehrere Raubvögel, als die Milane und Sumpfwrenhe verfolgen die Jungen. Die Alten sind gewöhnlich wegen ihrer Schnelligkeit im Untertauchen ge-

sichert. Man hintererschleicht sie zum Schießen, muß aber wegen des schnellen Untertauchens vorhalten oder einen Schirm vor der Pflanne haben. Am besten lassen sie sich im Fluge schießen, wenn man sie aufjagen kann. Man steckt ihnen auch unter dem Wasser versteckte Garne in ausgeschnittene Schilfgänge, durch die man sie oft schwimmen sieht. Obgleich das Fleisch von manchen Personen gegessen wird, so hat es doch einen thranigen, unangenehmen Fischgeschmack. Die dicke, feste, glänzende Bauchhaut wurde sonst zu kostbaren Damen-Müffen, Besetzungen der Kleider u. s. w. verarbeitet. Auch zum Ausstopfen sind es vortrefliche Federn. Ihr Schaden, den sie an der Fischzucht thun, ist ganz unbeträchtlich, desto wichtiger ihr Nutzen durch Vertilgung mehrerer plagenden Wasserinsecten und der Sämereyen des Wasserunkrautes. 2) Kleiner Steißfuß oder kleiner Taucher, *P. minor* — heißt auch Ducken, schwarzhlicher Taucher, gemeines Taucherchen, Tauchentchen, Käferentchen, Flugtaucher, Zwerchtaucher, Sumpftaucher, Lounain, Doufker und Ducker. Die Kennzeichen der Art sind: Der Kopf ist glatt; der Oberleib schwarzgrau; der Bauch aschgrau; am Männchen Wangen und Kehle rothbraun; am Weibchen gelblichgrau. Er hat kaum die Größe einer Taube, ist zehn Zoll lang, wovon der Schwanz fast einen Zoll mißt,

mist, und ein Fuß vier Zoll breit; die Flügel legen sich am Streife zusammen. Der Schnabel ist gerade, zusammengebrückt, spizig und dunkelbraun; der Augenstern röthlich nussbraun; die Füße schwärzlich ins olivengrüne übergehend; die gedruckte Fußwurzel ein und einen Viertel Zoll hoch. Der Kopf, der übrige Oberleib, die Deckfedern der Flügel und die Brust ist schwarz ins Graue schimmernd, am Unterhals ins schmutzig Rothbraune übergehend; die Wangen, Schlaffe und die Kehle hoch rothbraun; der Bauch schmutzig aschgrau; die Schwungfedern aschgrau, die hintern auf der inwendigen Fahne weiß; die innern Deckfedern der Flügel auch weiß. Alle Federn sind außer den Schwungfedern haar- oder wollenartig. Das Weibchen ist merklich verschieden; am Oberleibe dunkelbraun; an den Wangen und der Kehle gelblichgrau, und der aschgraue Bauch zuweilen gelblich überlaufen. Nach dem Alter giebt es mancherley Varietäten. Die Jungen sehen bis zum ersten Mausern am Oberleibe graubraun, am Unterleibe aber schmutzig weiß oder grau aus. Im zweyten Jahre ist der Untertheil des Oberleibes rothbraun überlaufen, am Vorderhalse gelblichgrau, und an der Brust aschgrau mit rostroth gesprenkelt, so wie an den Seiten. Es ist ein äußerst scheuer Vogel, der, ob er gleich oft in der Nähe der Menschen wohnt, doch selten sichtbar ist, so schnell taucht er unter, oder verbirgt sich in

Schilf oder Gebüsch, wenn er einen Menschen gewahrt wird. Er taucht unter allen seinen Gattungsverwandten am geschicktesten, und bleibt sehr lange unter dem Wasser, wenn man ihn an dieser Seite des Teiches untertauchen sieht, so kommt er gewöhnlich auf der entgegengesetzten wieder zum Vorschein, und schwimmt daher schnell unter dem Wasser weg. Zur Paarungszeit locken sich Männchen und Weibchen durch die heellen Töne: I! I! Ihr Flug ist niedrig und muß ihnen schwer werden, da sie im Sommer nicht von einem Teiche zum andern gehen, ob gleich oft nur ein schmales Ufer dazwischen ist. Im Sommer ist man daher nicht im Stande, sie aufzujagen. Man trifft ihn in ganz Europa, im nördlichen Amerika und auf den Philippinischen Inseln an. Unter allen Streiffüßern ist er der gemeinste, denn man findet ihn nicht bloß auf Seen, sondern auch, und vorzüglich, auf den Teichen. Es sind gewöhnlich Zugvögel; allein in Thüringen habe ich sie auch in gelinden Wintern an den Einflüssen der Teiche, und wo warme Quellen sind, mehrmalen angetroffen. Vorzüglich häufig habe ich sie auf den Waldteichen gefunden. Seine Nahrung besteht aus nichts als Wasserkäfern und andern Wasserinsekten, Gras, Samenteyen und Kräutern, sowie aus weißen Quarkkörnern. Sie fressen also wohl keine Fische. Das Nest ist ein großer Klumpen Wasserflachs und anderer Wasserkräuter, die sie zu-

zusammentreiben, in die Höhe wölben, und an einen Zweig oder an Schilf befestigen. Das Weibchen legt gewöhnlich vier schmutzig blaßgelbe Eyer, die durch das Abfärben der Wasserkräuter, auf welchen sie immer naß und feucht liegen, mit dunkelbraunen Flecken beschmuckt zu seyn scheinen. Das Weibchen brütet sie in drey Wochen aus, und belegt sie allezeit mit den Nestkräutern, wenn sie von Menschen oder Thieren aufzusteigen gezwungen wird. Man wird sie daher nicht leicht gewahr, und hält das ganze Nest für einen Klumpen zusammengetriebener Wasserkräuter. Man findet auch das Nest in unter den Wasser stehenden Entenhäuschen, wo sie sich dann gegen die größte Ente zu vertheidigen wissen. Die Jungen können mit den Händen gefangen werden. Man kann die großen Bassins damit besetzen, wenn man ihnen die Flügel beschneidet. Er hat eben die Feinde und die verschiedenen Arten des Fanges, und der Erlegung wie der vorige. Wenn man den ganzen Vogel von der Haut entblößt, so läßt er sich essen; sonst hat er einen thranigen Geschmack. Die Federn sind zum Ausstopfen zu gebrauchen. Sie vertilgen viele schädliche Insekten und Sämereyen der Wasserunkräuter. 3) Graukehliger Steißfuß, *P. subcristatus*, Lath. unterscheidet sich durch einen auf beyden Seiten des Kopfes über die Ohren herabhängenden abgestuften schwarzer Federbüschel; die Kehle ist

grau, und der Körper 17 Zoll lang. Auch er variirt in der Farbe nach dem Alter; denn an den Jungen ist die Kehle weiß, und die Schläfe und Wangen sind weiß, mit einigen schwarzen Längsstreifen, und die rothbraune Halsfarbe mit Dunkelbraun vermischt. Er wählt sich zum Wohnorte die Seen und großen Teiche Deutschlands, die Geröhrig haben; auf dem Zuge im Herbst ist er auch auf allen schilfigen Teichen. Seine Nahrung ist wie bey dem gehäubten Steißfuße. Das Nest besteht aus einem Klumpen Wasserpflanzen über dem Wasser mit 3 bis 5 grünlichweißen braun beschmuckten Eeyern. Man giebt ihm auch die Rahmen: Graukehliger Haubentaucher, Kastanienhälsiger Taucher mit schwarzer Wirbelplatte und kurz abgestuften Schopfe und kurzschopfiger Taucher. 4) Dören-Steißfuß s. oben. 5) Dunkelbrauner Steißfuß, *P. obscurus*: Der Schnabel faßt wie am Dören-Steißfuße in die Höhe gezogen; der Kopf glatt; der Mittelhals aschgrau; Wangen, Kehle, Bauch und zweite Ordnung der Schwungfedern weiß; der Unterhals am Männchen rostfarben, 12 Zoll lang. Er variirt in der Farbe, wie die vorigen: denn das Weibchen hat nichts rostrothes am Halse. Die Jungen von der ersten Mauser sind, wie fast alle Steißfußarten, die ihr volles Gefieder noch nicht haben, am Oberleibe schwarz, mit durch die Wolle schwach rostfarbenen Längsstreifen.

fen am Halse und auf dem Rücken. Sein Wohnort sind die schilfreichen Seen und Teiche — geht im Spätherbste weg. Die Nahrung ist wie beim Ohrensteißfuß. Das Nest schwimmt, an Schilf oder Sträuchern befestigt, mit 3 bis 4 grünlich weißen, durch die Nestpflanzen beschmutzten, Eiern. Dieser Vogel führt auch die Namen: Dunkelbrauner, schwarzbrauner, und rothhälsiger Taucher, dunkelbrauner Steißfuß, schwarz und weißer Taucher, Rothhäls.

Stellen heißt 1) das Aufstellen der Netze zur Jagd oder zum Vorfange, 2) bei der Schweinsjagd, wenn die Hunde ein Schwein vorbellten, und nicht fortlassen.

Stellflügel s. Flügel No. 2.

Stellgräbchen ist beim Vogelheerde ein flaches, schmales, in die Erde gemachtes Gräbchen, wovon man die Stellstäbe legt.

Stellstab heißt, beim Vorfange, ein Stock, der ein aufgerichtes Garn leitet, wenn die Vögel mit der Wand gefangen werden sollen.

Stellstangen s. Forkeln.

Stichel ist ein, von einem runden Stücke Holz gemachter, und unten mit einer eisernen Spitze beschlagener Pflock, den man braucht, um beim Stellen der Netze, die Löcher in die Erde zu machen.

Stieglitz gehört unter die Gattung Finken.

Stöber, Stöberer, Stöberhund ist ein Hund, den man zum Suchen und Aufjagen allerley kleinen Wildprets braucht. Man nimmt gewöhnlich Bastarte von einem Hühner, und Dachshunde dazu. Man muß ihn gewöhnen, nicht weit, sondern kurz vor dem Jäger, zu revieren, doch muß solches nicht mit zu großer Strenge geschehen, weil sie sonst launisch werden, gar nicht mehr suchen, sondern hinter dem Jäger her schleichen.

Storch — Ciconia — macht in der Ordnung der Sumpfvögel eine besondere Gattung mit folgenden Kennzeichen aus: der Schnabel ist gerade, zusammengebrückt, glatt, ungesurrt, spitzig, lang, und weit größer als an den Reiher. Die Zunge ist ein kleiner, im Schlunde liegender, Knorpel. Der Hals ist kürzer, gegen die Brust allmählich dicker, als an den Reiher. Die Füße sind lang, mit kurzen Zehen, die alle an der Wurzel mit einer kleinen Haut verbunden, und deren stumpfe Nägel glattrandig sind. Die Nahrung besteht meist aus Amphibien; sie sitzen auf Gebäuden und Bäumen. Bei uns kommen folgende Arten vor: 1) Weißer Storch, C. alba: Storch, gemeiner und bunter Storch, Stork, Aebbar, Ebeher, Ebiger, Odeboer, Hennoter, Ebinger, Kelzbähr, Klapperstorch, Langbein,

bein, Klapperstork, Langbein und Klapperbein. Die Kennzeichen der Art sind: Der Leib ist weiß; Schwung- und Schulterfedern sind schwarz; Schnabel, Füße und Haut blutroth. Er ist drey und einen halben Fuß lang und sechs und ein Viertel Fuß breit; der Schnabel ist fast sieben und einen halben Zoll lang, so wie der Schwanz; die gefalteten Flügel reichen bis auf die Schwanzspitze und das Gewicht ist 4 Pfund. Der Schnabel ist gerade, vorn zugespitzt und blutroth; die weite Kinnhaut, so wie die nackten Augenkreise, schwarz; der Augenstern rußbraun; die Füße wie der Schnabel roth; die neßförmige Fußwurzel fast eilf Zoll hoch. Der ganze Leib schneeweiß, außer daß die Schwungfedern, einige von den langen Schulterfedern und von den größeren Deckfedern der Flügel schwarz sind, so daß bey zusammengelegten Flügeln der ganze Hintertheil des Oberleibes schwarz zu seyn scheint; die schwarze Farbe ist purpurglänzend und von den hintern Schwungfedern ist die äußere Fahne aschgrau überpudert; der Vorderhals hat nach der Brust zu schöne lange schwankende Federn. Das Weibchen ist fast gar nicht vom Männchen verschieden; außer daß es etwas kleiner scheint, und einen etwas dünneren Schnabel hat. Die weißen Störche zeigen in ihrem Gange und Fluge einen gewissen Anstand; sie spazieren gravitatisch auf den Wiesen herum, und beschreiben in der Luft sehr

schöne Bogen in einem schwimmenden Fluge. Wenn sie schlafen, so ziehen sie ein Bein an sich. Durch ein starkes Zusammenschlagen der Kinnladen können sie eine Art von Klappern hervorbringen, wodurch sie ihre Affekten zu erkennen geben. Sie sind sehr reinlich. Sie lassen sich leicht zähmen und gehen dann auf dem Hofe unter anderm Gervieh herum; nur müssen sie alsdann hinlängliches Futter bekommen, sonst vergreifen sie sich an den jungen Hühnern. Der Storch bewohnt wechselsweise verschiedene Länder der alten Welt, scheut aber die äußerste Kälte, so wie die äußerste Hitze, und er geht kaum unter den funfzigsten Grad hinauf. In Deutschland ist er allenthalben, wo Sümpfe in der Nähe sind, des Sommers gemein. Er gehört unter die halben Hausvögel, da er sein Nest auf die Gebäude in Städten und Dörfern bauet. Gewöhnlich kommt er in der Mitte des März von seinen Winterwanderungen zurück, doch geschieht dieses auch früher, wenn die Witterung gelinde ist. Das Männchen kommt gewöhnlich allein, und holt alsdann nach etlichen Tagen, auch wohl nach vierzehn Tagen, erst sein Weibchen nach. In der ersten Hälfte des Augusts ziehen diese Vögel schaarenweise schon wieder in wärmere Gegenden, nach Aegypten u. s. w. Die verschiedenen Familien einer Gegend versammeln sich dann auf einer Wiese. Hier fällt auch das berühmteste Blutgericht der Störche vor,

vor, von welchem nur so viel gegründet zu seyn scheint, daß sie bey der Versammlung zum Weggzuge diejenigen tödten, welche unfähig sind, die Reise mit zu machen. Bey genauer Untersuchung bemerkt man auch bey den auf diese Art getödteten Fehler an den Flügeln. Daher auch vermuthlich das Verfolgen der Gezähmten. Sie gehen bey ihren Zügen sehr hoch in die Luft. Man bemerkt wenig Züge, die ausruhen. Geschieht es, so setzen sie sich des Nachts gern auf ein erhöhtes Schloßdach, und auf die einzelnen Bäume an Bergen. Des andern Morgens ziehen sie schon wieder hoch in der Luft weg, und es scheint, als wenn sie auf ihren Reisen, die freylich nicht lange dauern können, gar keine Nahrung zu sich nähmen. Zur Zeit des Wegziehens werden auch die gezähmten Störche unruhig, und versuchen wegzufiegen. Daß sie in ihren Winterquartieren, z. B. in Aegypten eine zweyte Brut verrichten sollten, ist unwahrscheinlich. Seine Nahrung besteht vorzüglich in Amphibien, Fröschen, Eydecksen, Blindschleichen, Ringelnattern, in Maulwürfen, Feldmäusen, kleinen Wiesel, in Fischen, Krebsen, Schnecken, Käfern, Heuschrecken, Regenwürmern, Bienen und Hummeln, in jungen Vögeln und Vogeleiern, die ihnen aufstoßen. Diese Thiere spießen sie erst allemal mit dem spitzigen Schnabel todt, dann verschlucken sie dieselben ganz. Wahrscheinlich zur Beförderung der Verdauung findet man Stein-

chen, Kirschkerne, auch wohl Glasstückchen u. s. w. im Magen. Sie laufen außerordentlich viel, und spritzen ihren weissen Urath zwischen den Beinen nieder. Die gezähmten nehmen mit den Eingeweiden von Thieren und Geflügel aus der Küche, mit gekochtem und rohem Fleische vorlieb. Alte Störche bessern nur bey ihrer Ankunft ihr großes, aus Dornen und Reifern bestehendes und mit Rasen, Binsen und Schilf ausgefülltes Nest, das auf dem Forste eines Daches, am liebsten auf einem ungebrauchten Schornsteine steht, wieder aus, legen drey bis fünf schmutzig gelblichweiße Eyer, von der Größe der Gänseeyer, und brüten sie in drey Wochen und etlichen Tagen aus. Die Jungen aber müssen ein eigenes Nest bauen, aber nie auf dem nämlichen Hause. Da man diesen Vögeln eine allgemeine Schonung angedeihen läßt, und sie gern sieht, so legt man ihnen zum bequemern Bauen alte Kutschräder, oder einen Verschlag oder eine geflochtene Unterlage auf das Dach. Die Jungen, welche fast vierzehn Tage wollig sind, werden anfangs mit Strüßchen Amphibien, Regenwürmern und Schnecken genährt, alsdann aber tragen ihnen die Eltern, wovon gewöhnlich eins auf dem Neste wartet, bis das andere wieder ankömmt, in der Schlundhaut Frösche, und einen lebendigen Maulwurf oder eine Maus vor, mit welchen die Jungen spielen, und sie auch zuweilen herabfallen lassen. Sind fünf Junge

Zunge im Neste, so wird gewöhnlich das Jüngste von den übrigen herausgestoßen, und wenn man es auch wieder hinein trägt, so nehmen es die Alten nicht wieder an, sondern stoßen oder tragen es alsdenn selbst heraus. Daher sagt der abergläubische Landmann: der Storch müsse alle Jahre ein Junges oder ein Ez zinsen. Bis zum ersten Mausern sehen die Jungen graulich weiß aus mit grauem Schnabel und Füßen. Ragen, Milanen, Habichte und Wandraufvallen verfolgen die Brut im Neste. Auf dem Leibe haufen gelbe und weiße Milben und die Storchlaus, und innerlich Zwirn- und Madenwürmer. Da sie fast allenthalben eine allgemeine Schonung genießen, welche theils in der Vertilgung mancher schädlichen Thiere, theils aber und vorzüglich in mehreren abergläubischen Meynungen ihren Grund hat, so sind sie, da sie wenig scheu sind, leicht zu schießen, und mit Schlingen und Angelhaken, an welchen man den Frosch als Köder macht, leicht zu fangen. Der Nutzen und Schaden ergiebt sich aus ihrer Nahrung, da sie wenigstens bey uns, wegen ihres schlechten, ranzig-schmeckenden, zähen Fleisches nicht gegessen werden. Durch Vertilgung mehrerer, wenn auch nicht schädlicher, doch für die mehresten Menschen unangenehmer Amphibien, durch Verminderung der Mäuse, Wiesel, Maulwürfe, Heuschrecken u. s. w. werden sie nützlich, und ha-

ben deshalb an vielen Orten Schutz. In alten Zeiten waren sie von den *Thessaliern* so geehrt, daß wenn einer diese Vögel tödtete, er mit dem Leben bezahlen mußte. Freylich nehmen sie auch manches Vogelnest aus, und beißen ganze Hände voll Bienen von den Blumen ab. Der Aberglaube sagt, daß man unglücklich sey, und Feuersbrunst zu befürchten habe, wenn man einen tödtet oder sein Nest zerstöhre. Eben so, wenn er von einem Hause weggiehe, oder gar die Materialien des Nestes wegtrage. Die Jägersprache ist hier sowohl als bey den übrigen Sumpfvögeln, wie bey dem gemeinen Reiher. 2) Schwarzer Storch — *C. nigra* — heißt auch blauer Storch und schwarzer Reiher, kleiner oder wilder Storch, und Aist. Die Kennzeichen der Art sind: Er ist schwarz oder schwärzlich mit verschiedenem Glanze; Unterbrust und Bauch sind weiß. Gestalt und Stellung hat er wie der weiße Storch, nur ist er etwas kleiner; die Länge ist drey Fuß; die Breite fast sechs Fuß; der Schnabel ist fünf und einen halben Zoll lang, und der Schwanz neun Zoll; die Flügel reichen bis zwey Drittheile auf letztern. Der Schnabel scheint noch stärker als am vorübergehenden zu seyn, ist zusammengedrückt, scharf zugespitzt, von Farbe hochroth; der Augenstern dunkelbraun; die Zügel, ein nackter Kreis um die Augen und die ganze Haut hochroth; die Füße dunkelroth; die

flachen

flachen Nägel hornbraun; die neßförmige Fußwurzel neun Zoll hoch. Doch haben sie die rothe Farbe an dem Schnabel und den Füßen nur im Alter, etwa vom dritten Jahre an; denn in der Jugend ist ihr Schnabel schmutzig olivengrau, an der Spitze weiß, und die rothen Beine sind entweder ebenfalls olivengrün, oder, wenn sie auch roth sind, mit Grün überlaufen. Der Kopf, Hals, die sehr langen, schmalen Schulterfedern, der Rücken, die Deckfedern der Flügel, die Schwungfedern, die mittelmäßigen obern Deckfedern des Schwanzes, und der zugerundete Schwanz sind schwarz oder braunschwarzlich; die Flügel und der zugerundete Schwanz mit violettem und grünem Glanze, die übrigen Theile aber blauglänzend; die Kehle und der Hals, der nach der Brust zu mit langen, obgleich mehr abgerundeten Federn versehen ist, als am weißen Storch, zuweilen mit gelblichweißen Flecken; die Brust, der Bauch und die langen untern Deckfedern des Schwanzes weiß. Vor dem dritten Jahre sind Kopf und Hals oben und unten rußbraun, rostgelb gewölkt. Das Weibchen ist etwas kleiner, nicht so dunkel, als das Männchen, und also schwarzbraun, besonders am Kopfe und Halse heller, und an dem Vorderhalse grau gewölkt, übrigens mit olivenfarbenem Schimmer. Varietäten: Der schwarze Storch mit weißem Schwanz. Die vier mittlern Schwanzfedern sind weiß. In seinen Sitten gleicht er dem

weißen Storch, nur scheut er die Gesellschaft der Menschen. Man trifft ihn in mehreren Gegenden von Europa und dem nördlichen Asien an, und er geht höher nach Norden hinauf, als der weiße. In Deutschland ist er allenthalben, wo große, besonders ebene Waldungen sind, in deren Nähe sich Sümpfe und Seen befinden, einzeln anzutreffen. Er kommt zu Anfang des Aprils an, und geht im August nach wärmern Gegenden. Längs dem Don hin soll er sehr häufig seyn. Seine Nahrung machen Frösche, Schlangen, Käfer und andere Insekten, Würmer und Fische aus. Nach letztern soll er nicht bloß ins Wasser waden, sondern auch über demselben herumflattern und plötzlich untertauchen, wenn er einen gewahr wird. Auch Wald- und Feldmäuse hintersteht er. In tiefen Wäldern baut er sein Nest auf die Bäume. Er legt zwey schmutzigweiße mehr abgerundete und etwas kleinere Eier, als der weiße Storch. Bäume sind es auch, wo er sich gewöhnlich niederläßt, austruht und schläft. Die Jungen lassen sich mit Fleische, Fröschen und Fischen eben so aufziehen, wie die weißen. Sie sind im ersten Jahre fahl, im andern braun, und je älter sie werden, desto mehr fällt die weißbraune Farbe ins schwarze und wird glänzend. Mehrere Raubvögel verfolgen die Brut. Sie sind scheuer, als die weißen Störche, und daher auch nicht so leicht zu schießen. Der Nutzen und Schaden ergiebt sich aus der

Nah:

Nahrung. Das Fleisch wird zwar hin und wieder gegessen, ist aber unschmackhaft und schwer zu verdauen. Mit der rothen Fußhaut überziehen die Bargaussischen Cosaken, die Messerscheiden. Den alten Römern ward der Vogel heilig, weil sie glaubten, er verfolge die Schlangen noch mehr, als der weiße.

Stoßgarne nennen manche auch die Klebgarne.

Stoßvogel, Stößer nennt man alle Arten von Raubvögeln, die mit Gewalt aus der Luft auf ihre Beute herabstoßen; hiezu gehören alle Arten von Habichten, Falken, Geyern, Sperbern ic.

Strandläufer — *Tringa* — macht in der Ordnung der Sumpfvögel eine weitläufige Gattung aus, die sich von den übrigen durch folgende Kennzeichen unterscheidet: Der Schnabel ist rundlich, gerade, dünn, vorne allmählig zugespitzt, mit dem Kopfe von ziemlich gleicher Länge, etwas kürzer oder länger; die Nasenlöcher sind klein und reifenförmig; die Zunge ist dünn und schmal; und die Füße haben entweder getrennte oder nur an der Wurzel mit einer kleinen Haut verbundene Zehen, woran die hintere höher sitzt, eingliedrig und von der Erde entfernt ist. Diese Vögel halten sich, wie die meisten Vögel aus der Gattung der Wasserläufer, an den Ufern von Gewässern und in sumpfigen Gegenden auf, und nähren

sich daselbst hauptsächlich von Insekten. Bey uns kommen nur nachstehende Arten vor: 1) Kampfpfender Strandläufer oder Kampfhahn s. oben. 2) Gemeiner Strandläufer, oder Sandpfeifer, gemeiner Sandläufer, Fisterlein, graues Wasserhuhn, Pfisterlein, Wasser-Strand- und Haarschnepfe, Strandläuferlein, Wasserbecassine, und kleine Myrstickel — *Tr. Hypoleucos*. — Die Kennzeichen der Art sind: Der Oberleib ist tiefbraun mit schwarzen und rostgelben Wellenlinien; der Unterleib weiß; der Schnabel dunkel und glatt; die Füße grünlich. Er ist etwas größer als eine Feldlerche, sieben Zoll lang, wovon der Schwanz ein und drey Viertel Zoll wegnimmt; die Breite der Flügel drey Zoll, und diese legen sich bis auf zwey Drittheile des Schwanzes zusammen. Das Gewicht ist zwey Unzen. Der Schnabel ist fast einen Zoll lang, dunkelbraun oder schwarzgrau, schmal, gerade, spizig, an der Spitze etwas übergekrümmt; der Augenstern rußbraun; die geschilderten Beine zehn Linien hoch und so wie die Zehen; deren äußerer und mittlerer durch eine kleine Haut verbunden sind, blaß bläulichgrün. Der Leib ist oben graubraun oder tiefbraun, auf dem Rücken, den Schultern, den Deckfedern der Flügel und den mittelmäßigen Deckfedern des Schwanzes glänzend seidenartig, am Rande der Federn erst mit einer schwärzlichen

chen und an der Spitze mit einer rostgelben Binde, die auf den Deckfedern der Flügel am deutlichsten sind, geziert; die Kopf- und Halsfedern sind mit weißlichen Rändern besetzt; daher auch diese Theile heller scheinen; der ganze Oberleib ist so dicht mit Federn und zwar kleinern Federn so besetzt, daß nicht nur diese Theile dicker erscheinen, sondern auch dicht mit schwärzlichen und rostgelben Wellenlinien bedeckt sind; vom obern Schnabelwinkel über die Augen weg läuft ein weißlicher Strich; die Augenlider sind weiß; der ganze Unterleib ist weiß, doch fällt die Kehle und der Hals ins Weißgraue, und an den obern Theilen der Brust ziehen sich die tiefbraunen Halsfedern herein und bilden hier zwey verglichen Flecken, so daß nur in der Mitte ein weißer Längsstreifen bleibt; die mittelmäßigen untern Deckfedern des Schwanzes sind schneeweiß; die Schwungfedern sehr dunkelbraun, die erste ohne Flecken, die übrigen bis auf die vier letzten längern Schulterfedern haben alle auf der inwendigen Fahne in der Mitte einen großen weißen Fleck; diese letztern aber sind tief braun und haben einen schwärzlich und rostbraungetüpfelten Rand, die mittlern sind mit weißen Spitzen versehen; die Deckfedern der ersten Ordnung sind weißgesteckt, und die großen tiefbraunen Deckfedern haben weiße Spitzen; der Schwanz ist zugespitzt, etwas keilförmig, weil die äußern Federn kürzer sind; die bey äußern Federn weiß mit dun-

kelbraunen Binden, die vierte läßt diese Binden ins Graue verlaufen und hat nur eine weiße Spitze, die viel mittlern endlich sind ganz dunkelbraun mit röthlicher und schwärzlicher Kante, wie getüpfelt; die untern Deckfedern der Flügel dunkelashgrau weiß gesteckt. Das Weibchen ist etwas größer, als das Männchen, mit einem hellern Schnabel, einem hellern Oberleibe und mit undeutlicher Zeichnung des Rückens und der Deckfedern der Flügel. Es sind gesellige Vögel, die in Herden zu zwanzig und mehreren auf ihren Reisen angetroffen werden. Sie sind außerordentlich scheu, und sobald sie aufstiegen, so schreyen sie unaufhörlich Hi dü! und zwar trillerartig. Zuweilen steigt einer von denselben sehr hoch in die Luft, - ruft etlichemal Hi, Gö, Gö gö! macht einige halbkreisförmige Schwenkungen, und stürzt sich wiederum wie ein Pfeil gerade herab zu der übrigen Heerde. Da dieß auf ihren Wanderungen geschieht, so erkundigt sich dieser vielleicht nach dem Luftzuge in den höhern Gegenden, die sie auf ihren Reisen besteigen, oder will sie zum Abmarsch kommandiren. Man kann sie mit Regenwürmern, kleinen Erdschnecken, gekochtem Fleische und mit Semmeln in Milch geweiht, lange im Zimmer und auf dem Hofe lebendig erhalten. Sie laufen außerordentlich schnell, bewegen den Körper, vorzüglich den Hinterkörper, beständig so schwankend, daß es scheint, als wenn er in Angeln liefe, und die Beine zu schwach wären, ihn zu tragen.

Der

Der Landmann und Jäger nennt diesen Vogel auch wohl zuweilen Himmelsziege, oder wilden Jäger, wenn er eine Heerde des Nachts in der höchsten Luftgegend ihr Hi, Gô, Gôgô! schreyen hört. Er bewohnt Europa, das nördliche Asien und Amerika. In Thüringen trifft man ihn im August in großer Menge an den Seen, Flüssen und Teichen an, sonst aber nur einzeln. Als Zugvögel verlassen sie uns im September, rotten sich aber schon im August zusammen und machen sich zur Reise fertig. Sie schreyen alsdann am Tage und des Nachts unaufhörlich; Hidübüdubi! Im Anfang des März kommen sie wieder. Sie ziehen des Nachts und man hört sie alsdann, wie gesagt, hoch in der Luft schreyen. Wo an Flüssen, Seen und Teichen sandige oder steinige Ufer sind, trifft man sie zu Anfange des Augusts in Menge an. Sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach ihren Winteraufenthalt in dem südlichen Europa, denn dort findet man sie im Winter wieder. Kleine Wasserschnecken und ans Ufer geschwemmte Wasserinsekten machen ihre Nahrung aus. Sie lesen so unaufhörlich Nahrungsmittel auf und verschlucken sie in solcher Menge, daß man kaum glauben sollte, daß sie der Magen alle zu fassen, und in einer solchen Geschwindigkeit zu verdauen, im Stande wäre. Wo sich aber im Herbst eine Heerde einige Tage an einem Teiche aufhält, da ist auch sogleich das ganze Ufer von ihrem Unrathe, das nichts als eine weiße flüssige Materie ist, wie überzogen. In

Teichen, Flüssen und Seen findet man auf Inseln und Stellen, die mit Wasser umgeben sind, im Sande vier- bis fünf gelblichweiße mit runden braunen Flecken gezeichnete Eyer liegen. Ein eignes Nest machen sie nicht. Sie brüten vierzehn Tage, und die Jungen laufen gleich davon. Auf einer Insel, die mit tiefen Wasser umgeben ist, kann man sie daher leicht fangen, weil sie nicht schwimmen können. Sie sehen gleich wie die Alten aus, nur ist der Unterleib schmutziger weiß, und die Wellenlinien des Rückens deutlicher, wenigstens die rostbraunen. Er hat die Feinde und die verschiedenen Arten des Fanges und der Erlegung, wie der punktirte Strandläufer. Wenn sie zu lange beschossen werden, so kommen sie gar nicht mehr ans Ufer, sondern setzen sich so lange auf die dicht stehenden und schwimmenden Wasserpflanzen, bis die Gefahr vorüber ist. Das Wildbret wird für sehr wohlschmeckend gehalten; doch wird es zuweilen thranigschmeckend gefunden. 3) Gambetta-Strandläufer oder Gambette. Dütcher, Kleines Brachvogel, rother Reuter, graues Wasserhuhn mit schwarzem Schnabel und gelben Füßen. — T. Gambetta Linn. — Der Schnabel an der Wurzel roth; die Füße roth; der Oberleib aschgrau und gelbbunt; der Unterleib weiß. 12 Zoll lang. Sein Wohnort ist an Meeren, Seen und Flüssen, zieht in großen Heerden, und ist auf dem Zuge auf gepflügten Aedern und nassen

nassen Wiesen zu sehen. Die Nahrung besteht aus Würmern und Insekten. 4) Steindrehender Strandläufer — T. Interpres Linn. oder: Steindrehender, Dolmetscher, Dolmetschender Strandvogel, Schwarzschnabel, Morrellsstrandläufer, rothgefiederte Schnepfe, grauer Kiebitz, Motinelle, Seelerche. Die Füße etwas kurz und orangeroth; ein schwarzes Halsband; der Oberleib rostfarbig, schwarz gefleckt; Kehle und Bauch weiß; Steiß weiß mit etlichen schwarzen Querbinden. $8\frac{1}{2}$ Zoll lang. Er variiert in der Farbe; denn die Jungen haben das Halsband nicht, und das Weibchen ist am Vorderhalse bloß dunkelbraun. Sein Wohnort ist am Strande der Meere, Seen und Flüsse. Die Nahrung besteht in Insekten, welche sie, wie mehrere Strandläufer, durch Umwenden der Steine suchen. Man findet das Nest auf dem Sande mit 3 bis 4 aschgrün, dunkelbraun gefleckten und punktirten Eiern. 5) Englischer Strandläufer oder Strandläufer von Greenwich, — T. grenovicensis, Latham. — Der Schnabel schwarz, schwach, an der Spitze etwas abwärts gebogen; die Füße olivengrün; der Hinterhals unten, so wie der Rücken, glänzend schwarz, die Federn hellrothlich roth gesäumt; Nacken, Wangen und Vorderhals aschgrau; der übrige Unterleib weiß, über die Flügel eine schmale weiße Binde. Herr Latham glaubt im Index ornithol. p. 731. N. 16.

daß er wohl eine Geschlechtsverschiedenheit von Tringa Interpres sey, welches er aber wohl nicht ist, wie die unten beigefügte Beschreibung eines alten, im August 1801 in Schlessien an einem schlammigen Teich geschossenen und vom Herrn von Minckwitz beschriebenen Vogels wahrscheinlich macht. Der Englische Strandläufer ist $12\frac{1}{2}$ Zoll (Par. Maas) lang; die Breite der Flügel, welche zusammengelegt $\frac{1}{2}$ Zoll über den $2\frac{1}{2}$ Zoll langen Schwanz hinausreichen, 1 Fuß 11 Zoll und das Gewicht $6\frac{1}{2}$ Unzen. Der Schnabel ist nicht stark, 1 Zoll 5 Linien lang, und vorn ein wenig übergebogen; der nackte Theil der Beine 1 Zoll 2 Linien, die Füße bis an die Zehen 1 Zoll 11 Linien hoch, die mittlere Zehe mit dem Nagel 1 Zoll 5 Linien, und die hintere stumpfe Zehe 3 Linien lang, die äußere und mittlere an der Wurzel verbunden und die Farbe der Füße dunkelolivengrün. Der Scheitel ist röthlichbraun und schwarz gestreift, indem die schwarzen Federchen röthlichbraun gesäumt sind; der Nacken aschfarben mit fast unmerklich schwarzen Flecken oder Streifen, welche von den in der Mitte um den Schaft herum etwas schwärzlichen Federn herrühren; der untere hintere Theil des Halses und der Rücken schwarz mit einem Glanze, die Federn an den Seiten breit und an den Spitzen wenig hellrothlich oder braungelb gesäumt; die kleinen und größern Deckfedern der Flügel schwärzlich aschfarben mit schwachem grünen Glanze, die

kleinern wenig und fast grau, die größern breiter und fast ins Hellrothigrothe gerändert, und die größten weiß, aber nur fein gesäumt, die gleich über den längsten liegende Reihe hat eine etwas breite weiße Spitze, welche über den Flügel einen schmalen weißen Streifen bildet; der Unter Rücken, Steiß und die Mitte der Deckfedern des Schwanzes schwärzlich aschfarben mit einigem Glanze und einem kleinen grauen Saume; die Kehle fast weiß; die Wangen grauweiß; der Unterhals bis zur schmutzig weißen Brust hell aschfarben oder grau mit etwas Lichtbraunen vermischt, welches von dem ins Lichtbraune fallenden Saume der Halsfedern entsteht; der Bauch, die Seiten, der After, die obern Deckfedern des Schwanzes an beyden Seiten und die ganzen untern Deckfedern desselben rein weiß, so wie auch die Unterflügel; die großen Schwungfedern dunkelbraun oder vielmehr aschfarbenswarz, an den Spizen sehr fein weiß gesäumt und mit mehr oder weniger weißen Schäften; die sehr langen hintern Schwungfedern und die Schulterfedern haben die Farbe des Rückens, und sind rostigroth gesäumt; der Schwanz ist etwas abgerundet, schwärzlich aschfarben, die drey äußersten Federn desselben mehr weiß, die in der Mitte aber schwach rostigroth, am Ende gesäumt. Dieser Strandläufer holt seine Nahrung aus schlammigen Teichen. Er wohnt in England und Schlesien, in letztem aber, wie in der Lausitz, nur selten. 6) Gefleckter Strand-

läufer — *T. macularia* Linn. — Die Wurzel des Schnabels und die Beine fleischroth; der Oberleib olivenbraun, theils mit Längs- theils mit Querlinien von schwarzer Farbe besetzt; der Unterleib am Männchen weiß und braun gefleckt, am Weibchen weiß. 8 Zoll lang. Er variiert in der Farbe; denn Herr Borkhausen sagt in seiner Deutschen Fauna I. S. 500, daß seine zwey Exemplare am Unterleibe in den braunen Flecken weiße Flecken hätten. Sein Wohnort ist an der Ostsee, auch am Rhein auf dem Ruge; und er führt auch noch folgende Namen: Gefleckter Strandvogel, gefleckter Kiebitz, gefleckte Wasserbrossel. 7) Rothfüßiger Strandläufer, oder: Rothbeiniger Kiebitz. — *Tr. erythropus*, Gmelin. Linn. — Der Schnabel schwarz; die Beine, welche hoch über die Ferse hinauf nackt sind, so wie die Füße roth; Stirn, Steiß und Schwanz rötlichweiß, letzterer mit einer schwarzen Endbinde, und der Bauch ruffarben. Größer als der kämpfende Strandläufer. 8) Punktirter Strandläufer, s. oben. 9) Wald-Strandläufer — *T. glareola* Linn. — Der Schnabel an der Wurzel fleischroth, an der Spitze schwarz; Füße schmutziggrün; der Augenkreis weiß; die Flügel dunkelbraun; der Oberleib dunkelbraun mit unordentlich gestellten dreyeckigen rostgelben oder gelblichweißen Flecken; der Mittelrücken und Steiß weiß; der Unterhals

mit dunkelbraunen und blasrothfarbigen Schmitzen. 8 Zoll lang. Er variiert in der hellern oder dunklern Grundfarbe des Oberleibes, und in hellern und dunklern Flecken, die von der Rothfarbe bis zum Weißen übergehen. Man hat diesen Vogel sonst mit dem punktirten verwechselt. Er ist aber weit kleiner, und nistet häufiger in Deutschland als jener, auch sind die Flecken auf dem Oberleibe weit größer. Herr Bochkstein hält den gesprengelten Strandläufer des Brissons — *Tringa naevia* Linn. l. c. p. 681. N. 40. — für einen jungen Vogel. Er gehört aller Wahrscheinlichkeit nach hieher. Sein Wohnort ist an Feld- und Waldteichen, an Seen und großen Brüchen; er zieht in großen Gesellschaften weg, wenn seine Nahrung, die Insekten, Regenwürmer und Schnecken abnehmen. Er baut das Nest an Binsenkufen und Erhöhungen in Sümpfen mit 4 gelblichgrünen, braungefleckten Eiern und hat auch die Nahmen: Gesteckter Strandläufer, kleiner Weißarsch, gesteckter oder getüpfelter Sandläufer, und Waldjäger. 10) Meerstrandläufer s. oben. 11) Kleier Strandläufer — *T. pusilla* Linn. — Der Schnabel dunkelbraun; die Füße grünlichgrau; der Rücken aschgraubraun, jede Feder rostgelb eingefasst, daher er ein rostfarben geschädtes Ansehen hat: die äußern Schwanzfedern mit weißen Spitzen. 5½ Zoll lang. Er variiert etwas in der Farbe; denn das Männchen ist

mehr aschgrau an der Brust, mit schwärzlichen Strichelchen, und das Weibchen daselbst mehr röthlichgrau. Die Jungen sind am Oberleibe, wie die jungen Enten, weißgeschuppt. Sein Wohnort ist der Norden von Europa, Domingo u. s. w. und einzeln in Deutschland — zieht in kleinen und großen Truppen im August durch. Die Nahrung sind Insekten. Man giebt ihm auch die Nahmen: Zwerchstrandläufer, Zwerkreuter, kleinster Sandläufer, graues Sandläuferchen, Sandläuferchen, kleine Meerlerche von St. Domingo. 12) Olivengarbener Strandläufer, heißt auch: Grüner Strandläufer, Wald- und Holzschneppse — *T. Calidris* Linn. — Schnabel und Füße schwärzlich; der Unterleib olivengrün; der Steiß graubraun, weißlich und dunkelbraun gefleckt. 9½ Zoll lang. Er variiert ebenfalls in der Farbe; denn bey den Jungen und Weibchen ist der Unterleib mehr braun als grün. Man kennt ihn nur als Zugvogel an deutschen Ufern und Küsten. 13) Kanus Strandläufer, s. oben. 14) Aschgrauer Strandläufer — *T. cinerea*, Gmelin. Linn. — Oben aschgrau; auf den Decken der Flügel mit aschgrauen, schwarzen und weißen Halbzirkeln; der Unterleib weiß; die Füßedankelgrün; der Kopf schwarz gefleckt. 10 Zoll lang. Sein Wohnort ist der Norden; im Winter zuweilen heerdenweise in Deutschland. 15) Alpenstrandläufer — *T. alpina* Linn. — heißt auch

auch Lappländischer Kiebitz, brauner Sandläufer, Lappländischer Strandläufer, kleinster Schneppensandläufer, Dunlin, Alpenstrandvogel, kleiner Krummschnabel. Der Schnabel und die Füße schwärzlich, ersterer ziemlich lang, nach der Spitze zu abwärts gebogen; der Rücken schwärzlich, rostfarbig und weiß gefleckt, welche Flecken die Federränder bilden; die äußern Schwanzfedern grau, der Vorderhals rostfarben aschgrau gemischt, und dunkelbraungestrichelt. 7 Zoll lang. Er variirt in der Farbe nach Alter und Geschlecht; denn das Weibchen ist auf dem Rücken und an der Brust heller, und die Jungen sind an der Brust stark schwarz gefleckt. Ob dieß etwa zuweilen in einen schwarzen halbmond förmigen Fleck zusammenläuft, wie dieser Vogel beschrieben wird, kann ich nicht bestimmen. Ich habe es nie so gesehen, obgleich dieser Vogel gemein ist. Noch ist zu bemerken, daß dieser Vogel in Rücksicht des an der Spitze gekrümmten Schnabels sich an die Brachvogel und vorzüglich an den rothbüchigen kettet. Sein Wohnort ist der Norden; doch findet man ihn auch im Herbst in kleinen und großen Heerden in Deutschland an Seen, Teichen und Flüssen. 16) Gestreifter Strandläufer — *T. striata*, Lath. — heißt auch: Gestreifter Reuter, gestreifter Kiebitz. Der Schnabel an der Wurzel roth, an der Spitze schwarz; der Oberleib dunkelbraun und

aschgrau gewellt; die meisten Schwungfedern weiß. 9 $\frac{1}{2}$ Zoll lang. Auch dieser Vogel variirt in der Farbe; denn nach Linné ist Steiß und Schwanz weiß mit Längs- und Querstreifen durchzogen; sonst aber wird der Schwanz schwarz beschrieben mit grauweißer Federeinfassung. Er hat seinen Wohnort im Norden und kommt nur im Herbst nach Deutschland. Seine Nahrung sind Insekten, welche nie Meereswellen ans Ufer treiben. Man findet das Nest im Innern der Baren, mit 6 weißen Eiern, die blaßbraune Flecken haben. 17) Schwarzer Strandläufer — *T. atra*, Gmelin. Linn. — Kopf und Hals schwarz; Rücken und Flügel blaßbraun mit untermischtem Schwarz; Brust und Bauch grau; Steiß grau, weiß und schwarz wellenförmig gezeichnet. Sein Wohnort sind die Ufer des Rheins.

Strandreuter — *Himantopus* — macht in der Ordnung der Sumpfvögel ebenfalls eine besondere Gattung mit folgenden Kennzeichen aus: der Schnabel ist lang, rundlich, spizig, vor der Spitze dünner. Die Nasenlöcher sind schmal; und die Füße sehr hoch mit 3 Zehen. Bey uns kommt nur vor: Gemeiner Strandreuter — *H. vulgaris*. — Der Schnabel schwarz; die Füße zusammengebrückt, elastisch biegsam am frischen Vogel und roth; der Unterleib weiß; die Flügel schwarz. 16 Zoll lang. Er variirt in der Farbe, so daß die Jungen auf dem Mantel nicht schwarz,

schwarz, sondern schwärzlich, oder vielmehr nur dunkelbraun sind. Eine etwas genauere Angabe dieses Vogels wird wohl hier nicht am unrechten Orte stehen. Sie ist vom Herrn von Mindewitz, der eine Menge dieser Vögel beobachtet und untersucht hat. Der Strandreuter hat einen schlanken Körper, von der Größe eines Kiebitzes, einen dünnen Hals, äußerst lange Füße, übrigens aber ein schönes Ansehen, und ist aufrecht stehend bis an den Scheitel 18 Zoll hoch. Der Schnabel ist (Par. Maß) 3 Zoll lang (bey dem Weibchen $2\frac{1}{2}$ Zoll) schwarz, dünne, von der Wurzel bis zur Spitze immer ganz allmählich schmaler und feiner, die sehr schmale und dünne Spitze des Oberkiefers etwas weniger länger als der Unterkiefer und sanft nieder gebogen, daß sie vor diesem vorsteht und mit dessen Fläche in horizontaler Richtung ausgeht, oder nur unmerklich wenig unter dieser Linie sich endigt; die Nasenlöcher schmal; der Augenstern karmoisinroth; die im Verhältniß ihrer Länge sehr dünnen Beine blutroth, bis zur Spitze der mittlern Zehe $11\frac{1}{2}$ Zoll hoch, die $4\frac{1}{2}$ Zoll langen Schienbeine $3\frac{1}{2}$ Zoll nackt, die Fußwurzel $5\frac{1}{2}$ Zoll hoch, die mittlere Zehe nebst dem 3 Linien langen, wenig gekrümmten, schwärzlichen Nagel $1\frac{1}{2}$ Zoll, die äußere mit der mittlern durch eine kleine Haut am ersten Gliede verbundene Zehe $1\frac{1}{2}$ Zoll und die innere 15 Linien lang. (Alle diese Angaben sind bey dem Weibchen etwas geringer). Der Kopf ist klein und rund; die Stirn

weiß; Scheitel und Hinterkopf schwärzlich; die Wangen grau der Obertheil des Halses weiß mit schwärzlichen Federn vermischt, nahe bey dem Rücken fast weiß; der Rücken, die Flügel und deren Deckfedern glänzend schwarz mit schwachen grünem Schimmer; der ganze Unterleib rein weiß; die Flügelspitzen reichen 2 Zoll über den Schwanz hinaus; der $2\frac{1}{2}$ Zoll lange Schwanz selbst ist graulichweiß. Das Weibchen ist etwas kleiner; Kopf und Hals sind weiß; die Farbe des Rückens ist nicht ganz so dunkel und glänzend, wie bey dem Männchen. Bey einem gegen den Herbst geschossenen erwachsenen, $14\frac{1}{2}$ Zoll hohen Jungen ist der Schnabel 2 Zoll 2 Linien, der Leib von der Spitze des Schnabels bis zum Ende des Schwanzes 1 Fuß und 3 Linien und die Beine $7\frac{1}{2}$ Zoll lang; die Füße schmutzig fleischfarben, und die Fußwurzel gleich unter dem obern Gelenke, oder das sogenannte Knie, ganz unförmlich breit und dick (welches nach der Versicherung eines Mannes, der auf dem Wiener Markte mehrmals sehr viele Junge besaßen gehen hat, bey allen Jungen der Fall seyn soll). Scheitel und Hinterkopf grau; der ganze Oberhals lichtgrau; Rücken und Deckfedern der Flügel lichtbraun mit schmutzig weißen Federsäumen; die längsten Schwungfedern einfärbig schwarz, die folgenden aber weiß gesäumt; die großen Deckfedern der Flügel nach vorne zu dunkelbraun, glänzend und die vordern untersten breit weiß gesäumt; Unterseite und Schwanz wie

te bey den Alten. Der Wohnort ist an den südlichen Ufern erwachsener deutscher Flüsse, Seen und Teiche — doch bemerkt man ihn mehr auf dem Zuge. Seine Nahrung besteht in Insekten, Froschlärven u. a. m. In Schlesien nistet er an Sümpfen und bewachsenen Teichen; in Ungarn in großen Brüchen häufig. Er führt auch noch die Nahmen: Riemenfuß, rothfüßiger Riemenfuß, Langfuß, Langbein, Dünnbein, Riemenbein, Stelzenläufer, hochbeinige Schnepfe, hochbeiniger Kranich, Strandläufer, fremder Vogel.

Strauchheerd ist eine Art von Vogelheerd, den man auf freyem Felde, nicht weit vom Holze anlegt, um allerley kleine Vögel, als Finken, Zeisige u. zu fangen. Man steckt nemlich grüne Sträucher, vier Schritt lang und anderthalb Schritte breit, recht enge bespammen, in die Erde, über diese richtet man eine so breite Wand, daß sie nicht allein über den Strauch, sondern auch auf die Erde schlagen kann. Wenn nun ein Flug Vogel ankommt, so fällt er, in Ermangelung anderer naher Bäume, in die Sträucher, und wird verfaßt. Nachst dem muß man noch eine Wand haben, die man nur auf die bloße Erde legt, und nicht bedeckt oder einschlägt, dahingegen jene breite Wand nicht unverdeckt liegen kanu, und gleich den Waldheerden eine Garnaube haben muß. Unter diese Beywand kommen die Läu-

fer, um die beyden Wände herum hingegen die Lockvögel, deren Käfige man mit grünen Zweigen bedeckt. Auch befestiget man Bauer mit Lockvögeln auf kleinen Stangen um den Heerd herum. Die Zeit des Strauchheerdfanges ist im September und zeitigem Oktober.

Strebestangen nennet man eine Art von Stangen, die man bey dem Aufstellen der Jagdzeuge und Tücher braucht, sie sind gemeinlich $1\frac{1}{2}$ Elle lang, und haben an beyden Enden eiserne Scheeren, womit man die eine Stellsange am Prellneze, und die andere am Tuche steckt, damit beyde gegen einander wie eine Mauer stehen.

Streichen, Strich, Ziehen der Vögel nennet man im Gegensehe des Wiederzuges (s. d. W.) den Zug der Vögel im Herbst, da sie unsere Gegenden verlassen, und in wärmere Länder ziehen. Zu welcher Zeit solches geschieht, ist bey der Beschreibung jedes Vogels aufgeführt.

Streifen nennet man das Abziehen des Balges von Hasen, Füchsen, Dachsen, Marbern u.

Streifjagen ist eine Jagd auf Roth- oder Schwarz- auch anderes Wildpret, durch Treiben, und nur einige vorgestellte Neze.

Strick, Windhunde, nennet man einige Windhunde (gemeinlich 3 Stück), die zusammen bey der Neze an einer Leine oder einem Riemen geführt werden. Hat man

man deren mehr, so sind es zwey Striche.

Stümpfe sagt man, wenn man bey Untersuchung der Hirschfärthen die Färthe des Hirsches, dessen Schaaßen Stümpfer sind, als die des Thieres, von diesen unterscheidet.

Stürzen, nicht fallen, sagt man vom Hirsche, wenn er fällt.

Sturmvogel — Procellaria — ist in der Ordnung der Schwimmvögel, und zwar in der ersten Familie, eine besondere Gattung mit folgenden Kennzeichen: der Schnabel ist gerade, an der Spitze hakenförmig gebogen. Die Nasenlöcher sind in einer cylindrischen, vorn abgestuften Röhre über die Wurzel des Schnabels liegend, und die Füße etwas über der Ferse nackt; drey Zehen vorwärts und hinten statt der Zehe ein Sporn. Es sind Meeresvögel, die fast zu einem beständigen Fliegen bestimmt sind; nur bey großen Stürmen werden sie zuweilen aufs Land, und also auch nach Deutschland verschlagen. Bey uns kommt nur vor Gemeiner Sturmvogel, *P. pelagica*, Linn. oder Ungewittervögel, Sturmvogel, Sturmschwalbe, Sturmverkläriger, St. Petersvogel, Pestrell, Drakmöbchen, Sturmmeve, Sturmfiak, Kleiner schwarzer Sturmvogel, kleinste Meve mit röhrenförmigen Nasenlöchern, See-Sturmvogel, und gewöhn-

licher kleiner Sturmvo-
gel. Er ist rufschwarz, oben dunkler, unten heller; Steiß und Afters weiß; die Schwungfedern der dritten Ordnung mit weißen Spitzen, 6 Zoll lang. Dieser Vogel variirt in der Farbe; denn man findet sie mit rothem und blauem Glanze, auch auf den Flügeln weiß gefleckt. Letzteres sind vielleicht Junge. Sein Wohnort ist allenthalben im Ocean — bey Stürmen haben sie sich nach England, und auch, wiewohl sehr selten, nach Deutschland verschlagen. Die Nahrung besteht in Fischen und Fleischabgang von Schiffen; und sein Nest bauet er in Felsen.

Stuh nennet man eine jede kurze Flinte oder Kugelbüchse.

Suche ist so viel als eine gute Nase, oder vielmehr ein gutes Geruchswerkzeug eines Hundes.

Sulze ist so viel als Salzlecke.

Sumpfschneise — *Parus pallustris* — auch Platten-Nonnen: Mönch: Münch: Nischen-Niet-By: Schleyer: Hanf: Rohr: Gras: Garten: Murr: Roth: Niede: Reit: Kohl: Mauer: Schwarz: Speck: und graue Meise, aschgraue Nonnenmeise, Schilfsperling, Meisenkönig und Dornreich genannt, hat als Kennzeichen der Art einen schwarzen Oberkopf und weiße Schläfe. Sie ist vier und ein Viertel Zoll lang, wovon der Schwanz fast

ist zwey Zoll und der Schnabel der Linien wegnimmt. Die Breite ist sieben Zoll und die Flügel legen sich auf der Mittelfelchen zusammen. Der Schnabel ist schwarz, der Augenfleck dunkelbraun; die Füße und Bleyfarben; die Fußwurzel fünf Linien hoch. Der Oberkopf ist bis in den Nacken schwarz; Wangen und Schläfe weiß; der Oberleib bräunlich aschgrau, unten außer der schwarzen Kehle, wie an der Gurgel schwarz geprengt ist, schmutzig weiß, an den Seiten und am After röthlich überlaufen; die Flügel und der Schwanz schwarzgrau. Das Weibchen hat eine kaum merkbare schwarze Kehle. Diese Meise ist sehr flink, lustig und scheu. Sie lockt laut: Dia, dia! tiki äh äh! und hat einen angenehmen, obgleich wenig abwechselnden Gesang. Im Zimmer gewöhnt man sie mit Hanf und Sonnenblumenkernen. Man rüfft sie in Europa und Asien an. Sie liebt die Gärten und Laubhölzer. Im Herbst tritt sie sich in kleinen Gesellschaften zusammen; und streicht bald dorthin, und zwar so, daß immer eine hinter der andern herliegt. Sie lieben dann die Gebüsch um Bäche und Teiche herum. Ueberhaupt sind sie lieber niedrig in den Gebüsch als auf Bäumen. Sie nährt sich von Insekten, Beeren und Samereyen. Den Sonnenblumensaamen scheint sie vorzüglich gern zu fressen, weil sie sich gern da aufhält, wo diese wachsen, und einen Kern nach dem andern holt. Im Gan-

zen ist sie in ihrer Nahrung der Blaumeise ähnlich, nur daß sie die Insekten und ihre Eyer vorzüglich von den Pflaumenbäumen und Schwarzdornsträuchern sucht. Sie nisten des Jahres zweymal in Baumhöhlen, vorzüglich gern in Obstbäumen. Das Nest besteht aus Papierschnitten, Heu, Gras, Stroh, Moos und Haaren, Wolle und Federn. Die 8 bis 12 Eyer sind silberweiß mit braunrothen Flecken, besonders am stumpfen Ende, besetzt. Die verschiedene Arten des Fanges und der Erlegung sind wie bey der Kohlmeise. Sie geht gern in den Meisenkästen, wenn man Hafer, Hanf und Sonnenblumenkerne hineinsetzt. Auf den Sonnenblumenkernen kann man sie mit Leimruthen sehr gut fangen. Das Fleisch hat einen angenehmen Geschmack. In den Obstgärten vertilgen sie viele schädliche Insekten. An den Sommerblumen thun sie Schaden, indem sie im Herbst alle reifen Kerne heraus holen, wenn sie dieselben einmal gewahrt worden sind. Man muß sie also davon zu verschrecken suchen.

Sumpfsänger — *Sylvia Palustris*. Bechst. — gehört zur Gattung Sänger als besondere Art. Der graue Oberleib ist grün überlaufen; über den Augen findet sich ein großer schmutzig weißer Streifen; der Unterleib schmutzig weiß, auf den Backen und an den Seiten gelbbräunlich überlaufen; der Schwanz ist etwas keilförmig, und die Füße

Füße sind röthlichgelb. Die Länge beträgt 5 Zoll. Es scheint, als wenn dieser Vogel aus dem Reich- und rostgrauen Sängergesammengesetzt sey; allein von jenem unterscheidet ihn der kürzere Schnabel und die runde Stirn, und von diesem der etwas keilförmige Schwanz. Er wählt sich zum Aufenthaltsorte mehr sumpfige Gegenden mit Gesträuch als Rohrteiche, und zieht ebenfalls weg, wenn seine Nahrungsmittel, die Wasserinsekten und Breeren anfangen, abzunehmen. Man nennt diesen Vogel auch: Rohrschmäcker, olivengrauer Rohrschirf, und Rohrsänger.

Sumpfvogel — Gr — machen unter dem Wasser eine bey uns aus 3 Gattungen bestehende Ordnung aus, deren: 1. überhaupt folgenden wesentlichen Charakter haben: der Schnabel ist walzen- oder kegelförmig, stumpf oder spitz und lang oder kurz. Die Waten im Wasser und Sumpfbestimmten Füße sind hoch, bis über die Knie hinaufsteigen. Alle Vögel dieser Ordnung kommen jedoch mehr im äußerlichen Ansehen überhaupt und in der Lebensart zusammen, als in der Gestalt des Schnabels.

I.

Tafelente — *Anas serina* — heißt auch eigentlicher Rothhals, Quellsche, afrikanische Ente, wilde braune Ente, Rothente, Rothhals, Rothkopf, braune Ente, braunköpfige Ente, rothe Mittelente, Wildente, Rothhalsente, wilde graue Ente, Ente mit rothem Halse, Brandente und Sumpfente. Die Kennzeichen der Art sind: der Kopf ist rothbraun; die Brustbinde und die obere und untere Decke des Schwanzes sind schwarz; der Spiegel schwarzgrün; die Hinterzehe belappt. Sie hat ohngefähr die Größe der Pfeifente, ist anderthalb Zoll lang, wo-

von der Schwanz zwey Zoll ab Linien mißt; die ausgebreiteten Flügel sind zwey Fuß acht Zoll breit, und legen sich fast an der Schwanzspitze zusammen. Der Schnabel ist zwey Zoll lang, breiter als an der Pfeifente, mittelmächtig stark, oben aschfarblich, unten und an dem hakenförmigen Nagel schwarz; der Augenstern kastanienbraun; die Schienbeine ein und ein Viertel Zoll hoch, diese, so wie die Zehen, bleigrau, Nägel und Schwimmhaut schwarz; Kopf und Hals sind dunkelkastanienbraun; die Brust und der Obertheil des Rückens schwarz, letzterer rostfarben eingefärbt; der übrige Rücken, die Schultern und Decke der Flügel bläulichgrau mit schwarz

schwarzen Querstichen durchzogen; die obern Deckfedern des Schwanzes schwarz; der Bauch weiß, an den Seiten rostbraun; der After schwarz; die äußern Deckfedern der Flügel und die vordern Schwungfedern dunkelbraun, auf der innern Fahne weiß, die mittlern bilden einen Band, unten und hinten weiß eingefärbt, schwarzen ins grüne spielenden Spiegel; die letztern sind ganz schwarz; der Schwanz ist zugespitzt dunkelgrau und weißgrau eingefärbt. Das Weibchen ist am Kopfe und Hals rostigbraun, schwarzgestreift; die Brust dunkelbraun und schmutzig rostgelb gewölkt; die Deckfedern der Flügel sind dunkelischgrau, weiß eingefärbt; der Rücken dunkelbraun, rötlichgrau eingefärbt; der Bauch weiß; die Seiten rostbraun; Steiß und Schwanz dunkelgrau, weiß eingefärbt; der After weiß mit großen kaffeebraunen Flecken; die Flügel wie beim Männchen. Auch diese Ente variiert in der Farbe. Man findet 1) welche, wo Kopf und Oberhals dunkelkastanienbraun sind, der Unterhals schwärzlich an den Seiten aschgrau, Brust und Bauch dunkelbraun, schwärzlich und aschgrau gestreift; Flügel schwarz und weiß melirt; der Schnabel schwarz an der Wurzel blau. 2) Kopf und Hals sind fuchsroth; Rücken, Deckfedern der Flügel, Bauch und After weiß mit schwarzen Querstreifen; die Brust schwarz; die Schwungfedern bleifarben an der Spitze schwarz. 3) Kopf und Hals dunkelrothbraun, und

an der Kehle weißlich. Schultern und Rücken bräunlichschwarz mit weißgesprenkelten Endkanten. Diese Ente hat einen außerordentlich schnellen und reißenden Flug. Auf ihrem Zuge sieht man sie in keiner ordentlichen Form fliegen. Sie hat eine zischende Stimme. Sie hält sich vorzüglich in dem nördlichen Europa, Asia und Amerika auf. Sie scheint sich bloß auf süßem Wasser aufzuhalten, denn sie berührt kaum die Mündungen der Flüsse. In Deutschland sieht man sie wenigstens auf ihren Wanderungen auf großen Flüssen und Seen nicht selten; sie besucht auch im Herbst und Winter die Teiche und die Berg- und Waldströme. Zu Ende des Oktobers kommt sie in kleinen Flügen von 20 bis 30 Stücken an, und geht im März wieder nach dem Norden zurück. Ihre Nahrung soll bloß in kleinen Fischen und Schalthieren bestehen. Von der Paarung, Vermehrung, Wachsthum und Erziehung der Jungen ist nichts zuverlässiges bekannt; und die verschiedenen Arten des Fanges und der Erlegung sind die gewöhnlichen. Sie hat unter allen Entenarten das wohlschmeckendste Wildpret; daher sie auch ihren Namen hat. Die Federn sind ebenfalls zu gebrauchen, und die Jägersprache ist die gewöhnliche.

Lagegarne, Lageneke, f. Lerchenneke und Lerchensfreichen No. 2.

Tagsschläfer ist eine eigene Vögelgattung, die man unter Nachtschwalbe angezeigt hat.

Lan-

Tannenheber ist einerley mit Nusskrähe, und gehört mit der Eichelkrähe oder dem Holzheber, in eine Gattung als besondere Art.

Tannenmeise — *Parus ater* — heißt auch Kleine Kohlmeise, Harz-, Pech-, Wald-, Hund-, Speer- und Kreuzmeise und Schwarzmeise; auch kleine Meise. Die Kennzeichen der Art sind: Der Kopf ist schwarz; der Rücken aschblau; die Brust und ein Streifen im Nacken weiß. Ihre Länge ist etwas über vier Zoll, die Breite sieben Zoll, der Schwanz, welchen die Flügel zur Hälfte bedecken, ein und drey Viertel Zoll, und der Schnabel drey Linien lang; letzterer ist schwarz, an der Spitze heller; der Augenstern schwarzbraun; die Füße bleifarben und die Fußwurzel acht Linien hoch. Oberkopf und Hals sind schwarz; vom Hinterkopfe geht dem Nacken herab ein breiter weißer Streifen; Wangen und Seiten des Halses sind weiß; der Rücken dunkelaschblau; der Steiß aschgrau grün; die Kehle bis zum obern Theile der Brust schwarz; die Brust weiß; der übrige Unterleib ebenfalls weiß mit einer röthlichen Mischung; die kleinsten Deckfedern der Flügel, wie der Rücken; die großen schwarz mit weißen Endpunkten, wodurch eine doppelte weiße Binde entsteht; die Schwungfedern bräunlich aschgrau, weiß gerändert, die Schwanzfedern von eben der Farbe. Das Weib-

chen ist nicht so stark schwarz am Halse. Varietäten: 1) Die weiße Tannenmeise. Sie ist entweder ganz weiß, oder daneben am Kopfe und Brust aschgrau überlaufen. 2) Die bunte Tannenmeise. Sie ist entweder weiß gefleckt, oder hat weiße Schwingen oder Schwanz. Es ist ein eben so munterer als kecker Vogel, wie die Kohlmeise. Sie klettert an den Stämmen und Zweigen herum. Ihre Laestimme ist Ziptón! und Zisi, zisi, zisi! Der Gesang ist von keiner Bedeutung. In der Stube ist sie sehr zänkisch, und hängt sich den Vögeln an den Schwanz an, wenn sie ihnen sonst nichts anhaben kann. Sie bewohnt ganz Europa, Sibirien und das nördliche Amerika. Sie ist in den großen Schwarzwäldern anzutreffen. Im Herbst aber kommt sie auf dem Striche auch in die Feldhölzer und Gärten. Sie formirt ansehnliche Heerden, die im Winter von einem Schwarzwalde zum andern ziehen. Ihr Anführer ist eine oder auch ein Paar Haubenmeisen, und auch die Goldhähnchen sind in ihrer Gesellschaft. Sie nähren sich von Insekten, die in Nadelhölzern leben, so wie auch von Tannen-, Fichten- und Kiefern-Saamen. Weil ihnen nur in den gebirgigen Waldungen der hohe Schnee und Duft oft ihre Nahrungsmittel bedeckt, so hat sie die Natur das Prestücken gelehrt, so daß sie den überflüssigen Fichtensaamen zwischen die Schuppen der Baumrinde verbergen, und bis zu eintretenden Mau-

Mangel aufbewahren. Dieß bemerkt man auch an ihnen als Stubenvogel. Die Tannenmeise nistet jährlich zweymahl, und legt jedesmahl 6 bis 8 rein weiße, leberfarben punktirte Eyer. Das Nest steckt meistens in einem verlassenem Maulwurfs- oder Fahrmausloche, oder in den höhlen Rändern der tief ausgefahrenen Fuhrwege, seltener in höhlen Bäumen und Mauerritzen. Es ist aus klargebissenen Erdmoosen und Thierhaaren gemacht. Die Jungen werden meistens mit grünen Räubchen aufgefüttert, und sehen bläßer als die Alten aus. Die Füchse,arder, Iltisse, Wiesel, Katzen und Fuhrwagen zerstören zuweilen ihre Brut, so wie der Sperber oder Finkenhäbicht die Alten verfolgt. Außer dem Falle, daß sie nicht in die Sprengel gehen, fängt und erlegt man sie wie die Kohlmeise. Das Fleisch schmeckt nach dem Fichtensaamen etwas bitter; allein in den Nadelwäldern sind sie sehr nützliche Insekten, indem sie Insekten, Puppen und Eyer aus der Rinde und aus den Knospen verzehren.

T a b e n nennet man die Füße der Raubthiere, besonders der Bären.

Tauben — Columbae — machen unter den Vögeln eine besondere Ordnung und Gattung aus, und sind gleichsam ein Mittel Ding zwischen den Sing- und hähnerartigen Vögeln. Die Ordnungskennzeichen sind: der dünne, gerade, an der

Wurzel häutige und aufgetriebene, an der Spitze gekrümmte Schnabel; und die kurzen mit bis an die Wurzeln getrennten Zehen versehenen Füße. Diese Kennzeichen unterscheiden die Tauben aber auch als Gattung von andern Vögeln, nur kommen noch hinzu die länglichen Nasenlöcher, welche mit einer weichen aufgeschwollenen Haut halb bedeckt sind; und die ganze Zunge. Sie leben paarweise, legen jedesmahl zwey Eyer, und füttern die Jungen mit eingeweichtem Getraide und andern Samereyen aus dem großen Kropfe. Ihr Nest ist schlecht gebaut, und steht theils in Höhlen, theils auf Bäumen frey. Außer der Ringeltaube und der Holztaube gehören noch als verschiedene Arten hierher die Tureltaube, davon weiter unten, und die eigentliche wilde gemeine Taube — Col. Domestica — auch wilde Taube schlechtweg, Felsen- Stein- Bauern- und Feldtaube, Feldflüchter, gemeiner und schwarzbäuhiger Feldflüchter genannt. Sie hat eine weißliche Nasenhaut, bläuliche Hauptfarbe: weißen Unterrücken, zwei schwarze Binden auf den Flügeln, und schwarze Schwanzspitze, 12 Zoll lang. Sie sieht der Holztaube ähnlich, ist aber größer, und die Stammutter der zahmen Taubenrassen. Man kennt sie unter dem Namen: gemeine Feldtaube, Feldflüchter. Sie hat ihren Wohnort in Deutschland auf Thürmen, Kirchen, al-

ten

ten Mauern und in freyen Taubenschlägen; in Italien und andern Europäischen Gegenden aber in Felsenhöhlen, besonders am Meere. Sie wählt sich zur Nahrung: Getraide und allerhand Gesäme. Das Nest ist in Höhlen mit 2 weißen Eiern.

Taubengehege legt man an, wo die Tauben auf alte Eichen und Aspen fallen, und in hohlen Bäumen brüten. Hierzu erwählt man kernfaule und hohle Kiefern oder Aspen, und schneidet davon Taubenhöhlen $1\frac{1}{2}$ Elle lang, und inwendig so weit, daß eine Taube reinlich darinnen sitzen kann; das inwendige faule Holz säubert man aus. Dann macht man Boden und Decke so daran, daß kein Wasser hineinlaufen kann; neben dem Höhlenloche wird eine schwache Stange zum Aufsetzen angebracht. Diese Höhlen macht man in Menge auf den Eichbäumen fest, damit sie der Wind nicht herunterwerfe, verschonet die wilden Tauben mit Schießen, und giebt ihnen eine gute Baize, so gewöhnen sie sich bald dahin. Hierzu werden Kästen gemacht, 2 bis 3 Fuß lang, eben so breit, und 8 Zoll hoch. Diese füllet man mit Kirrsulze so voll, daß sie in der Mitten wie ein Berg erhöht stehet. Zu mehrerer Sicherheit wider den Anlauf der wilden und zahmen Thiere, verwahret man diese Kästen mit Stangen, läßt sie den Winter über stehen, und füllet sie im Frühjahr mit frischer Baize an. Im ersten Jahre läßt man alle

Jungen ausfliegen, so kommen sie wieder, brüten hier und vermehren sich, besonders wenn man die alten Höhlen mit neuen verwechselt. Das Wildpret solcher Tauben ist viel wohlschmeckender und gesünder, als zahmes Taubenfleisch.

Taucherhuhn — *Uria* Lath. und *Colymbus* Lin. — macht in der Ordnung der Schwimmvögel in der zweiten Abtheilung mit ganzen Schwimmfüßen — *Ped. palmati* — und zwar in der ersten Familie mit geradem, ungezähntem und zugespitztem Schnabel, eine besondere Gattung mit folgenden Kennzeichen aus: der Schnabel ist gerade, pfriemenförmig zugespitzt an der Spitze der obern Kinnlade etwas abwärts gebogen, und die etwas zusammengedrückte Wurzel mit kurzen Federn bedeckt. Die Nasenlöcher sind röhrenförmig am Grunde des Schnabels. Die Zunge ist dünn, fast von gleicher Länge des Schnabels; der Rachen gezähnt und die Füße sind dreizehlig. Diese Vögel bewohnen gesellschaftlich das Meer, schwimmen und tauchen gut, gehen aber wegen der zu weit rückwärts gestellten Füße wie geldämt. Bey uns kommen bloß folgende Arten vor: 1) Dummes Taucherhuhn, U. Troile, Lath. oder auch Taucherhuhn, schlecht weg, Taucherhuhn, Lumme, Lum, Lumer, Loow, Lomme, Lombe, Tauchermöve, Mevenschnabel, Troil.

Troiltaucher, schwarz und weißer Taucher genannt. Der Oberleib dunkel, (müdegrau, dunkelbraun, oder schwärzlich); der Unterleib weiß; die hinteren Schwungfedern mit weißen Spitzen, 17 Zoll lang. Der Wohnort sind die Meere des Nordens, auf seinem Zuge kommt er zuweilen nach Deutschland auf Seen, Teichen und Flüssen. Es wählt sich zur Nahrung Frösche, und baut das Nest in steilen Felsen, und legt ein großes bläulich weißes oder hellmeergrünes, unregelmäßig schwarzgeflecktes und gestreiftes Ey. 2) **Schwarzes Taucherhuhn**, U. Grylle Lath.: Die Hauptfarbe braunschwarz, über die Flügel, durch die weißen Deckfedern verursacht ein breites weißes Band; die Füße roth, 14 Zoll lang. Es variiert in der Farbe; denn die Jungen sehen weißlich oder hellgrau aus, auf den Flügeln schwärzlich, und noch im dritten Jahre ist die Farbe schwarz und weiß gemischt, und der weiße Flügelspiegel nicht vollkommen groß und deutlich. Es hat seinen Wohnort im Norden, seltner an den deutschen Küsten der Ostsee, und wählt sich zur Nahrung Fische. Hingegen das Nest findet man auf Felsen mit einem weißlichen, rostfarbenen geflecktem und aschgrau gesprenkeltem Ey. Es hat endlich auch die Namen: Grönländische Taube, schwarze Grönländische Taube, Tauchertaube, Seertaube, Grylltaucher, Grönländische Gans. 3) **Weißliches**

Taucherhuhn, U. albida.: Oben grauweiß; unten schneeweiß; der Mittelrücken schwarz; Kopf und Hals weiß; hinter jedem Auge ein schwärzlicher Fleck. Sein Wohnort ist auch am Rheine, wo man es mehreremal geschossen hat.

Teichsänger — *Sylvia s. Motacilla arundinacea* — heißt auch **Rohrsänger**, **Rohrsperling**, **Schilfschmäger**, **Weidengucker**, **Rohrgrasmücke**, **Rohrschleifer**, **Schilfbornreich**, **Weidenmücke**, **kleine braungelbe Grasmücke**, **Weyderle** und **Zepste**, und ist eine besondere Art in der Sängergattung, und zwar in der zweiten Familie. Der Körper ist oben olivenbraun, unten rostgelblich weiß; über den Augen befindet sich ein rostgelblich weißer Streifen; der Schwanz ist etwas keilsförmig; die Beeren sind unten gelb; und die Länge beträgt $5\frac{1}{2}$ Zoll. Dieser Vogel wechselt ebenfalls in der Farbe: denn es giebt einige, die auf dem Schwanze eine röthlichgelbe Binde haben. Er hält sich am liebsten im Schilf und Gebüsch, an Teichen, Seen und Flüssen, so wie auch um die Dörfer und Städte herum am Wasser auf, zieht aber einzeln weg, wenn seine Nahrung die Wasserinsekten abzunehmen anfängt. Das tiefe Nest ist zwischen Rohrhalmen gewebt und enthält 4. bis 6 weißgrünliche Eyer, welche aschgraue und größere olivenbraune Flecken und dergleichen Pünktchen haben.

Tel.

Tellereisen, Tritteisen, ist eine Art von Fallen zum Fang verschiedener Raubthiere, als Marber, Fischotter, Füchse &c. Es bestehet aus einer Feder und zwey Bügeln, die man aus einander macht, und einen Teller, mittelst zweyer Haaken, locker darauf befestiget. Wenn ein Thier auf den Teller tritt, fällt er ab, und die Bügel schnellen los, und ergreifen das Thier. Zum Fange größerer Thiere hat man solche, deren Bügel sägenförmige Zacken haben, um das Thier desto besser zu halten. Man hat auch Schwanenhälse, welche zugleich einen Teller haben, und so vorgerichtet sind, daß sie losgehen, das Thier mag den Faden abziehen oder auf den Teller treten.

Tesa ist eine Art von Vogelfang, den man auf einem breiten Flügel, in dessen Nähe keine großen Bäume sind, wo aber ein guter Zug ist. Die Gestalt ist rund, ohngefähr 50 bis 70 Schritt im Durchmesser. Man braucht dazu einige hundert Fallruthen, welches zwey Spannien lange Leimruthen sind, die man an darinnen aufgerichteten Bäumen befestiget, unter deren Nesten man einige Lockvögel in Bauern hängt. Uebrigens beobachtet man dabey alle Vortheile, die beym Vogelfange, besonders mit Leimruthen, gebraucht werden.

Thauschlächting heißt, wenn ein im Thauze gegangenes Thier die Tropfen vom Gertraide oder Grase abgeschlagen hat.

Thier, Stüd. Wildpret Hirschkuh, Hindin, heißt im Jägerausdruck das weibliche Geschlecht des Hirschens. So lange es noch unteschlagen ist, heißt es ein Schmalthier, nach der ersten Befruchtung ein Thier, und wenn es kein Kalb hat, ein gölttes Thier, ist es aber so alt, daß es nicht mehr brunftet, ein abgebrunftes Thier. Es hat kein Geweih, ist schwach und furchtsam, hat aber ein sehr scharfes Gesicht und einen schnellen Lauf. Die Färbhe eines, über die Hälfte trächtigen (hochbeschlagnen) Thieres, zeigt sich durch folgende Kennzeichen: Ein Hinterlauff bleibt allemal eine Spanne weiter zurück, als sonst, und schleift bisweilen auf der Erde, und tritt tiefer damit ein, als mit dem andern. Alles dieses findet auf der Seite statt, wo das Kalb liegt, und die dadurch schwerer und unbehüllicher wird, welches bey einem Hirschkalbe auf der rechten, und bey einem Wildkalbe auf der linken Seite ist. Auch macht es den Schloßtritt mit dem Laufte, auf welchem das Kalb liegt. Ein tragendes Thier sucht seine Nefung mehr in der Höhe, als ausserdem.

Thiergarten ist ein, mit einer Mauer umgebenes und reichlich mit Gräseren versehenes Gehölze, um allerley Wildpret darinnen aufzubewahren. Es werden folgende Stücke dazu erfordert: 1) Eichen, Buchen und wilde Obstbäume, 2) Dickigte, 3) grasreiche Weide, 4) gute gesünd

Jünde Quellen, fließende Wasser, oder Teiche, 5) Heuschrecken, zur Winterfütterung für das Wildpret, 6) ein Jagdhaus. Das Gehölze darinnen muß nöthigst mit der Abholzung geschnitten, und ganz pfleglich behandelt werden. Auch ist es nicht gut, ihn zu nahe an der Grenze eines andern anzulegen, damit nicht etwa Deffnungen gemacht, und die Thiere zum Ausgange veranlasset werden. Das Wildpret, so man darinnen aufbewahret, sind Hirsche, Dammhirsche, Rehe und Haasen. Für Sauen muß er schon von großem Umfange seyn, weil sie sonst nicht Nahrung genug finden.

Thurmschwalbe — *H. apus*, Linn. macht in der Gattung Schwalbe, und zwar in der zweyten Familie, wo an den Vögeln alle vier Behen der Füße nach vorne gekehrt sind, eine besondere Art aus. Sie ist überall mattschwarz; die Kehle weiß, $6\frac{1}{2}$ Zoll lang. Der Wohnort ist in Städten und Dörfern, und wandert weg in kleinen Heerden. Ihre Nahrung sind die hochfliegenden Breiten und andere Insekten, und man findet das Nest in Mauerritzen, unter Dächern und Verschlägen hoher alter Häuser mit 4 bis 6 weißen, kaum merklich graugesprenkten Eiern. Sie hat auch die **N a m e n**: Mauer-, Stein-, Kirch-, Spitz-, Spür-, Pier-, Feuer- und Geverschwalbe, Speyer-, Gerschwalb, Veerdschwalcken, Spierschwalcken, gro-

ße Thurmschwalbe, gemeine Mauer- oder Schwalbe.

Tyras, Tyras ist ein großes zum Fange des kleinen Geflügels gehörendes Netz, womit man Rebhühner, Wachteln, Lerchen u. fängt. Er ist gemeinlich 30 Ellen lang und 20 breit, und hat nur an der vordern langen Seite einen Seimen, an den andern aber nicht. Bey Rebhühnern, und Wachteln läßt man einen Hühnerhund suchen, und wenn dieser steht, nehmen zwei Personen den ausgebreiteten Tyras in die Hände, ziehen ihn steif an, und gehen damit gegen den Wind, bis über den Hund hin, dann lassen sie das Netz fallen und drücken die in die Höhe stehenden Enden nieder, so ist der Fang vollbracht. Noch besser halten sie, wenn man einen Falken zur Hand hat, und ihn, während dem Ueberziehen revieren läßt. Zum Lerchenfange braucht man nur einen kleinen Lerchenfalken, den man von der Hand wirft, so bald man eine Lerche siehet, welche alsbald niedersällt, wenn sie ihn gewahrt wird, und sich bedecken läßt. Am besten geschieht dieser Fang auf frisch abgeernteten Stoppelfeldern.

Traben oder Trolen nennt man den Gang bey den Hirschen, wenn sie des Abends bey Sonnenuntergange von ihrem Standorte auf das Gede ziehen; aber es bedeutet auch den Gang des Wolfs, der gewöhnlich immer im Trabe läuft.

Trach

Trächtig, tragend nennet man jedes weibliche Thier, das Junge im Leibe hat.

Tränkeheerd ist ein Vogelheerd, den man im Holze da anleget, wo eine Lache oder ein anderer Ort, da sich Wasser sammlet, die Vögel einladet, ihren Trank daselbst zu suchen. Ueber einen solchen Platz bereitet man eine Wand, so, daß sie, wenn man sie rückt, schnell über den Wasserbehälter fällt. Hierher gewöhnet man die Vögel zur Tränke, dadurch, daß man alle übrige Wasser in der Nähe verdeckt. Sind sie nun völlig dahin gewöhnet, so errichtet man eine Hütte, bringet die Rehe hin, und verfährt dann, wie bey allen Vogelheerden.

Trainjagen ist eine Jagd, die man macht, um junge Parforcehunde einzuhengen. Man hebt nemlich abgelöste Läufe erlegter Hirsche, nebst den Schaalen und Oerrücken zu diesem Behuf auf, und weicht sie kurz zuvor, ehe man eine solche Jagd anstellen will, in reines, warmes Wasser ein. Diese bindet man hernach an eine Leine, und ein Jäger reutet damit in verschiedenen Krümmungen durch den Wald, dem sodann die übrigen Jäger mit der Meute unter Beobachtung aller, bey einem Parforcejagen üblichen Gebrauche folgen. An vielen Orten hält man nicht mehr viel auf diese Art von Jagd, weil dadurch die Hunde oft mehr auf die Witterung des Pferdes, mit welchem der Jäger voran-

reutet, als des Hirschens, gewöhnet werden. Sie halten daher für besser, einen schlechten Hirsch anzuschießen, und ihn dann mit den Hunden vollends tod zu bringen, diesen auch den Geruch zu geben und das Carée zu machen.

Trappe, Otis tarda — auch großer Trappe, gemeine Trappe, Akertrappe und Trappgang genannt, macht unter den hühnerartigen Vögeln, oder in der achten Ordnung eine eigene Gattung aus, deren Kennzeichen sind: ein kurzer, etwas kegelförmiger und krummer Schnabel; eiförmige Nasenlöcher; eine zugespizte und etwas gespaltene Zunge; die Füße über den Fersen etwas nackt und mit drey unverbundenen Zehen. Er macht den Uebergang von den Hühnerartigen zu den Sumpfvögeln; hat aber doch in seiner Lebensart, Sitten und Betragen noch mehr Aehnlichkeit mit dieser Ordnung. Die Kennzeichen der Art bestehen in folgenden: Der Oberleib ist rostroth mit dichter schwarzer wellenförmiger Zeichnung. Das Männchen hat an beyden Seiten des Kopfes einen buschigen und an beyden Seiten der untern Kinnlade einen faserigen Bart, welche beyde dem Weibchen fehlen. Bey uns kommen drey Arten vor, als der große, kleine und Kracken-Trappe s. oben. Unter dem wilden eßbaren Geflügel ist Trappe in Deutschland der größte. Er ist viertelhalb Fuß lang, wovon der Schwanz neun Zoll wegnimmt, sechs Fuß breit und wiegt,

wiegt, wenn er im Herbst gut bey Leibe ist, vier und zwanzig bis dreyßig Pfund. Das Weibchen ist um ein Drittheil kleiner, und wiegt nur zehn bis vierzehn Pfund. Der Schnabel ist fast drey Zoll lang, gerade nur oben etwas gewölbt und vorne ein wenig übergebogen, stark und graubraun; die Nasenlöcher sind eyrund, liegen an der Seite und sind oben mit Federn bedeckt; der Augenstern ist rothgelb; das Ohr sehr groß und mit buschigen weißgrauen Federn besetzt; die Zunge ist knorplich, gefranzt und zugespitzt; unter derselben ist eine Oeffnung zu einem fußlangen Sacke, der nach dem Schlunde wegliegt, und sieben Pfund Wasser faßt, das vielleicht der Trappe, wie das Kameel, im Nothfalle braucht, und das ihm ein Rettungsmittel gegen die Raubvögel ist, indem er es von sich spritzt, wenn er von ihnen verfolgt wird. Die Schienbeine sind fünf Zoll hoch, stark, über den Knien etwas nackt, geschuppt und grau; die Nägel stumpf, groß und hornfarben. Der Kopf hat zur Seite an den Wangen und hinter den Ohren auch oben über den Augen nach dem Nacken zu, weißgraue buschige Federn, und ist, so wie der Nacken und Unterhals, hellaschgrau; der Augenring und die Seiten des Halses sind weiß; der Oberhals und ein breiter Kragen, der den hintern Theil des Halses bis zur Brust umgiebt, schön rothbraun, an den Seiten mit schwarzen Wellenlinien, und vorn aschgrau gefleckt; der übrige Oberleib roth-

roth, mit dichter schwarzer wellenförmiger Zeichnung, die sich sehr schön ausnimmt; die obernen Deckfedern des Schwanzes sind mittelmäßig lang, rothbraun mit schwarzen Queerlinien; an beyden Seiten des Unterkiefers hängen acht Zoll lange schmale weißliche Bartfedern, die sich nach den Seiten fächerförmig ausbreiten; hinter denselben sind die Seiten des Halses fast kahl; um den Anfang der Brust läuft eine aschgraue Binde; Brust, Bauch, Schenkel, die Deckfedern der Unterflügel und die vordernen Deckfedern der Oberflügel sind weiß, graulich überlaufen; die untern Deckfedern des Schwanzes sind mittelmäßig lang und weiß; die zehn ersten Schwangfedern schwarz, die sieben folgenden weiß, die zwey folgenden weiß, gegen die Spitze schwärzlich und röthlichgelb gefleckt, die übrigen weißrothgelb, schwarz und roßbraun bandirt; der Rücken der Flügel, oder die Schulterfedern und hinternen Deckfedern, sind roßgelb, schwarz und roßbraun dicht gewellt, und werden von einer weißgrauen Binde umfaßt; die zwanzig Schwanzfedern sind roßroth, mit einzelnen schwarzen Querstreifen und dergleichen Flecken und breiten gelblich weißen Spitzen. Die Spitzen der Rieme und alle Flaumfedern sind schön rosenroth. Das Weibchen ist weit kleiner, als das Männchen; hat keinen Bart am Kinn; Kehle und Seiten des Kopfes sind braun; der Unterhals aschgrau, der Kopf und Oberhals aber einsfarbig mit dem

Z

Rat.

Rücken, doch nicht von so lebhafter gelbrother Farbe, und nicht so egal in die Quere gestreift, als bey den Männchen; die Flügelränder sind schwarz. Doch giebt es auch Weibchen, die den Männchen ganz gleich sehen, nur daß ihnen der Bart fehlt. Es sind aber sehr alte Vögel. Varietäten. a. Der bunte große Trappe. Er hat große weiße Flecken auf dem Oberleibe, zuweilen ganze weiße Deckfedern der Flügel. Diese Trappen sind scheue, furchtsame und sehr vorsichtige Vögel. Den Hund fürchten sie mehr, als den Menschen, das Pferd aber lassen sie nahe an sich kommen; beydes scheinen gemachte Erfahrungen zu seyn, da sie nämlich der Hund, wenn er nahe genug ist, ehe sie auffliegen können, einhohlen kann, und das Pferd des Landmannes, das ihnen immer nahe ist, ihnen noch nichts zu Leide gethan hat. Ihr schwerer Körper macht, daß sie nicht leicht auffliegen können, wenn sie sich aber erhoben haben, so machen ihre großen breiten Flügel, durch welche sie sich auch vor andern hühnerartigen Vögeln unterscheiden, daß sie große Strecken fliegen können. Man hört selten eine Stimme von ihnen, außer zur Falzzeit und im Zorne ein gewisses Knurren und Brummen. Ganz Europa bis Schweden hinauf und das nördliche Asien sind die Heymath dieses Feldgeflügels. Sie lieben die ebenen Fruchtfelder, und kommen nur im Winter, wo sie als Strichvögel von einem Orte zum an-

dem gehen, in der Nähe der Waldungen auf die Saatkäfer. Wo sie in einem kleinen Bezirk etliche Felder mit Winterrübsaat antreffen, da bleiben sie den ganzen Winter über, und fliegen, wenn sie von dem Jäger aus diesem Felde verscheucht werden, in das andere, und so fort. Im Herbst reitiren sie sich in Truppen von sechsen bis zu sechzig, und ziehen von einem Felde bis zum andern, und sind immer da, wo der wenigste Schnee liegt, daß sie zur grünen Saat kommen können. Im Norden selten es Zugvögel seyn. Ihre Nahrung besteht aus allerhand Getraide, vorzüglich aus Weizen und sonstigen Gesämen und Körnern, aus Kohl- und Kopfskrautblättern, Mohrrüben, Insekten und Würmern, und im Winter aus grüner Saat, am liebsten aus dem Blättern der Winterrübsaat. Zur Beförderung der Verdauung brauchen sie kleine eckige Kieselsteinchen, Stückchen Metall und Geld, das sie auf den Aedern finden. Sie leben in Polygamie, und im May und zu Anfange des Aprils sammeln sich die alten Männchen drey bis sechs und die Jungen zwey bis vier Weibchen aus dem Truppe, mit welchem sie im Winter herumgestreift sind. Dann giebt es oft blutige Kriege, in welche, wie gewöhnlich, die jungen Männchen den Kürzern ziehen. Die Hähne machen fast ähnliche Gebeerden, wie die Truthühner, schleichen mit radförmigen Schwänze und gesenkten Flügeln herum, und sträuben die Kopf- und Bartfedern

federn. Der Hahn tritt dann eine Henne um die andere, und geht, bis sie alle gehörig befruchtet sind, nicht von denselben. Diese schleichen sich, wenn sie den Trieb zum Nestmachen fühlen, von selbst von ihm weg, und er irrt dann wieder einzeln im Felde herum. Die Henne scharrt eine Grube in den Boden, vorzüglich gern auf Haferstücken, zieht einige Getraide- und Grashalmen um sich herum, und legt zwei bis drei schmutzig olivengraue mit großen und kleinen olivengrünen und aschgraubraunen Flecken bezeichnete Eier, die die Größe der Gänseeyer haben. Sie werden vier Wochen bebrütet, und wenn die Jungen ausgekrochen sind, so laufen sie mit der Mutter davon. Diese sehen den Vater nicht eher, als bis im Herbst die Felder leer sind, und mehrere Familien sich vereinigen, und im Winter dann große und kleine Heerden bilden. Man darf die Eier nicht mit bloßen Händen berühren, wenn die Mutter nicht davon bleiben soll. Sie widersteht sich auch auf dem Neste gegen Hunde und Menschen, und wenn sie dieselben eher bemerkt, so sucht sie sich davon zu entfernen, indem sie ihnen immer so nahe bleibt, daß sie sie zu greifen glauben. Die Jungen sehen der Mutter ähnlich, und die Männchen bekommen nach dem ersten Mausern erst die buschigen Bart- und Backenfedern. Man kann sie, wie die jungen Haushühner, aufziehen, und zu dem Hausgeflügel gewöhnen. F ü c h s e, I t t i s s e

und Marter suchen Eier und Junge auf, auf letztere stoßen auch R a u b v ö g e l, allein an alte wagt sich nur der Adler. Eine gelbliche M i l b e wohnt auf ihnen, besonders auf den Jungen, denen sie beschwerlich werden muß, da man sie auf manchen so häufig findet, daß sie abgezehrt sind. Man jagt sie mit Windhunden, doch muß man ihnen nahe seyn, weil der Anlauf zum Aufspringen nicht so groß ist, wie ihn manche Jäger beschreiben. Man schießt sie mit dem Schußpferde, auf Marsforcepferden, mit der Karren- oder so genannten Trappenbüchse, die auf einem Wagen liegt, auch indem man sich in Weibkleidern oder in einem Fuhrmannskittel und Korbe mit einer großen mit Lauffugeln geladenen Flinte an sie zu schleichen sucht, und auf dem Felde im Winter, indem sie eine Menge Schützen, wenn sie sich auf der Saat äßen, umstellt, durch Hunde oder Treiber aufstöbern läßt, und mit Lauffugeln, wenn sie über ihnen wegstreichen, unter sie schießen. In Thüringen schießt man sie noch auf folgende Art: Man merkt sich den Stand, wo sie sich des Nachts befinden. Dieser ist fast immer derselbe, und zwar so, daß auch die einzelnen Trappen, die zu einer Familie gehören und zusammen halten, immer an der nämlichen Stelle stehen. Dahin schleicht man sich des Nachts mit einer Laterne, die man unter einem schwarzen Tuchmantel nebst der Flinte verbirgt;

So bald man an den Ort kommt, wo der erstere steht, öffnet man den Mantel, setzt die Laterne hin, die Trappen werden geblendet, bleiben betäubt stehen, und man kann mehr als einen auf einmal erlegen. In einigen Gegenden lockt man sie auch im Winter mit ausgestopften Lockvögeln und hingestellten Krautköpfen unter das Schlaggarn. Man kann sie auch, wiewohl etwas unweidmännisch auf Teller reißen und in Schwanhälsen fangen, wenn man auf den Abzug ein Braunkohlherz bindet. Das Wildpret der jungen Trappen ist zart, wohlschmeckend und gesund; das der alten muß erst gebäizt und dann durch gewürzhafte Zubereitungen schmackhaft gemacht werden. Die Spulen braucht man zum Schreiben und an die Angeln, weil die Fische die schwarzen Flecken für Fliegen halten und gern anbeissen. Wo sie sehr häufig sind, da thun sie an den Weizen, wenn er ausgesäet wird und wenn er reif ist, keinen geringen Schaden. Eben so, wenn es im Winter naß ist, an der grünen Saat. Sie gehören zur hohen Jagd, werden aber theils wegen ihrer Scheuheit, theils wegen ihres Schadens nicht pflöglich gehegt.

Kleiner Trappe — *O. Tetrax*. Linn., er hat auch die Namen: Zwerch-, Zriel-, und Grielttrappe, Trappen-zwerch. Der Oberleib rothgelblich, schwärzlich gespricelt und mit kleinen irregulären Linien in die Quere gestreift; Kopf und Hals glatt; am Männ-

chen der Hals schwarz mit einem doppelten weißen Halsbande; — am Weibchen der Hals von der Farbe des Rückens; ohne Halsbänder, $1\frac{1}{2}$ Fuß lang. Sein Wohnort ist in den Ebenen des südlichen Deutschlands, in Oesterreich, Schlessien einzeln und wandert in Heerden. Er hat eben die Nahrung, wie der vorige, und sein Nest in einer gescharrten Vertiefung mit 3 bis 5 grauen Eiern.

Trauerente — *A. nigra*, Linn. — hat auch die Namen: Mohrente, schwarze Ente, schwarze Seeente, und gehört mit dem Schwan in eine Gattung und Familie. Bey dem Männchen ist der Schnabel schwarz, in der Mitte gelb, der fleischige Wurzelhöcker (im Sommer) fleischroth, durch eine gelbe Linie getheilt; der ganze Leib schwarz; dem Weibchen fehlt der große Nasenhöcker, und die Farbe ist blos schwärzlich oder schwarzbraun, am Bauche weiß gefleckt, 22 Zoll lang. Sein Wohnort ist der Norden — kommt aber oft, und zwar einzeln, nach Deutschland im Winter. Seine Nahrung ist Gras, Muscheln und Schnecken.

Treibjagen, Klopjagen, Klapperjagd, Treiben nennt man eine jede Jagd, wo das Wild durch Personen auf- und fortgetrieben, und durch vorgestellte Schützen geschossen wird. Es geschiehet auf Roth- u. Schwarzwildpret, Rehe, Füchse, Hasen und Schnepfen, entweder mit

mit Netzen, so, daß auf beyden Seiten Netze vorgelegt werden, oder mit Federlappen, welche auf beyden Seiten vorgezogen worden, damit kein Wild zur Seite auspralle, oder auch ohne Netze und Federlappen. Auf alle Arten von Wildpret geschiehet es im Holze, auf Haasen aber auch im Felde. Die Treiber müssen bey dem Anfange des Treibens in eine Reihe gestellt werden; im Felddreiben aber eine Art von halben Mond bilden, und sodann in gerader Richtung wie sie angestellt sind, ohne großen Lärm zu machen, fortgehen. Im Holze müssen sie einander von Zeit zu Zeit zurufen, um die Richtung bey zu behalten, auch wenn sie ein Wild sehen, habacht rufen, und dazu sagen, was es ist, z. B. habacht ein Reh, auch müssen sie mit ihren Stöcken an die Bäume und Sträucher klopfen; im Felde müssen sie mit den in Händen habenden Klappern, klappern. In der Mitten muß der Jäger gehen, der das Treiben befehliget, auf jeden Flügel muß auch ein Schütze gehen, um das ausprellende Wildpret zu schießen. Das Treiben muß so angestellt werden, daß der Wind von den Treibern auf die Schützen zugehe. Die Schützen werden da angestellt, wo das Treiben zugehet, auch müssen zu beyden Seiten des Treibens einige angestellt werden, weil die Rehe meistens zur Seite ausprellen. Im Felde müssen sich die Schützen in Ermangelung schicklicher Anstände in Gräben, hinter Rainen, oder auch auf den

Bauch auf die bloße Erde legen. Die Felddreiben sind eine eben so angenehme Jagd, als die Holzdreiben, sie sind aber der Wildbahn schädlich aus folgenden Gründen: 1) Kann man dabey keinen angeschossenen Haasen nachsuchen, folglich muß alles Ungeschossene ungenutzt umkommen. 2) Laufen dabey gewöhnlich viel ungeschickte Schützen mit, die mehr zu Schanden, als todt schießen. 3) Wird allemal ein ganzer Distrikt ausgejagt, und die Haasen, die nicht geschossen werden, durch den vielen Lärm, den sie immer hinter um und neben sich hören, veranlaßt, in ein anderes Revier zu gehen, wodurch das Revier von Haasen entblößt wird. Ueber dieses sind solche Jagden, wo man allerley Volk mitnimmt, eine Pflanzschule für Wildddiebe.

Treiben (ein Treiben) nennet man den Bezirk, der auf einmal und unter einem Vorstellen der Schützen, abgetrieben wird.

Treibzeug, Treibzeug ist ein Geräthe zum Fange der Rebhüner. Es bestehet: 1) in einem in die Runde gestrickten, vorn weiten, und hinten spitzig zulaufenden Garne, in Gestalt eines solchen Garsackes, wie man zur Fischerey brauchet, das mit Reifen, die $\frac{1}{2}$ Elle weit aus einander stehen, und nach hinten zu, immer enger werden, von einander gesperrt ist. Dieses heißt der Rebhünerbeerer oder bahmen. 2) In dem Geleiter,

welches zwey, beynahe wie Steckgarne gestricke Netze sind, die zu beyden Seiten an den Hahnen, wo er anfängt, gestellet werden, und immer weiter auslaufen, wie Fig. 10 zeigt, wo a—h der Hahnen und cdef. Das Geleitet ist 3) aus einem Schilde, worauf eine Kuh gemahlt ist, s. Schild. Wenn man nun durch Verhören am Morgen, oder durch den Hühnerhund weiß, wo Hühner liegen, so stellet man den Hahnen in eine Furche, wo man glaubt, daß die Hühner hinlaufen, und gehet dann von der entgegen gesetzten Seite ganz langsam mit dem Schilde auf die Hühner los, welche die gemahlte Kuh für eine lebende, daselbst weidende halten, wofür sie sich nicht fürchten, sondern immer in der Furche hin, nach dem Garne zu laufen. Wenn die Hühner stille liegen, steht der Hühnerfänger auch stille, wenn sie aber in der Furche hinlaufen, gehet er langsam nach; scheiden sie sich aber an, aufzufliegen, oder zur Seite laufen zu wollen, oder sich zu zerstreuen, so daß nur einige laufen und die andern stehen bleiben und hörchen, so muß er auch ganz stille stehen bleiben. Sobald sämtliche Hühner im Sacke sind, läuft der Jäger leise zu, bindet das weite Ende zu, und ziehet dann die Schleife des engen auf, und nimmt die Hühner heraus.

Tritt ist eines der vorzüglichsten Unterscheidungszeichen des Hirsches vom Thiere; man hat davon folgende Arten: den Bey-Blende-Kreuz- und Schloßtritt, s. d. Wörter.

Trommel ist ein Garnsack, in welchem von einigen Jägern mittelst eines Lichtes, die Staa-re des Nachts auf den Teichen gefangen werden.

Tuchlappen oder Tücherlappen sind Streifen von grober, doch weiß gebleichter, Leinwand $1\frac{1}{2}$ Elle lang, $\frac{3}{4}$ Elle breit, die man, in Zwischenräumen von $\frac{3}{4}$ Elle an Leinen nähert, um sie im Nothfalle statt der Tücher zu gebrauchen; wenn man unverhöft an Grenzen Roth- oder Schwarz-Wildpret, oder Wölfe spüret, um dann in Ermangelung andern Zeuges damit einzustellen. Ein Bund solcher Federlappen hält in der Länge 40 gedoppelte Waldschritte, oder 100 Ellen, kleiner Fingers dicke Leinen, woran $1\frac{1}{2}$ Schock Ellen Leinwand auf obige Art genähet, an beyden Enden aber 9 Ellen Leine ohne Lappen gelassen werden; an deren einem Ende man einen starken Haaken 2 Ellen lang, von bleichenem Holze, an dem andern aber einen eben so starken Hefel von gleichem Holze, oben mit einem Ringe beschlagen, anschlinget. Zu einfachen Lappen sind die Forkeln 3 Ellen lang, oben mit einem Ringe und Korbe, zu doppelten hingegen, die man besonders zu Rothwild brauchet, müssen sie $4\frac{1}{2}$ Elle lang, und auch in der Mitten mit einem Korbe versehen seyn, um zwey Leinen mit Lappen über einander hängen zu können.

Turteltaube — Col. Turtur — heißt auch gemeine Tur-

Turteltaube, wilde Tur-
teltaube und Wegtaube.
 Die Kennzeichen der Art sind:
 An den Seiten des Halses
 steht ein schwarzer Fleck
 mit weißen Querstreifen;
 der schwärzliche Schwanz
 hat eine weiße Spitze. Sie
 ist etwas stärker als eine Mi-
 stelbrossel, elf Zoll lang, wo-
 von der Schwanz vier Zoll und
 der Schnabel drey Viertel Zoll
 wegnimmt; die Breite ist an-
 derthalb Fuß, und die gefalte-
 ten Flügel bedecken drey Vier-
 theile des Schwanzes. Der Schna-
 bel ist dünn, hornblau, auf der
 Nase roth und weiß; der Na-
 sen roth; der Augenstern röth-
 lichgelb und ein schmaler kahler
 Augentring fleischroth; die Füße
 sind hochroth; die Nägel horn-
 blau; die Fußwurzeln acht Li-
 nien hoch. Die Stirn ist weiß-
 lich; die Wangen sind rothgrau;
 der Scheitel und ein Theil des
 Oberhalses hellblau; von da wird
 diese Farbe bis zum Schwanze
 dunkler und schmutziger, welches
 ein rothgrauer Anstrich verursacht,
 der Rücken mit schwärzlichen Flek-
 ken, die durchschimmern, schwarz
 gewölbt, und die mittelmäßigen
 Steißfedern rothfarben gerändert;
 an beyden Seiten des Halses
 liegt ein schwarzer Flecken, mit
 drey bis vier halbmondförmig
 gekrümmten weißen Querstrei-
 chen, welche von den weißen
 Spitzen der schwarzen Federn ent-
 stehen, und dem Vogel ein gar
 schönes Ansehen geben; der Bauch
 und die mittelmäßigen Astersfe-
 dern sind weiß, die Kehle, der
 Hals und die Brust hellaschfar-

ben ins kupferfarbene und vio-
 lette glänzend, (schön weinfarbig);
 die Schenkelfedern rothgrau; die
 obersten kleinen Deckfedern, die
 Deckfedern der ersten Ordnung,
 und die Astersflügel, (an den
 beyden ersten schwärzlichen Flecken
 durchstehend), hellaschfarben, die
 übrigen Deckfedern, so wie die
 Schulterfedern schwärzlich mit
 breiter rostrother Einfassung; die
 vordern Schwungfedern dunkel-
 braun ins blaue fallend, mit sehr
 schmalen äußern Ranten, die
 hintern aschfarben mit rosenro-
 then Ranten; der abgerundete
 Schwanz schwärzlich, die mitt-
 lern Federn einfarbig mit schma-
 len sich verlaufenden rostfarbe-
 nen Ranten, die übrigen mit 1
 Zoll großen weißen Spitzen, wel-
 che bey dem Fluge des Vogels einen
 weißen Halbzirkel bilden, die äu-
 ßerste auch noch äußerlich weiß-
 kantirt. Das Weibchen ist
 kleiner, hat einen sehr kleinen
 spitzigen Kopf; die Brust ist
 blässer, und besonders sind die
 Ranten der Deckfedern der Flü-
 gel nicht so schön, auch nicht so
 stark, und, statt rostroth, rost-
 farben gerändert, und also nicht
 so lebhaft als am Männchen;
 der schwarze Halsfleck nicht, so
 breit, und die Rückenfarbe mehr
 rothgrau als aschgrau; auch fehlt
 die weißliche Stirn, und die
 Flügelfedern sind schmutzig dun-
 kelbraun, da sie bey dem Männ-
 chen reiner sind, und sich mehr
 ins schwärzliche ziehen. Unter
 den Waldtauben ist dieß die nied-
 lichste, und da man in der Stu-
 be, wie bey den Lachtauben
 eine außerordentliche Anhänglich-

keit

keit des Männchens an das Weibchen bemerkt, so gilt sie für das Bild der Keuschheit und ehelichen Treue. In Feldhölzern list sie außerordentlich scheu und furchtsam, in großen Waldungen aber nicht. Da sie, besonders jung aufgezogen, sehr kirre werden, so sind sie in Thüringischen Walddörfern gewöhnliche Stubenvögel, von welchen der Aberglaube sogar glaubt, daß sie die Flüsse und Krankheiten an sich zögen, da sie oft geschwollene Beine bekommen, wenn sie in einer sichtigen Stube sind. Ihre Heimath ist ganz Europa, der Norden ausgenommen, Asien und die Inseln der Südsee. Sie halten sich in Laub- und Nadelwaldungen auf, und in großen gebirgigen Gegenden, bloß in den Vorbergen. Als Zugvögel kommen sie erst zu Ende des Aprils, oder Anfange des Mayes an, und verlieren sich zu Anfange des Septembers wieder nach und nach. Zu Anfange des Augusts versammeln sie sich in Flügen zu zwanzig und mehreren und gehen, wenn es nicht hinlänglichen Fichtensaamen in den Wäldern giebt, nach den Feldern. Sie fressen die meisten Getreidearten, Roggen, Weizen, Gerste und Heidekorn, Lein, Hirsen, Hanf, Rübsaamen, Wicken und vorzüglich gern, wie alle Tauben, Erbsen. Auch die Heidelbeeren suchen sie ab. Zur Paarungszeit heult die Turteltaube in einem tiefen Tone, steckt den Kopf darzu nieder und steht stille. Auch bey Veränderung des Wetters lassen sie eine

heulende Stimme hören. Sie nisten gewöhnlich nur einmal des Jahres, und zwar auf hohen und niedern Bäumen, auch auf Sträuchern. Das Nest ist schlecht gebaut, und wird daher leicht vom Winde zerstört. Es enthält zwey weiße eyrunde Eyer, die in 14 Tagen von beyden Gatten wechselsweise ausgebrütet werden. Die Jungen sehen am Oberleibe rothgrau aus, und sind auf den Flügeln etwas schwarzblau gefleckt. Nach den ersten Mausern verändern sie diese Farbe in die oben beschriebene. Man zieht sie auf, und sie paaren sich dann in der Stube mit den Lachtauben. Er hat eben die Feinde wie die Holztaube; vorzüglich sind sie der Verfolgung der Sperber sehr ausgesetzt, die immer hinter ihnen her sind. Im Jahr 1788 nistete auf den Vorbergen des Thüringerwaldes in den Fichtenholzungen eine außerordentliche Menge dieser Vögel, und sie waren so kirre, daß man sie an der Tränke mit Stöcken todt schlagen konnte. Vielleicht hatten sich hier wegen übler Witterung, oder weil sie so viel Fichtensaamen antrafen, solche Flüge niedergelassen, die in eine weit nördlichere, wenigstens von Menschen nicht so gestörte Gegend gehörten. Sie flogen das ganze Jahr nicht ins Feld, sondern lasen bloß Fichtensaamen auf. Man hat bemerkt, daß die beyden Jungen nicht wie bey andern Tauben nach einer Seite zu sitzen, sondern wechselsweise, die eine mit dem Kopfe nach dieser, und die andere nach jener

Seite zu, vielleicht aus einen natürlichen Instinkte, damit sie die Gefahr nach allen Seiten bemerken. Sie gehören zur niedern Jagd. Bey den Salzlecken fängt man sie in Schlingen; sonst schießt und fängt man sie wie die Holztauben. Ihr Fleisch, besonders das der

Jungen, ist vorzüglich gut und schwachhaft. Die alten Jungen opferten vorzüglich Turteltauben — gewiß ein Beweis, daß sie gut schmecken müssen. In Erbsenfeldern thun sie, da wo sie häufig sind, oft beträchtlichen Schaden; weniger beträchtlich an der Fichtensaart.

U.

Ubereilen sagt man von jungen Hirschen, wenn sie, wegen der in ihren Gelenken, Fleischen und Sehnen annoch obwaltenden Biegsamkeit, den Hinterlaufs über den Vorderen setzen.

Ueber den Zeug fallen heißt, wenn bey einem Jagen ein Hirsch oder sonst ein Thier, über den Zeug hinaus ins Lichte und Freye kommt.

Uebergangen ist, wenn der Leithund aus zu großer Hitze und Begierde über die Fährte hinschießt.

Uferschwalbe — *Hir. riparia* — heißt auch Wasserstrand: Rhein: Sand: Dred: Roth: Erd: Meer: und Felsenschwalbe, Gestettenschwalbe, graue Schwalbe, Wasserschwalbe und Rheinvogel, gehört unter die erste Familie der Schwabengattung als eigene Art. Sie hat einen aschgraubraunen Oberleib; eine weiße Kehle und Bauch,

fast nackte Füße und eine Länge von fünf Zoll. Uebrigens wechselt sie auch in der Farbe, und man findet bisweilen weiße Spielarten darunter. Sie wählt sich zum Aufenthaltsorte die Ufer der Flüsse, großer Seen und Teiche; zieht aber im Herbst gesellschaftlich weg, so bald ihre Nahrung die Wasserinsekten zu mangeln anfangen. Ihr Nest trifft man an in Höhlen der sandigen Ufer, in Steinlöchern, Lehmgruben, alten Mauern und steinernen Brückenlöchern mit 5 bis 6 weißen, röthlich aschgrau gewollten Eiern.

Uhu ist als Eulenart unter der Gattung Eule.

Unterleine ist die unterste Reine an den Jagdtüchern und Wildpretsnehen.

Unweidmännisch heißt alle Jägeren, welche wider die Regel ist, und wodurch das Wildpret auf eine martervolle Art sein Leben verliert.

B.

Verbeißen oder **Verbissen**, sagt man, hat der Auerhahn, wenn er im Frühlinge den buchenen Vorschuß genießt, und dann nicht mehr falzet.

Verbeißen oder **Verfangen** sagt man von Hauhunden, wenn sie sich beim Fangen eines Hirsches oder einer Sau so fest einbeißen, daß sie von selbst nicht wieder losgehen können.

Verbrechen heißt, wenn der Jäger ein erlegtes Stück Wild mit grünen Reifern bedeckt; oder ein abgebrochenes Astchen, Bruch genannt, mit der Spitze in die Fährte bergestalt legen, daß die Spitze des Bruches hinweist, wo das Wild zugegangen ist.

Verrecken heißt beim Hirsche, wenn er sein Geweihe abgeworfen; vom neuen das Gesäuge vom Kolben abgeworfen, und dieses wieder seine gehörige Stärke erlangt hat.

Verenden, ist so viel als enden.

Verhalten sagt man von Sangvögeln, die man zu Lockvögeln auf dem Vogelheerde bestimmt hat, und die man den Sommer über in ihren Käfigen an finstern Orten hält, damit sie nicht singen, sondern ihren Gesang bis dahin aufsparen, wenn man ihn auf dem Vogelheerde zum Locken nöthig hat, s. Lockvogel.

Verlappen heißt allerley Wildpret mit Lappen, geschwinde, als solches mit Rehen oder Luchern geschehen kann, einstellen. Wenn in einem Revier oder Dichtge Wildpret steht, von dem man glaubt, daß es nicht aushalten möchte, bis es mit dem Zeuge umstellt ist, so schlägt man in aller Eil Luchern oder Federlappen vor; wenn das Wildpret dieselben sieht, scheuet es sich dafür, und prellet wieder zurück. Die Luchernlappen nimmt man bey Stellen bundweise auf Haafen, und damit das Stellen geschwinde von Statten gehe, müssen 2 Mann Löcher machen, 2 die Forkeln einstößen, und einer die Lappen stellen. Vorzüglich muß man die Wechsel gehörig mit Lappen behängen. Im Walde kann man in der Geschwindigkeit und in Ermangelung von Forkeln, die Leinen der Lappen an Bäume und Sträucher binden, und wenn sie schlaff hängen, mit Lappreifern unterstützen. Man stellet auch bisweilen zwey Reihen Lappen über einander, hierüber s. Luchernlappen. Man verlappet bisweilen, wenn man Feldtreiben machen will, des Nachts vorher das Holz, damit die Haafen, aus Furcht vor den Lappen, nicht ins Holz gehen, und man desto mehr auf dem Felde antreffen möge. In Ermangelung von Federn, macht man auch Lappen von Strohwischen statt der Federn in die Leinen gebunden.

Ver.

Verlorne's Treiben heißt, wenn man ein Gehölz, vor welchem keine Schützen angestellt sind, das aber an das bestellte Treiben gränzet, ordentlich durchtreiben läßt, um das etwa darinnen befindliche Wildpret heraus und ins Jagd zu treiben.

Viole nennt man den Büschel Haare über der Standarte des Fuchses, weil sie einen Weichenartigen Geruch haben.

Vogel, ist ein zur zweyten Klasse des Thierreichs gehörendes lebendiges Geschöpf, das sich von den Säugethieren durch folgende Kennzeichen unterscheidet: 1) durch den Schnabel, 2) durch die Flügel, welche ihm dienen sich lange in der Luft zu erhalten und geschwind von einem Orte zum andern zu kommen; hierzu tragen auch die hohlen und von Marke leeren Knochen, wodurch der Körper um ein Großes an Leichtigkeit gewinnt, vieles bey. 3) Durch die Beine, deren die Vögel nur zwey, die Säugethiere hingegen 4 haben, welche auch anders gestaltet sind. 4) Durch die Federn, womit der Körper statt der bey den Säugethieren statt findenden Haare bedeckt ist. 5) Durch die Lunge, welche nicht, wie bey den Säugethieren, frey in der Brust, sondern an Rücken und andern Ripben angewachsen ist, und mit verschiedenen zellichten Geweben, als Luftbehältern, in Verbindung steht, und daher den langen zum Fliegen und Singen nöthigen Odem, bewirkt. 6) Durch

die Art der Fortpflanzung, da sie nicht lebendige Junge zur Welt bringen und säugen, sondern Eyer legen und diese in kürzerer oder längerer Zeit ausbrüten. Nach ihrer verschiedenen Nahrung und Lebensart theilt man die unter zehn Ordnungen gebrachten Vögel in Hauß- und wildes Geflügel, und letzteres wieder in Land- oder Feld- Wald- Wasser- und Sumpfvögel; alle diese letztern Klassen aber in nutzbare, Sanges- Raub- und solche Vögel, von denen weder einiger Nutzen noch Schaden bekannt ist.

Vogelbauer, Gebauer, Käfig, ist ein von Holz oder Drath verfertigtes Behältniß, um darinnen lebendige Vögel aufzubewahren. Je nach der verschiedenen Größe und Lebensart der Vögel sind auch die Gebauer von verschiedener Größe und Beschaffenheit, welche hier einzeln aufzuführen, zu weitläufig seyn würde.

Vogelfang, ist die Art und Weise, sich der Vögel lebendig oder todt zu bemächtigen. Dieses geschieht mit Garnen und Netzen auf verschiedene Weise, auf allerley Heerden, mit Steck- und Streichnetzen, mit Schleifen, Schlingen, Sprenkeln, in Falten, mit Leimruthen, Kloben, Schlagbauern, mit Falken und durch Schießen. Wie solcher in jedem Monate zu bewirken, ist am Ende dieses Bandes in dem angehängten Jagdkalender nachzusehen.

Vogel:

Vogelheerd, ist ein Platz, auf welchem man Neze ausbreitet, und Lockvögel stellet, um die auf den Platz fallenden Vögel, aus der dabey stehenden Hütte zu berücken und zu fangen. Man hat Wald: Feld: Strauch: Perchen: Spring: Tränk: Schröck: und Schußheerde, s. diese Wörter. Nach Königl. Sächsis. Gesetzen dürfen die Niederjagdberechtigten zwar auf ihren Güthern Vogelheerde haben, sie dürfen aber fremden Leuten keine Vogelgestelle vermietthen; was aber die Königl. Vogelheerde betrifft, so sollen solche jährlich zugleich durch den Jägermeister, Amtsverwalter, Ober: oder Unterförster, wo es ohne Nachtheil der Wildbahn geschehen kann, vermiethet, der Zins auf Förstereyen im Michaelis Monath erlegt, und durch den Amtsverwalter treulich verrechnet, auch in der Rechnung nachahmhaftig gesetzt werden, wie hoch jeder Vogelheerd, Dohnen und ander Vogelgestelle vermiethet worden, und wo sie gelegen, s. Forst: und Holzordn. vom 8. Septbr. 1560 C. A. II. S. 497. Doch sollen die übermäßigen Vogelgestelle eingezogen, was aber an unschädlichen Orten bewilliget, davon sollen die Zinsen erhöht, und von einem großen Vogelgestelle weniger nicht als 1 Neuschock; von einem kleinen aber 30 Gr. erlegt und berechnet werden. S. Ref. Punkte vom 28. Aug. 1697. No. 27. C. A. II. S. 591 und Gen. vom 10. Jul. 1753. No. 27. S. C. A. I. S. 1527.

Vogelleim, ist ein sehr kleblicher Leim, den man zum Fange der Vögel auf Leimruthen braucht, und der auf folgende Arten bereitet wird: 1) Man nimmt Eichenmistel, streift die Stängel und Blätter davon ab, legt sie in einen Topf, und läßt sie im Wasser 2 Stunden lang sieden. Wenn es dick genug ist, gießt man kaltes Wasser in einen tiefen Napf, und den Leim dazu, damit er zähe werde. Hierauf legt man ihn auf etwas hartes, schlägt mit einem Hammer oder nassem Stöck so lange darauf, bis er alle Körner fahren lassen, wäscht ihn wieder mit frischem Wasser ab, thut ihn in einen Topf mit Leinöl oder Wasser, und hebt ihn in einem mit Wachspapier verbundenen Topfe auf. Beym Gebrauche nimmt man jedesmal so viel davon, als man nöthig hat, thut es in eine Schüssel und etwas Leinöl dazu, und läßt es auf Kohlen zergehen, aber nicht sieden, so ist der Leim zum Gebrauche fertig. Wenn im Sommer der Vogelleim zu weich werden will, nimmt man auf ein Maß Vogelleim, eines halben Hünereyes groß von dem feinen Harze, das man in den Tannenblättern findet, läßt es zusammen über einem gelinden Kohlf Feuer zergehen, rührt es wohl untereinander, und kühlt es in frischem Wasser wieder ab. Wird aber im Gegentheile der Vogelleim bey kaltem nassem Wetter zu zähe, so rührt man unter ein Maß Vogelleim einen Eßlöffel voll reines Leinöl. Im Winter bey hartem Froste tunket man die

die Hände in Brandwein und durchknetet damit den Leim, so frieret er nicht. Ist der Leim von langem Gebrauche an den Ruthen schwarz worden, so zieht man ihn in warmen Wasser ab, wäscht die Unreinigkeiten heraus, brennt ihn auß neue ein, und gebraucht ihn auß neue. 2) Einen Wasserleim, nämlich einen solchen Vogelleim, der auch im Wasser hält, bereitet man folgender Gestalt: Man legt gemeinen Vogelleim in warmes Wasser, worinnen man die Hand leiden kann, wäscht ihn so lange, bis er rein genug ist; sodann knetet man zerlassenes Schweinschmeer so lange unter den Leim, bis er anfängt an den Händen zu kleben, dann setzt man ihn in einem neuen glasirten Topfe aus Feuer und läßt ihn zergehen. Bey kaltem Wetter kann man dann noch ein wenig zerlassenes Schmeer hinzu thun, bey gelindem Wetter aber ist es nicht nöthig. Oder man nimmt zu $\frac{1}{2}$ Pfd. Leim 1 Loth Terpentινό und $\frac{1}{2}$ Loth guten Brandwein, mengt es unter einander, und reibt den Leim, ohne ihn zu wärmen, wohl mit den Händen ab.

Vogelnest, s. Nest.

Vogelsteller, Vogelfänger, ist ein Mann, dessen Geschäft im Vogelfange besteht. Er muß die Natur und Eigenschaften aller Vögel, sowohl als ihre Fangarten aus dem Grunde kennen, und wissen, wenn und wie er jeden derselben auf die zweckmäßigste Art in seine Gewalt be-

kommen kann. Auch soll er die nöthigen Netze selbst zu stricken, den Vogelleim und die Dohnen, so wie alles Nöthige, selbst zu bereiten verstehen, und überhaupt thätig, unverdrossen, wachsam und geduldig seyn.

Vogelwände, sind die Netze, die man zum Vogelfange auf Heerden gebrauchet. Die Größe der Vögel bestimmt die Größe der Wände überhaupt, so wie ihrer Maschen insbesondere. Ihre Beschaffenheit ist bey jedem Vogel besonders aufgeführt.

Volk, Ritte, Rett ist eine Familie Rebhüner, oder Haselhüner, aus dem Paar Alten mit ihren Jungen bestehend, welche jederzeit bis zur Paarzeit beisammen bleiben, und kein fremdes Huhn unter sich leiden.

Volontair, ist ein gelernter Jäger, der keinen Dienst oder Stelle hat, gemeinlich aber sich bey einem Jägerhofs, Forstbeamten oder Forstbedienten aufhält, um sich durch die Übung in seinem Metier immer mehr zu vervollkommen.

Vorgreifen, heißt mit einem Hunde um ein Gehölz oder Dückicht herum ziehen, um zu untersuchen, ob ein hinein gespürtes Wild noch darinnen, oder durch einen andern Weg herausgegangen sey.

Vorhabe, heißt bey einer Koppel, die, dem Landesherrn 14 Tage eher, als den Koppelberechtigten,

tigten, zustehende Ausübung der Jagd in der Koppel.

Vorläufer, s. Läufer.

Vorlaß, s. Weihvögel.

Vorlos, s. Federspiel.

Vorstehender Hund, Hühnerhund, Wachtelhund, ist ein darauf abgerichteter Hund, daß er im Feldreviere vor Hünern, Wachteln und Haasen stehe, bis man dieselben schießen, tyrasiren oder baißen kann und die geschossenen apportire. Er darf keinen gesunden Haasen im Felde jagen, und muß guten Apell haben, d. h. den Ruf oder Pfiff seines Herrn, und wenn er auch wirklich im Stehen begriffen wäre, genau befolgen, und sogleich auf ihn zueilen, auch darf er nicht eher auf das Wildpret zu-

fahren, bis ihn der Schuß oder der Befehl seines Herrn dazu berechtiget. Sie bestehen aus verschiedenen Racen von unterschiedlicher Größe und Farbe. Alle aber sind lang behangen. Die Raze, welche rauchhärig ist, nennt man die Pohlische Raze. Allen Hühnerhunden werden in der Jugend die Schwänze verstugt.

Versuchen nennt man, des Morgens mit dem Hunde um ein Holz herum ziehen, um zu sehen, was von Wildpret hineingezogen.

Vorwurf nennt man das zum Fange der Raubthiere auf einen bestimmten Platz hingeworfenes gefallenes Wildpret, zahmes Vieh u. um Raubthiere damit zu kören;

W.

Wachtel — *Perdix, coturnix* — gehört als eigene Art unter die Gattung Feldhuhn und heißt daher auch kleines Feldhuhn, Quackel, Schlag-Schnarwachtel und Die cur hic-Bogel. Die Unterscheidungs-Kennzeichen der Art sind: Die Hauptfarbe des Oberleibes ist rostgrau, schwarz gefleckt; über den Augen ein gelblichweißer Streich; der Sporn so wie der kahle Fleck am Auge fehlt. Das Männchen hat eine schwarzbraune Kehle und auf der blaßrostfarbenen Brust stehen weißliche Längsstriche; das Weibchen hat eine weißliche Kehle, und die blässere Brust ist

broffelartig schwarz gefleckt. Die Größe ist sieben Zoll, wovon der niedergebogene Schwanz ein und ein Viertel Zoll einnimmt; die Breite vierzehn Zoll und die Flügel reichen bis auf den Anfang desselben. Das Gewicht ein halb Pfund und darüber. Der Schnabel ist fünf Linien lang, vorn übergebogen, im Sommer dunkelhornbraun, im Winter mehr aschgrau; die Nasenlöcher sind länglich in einer aufgeblasenen Haut liegend; der Augenstern olivenbraun; die Schienbeine einen Zoll hoch und so wie die Zehen hellfleischfarben. Die Kopffedern sind schwarzbraun rostfarben gerändert; von den Nasenlöchern bis zum

zum Nacken läuft auf beyden Seiten ein gelblich weißer Strich hin, der nach hinten zu breiter wird, und ein dergleichen schmalerer geht der Länge nach über die Mitte des Scheitels; Bügel und Schläfe sind rothbraun und verwandeln sich in einen dergleichen schwarzgeleckten Streifen nach dem Rücken hin; an den Seiten des Halses ist ein gelblich weißer Fleck; der Oberhals und Ober Rücken schwarzbraun und rostfarben geheckt, mit einzelnen weißen Stricheln; der übrige Oberleib ist mit den Streiffedern, die den Schwanz bis auf die äußerste Spitze bedecken, schwarzbraun mit rostfarbenen Federrändern und sehr schmalen, winklichen hellrostfarbenen Querlinien, und auf den Seiten mit einzelnen länglichen sehr hellrostgelben Strichen, die auf jeder Seite am Rücken bis zum Schwanze herab zwey hellrostfarbene breite, schöne Längsstreifen machen; die schmutzig weiße oder nach der ersten Mauser bis zur zweyten schön rostfarbene Kehle umgeben zwey kastanienbraune Bänder, eins von der Wurzel des Schnabels, das zweyte von den Ohren an, und in der Mitte derselben steht vom Kinn an bis auf das erste Band herab ein schwarzbrauner Fleck; der Unterhals und die Brust sind blaßrostfarben (hellcarmelet) mit einem weißen Längsstrich oben auf jeder Feder; der Bauch ist schmutzig weiß; die Schenkel sind röthlichgrau; die After und die langen untern Deckfedern des Schwanzes rostfarben weiß; die Seiten sind bis zum Schwanze

herab kastanienbraun und auf demselben laufen zwey weiße breite Streifen herab, die mit schmälern, schwarzen eingefäßt sind; die Deckfedern der Flügel sind röthlich grau; die größern mit blaßrostfarbenen Querlinien und einzelnen dergleichen Strichen auf den Schäften bezeichnet; die Schwungfedern dunkelgrau; die vordern auf der äußern Fahne mit vielen schmalen rostfarbenen Querbinden, die hintern auf beyden, und die drey lehtern wie der Rücken gezeichnet; die untern Deckfedern der Flügel und die langen Achselfedern röthlich weiß; die vierzehn niederwärts gekrümmten kleinen Schwanzfedern dunkelbraun mit vier bis fünf rostfarbenen weißen Querbinden und dergleichen Schäften. Das Weibchen unterscheidet sich gar merklich vom Männchen; die Kehle ist bloß weißlich, und hat also den schwarzbraunen Fleck in der Mitte nicht; die Rückenfarbe ist dunkler; die Seitenstriche des Rückens hell rostfarben; die Brust auf der hellern Grundfarbe, wie bey einer Singdrossel, schwärzlich geheckt. In der Jugend kann man die Männchen nicht leicht von den Weibchen unterscheiden. Varietäten: a) Die weiße Wachtel. Entweder rein weiß oder gelblichweiß, oder graulichweiß. b) Die bunte Wachtel. Es sind entweder einige Theile des Körpers weiß, oder sie hat unregelmäßige große weiße Flecken. c) Die aschgraue Wachtel. Sie ist hellaschgrau mit dunkelbrauner Zeichnung und schmutzigweißer Brust. d) Die schwarz

ze Wachtel. Sie ist rußschwarz, am Unterleibe schmutzig aschgrau; allenthalben sieht die dunklere Zeichnung durch. Sie wird manchmal so in der Stube, wenn sie zu viel Hanf bekommt. e) Die große oder die Polnische Wachtel. Sie ist größer als die gewöhnliche, sonst ihr ähnlich. Auch bey uns trifft man solche Exemplare an. Folgende sind Altersverschiedenheiten, die die Vogelfsteller für Abänderungen ausgeben. f) Die Sandwachtel oder der Rothhahn. Ein zweijähriges Männchen mit braunem Fleck unter der Kehle und etwas schwärzlich punktirter Brust. g) Die Mohrwachtel oder der Kohnhahn. Zuweilen sind bey sehr alten Vögeln nicht bloß die Kehle, sondern fast der ganze Kopfschwärzlich oder schwarzbraun. h) Die Steinwachtel ohne dunklen Kehlfleck, doch weißlich wie das Weibchen, nach der ersten Mause sind die Jungen oft so, besonders in der Stube. Die Wachtel ist ein munterer und schüchtern Vogel. Er fliegt wegen der Kürze seiner Flügel nicht leicht, und gern, gewöhnlich muß man ihn aufjagen, und dann schwingt er sich nur eine kurze Strecke, aber mit großer Schnelligkeit, über den Boden hin. Sein Gang ist sehr schnell und mit aufgerichtetem Halse und nickendem Kopfe. Zur Begattungszeit ruft oder schlägt das Männchen Pickwerwick! bis zwölfmal hintereinander, wenn es vorher die leise Töne Wärra! etlichemal gerufen hat. Die Landleute sagen es beträfe dieser Aufruf die Sau-

len in der Erndte, und hieß: Bück' den Ruck! Jener Rector empfahl es seinen Schülern und sagte, es hieß: Dic cur hic? Weiter lassen Männchen und Weibchen noch die zärtlichen Töne Gilla! und im Wohlbehagen ein Schnurren wie die Katzen hören. Das Weibchen lockt außerdem noch das Männchen durch die leisen Töne Püpü! Die Wachtel bewohnt fast die ganze alte Welt, nur nicht den hohen Norden von Asien und Europa. Sie hält sich nur im freyem Felde, vorzüglich auf Weizenäckern auf. Sie gehört unter die Zugvögel, die zu Anfange des Mays, seltener zu Ende des Aprils ankommen, und zu Ende des Septembers oder Anfange des Octobers wieder wegziehen. Sie ziehen nicht truppen- sondern familienweise und zwar des Nachts weg; denn am Tage sieht man sie nicht fliegen. Ihre Nahrung besteht in allerhand Getraide, Samen, Weizen, Hirsen, Rübsensaamen, Hanf, Mohn, in grünen Pflanzen und mehreren Arten von Insekten und besonders Ameiseneyern. In der Stube erhält man sie leicht mit Weizen, Gerstenschrot in Milch geweicht, Semmeln, Brod u. s. w. Sie lieben frisches Wasser und baden sich nicht gern im trocknen Sande oder Staube, sondern wollen es immer angefeuchtet haben. Obgleich diese Vögel in Monogamie leben, so ist doch das Männchen im Frühjahr außerordentlich hitzig und kämpft mit seinen Nebenbuhlern. In der Stube rufen sie die Weibchen, wenn sie ihnen

ihnen nicht zuwillen sind, fast nackt. Das Weibchen legt spät im Julius in ein aus Gras- und Strohhalmen bereitetes Nest, das in einer aufgescharrten oder natürlichen Vertiefung steht, gewöhnlich auf einem Weizenacker, acht bis vierzehn große stumpfe, grünlichweiße, mit großen und kleinen olivenbraunen, wie lackirt glänzenden Flecken und brütet sie in drei Wochen aus. Die wolligen Jungen laufen gleich mit der Mutter davon, lassen sich von ihr hüten; und können gegen die Regel der hühnerartigen Vögel sehr bald, gleich nach acht bis zehn Tagen, fliegen, so daß sie, ob sie gleich bald weggehen und spät ausgebrütet sind, doch ihre Reise ins Winterquartier mit machen können. Sie mausern sich nicht bey uns, sondern, wie man an Stubenwachteln bemerkt, wenn sie an den Ort ihres Winteraufenthalts ankommen, und im Frühjahr, wenn sie bey uns angekommen sind, zum zweytenmal; allein beyde Mal nicht ganz aus. Wie andere Stubenvögel, bekommen sie im Zimmer zuweilen die fallende Sucht. Man sagt auch, daß sie im Freyen damit behaftet wären, und deshalb wollen einige ihr Wildpret nicht genießen, weil sie vergeben; es theile die Epilepsie mit. Füchse, zahme und wilde Raben, Wiesel, Iltisse, Kolltraben, Rabenkrähen und mehrere Arten von Raubvögeln sind Feinde der Alten, der Eier und jungen Brut. Auf ihnen findet man gelbe Milben, wie Flöhe. Als Jägerbeobachtungen mögen folgende hier stehen:

1) Etwas Eigenes ist es, daß

diese Vögel glauben, wenn sie den Kopf in Sicherheit hätten, und den Feind nicht sähen, so wären sie sicher, und würden auch nicht gesehen. Kommt ihnen ein Mensch, Hund oder dergleichen zu nahe, so verbergen sie ihn in ein Loch oder in den Ritz einer Fahrgleise. 2) Das Männchen ist stumm, wenn das Weibchen bey ihm ist, ist dieß aber entfernt, so schlägt es, um es herbeizulocken. So ist es wenigstens im Zimmer. 3) Gegen die Regel der wandernden Vögel ziehen die Wachteln mit dem Winde, und zwar gehen sie gewöhnlich mit dem Nordwestwinde weg, und kommen mit dem Südwinde wieder. 4) Die Wachteln scheuen die Waldungen, doch ruhen sie auf ihren Wanderungen auch wohl in einem Walde aus, wenn sie eben müde sind. Sie gehören zur niedern Jagd. Man fängt sie mit den Hühnerhunde und Tiraf, im Steckgarne, vermittelst einer Lockpfeife oder mit einem lebendigen Weibchen, oder indem man die Steckgarne im Herbst durch einzelne noch bewachsene Aeder steckt und mit Reinen die Wachteln in dieselbe treibt, mit Lockwachteln und dem Treibzeuge, und im Klebgarne. Sie werden auch mit dem Sperber gebait, und mit dem Spionhunde und vor dem Hühnerhunde geschossen. Zwey künstliche Wachtelfänge sind noch folgende:

1) Der Ruf mit der Wachtelpfeife und mit Lockvögeln. In einer Ebene, wo hohes Gras oder halb erwachsenes Getraide steht, legt

U sich

sich der Jäger mit der Pfeife der Länge nach rücklings auf der Erde hin. Ohngefähr zehn Schritte von ihm hängen auf beiden Seiten drey Fuß hoch an Stöcken zwey Weibchen in Käfigen, die wie Handkörbe gestaltet sind. Noch zwey Schritte von diesen hängen auf allen vier Seiten Fluggärnchen auf Stöcken, und zwey von den im Getraide oder Getraide liegenden Jägern stecken ringsherum Wachtelstедgarne, und er selbst ist mit einem Tiraßgarne überzogen. Auf diese Art können in einer Stellung, deren sich in einem Abend zwey machen lassen (denn der Fang kann bloß in der Abend- und Morgendämmerung geschehen), funfzehn bis zwanzig Wachteln gefangen werden; welches einen ganzen Sommer hindurch da, wo es viel Wachteln giebt, etwas Beträchtliches macht. 2) Man verfertigt einen Käfig, dessen Diameter zwey bis drey Fuß hält. In dessen Mitte macht man einen besondern runden Boden, an welchen man einen leinenen Tuchsack oder ein grüngesärbtes Garn heftet, das man durch Reife, wie einen Vogelbauer, aus einander sperren, und oben zusammen binden kann. In diesen innern Raum kommt eine Lockwachtel, d. h. ein wildes oder zahmes Weibchen, das hüzig ist, und die Wachtelmännchen fleißig anruft. Außen herum wird der Vogelbauer mit grüngemahlten Sprossen verwahrt, und mit Thürchen versehen, die sich sehr leicht einwärts aufstoßen lassen, und gleich wieder zufallen. Diesen großen Vogelbauer trägt man dahin, wo man mehrere Männ-

chen hört; das Weibchen lockt herbey, sie stoßen die Thürchen auf, und fangen sich. Oben ist der ganze Bauer mit Tuch bespannt, damit sich die gefangenen Männchen die Köpfe nicht einstecken. Sollten sich einige scheuen, und nicht in den Vogelbauer laufen wollen, so legt man um denselben noch überdieß Schlingen, in welchen sie sich fangen müssen. Das Wildpret ist zart, leicht verdaulich und gesund, so daß selbst Kranke genießen können. Sie sind im Herbst außerordentlich fett, und dadurch so unhülfflich, daß man sie mit der Hand unter dem Getraideschwaden fangen kann. In der Medicin wird nichts mehr von ihnen gebraucht; vom Fleische sagt man, daß es geil mache. Die Wachtel ist ein angenehmer Stubenvogel wegen ihrer Reinlichkeit und ihres Gesanges. Die oben angegebenen Nahrungsmittel wird wohl niemand hoch anrechnen, da sie immer nicht zahlreich sind.

Wachtelgarn, ist ein Stedgarn vom festen starken Zwirne, 18 bis 20 Ellen lang und etwa eine bis $1\frac{1}{2}$ Elle hoch. Es wird in Feldern an kleinen Spießen befestiget. Man stellt es da auf, wo Wachteln schlagen, und legt sich in einer kleinen Entfernung dahinter ins Getraide. Wenn nun ein Hahn schlägt, so ahmet man mit der Wachtelpfeife den Ruf der Sacke, welcher zweylautig, der des Hahnes hingegen, dreylautig ist, nach, ruft aber eine Sacke, so macht man den Schlag des Hahns nach. Doch muß

muß man mit dem Pocken nicht eher anfangen, bis sich die rechte Wachtel hören läßt, und mit dieser zugleich auch wieder aufhören.

Wachtelkönig oder Wiesenschnarrer, Schnärz — *Crex pratensis* Bechst. oder *Rallus Crex* Lin. heißt auch Ralle, Schnarrwachtel, Schnarrer, Schnarker, Schnerker, Wiesenschnarher, Aipschnarr, Schnarrichen, Schars, Schärs, Schrecke, Schreck, Schnarf, Eggenfchar, Schnerpert, Heckschnarr, Grasrätcher, Kreßler, Größel, Feldwächter, Gras- und Wiesenläufer, alter Knecht, schwarzer Caspar und Faule magd, und gehört in die Gattung Anarrer — *Crex* — als besondere Art, welche sich durch nachstehende Kennzeichen unterscheidet: Die Flügel sind braunroth; die Seiten und untern Deckfedern des Schwanzes rostfarben mit weißen auch einzelnen dunkelbraunen Querstreifen; die Füße bleifarben. Der Wachtelkönig ist etwas größer als eine Wachtel. Die Länge ist zehn Zoll, wovon der Schwanz ein und drey Viertel Zoll wegnimmt, die Flügelbreite sechzehn Zoll, und die gefalteten Flügel reichen bis ans Ende des Schwanzes. Das Gewicht ist sechs bis acht Unzen. Der Schnabel ist fast einen Zoll lang, an den Seiten gedrückt und bräunlich, oben graubraun, unten fleischfarben; die rigenformigen Nasenlöcher liegen mitten im Schna-

bel in einer dünnen Haut; die Augen sind rußbraun; die Schenkeine sind geschildert, ein und einen halben Zoll hoch und mit den Sehnen, die weißliche Nägel haben, hell bleifarben. Der Kopf ist klein, flach, länglich, bräunlich gelb und schwarzgestreift; über die Augen geht ein aschgrauer Streif bis in den Nacken, durch die Augen ein bräunlichgelber, und vom untern Schnabelwinkel noch ein aschgrauer, der an den Seiten des Halses hinkläuft; der Oberhals ist röthlichgrau und klärer schwarz gestreift als der Scheitel; der Rücken, die Schultern und die obern langen Deckfedern des Schwanzes schwarz, breit röthlichgrau eingefast; die Kehle weißlich; der Hals und die Brust aschgrau, an den Seiten röthlich überlaufen, bey alten sogar olivenbraun gewässert; der übrige Unterleib, in der Mitte weiß, an den Seiten und an den langen untern Deckfedern des Schwanzes mit dunkelbraunen rostfarbenen und weißen schönen Querstreifen; die obern kleinen und untern größern Deckfedern, der Flügel schön braunroth, erstere mit einigen weißlichen Fleckchen; die Schwungfedern braunroth, auf der innern Fahne etwas dunkler, die letztern wie der Rücken; der kurze Schwanz spitzig zulaufend, aus vierzehn Federn bestehend, und ebenfalls wie der Rücken gefärbt. Das Weibchen ist an der Brust blaß aschgrau, und die zwey Linien über und unter den Augen sind grauweiß. Sie lassen des Abends und Nachts, seltner am Tage, und vermuthlich das Männchen

allein, ein unangenehmes, scharfes schnarrendes Geschrey hören, das wie Arrp, Schnarry! klingt, und da sie sehr geschwind durchs Getraide und hohe Gras laufen können, so hört man sie bald hie bald da. Sie haben aber auch noch eine ganz eigne Lockstimme, welches ein leises Schnalzen ist, wie man es mit der Zunge macht. Wegen ihren kurzen Flügeln fliegen sie schlecht, doch findet man sie auf den Inseln, wie z. B. auf den Schottlandsinseln. Man sieht sie aber sehr selten fliegen, und wenn sie es thun, so müssen sie aufgejagt werden, und alsdann erstreckt sich ihr Flug doch nicht weiter, als ohngefähr hundert Schritte. Sie lassen sich sehr leicht zähmen und sind in der Stube, wegen der Geschwindigkeit ihrer Füße und ihres artigen Betragens, angenehme Vögel. Sie tragen sich wie junge Hühner, und die Jungen piepen auch so wie diese. Man trifft sie in ganz Europa, in Asien und in Amerika an. In Thüringen sind sie oft häufig, gewöhnlich aber nur einzeln. Sie scheinen unter den Zugvögeln die letzten zu seyn, denn man hört sie erst in den ersten Tagen des Junius schreyen. In der letzten Hälfte des Septembers ziehen sie mit den Wachteln, mit denen man sie in die Monate unter den Haserschwingen antrifft, weg, daher auch der Name Wachtelkönig seinen Ursprung hat. Sie halten sich im Gras und Getraide auf, und lieben vorzüglich etwas feuchte Gegenden, doch hat man sie

auch, und oft häufig, in gebirgigen Feldern angetroffen. Im Herbst findet man sie auch in Feldhölzern und in Vorhölzern in Wachholdegesträuch. Ihre Nahrung besteht in Erbkäsern; Heuschrecken; Würmern, auch in kleinen Sämereyen und Kräutern. Zur Beförderung der Verdauung verschlucken sie Quarkörner. Da sich die Männchen durch die Pfeife locken lassen, so müssen sie mit ihres Gleichen um die Weibchen kämpfen. Sehen kann man dieß nicht, da sie nicht leicht aufsteigen, sondern fast stets herumlaufen. Im Junius und Julius findet man auf bloßer Erde mit einigen umgelegten Halmen acht bis zwölf Eier, welche schmutzig weiß oder grünlichgrau und hellbraun gefleckt sind. Sie werden vom Weibchen in drey Wochen ausgebrütet, und dieß sieht so fest auf denselben, daß ihnen die Grashauer oft die Köpfe abhauen. Die Jungen sind anfangs mit einer schwarzen Wolle bedeckt, welche sich nach drey Wochen in Federn verwandelt, die an der Brust röthlichgrau sind, und haben hell aschgraue Beine. Sie mausern sich erst in den wärmern Gegenden, wohin sie wandern. Raben, Krähen, Wiesel und Eltisse zerstören ihre Brut, und mehrere Raubvögelarten stoßen auf Junge und Alte. Von Jägerbeobachtungen wissen wir: 1) Rasche Hunde greifen den Wachtelkönig, besonders im Herbst, wenn er fett ist, und bringen ihn dem Jäger. Daher die Hunde, dann auch,

auch, wenn es ihnen einigemal gelingt, den Vogel lebendig zu fangen, so bald sie ihn im hohen Grase nahe kommen, ungewöhnlich schnelle Sprünge bald nach dieser, bald nach jener Seite zu machen pflegen, welches vorzüglich alsdenn geschieht, wenn sie zwar die Witterung in der Nase haben, die Stelle aber, wo sich der Wachtelkönig unter dem dicken Grase oft zwischen den Füßen des Hundes verborgen hat, nicht ausmachen können. 2) Einen jungen Hund an diese Vögel zu bringen, ist nicht rathsam, er gewöhnt sich, da sie beständig und noch anhaltender als die Wachteln laufen, und er fast immer auf der Spur nachziehen muß, eine niedrige Suche, und zum Theil auch, wenn er sie hin und wieder greift, das Nachprallen an, und wird hitzig. Der Wachtelkönig gehört zur niedern Jagd, und die beste Zeit zum Schießen desselben ist der Junius, Morgens und Abends, weil man sie dann häufiger rufen hört, und sie auch alsdenn eher als am Tage auffliegen. Man lockt sie durch einen mit Papier durchflochtenen Kamm herbei, indem man denselben streicht. Da sie schwer und gerade fliegen, so sind sie, wenn man sie nur ausziehen läßt, leichter, als jedes andere Federwildpret, zu schießen. Am besten fängt man sie mit dem Liras und Steckgarne. Im August kann man die Jungen, welche gern unter die Getraideschwaden laufen, sobald man auf sie trifft, mit den Händen fangen. Das Fleisch der jungen und alten hat einen

vortreflichen Geschmack, besonders im Herbst, wo sie sehr fett sind.

Wachtelpfeife, ist eine Lockpfeife von Leder mit einem beinernen Röhrchen, womit man beim Wachtelfange die Stimme der Wachteln nachahmet, s. Wachtelgarn.

Wagenmeister ist bey der Jägerey derjenige, der die Aufsicht auf die Wagen und das Jagdzeug hat. Er bestellet bey den Jagdhandwerksleuten alle Arbeit, bekömmt sie von ihnen, und übernimmt sie nach gehöriger Untersuchung. Er hält über alles vorrathige Zeug ein Verzeichniß, und führet Rechnung darüber. Beyangestellten Jagden sorgt er dafür, daß das Zeug an den bestimmten Ort, und nach vollendeter Jagd wieder in das Zeughaus zurückgebracht werde.

Waldgeflügel, Waldvögel sind alle Vögel, die ihren Aufenthalt vorzüglich im Walde haben. S. Geflügel.

Waldgeschrey ist ein Ruf, den die Jägerey bey großen Jagden, wenn sie zu, und vom Holze ziehen, hören läßt. Es wird z. B. bey einem Hirschestjagen: Ja, ha, ha, ja, ha! und bey der Schweinsjagd, Ho, ri, do, ho, ha, ho! zu Holze, und nach der Jagd unter dem Geschrey Ja, ho, ho! vom Holze nach dem Schirme gezogen.

Waldheerd ist der vornehmste und gewöhnlichste Vogelheerd. Man erwählet dazu einen Platz, der nicht von zu dicke stehenden Büschen zu dunkel, oder von ermangelnden Bäumen zu hell ist, der auch nicht zu nahe an Fahr-

Fahrwegen oder Fußsteigen liegt. Auch muß dieser Platz mit Gras bewachsen seyn, in dessen Ermangelung man Rasen ausstechen, und ihn so weit der Umfang des Heerdes reicht, so genau zusammen sehen muß, daß er einem natürlichen Grasplatz gleichet. Besser ist es, wenn der Platz etwas erhaben liegt, weil dann mehr Licht auf dem Heerde ist, und die Vögel um desto eher auffallen. Auch ist es gut, wenn ein Bach oder anderes Wasser in der Nähe ist, welches theils wegen der Lockvögel, theils auch die fremden Vögel desto eher dahin zu gewöhnen, von großem Nutzen ist. Auf beyden Seiten dieses Platzes macht man bedeckte Garngruben, in welche man die Garne nach der Länge ausgebreitet legt, und damit sie von den Vögeln nicht gesehen werden, mit Reifern bedeckt. Auswendig herum besetzt man den Platz mit einer Hecke von größern und kleinern Sträuchen, und gräbt dürre Bäume zum Aufsetzen der Vögel ein. Inwendig besetzt man den Platz mit Wacholdersträuchen, Eberesche und andern Bäumen, und ordnet die Lockvögel. Die beyden Wände werden hinten und vorn mit starken Leinen und eingeschlagenen Hesteln eingespannt, daß man sie mit einer Hand geschwind rücken kann, und sie oben über dem Strauche zusammen schlagen. Wo die großen Vorläufer hingebracht werden, müssen erhaben, mit Gras bewachsene und mit Ebereschens- oder Wacholdersträuchen besetzte Plätze gemacht wer-

den, damit sie die fremden Vögel desto eher sehen. Die kleinen Vorläufer bedürfen dieser Erhöhungen nicht, sondern man sticht den Rasen von kleinen runden Plätzchen aus, wo man ihr Futter und Getränke hinbringt. Gleich dabey wird ein Haackreiß zum Aufsitzen der fremden Vögel errichtet, bey welchem von einem langen, etwa zwey Hände breiten Plaze, der Rasen abgestochen, und der Platz mit allerley Gesäme zur Körnung bestreuet wird.

Waldborn ist ein blasendes Instrument von Messing, das ehemals bloß als Jagdmusik diente, jetzt aber zu allen Musikern gebraucht wird.

Waldbuhn ist unter den hühnerartigen Vögeln der Nahme einer aus mehreren Arten, s. Auerhahn u. bestehenden Gattung.

Waldschnepfe — *Scolopax rusticula* — heißt auch gemeine Schnepfe, gemeine, gewöhnliche, und europäische Waldschnepfe, Rietbusch-Holz- und Bergschnepfe, große und größere Schnepfe, Schneppe, Bergschneppe, Schnepphahn, Wasserrebhuhn, Becasse und Eulenkopfschnepfe, und gehört als besondere Art zur Gattung Schnepfe mit folgenden Kennzeichen: Der gerade Schnabel ist an der Wurzel röthlich, über den Hinterkopf gehen einige schwarzbraune Querbän-

ben und die Schenkel sind bedeckt. Da die Waldschnepfen ein dickes Gefieder haben, so kommen sie an Größe den Rebhühnern gleich. Ihre Länge ist etwas über dreyzehn Zoll, wovon der Schwanz zwey und einen halben Zoll mißt, und die Flügel, welche sich fast am Ende desselben falten, sind ein und einen halben Fuß breit. Das Gewicht ist vier und zwanzig bis sechs und zwanzig Loth. Der Schnabel ist etwas über drey Zoll lang, gerade, weich, durch die starken Riesen eckig, an der Spitze stumpf oder kolbig, oben fleischfarben, unten grüngelb, an der Spitze schwärzlich; der Augenstern schwarzbraun; die Schienbeine sind ein und einen halben Zoll hoch, geschilbert, und mit den Behen grüulich aschgrau. Der Kopf ist klein, schmal, erhaben, mit einer hohen Stirn, fast eckig, vorn aschgrau, röthlich und schwarz gewässert, auf dem Scheitel bis zum Nacken mit vier schwarzbraunen und drey rostgelben Querverbinden gezeichnet; Gesicht, Backen und Kehle weißlich mit schwarzen Sprinkeln, und vom Schnabelwinkel bis zu dem Auge ein schwarzbrauner Strich, das Genick und die Seiten des Halses rostgelb mit schwarzbraunen Querverbinden; der Ober Rücken rothbraun, mit schwarzen, feinen regelmäßigen Querverbinden und Sprüngen und röthlich weißen und schwarzen großen einzelnen Flecken; der Unterrücken und die ziemlich langen obern Deckfedern des Schwanzes rostfarben mit schwärzlichen Quer-

bändern; die Schulterfedern, wie der Rücken, nur an den Spitzen mit großen röthlich weißen Flecken, die hinten an dem Flügelweg ein weißliches Band bilden; der Vorderhals und die Brust hellröthlich aschgrau; der Bauch, die Seiten, die Schenkel und die Deckfedern der Unterflügel gelblich weiß, alle untern Theile des Körpers mit feinen dunkelbraunen Wellen überdeckt, der Hals am häufigsten und die Seiten noch überdies mit einzelnen rostgelben Flecken; die langen untern Deckfedern des Schwanzes rostgelb mit weißen Spitzen und einigen winklich zusammenlaufenden schwarzen Streichen; die Deckfedern der Flügel rothbraun, mit vermischten schwarzen, grauen und einzelnen röthlichgelben unregelmäßigen Bändern und Streifen; die vordern Schwungfedern dunkelbraun, an der äußern mit größern und auf der innern mit kleinern dreyeckigen rostfarbenen Flecken, die Schwungfedern der zweyten Ordnung von eben der Grundfarbe, aber rostfarben bandirt, die langen hintern wie der Rücken gefärbt; der kurze, aus vierzehn Federn bestehende Schwanz schwarz, mit einer hellaschgrauen Spitze, und dreyeckigen kastanienbraunen Flecken an dem Rande der Federn. Das Weibchen ist etwas größer, aber bläßer von Farbe; Schnabel und Beine sind fleischfarbenaschgrau, und auf den Deckfedern der Flügel befinden sich viele große weiße Flecken. Farben-Varietäten: a. Die weiße Waldschnepfe. b. Die stroh-

strohgelbe Waldschnepfe. c. Die rothköpfige Waldschnepfe. Sie hat einen röthlichen Kopf, weißen Leib und braune Flügel. d. Die bunte Waldschnepfe. Mit allen Schnepfenfarben unordentlich gefleckt und vorzüglich weiß gemischt. e. Die weißflügelige Waldschnepfe. Die Flügel sind ganz weiß, f. mit einfarbig rostgelben Bauche. Der Jäger unterscheidet auch Größen-Varietäten, die er auf dem Striche bemerkt, und die wahrscheinlich Unterschiede des Klimas sind: a. Die kleine Waldschnepfe. Sie ist um ein Drittheil kleiner als die andere, dunkler von Farbe, mit mehr schwarzen Punkten und Strichen, kürzern aschgrauen Hals und bläulichen Füßen. Sie ist die erstere, die ankömmt. b. Die große Waldschnepfe. Sie ist auf der Brust weißlicher, und hat röthlichgraue Füße. Einige nehmen sogar c. noch eine mittlere Waldschnepfe an. Ausser der Nistzeit sind diese Vögel scheu; doch alsdann lassen sich die Weibchen von den Eiern nehmen, so erpicht sind sie auf ihr Brüten. Sie haben einen schwankenden schwerledigen Flug, welches die Breite ihrer Flügel, die Kürze des Schwanzes und der lange Schnabel verursacht. Sie überpurzeln sich daher zuweilen in der Luft. Man sieht sie daher auch nicht oft fliegen. Sie fallen wie eine schwere Masse nieder. Ihre Augen scheinen mehr für ein dämmerndes Licht als für ein helles oder ganz dunk-

les Licht zu seyn, daher sind sie auch in der Dämmerung und den mondhellten Nächten am meistens in Bewegung. Höchst selten sieht man sie auf einem Baumstrunke sitzen. Ihr Ruf, den sie auf ihrem Striche hören lassen, klingt zwitkend und und quarrend. Man findet sie in mehreren Gegenden von Europa, Asien und Afrika. Sie gehen bis Island und Kamtschatka hinauf, und bis China und Japan und die Goldküste hinab. Sie lieben die Waldungen und zwar vorzüglich gern die hohen gebirgigen Waldungen, in deren Nähe Wiesen, Acker, Sümpfe und Tristen sind. Ob man sie gleich in gelinden Wintern beständig im mittleren Deutschland einzeln antrifft, so sind dieselben doch allen Vermuthungen nach weit nördlichere Vögel, und unsere sind Zugvögel, die in der Mitte des Oktobers, gewöhnlich wenn auf den hohen Gebirgen der erste Schnee fällt, weggehen, und im Frühjahr im März und April wieder kommen. Auf ihrem Wegzuge halten sie sich gern in Laubhölzern, besonders in Feldhölzern auf. Auf ihrem Winterstriche, welches eigentlich der *Schnepfenstrich* genannt wird, streichen sie alle Abende von einem Orte zum andern, und da auf den hohen Gebirgen der Schnee spät schmilzt und die Kälte länger dauere, so streichen sie da auch noch bis zu Ende des May, ehe sie sich paaren. Sie sind zwar immer in Gesellschaft, fliegen aber nicht mit ein-

einander auf, sondern eine nach der andern. Sie liegen alsdann am Tage gern in Dickungen. Ihre Nahrung besteht, wie man sagt, aus Regenwürmern, nackenden Schnecken, allerley Erdmaden, Mistkäfern und andern Insekten, zarten Gras- und Sumpfgaswurzeln. Am Tage suchen sie dieselbe in Hölzern und Hecken, des Nachts aber gehen sie auf die Wiesen und Acker, in die Sümpfe, ins Schilf und Riedgras, besonders auf die Tristen, wo das Vieh geweidet hat, und auf die Viehhalten, weil sich hier unter dem Kuhmist allerhand Insekten für sie aufhalten. Ihr Lieblingsfutter machen die kleinen Mistkäfer aus, welche sie im Pferde- und Hornviehmist finden. Sie schleudern beim Futtersuchen die Materialien, in denen es geschieht, mit Kraft um sich her; und ihr Schnabel, den sie oft bis an die Nasenlöcher in den Roth stecken, scheint ein feines Gefühl, oder vielmehr einen sehr feinen Geruch, dazzu zu haben. So wie alle Vögel, also haben auch diese bey der Paarung, oder dem Balzen, ganz eigene Bewegungen. Sie brüten nur einmal des Sommers und zwar in hohen gebirgigen Gegenden, im Grase oder Moose. In sechzehn Tagen bringen sie drey oder vier Junge aus. Das Nest ist eine bloße aufgescharrte Vertiefung, mit etlichen Reisern oder Halmen umlegt. Die Eyer sind stumpf, schmutzig blasgelb, am obern Rande blasviolet und braunroth gefleckt. Die Jungen laufen sogleich, wenn

sie aus den Eiern geschlüpft sind, mit der Mutter nach den niedrigen Thälern und Sümpfen, wo Buschholz in der Nähe ist, und man findet immer die leeren Schalen noch im Neste. Durch Füchse, Baum-Marder, Iltisse und Wiesel leiden Alte und Brut; und mehrere Falkenarten stoßen auf ihren Wanderungen auf diese Vögel. Es plagen sie auch außerlich graue Läuse und inwendig Band- und Krakerwürmer. Von Jägerbeobachtungen wissen wir: 1) Der Schnepfestrich ändert sich nach dem Abtriebe der Holzungen; daher man jetzt fast gar keine da sieht, wo sie sonst in Menge zogen, und wo vielleicht Dörter davon den Namen erhalten haben. 2) Wo Dickungen am Hochwalde, leere Schläge und Tristen grenzen, und ein Thal in der Nähe ist, da streichen die Schnepfen gern hin. 3) Die Schnepfen ziehen nicht, wie andere Vögel, gegen den Wind, sondern mit dem Winde, und wenn der Wind von Abend weht, und warme Abendregen kommen, so ist der Strich in wenigen Tagen vorbey. 4) In Italien kommen im Herbst ganze Schaaren dieses Vögel an, beschäftigen den Jäger den ganzen Winter über, und verschaffen den Italienern vortrefliche Gerichte. Die Walbschnepfen gehören, so wie alle Schnepfenarten zur niedern Jagd. Man fängt sie in Klebgarnen, den gewöhnlichen Hühnerstreckgarnen, in Schlingen oder Laufdohnen, in Schnepfenfallen,

fallen, und schießt sie des Abends, seltener des Morgens, auf ihrem Striche, auch im Herbst und Winter bey Treibjagen und mit dem Stöberhunde. Ihr Wildpret ist sehr wohlschmeckend und gesund, und sie werden in dieser Hinsicht zu dem besten wilden Geflügel gerechnet. Man ißt sie mit den Eingeweiden; ja der Unrath wird sogar für besonders delikat gehalten. Sie vertilgen sehr viele schädliche Insekten und das Auffuchen ihrer Nahrung, nennen die Jäger, die Aesung stechen.

Waldschritt ist ein Maas, nach welchem die Lächer und Rege gestellt werden. Ein einfacher Waldschritt beträgt $2\frac{1}{2}$, ein doppelter 5 Fuß.

Waldbogel ist so viel als Waldgeflügel.

Wamme heist bey dem wilden Schweine die Dünung am Bauche, nebst dem Bauchfette.

Wand, Schlagwand ist ein Vogelnetz, das nach Verhältniß der damit zu fangenden Vögel mehr oder weniger hoch, lang und stark ist. Die Maschen sind weit, mithin ist das Ganze nicht schwer, sondern leicht zu überziehen. Die zum Fange der kleineren Vögel von Mittelzwirn gestrickten Wände, sind ohngefähr vier Ellen breit, man schlägt sie im Herbst auf solchen Feldern auf, wo Sommergetraide gestanden hat. Sie müssen etwas tiefer in Rinnen liegen, mit Spreu

und Heckerling bedeckt, und so zugerichtet seyn, daß sie mittelst ein Paar Schlagfedern im Rücken schnell zusammen schlagen. Die Rege sind an Stangen befestiget, und mit der einen Seite auf dem Boden so angehangen, daß sie, vermittelt der durch die daran befestigten Ringe gezogenen Leinen, aufs Schnellste in die Höhe und über den Vögeln zusammen schlagen.

Wanst heist bey dem Rothwildpret, das Netz mit den Gedärmen, die es in sich faßt.

Wassergeflügel ist unter Geflügel aufgeführt.

Wasserhuhn — Fulica — ist eine besondere Gattung unter den Sumpfvögeln und bey dem gemeinen Wasserhuhn, oder Bläßhuhn, angezeigt.

Wasserhund ist ein darauf abgerichteter Hund, im Wasser zu waden und zu schwimmen, das Wassergeflügel zu suchen, aufzujagen, und das Geschossene zu apportiren. Die besten Hunde dazu sind die Pudeln, viele Arten von Hünerhunden und die glatten dänischen Hunde. Man richtet ihn so ab, daß man anfänglich auf dem Lande, dann aus dem Wasser, ein Stück Holz bringen lehret, und wenn er dieses vollkommen kann, läßt man eine zahme Ente schwimmen, schießt sie, und läßt anfänglich einen alten Hund als Anführer mit auf das Wasser, in der Folge aber den Jungen allein, so lange

lange, bis er seine Kunst gelernt hat.

Wasserjagd ist eine Jagd an einem solchen Orte, wo das Wild durch ein Wasser getrieben werden muß. Das Treiben geschieht wie bey einem andern Abjagen, nur daß der Lauf ein Teich oder mittelmäßiger Fluß ist, in diesem wird der Schirm für die Herrschaft von grünen Reisern auf Rähne gemacht, die durch Anker im Wasser festgemacht sind; die Lächer aber werden auf Rähnen über das Wasser gefahren, und an hohen Stangen dergestalt aufgeschlagen, daß die Unterleine knapp über dem Wasser liegt, auch bindet man die Windleinen an große ins Wasser geschlagene Pfähle. So ist das von den Hunden herausgejagte Wild gezwungen durchs Wasser zu schwimmen, da es denn von den Herrschaften geschossen wird.

Wasserläufer — Totanus — macht unter den Sumpfvögeln eine besondere Gattung mit folgenden Kennzeichen aus: der Schnabel ist ohne tiefen Einschnitt im Kopfe, weich, rund, dünn, lang (zweymal so lang als der Kopf), etwas herab- oder hinaufwärts gebogen, ohne höckerige, aber mit harter Spitze; die Nasenlöcher sind schmal; die Zunge ist kurz und spizig; die Augen sind mittelmäßig und in der Mitte des Kopfs. Die Füße sind hoch, über der Ferse weit am Beine hinauf nackt; die Zehen getrennt, doch zwischen der

Mittelzehe und der äußern oft eine kleine Spannhaut an der Wurzel, die Hinterzehe kurz und hochstehend. Ihre Nahrung, die sie am Tage am Wasser suchen, besteht in Insekten und Würmern. Sie speyen die unverdaulichen Sachen in Ballen, wie die Raubvögel, weg. Sie drücken sich nicht vor ihren Feinden an, sondern laufen oder fliegen davon. Diese Gattung läuft eigentlich mit der Schnepfengattung, noch mehr aber mit der Strandläufergattung zusammen. Allein obige Kennzeichen schneiden sie hinlänglich von beyden ab, und ohne diese Mittelgattung ist man fast nicht im Stande, wenigstens in Cabinetten, die zwey so verwirrten Vögelgattungen der Schnepfen und Strandläufer gehörig zu ordnen. Herr Bechstein zweifelt, ob er alle hieher gehörigen deutschen Vögel kenne, und ob er sie gehörig unterschieden habe; allein er hoffet doch, und zwar mit Recht, daß durch diese genaue Abtheilung die Arbeit nun erleichtert ist. Sie wird in zwey Familien abgetheilt, als: a) Mit an der Spitze etwas abwärtsgebogenem Schnabel. 1) Gefleckter Wasserläufer — Totanus maculatus, Bechst. hat auch die Namen: Gefleckte Pfuhschnepfe, gefleckte Strandschnepfe, große rothfüßige Schnepfe, großer Rothschinkel, Rothbein, Strandschnepfe, gefleckte Schnepfe, und bey'm Linné Scolopax Totanus. — Der Schna-

Schnabel ist lang, an der Spitze merklich gebogen; die Füße blaßroth; die Hauptfarbe schwarzbraun mit kleinen weißen Flecken; Brust, Bauch, Rücken und Steiß weiß; mit dunkelbraunen Quersflecken an beyden erstern: der Schwanz mit schwärzlichen und weißen klaren Binden, Weibchen 13 Zoll lang. Er variirt in der Farbe, so daß die Hauptfarbe schwarz, schwärzlich, dunkelbraun, und dunkelgrau, mit (S. T. maculatus) oder auch wohl ohne weiße Flecken ist. Er hat seinen Wohnort in Sümpfen, an Seen und Teichen.

2) Rothfüßiger Wasserläufer — S. Calidris, Bechst. — Der Schnabel mittelmäßig lang, an der Wurzel hochroth und an der nur wenig gebogenen Spitze schwarz; die Füße orangefarben; die Farbe des Oberleibes graubraun mit grünem Glanze, schwärzlichen Quersflecken, auch einzelnen weißlichen Flecken; über die Flügel ein weißer Querstreifen; der Schwanz weiß mit zahlreichen schwarzen schmalen Querbinden, Weibchen 11 Zoll lang. Er variirt nach Alter, Geschlecht und Jahreszeit in der Farbe; denn oben ist die Farbe bey den Weibchen heller, bey den Jungen dunkler, und der Unterleib bey letzteren auch am Bauch länglich gefleckt; und im Winter sind die Federn nur weißlich eingefärbt. Bey einigen ist Bauch und Steiß rein weiß. Die Füße der Jungen sind kirschroth. Der Wohnort sind Sümpfe und Seeufer — zieht aus dem Norden weg — in England

aber nicht. Die Nahrung ist die gewöhnliche des vorigen und er hat sein Nest in Sümpfen mit 4 weißlich olivenfarbenen überlaufenen Eiern, die unregelmäßig schwarz gefleckt sind. Man giebt ihm auch die Namen: Rothfuß, Rothbein, kleiner Rothschenkel, und bey Linné Scolopax Calidris —

3) Dunkelbrauner Wasserläufer — T. fuscus Bechst. — Mit schwarzem, an der Spitze merklich gekrümmtem und langem Schnabel, dunkelbraunen Füßen, schwärzlichem, weißlich geflecktem Oberleibe, und aschgrauem Unterleibe, 10 Zoll lang. Sein Wohnort sind Ufer der Flüsse — bloß sehr einzeln auf dem Zuge in Deutschland. Er hat einige Aehnlichkeit mit No. 1. und ist Scolopax fusca Linné,

4) Schwimmenber Wasserläufer — T. natans Bechst. hat auch die Namen: Schwimmschnepfe, schwimmende Uferschnepfe, graue Schnepfe. Schnabel an der Wurzel der untern Kinnlade roth; mittelmäßig lang und an der Spitze etwas gebogen; die Füße hellroth; der Oberleib aschgrau; der Unterleib weiß mit aschgrauen Flecken, die am Bauche einzeln stehen, über den Augen ein weißer Streifen; der schwarze Schwanz weiß in die Quere gestreift, 12 Zoll lang. Er geht mit seinen langen Beinen nicht bloß im Wasser, sondern schwimmt auch. Sein Wohnort ist Mecklenburg, Schlesien und Thüringen — zieht einzeln weg. b. Mit an der Wurzel oder in

in der Mitte etwas aufwärts gebogenem Schnabel. 5) Dunkelfüßiger Wasserläufer — *T. limosa* Bechst. — heißt auch: Gemeine und kleine Pfuhschnepfe, Pudels-, Wasser-, Ried- und Moorschnepfe, gemeine Uferschnepfe, Fardreka; und *Scolopax limosa* bey Linné. Der Schnabel an der Wurzel röthlich, und in der schwärzlichen Spizenhälfte etwas in die Höhe gezogen; die Füße dunkelbraun; die Hauptfarbe braungrau; Unterrücken und Steiß weiß; über die Flügel ein weißer Fleck, den aber die vier ersten Schwungfedern nicht haben; 16 Zoll lang. Er variiert in der Farbe; am Oberleibe grau, auch braun mit weißlichen und röthlichen, und an den äußern Schwanzfedern mehr oder weniger mit schwärzlichen Querverbinden. Er wählt sich seinen Wohnort im Norden, an Meeresufern — zieht in kleinen Heerden durch. Die Nahrung ist, wie gewöhnlich, Würmer und Insekten. 6) Grünfüßiger Wasserläufer, s. oben und bey Pfuhschnepfe. 7) Geißkopfs-Wasserläufer, s. oben. 8) Dickfüßiger Wasserläufer, *T. leucophæus* Bechst. Der Schnabel lang, in der Mitte etwas aufwärts gebogen; über den Augen ein weißlicher Streifen; Oberleib dunkelbraun, alle Federn röthlichweiß oder rostgelb ingefärbt; Kehle, Bauch und Unterrücken weiß; Brust röthlich aschgrau mit braunen Schminen; Schwanz weiß mit schwarz-

braunen Querverbinden; Füße aschgrau, und nach der Ferse (Knie) zu dick, 14 Zoll lang. Soll mit dunkler und heller Farbe des Oberleibes, auch in der Länge des Schnabels variiren. Er hat seinen Wohnort am Ufer des Meeres, der Seen, Teiche und Flüsse — zieht im Nachsommer truppenweise durch. Die Nahrung sind Wasserinsekten, Regenwürmer und Schnecken. Man findet das Nest zuweilen an deutschen Seehäfen und großen Seen im Sumpfe. Er hat auch noch die Nahmen: Gemeine Pfuhschnepfe, Geißkopfschnepfe, Blaufuß, Gacker, Regenvogel, Regenschnepfe, Gacker mit aufwärts gekrümmtem Schnabel. 9) Lappländischer Wasserläufer — *T. lapponicus*, Bechst. — Der Schnabel lang, an der Wurzel ein wenig aufwärts gebogen, und roth, an der Spitze etwas löffelförmig und schwarz; Kopf Hals und Brust rothbraun; Kehle weiß, Oberleib dunkelbraun; die Federn rostfarben gerändert; Schwung- und Schwanzfedern schwarz, erstere mit weißen Spizen und letztere an den Seitenfedern weißgestreift; Füße schwarzgrau, 16 Zoll lang. Er variiert in der Farbe, so daß die Rostfarbe bald fuchseroth, bald rostgelb, bald rostgrau ist, auch mit aschgrauem Kopf und Hals, und mit weißem und rostgelblichem Steiße. Sein Wohnort sind nördliche Seeufer, und auf dem Durchzuge im Spätsommer an Teich- und Flußufern. Die Nahrung besteht in Insekten und Schnecken.

Schnecken. Man nennt diesen Vogel auch: Lappländische Schnepfe, Seeschnepfe, größte Pfuhschnepfe, und ist *Scolopax lapponica* Linné.

10) Grauer Wasserläufer — *T. gregarius* Bechst., und heißt auch: Uferschnepfe, graue Uferschnepfe, kleine rothgelbe Uferschnepfe. Der Schnabel kürzer, etwas aufwärts gebogen; der Oberleib graubraun, hellrostbraun und einzeln weiß gefleckt; die äußern Schwanzfedern weiß, die mittleren mit 6 bis 7 graubraunen Binden; die Füße grau. Kleiner als die vorhergehende, etwas kleiner als ein Kleibiz. Er nimmt seinen Wohnort an Ufern der Meere (Insel Riemis zwischen Pommern und Rügen) — zieht in Schaaren weg. Er hat in der Farbe viel Aehnlichkeit mit der vorhergehenden, allein er ist an sich kleiner, und hat einen weit kürzern Schnabel. Herr Dito hat ihn selbst mit dem vorhergehenden verglichen, und sagt, daß er ihm nur auf den ersten Anblick ähnele. 11) Leich-Wasserläufer — *T. stagnatilis* Bechst. Er hat auch die Rahmen: Kleine Pfuhschnepfe, Sandschnepfe, Hemic, kleiner Hemic. Der Schnabel kürzer, in der Mitte etwas aufwärts gebogen, dünn und schwarz; das Gesicht weiß; Oberleib dunkelbraun mit rothgraulich weißen Federkanten; Unterleib und Steiß weiß; der Schwanz weiß, mit einigen dunkelbraunen, abgebrochenen Binden; die Füße grüngrau, 8 Zoll

lang. Er wählt sich zum Wohnort die sandigen Teich-, See- und Flußufer — zieht in Heerden im Spätsommer durch. Die Nahrung besteht in Wasserinsekten und Schnecken. Die größte Aehnlichkeit hat dieser Vogel mit dem grünfüßigen Wasserläufer, allein er ist fast um Hälfte kleiner, der Schnabel dünner und länger, die Schwinge kürzer und das Gesicht rein weiß.

Wassersäbler — *Recurvirostra* — macht in der Ordnung der Sumpfvögel eine besondere Gattung mit folgenden Kennzeichen aus: Der Schnabel ist niedergedrückt, nach vorne zu in die Höhe gekrümmt, zugespitzt, mit biegsamer Spitze. Die Zunge kurz. Die Nasenlöcher sind schmal, gegenüber durchsichtig und die Füße hoch, mit vier Zehen, deren vordere mit einer zur Hälfte ausgeschnittenen Schwimmhaut verbunden sind; die hintere Zehe kurz und hochstehend. Man hat bey uns nur den gemeinen Wassersäbler — *R. Avocetta*, Linn. — Der Leib ist etwas stärker, als der eines Kleibizes (*Tringa Vanellus*); von der Spitze des Schnabels an ist der Vogel 1 Fuß 9½ Zoll lang und aufrecht stehend bis auf den Scheitel 17 Zoll hoch; der schwarze Schnabel 4 Zoll lang, dünn, an der Wurzel 4 Linien breit, dann allmählig abfallend, zuletzt sehr fein und schmal, und dennoch bey dem Oberkiefer etwas wenig abgestumpft, bey dem Unterkiefer aber wie eine Nadel spitzig, an der Wurzel sich etwas senkend, dann

dann in sanfter Krümmung aufwärts gebogen, so daß, wenn man von der Wurzel des Oberkiefers eine Linie bis zur Spitze des Schnabels zieht, die größte Bogenabweichung, welche $1\frac{1}{2}$ Zoll von der Spitze entfernt ist, nur 10 Linien beträgt; der Oberkiefer hat gleich von der feinen, einige Linien lang sanft wieder abwärts gebogenen Spitze an, eine Höhlung, die nach und nach immer breiter und tiefer wird, der Unterkiefer hingegen vorn einige scharfe Kanten, von der Mitte desselben an bildet sich auch eine kleine Rinne, welche gegen die Wurzel zu immer tiefer wird, und worin die Zunge liegt. Diese Beschaffenheit des ganz sonderbaren und sehr schwachen Schnabels erleichtert wahrscheinlich das Festhalten und Verschlingen der Nahrung. Die Nasenlöcher sind 3 — 4 Linien breit, linienförmig, enge und durchsichtig; der Augenstern ist rothbraun; die Schenkel und Schienbeine 4 Zoll hoch und dabey $2\frac{1}{2}$ Zoll nackt, die Fußwurzel $3\frac{1}{2}$ Zoll hoch, die mittelmäßigste Zehe nebst dem 3 Linien langen, fast geraden schwarzen Nagel 1 Zoll 10 Linien, die äußere 1 Zoll 7 Linien, die innere 1 Zoll 5 Linien und die hintere hochstehende 3 Linien lang, die Vorderzehe mit einer etwas gezehnten Schwimmhaut verbunden, welche von der äußern bis zur mittlern Zehe wenig, von dieser aber bis zur innern tiefer ausgeschweift ist und ich bis an die Nagel zieht. (Vey schlechter Behandlung eines ausstopfenden Exemplars schrumpfte die Schwimmhaut leicht zusam-

men, und daher entstehen Beschreibungen, die nicht mit der Natur übereinstimmen). Füße und Schwimmhaut sind lichtblau. Stirn und Scheitel bis zu dem Mundwinkel und zu den Augen sind schwarz, und diese Farbe zieht sich über den Hintertheil des Halses fort bis nahe an den Rücken; der übrige Kopf und Hals, die mittlern Schwungfedern, die Schultern, Brust, Bauch und Schwanz sind weiß, bey einigen grau oder bläulich angelauten; der äußere Theil der Flügel und ein anderer langer und etwas breiter Streifen, von zwey oben zusammenhängenden und über die großen Deckfedern der Flügel herunterlaufenden, unten aber offenen schwarzen Quergebunden umgeben, sind auch weiß; die langen Schwungfedern, die die Spitzen des Schwanzes fast ganz erreichen, sind bis zur Hälfte hinaus schwarz, so wie die letzten, welche an den Rumpf stoßen. Das Weibchen ist durch nichts unterschieden, als daß es etwas kleiner ist. Die Jungen sind im Herbst ebenfalls schon den Alten fast gleich, nur haben sie statt der schwarzen eine schwarzgraue, etwas ins schmutzigbraune gehende Farbe. In Ungarn sind diese Vögel nicht einzeln. Auch trifft man sie häufig an der Ostsee, und an andern deutschen Seen, Teichen, Flüssen und Brüchen — z. B. in Schlesien, Franken, Schwaben. Er zieht weg. Seine Nahrung besteht in Insekten und Würmern. Sein Nest findet man an Ufern mit 2 grünlichweißen, schwarzgefleckten Eiern.

Uebri:

Uebrigens hat er auch noch die Rahmen: Säbelschnäbler, Säbelschnabel, Avocette, Kreiner, weißschwarzer Krummschnabel, Schabehelschnabel, Avosetten, Avosettenschnepfe, Verkehrt-schnabel, Stahelschnabel, Wassersäbel.

Wasserschwäger — *Cinclus* — macht unter den Singvögeln eine besondere Gattung mit folgenden Kennzeichen aus: Der Schnabel ist spizig; hochkantig, an den Seiten gedrückt und eingezogen. Die Nasenlöcher sind mit einer flachen Haut und mit Haaren fast ganz bedeckt, und rifenförmig. Der Kopf ist klein, spizig, oben schmaler als unten; der Leib ist stark und die Augen sind hochliegend. Der Gestalt nach unter die Singvögel gehörig, der Nahrung und Lebensart nach aber sich den Sumpfvögeln und zwar den Strandläufern nähernd. Nähren sich von Wasserinsekten und nisten in Uferlöchern. Es giebt bey uns nur den gemeinen Wasserschwäger — *C. aquaticus*, Bechst. — auch Wasserstaar, Wasserbach und Stromamsel, Wasserdrossel, Wassermerle, Bachspitze und Wassersänger oder *Sturnus Cinclus*, Linn. genannt. Er ist schwärzlich mit weißer Brust und Vorderhals. Auch dieser Vogel variirt in der Jugend, so daß vor dem ersten Mausern die Farbe des Oberleibes aschblau und schwarz gescheckt, und des Unterleibes

weiß, rostgelb überlaufen und schwärzlich kantirt ist. 7 Zoll beträgt die Länge. Er nimmt seinen Wohnort an Flüssen, doch lieber an kalten Bächen in bergigen Gegenden, wandert nicht. Seine Nahrung sind Wasserinsekten, auch, wie man sagt, Fischbrut. Man findet sein Nest in Uferlöchern, Mählbetten u. mit 4 — 6 weißen Eiern.

Wassertreter — *Phalaropus* — macht unter den Sumpfvögeln eine besondere Gattung mit folgenden Kennzeichen aus: Der Schnabel ist gerade, rundlich, an der Spitze etwas gebogen; die Nasenlöcher sind schmal und klein; der Körper und die Füße, wie bey den Strandläufern; doch sind die Beine mit breiten, gewöhnlich gelappten Häuten besetzt; daher diese Vögel nicht nur beständig mit ausgebreiteten Flügeln, statt zu fliegen; übers Wasser laufen, sondern auch gut schwimmen, und so meist ihre Nahrung suchen. Wir haben bey uns nur den gemeinen Wassertreter — *Ph. vulgaris*, Bechst. — auch: Rosthes Bastartwasserhuhn, Wasserdrossel, rothe Wasserdrossel, Eiskiebig, braunes Rothhuhn, Nordischer Strandläufer, Wasserhuhnähnlicher Strandläufer, und *Tringa hyperborea* oder *Fulicaria* bey Linné genannt. Dieser Vogel hat einen pfriemenförmigen zugespitzten Schnabel, aschgraue Brust; dunkle Augenstreifen und rostfarbene Ränder der Schulterfedern.

federn und 8 Zoll Länge. Er variiert in der Farbe; denn das Männchen hat an den Seiten des Halses einen rostrothen Flecken, der den Weibchen und Jungen fehlt. Sein Wohnort ist der Norden von Europa, Asien und Amerika, auch einzeln in Schlessien und Oesterreich — zieht einzeln weg. Er hat sein Nest am trockenen Ufer, mit 4 Eiern und seine Nahrung sind Insekten, die vorzüglich schwimmend aufgefischt werden.

Wechsel heißt ein Ort, wo ein Wild gewöhnlich zu Felde oder zu Holze zu ziehen pflegt. Denn Wechseln heißt bey dem Wildpret, von einem Orte zum andern ziehen.

Wehrhaftigmachen ist die Ceremonie der Jäger; wenn sie nach geendigten Lehrjahren dem bisherigen Lehrlinge bey dem Freysprechen den Hirschfänger zum Seitengewehr überreichen und ihn dadurch zum Hirsch- und Holzgerechten Jägerbütschen erklären.

Weideloch heißt bey dem Wildpret die äußere Oeffnung des Mastdarms, wo der Stoth herausfällt.

Weidemann oder Weydemann; war sonst der allgemeine Name der Jäger, von ihrem Geschäfte, dem Weidwerke oder Jagen abgeleitet.

Weidemann machen oder setzen, heißt bey abergläubischen Jägern, einem andern einen Poffen

spielen, damit er im Schießen nicht glücklich seyn soll.

Weidemanns Heil war bey alten Jägern ihr gewöhnlicher Gruß und galt eben so viel als das Glück auf! bey den Bergleuten.

Weidemesser ist ein großes Messer, das bey großen Jägen zum Zerlegen des Wildprets und zur Bestrafung derjenigen gebraucht wird, welche wider die Jagdgesetze gehandelt oder unweidmännisch gesprochen haben.

Weidensänger oder Weidenzeißig — *Sylvia rufa* Lath. und *Motacilla rufa*, Linn. — macht unter den Singvögeln in der Gattung Sänger eine besondere Art aus und heißt auch noch kleiner Weidenzeißig, grüner König, kleinste Grasmücke, Weidenzeißlein, kleine gelbrothe und eigentliche Grasmücke, kleinstes Laubvögelchen, brauner Kitis, Goldhähnchen, Mitwalblein, Tyrannchen und Läufer. Die Kennzeichen dieser Art sind: Der Oberleib ist rothgrau; über die Augen ein schmutzig gelber Streifen; die untern Deckfedern der Flügel strohgelb; der Unterleib einzeln mit rostgelben Flecken bespritzt; die Füße schwarzbraun. Nächst dem Goldhähnchen, oder gekrönten Sänger ist dieß das kleinste deutsche Vögelchen. Es ist vier Zoll lang; sechs und drey

Viertel Zoll breit; der Schwanz mißt ein und drey Viertel Zoll; der Schnabel fast vier Linien; und die Flügel reichen bis zur Mitte des Schwanzes. Der Schnabel ist schwarzbraun, inwendig gelb; der Augenstern dunkelbraun; die Füße schwarzbraun; die geschilderten Schienbeine acht Linien hoch. Der Oberleib ist rothgrau, etwas olivengrün überlaufen; über die Augen geht ein schmutzig strohgelber Streifen; die Backen sind bräunlich; der Unterleib schmutzig weiß, einzeln mit rostgelben Flecken bespritzt; die Kniee grünlich grau; die Schwung- und Schwangfedern schwarzgrau silbergrau eingefast; die Deckfedern der Unterflügel röthlichgelb. Das Weibchen ist fast gar nicht vom Männchen unterschieden; außer daß der Oberleib röthlichgrau und der Unterleib noch sparsamer gelb bespritzt ist. Dieses Vögelchen, welches mit dem vorhergehenden die größte Aehnlichkeit hat, und mehrentheils auch mit demselben für einerley gehalten wird, ist noch munterer und kecker, als jenes. Es ist auch zänkisch und neßt große Vögel. Es lockt Hoid, hoid, und singt abgebrochen Zip zapp, zip zap zap! Es kriegt eben so, wie jenes, und noch mehr durch alle Büsche und Winkel. Dieser Vogel bewohnt ganz Europa, und in Deutschland trifft man ihn in allen Laub- und vorzüglich in den Nadelhölzern der Vorwälder an. Im August begiebt er sich aus den Wäldern in die Gärten und Weidenbäume, und im October zieht er in die warmen Ge-

genden. In der Mitte des März ist er in unsern Hecken und Gärten wieder. Er frist kleine Insecten und Insecteneyer; im Herbst auch Hollunderbeeren. Das Nest steht an der Erde unter Laub und Gebüsch, und ist wie ein Backofen zugebaut. Es enthält 4 bis 6 kleine weiße, am stumpfen Ende dicht, übrigen aber nur einzeln, purpurroth punktirte Eyer. Dieser Vogel macht gewöhnlich des Jahres zwey Gehecke. Seine Feinde und die Fangarten sind wie beym Fitis. Das Fleisch schmeckt gut; aber es ist schädlich, diesen Vogel zu tödten, da er im Walde und in den Gärten großen Nutzen durch Ablesung der Insecteneyer stiftet.

Weidewerk bedeutet alles, was sowohl zur hohen als niedern Jagd gehört und darunter verstanden wird.

Weidewerken ist soviel, als auf dem Reviere birschen gehen, um Wildpret zu suchen, und zu schießen.

Weidewund heißt, wenn ein Thier, von welcher Gattung es sey, durch das kleine Geschweide oder den Wanst geschossen wird, so daß ihm das Gefäße, oder die Weide, davon ausgeht.

Weidsprüche waren vormals gewisse Fragen und Antworten, mit welchen die Jäger einander bey ihren Zusammenkünften zu examiniren pflegten, besonders die fremden und reisenden

en Jäger; allein jetzt sind der gleichen Sprüche aus dem Gebrauche gekommen.

Weidtasche oder Jagdtasche ist der bekannte leberne Sack der Jäger mit glattem oder rauhen Deckel, und dient dem Jäger theils zu seinen Bedürfnissen, theils zum Tragen des erlegten kleinen Wildwerks.

Weißäugige Ente — *Anas Leucophthalmus*, Borkh. — heißt auch **Weißköpfige** oder **othköpfige Ente**, **Brandente**, **Braunkopf**, **Moortente** und **braunköpfige Ente**. Das Männchen hat einen beschöpften und sehr zusammengebrückten Kopf, einen kastanienbraunen Hals und Brust, einen schwarzbraunen Rücken und Ring um den Hals; einen weißen Augenfleck, Spiegel und kleinen Fleck am Kinn, so wie auch gelappte Hinterfüße; den Weibchen aber fehlt der schwarzbraune Halsring, und Kopf, Hals und Brust sind schmutzig rothfärbend. Die Länge beträgt 16 Zoll. Das eigentliche Vaterland ist Rußland, auch die übrigen Seen und Teiche des nördlichen Deutschlands; im Herbst und Winter familienweis auf deutschen Teichen, Seen und Flüssen, am Rhein, in Hinterhessen und Franken. Die Nahrung besteht in Vegetabilien, Insekten, selten Fische. Man findet das Nest in einer Höhle an einer Anhöhe mit 6 bis 8 weißlichen Eiern. Herr Naumann sagt, es stehe auf Schilfkufen, kleinen Inseln und im Rohr mit

9 bis 10 Eiern, die denen der wilden Ente ähnlich sind. Hierher gehört wahrscheinlich, nach Herrn Borkhausens Bemerkung, auch Herrn Becksteins Brandente, die er für eine Varietät der Tafelente ausgegeben hat. Kopf, Nacken, und ein Ring um den Hals sind dunkelbraun; Brust kastanienbraun; Bauch weiß, einzeln braun gefleckt; die oberen Deckfedern der Flügel schwarz; die Schwungfedern schwarz, und der Schwanz dunkelbraun.

Weißbackente oder Weißköpfige Ente, auch **Rüderente**, **blauschneeliche Ente** genannt — *Anas Leucocephala* — hat einen großen und breiten Schnabel, über dem Nasenlöchern aufgeschwollen und in der Mitte durch eine Hohlkehle getheilt; die Füße sind lang und außer dem Gleichgewichte; die Flügel ohne Spiegel, am Männchen der Schnabel blau; der Kopf und ein Theil des Halses weiß, auf dem Scheitel ein Fleck und die Mitte des Halses schwarz, am Weibchen der Schnabel und Kopf braun, und die Kehle weiß. (Größe zwischen der gemeinen wilden Ente und der Kriechente). Sie variiert dem Alter nach in der Farbe; denn die jungen Männchen sehen wie die Weibchen aus, und hat zum Wohnort die Sibirischen Seen; im Winter zieht sie zuweilen nach Deutschland, nach Krain und Thüringen. Hierher gehört wahrscheinlich Herrn Naumanns Weißbackente (S. 374. Taf. 92. Männchen.

91. Weibchen) an welcher, dass sie im Herbst geschossen, die Farben nicht rein ausgezeichnet sind. Kehle, ein Theil des Halses und die Wangen sind schmutzig weiß; Scheitel, Nacken und Augengegend dunkelbraun; Brust und Bauch braungrau; der Schwanz mit starkkieligen zugespitzten Federn, die etwas schaufelförmig ausgehöhlt liegen. Das Weibchen ist schmutziger gefärbt.

Weißes Waldhuhn — *T. albus*, Linn. — mit Weinen und Behen, die dicke und lange weiße Federn haben, und einem Schwanz, woran die mittlern Federn weiß, und die übrigen dunkelbraun mit weißen Spizen sind. 16 Zoll lang. Es variiert in der Farbe; denn die Sommertracht ist tief orangengelb mit vielen dunkelbraunen Querstreifen und großen weißen Flecken; die Winterfarbe aber außer den dunkeln oben angegebenen Kennzeichen weiß. Es ist größer als das Schneehuhn, ihm, wie die Beschreibung weist, sehr ähnlich, und es ist noch nicht ganz entschieden, ob es eine wirklich verschiedene Art, oder nur ein altes Schneehuhn im Winterkleide sey. Eben so ungewiß ist, ob die in Pommern zuweilen im Winter sich verfliegenden von dieser Art und wirklich verschieden sind.

Weißspecht — *Picus medius* — gehört mit dem Schwarzspecht in eine Ordnung und Gattung, wo er eine besondere Art ausmacht. Er führt auch

die Namen: Mittler Bunspecht, Mittelspecht, Mittler Rothspecht, kleinerer kleiner bunter- und gesprenkelter Specht, Elst- und Aegerst-Specht, kleiner schwarz und weißbunter und haariger Baumhacker, und kleines Baumhacker. Als Kennzeichen dieser Art gelten folgende: Er ist weiß und schwarz bunt, und der Afters rosenroth; der Schnabel dünn und zugespitzt; am Männchen der Oberkopf karmoisinroth. Senf hielt Hr. Bechstein diesen Specht selbst für eine bloße Varietät des Buntspechts, wie mehrere Naturforscher, allein bey genauerer Beobachtung ist es eine wirkliche verschiedene Art. Er ist kleiner als der Buntspecht; die Länge acht und ein halbes Zoll, wovon der Schnabel zehn Linien und der Schwanz vier Zoll einnimmt; die Breite dreizehn und ein halber Zoll, und die Flügel reichen bis auf die Mitte des Schwanzes. Der Schnabel ist weit dünner und weit spiziger zulaufend, als am Buntspecht, und dunkelbleifarben; der Augenstern ist braun mit weißgrauem Ringe; die Füße schmutzig bleifarben; die geschilderte Fußwurzel eils Linien hoch. Der Scheitel ist karmoisinroth; die Stirne schmutzig rothfarben; der Nacken schwarz; die Backen weiß, an den Seiten des Halses ein weißer Fleck, beides mit einem schwarzem Bande, das oben unter den Augen und unten am Schnabelwinkel anfängt und weit stark in die Brust herab geht, ein

ungefaßt; der Oberleib schwarz; der Unterleib bis zum After muthig grauweiß, die Schäfte der Federn an der Brust und an den Seiten schwarz; der After faß rosenroth; die weißen Schultern und hintern Deckfedern der Flügel bilden ein eyrundes Schild, das einen schwarzen Fleck hat; die übrigen Deckfedern schwarz; die Schwungfedern schwärzlich, weißgestreift (wie beym großen Buntspecht), und die vordern haben weiße Spizen, die Schwanzfedern sind schwarz, die beyden äußern von der Hälfte an nach der Spitze zu weiß, schwarz in der Quere gestreift, die dritte mit vier gelblichen Spizen, die vierte und fünfte ganz schwarz. Das Weibchen ist gewöhnlich weniger roth auf dem Scheitel, wenn es aber jung ist, hat es rothgesprenkelte Federn. Bemerkenswerth ist noch, daß die Jungen unter dem Schwanz um einen Anstrich von rosenroth haben. Bey dem ersten Ausfliegen verliert sich am Weibchen die schwärzlich gesprenkelte Scheitelfarbe, und die rosenrothe Farbe am After erweitert und verschönert sich von Jahr zu Jahr. In seiner Lebensart kommt er mit dem Buntspechte fast gänzlich überein; außer daß er geschickter fliegt, da er weit leichter ist. Man trifft ihn in ganz Europa an. In Deutschland findet er sich auch, allein seltener als der Buntspecht. Es scheint, als wenn er sich mehr liebte in Feldhölzern und Gärten, als in großen Laubwäldern aufhielt. Im Herbst

und Winter trifft man ihn vorzüglich in Gärten an. Seine Nahrung besteht aus Insekten und ihren Larven und in Nüssen und Bucheckern. Er betrügt sich dabey, wie der bunte Specht. Er nistet hoch in die Höhlen der Eichenbäume, und legt seine drey bis vier glänzendweißen Eyer auf faules Holz. Sie sind weniger scheu, als die großen Buntspechte, und daher noch leichter zu schießen. Sonst wie bey diesem, mit welchen er auch die Feinde gemein hat. Ihr Fleisch hat einen guten Geschmack. Sie sind ganz unschädlich und nützen den Gärten durch ihren Fraß gar sehr.

Weißstirnige Ente —

Anas albicans — ist wahrscheinlich eine Bastartart mit einem Schnabel, wie die Bisamente; mit einer weißen Stirne, und einem braunrothen Kopfe und Halse. Sie ist so groß, als ein Haushahn.

Weißwangige Gans —

Anas leucopsis Bechst. — auch Bernakelgans, Schottische Gans, Rothfußgans, Nordgans, weißköpfige kleine Gans genannt, wohnt im Norden der Erde, kommt aber auf dem Zuge häufig nach Deutschland. Die Hauptfarbe ist aschgrau; der Hals schwarz; Stirn, Kehle und Wangen sind weiß, und über die Augen geht ein schwarzer Streif; der Schnabel und die Füße sind schwarz. Die Länge beträgt etwas über zwey Fuß.

Wen.

Wendehals — Yunx — macht in der Ordnung der spechtartigen Vögel eine eigene Gattung aus, mit einem ziemlich geraden, kegelförmig zugespitzten Schnabel, mit unbedeckten und ausgehöhlten Nasenlöchern, und mit einer wurmförmigen, langen Zunge, die mit einer scharfen Spitze versehen ist. Wir haben bey uns nur den gemeinen **Wendehals — Yunx Torquilla** — heißt auch schlechtweg **Wendehals**, **Drehhals**, **Drehvogel**, **Otterwindel**, **Ratterwendel**, **Windhals**, **Halsdreher**, **Halswinder**, **Treyhals**, **Ratterzwang**, **Grasspecht** und **Ratterhals**. Die Kennzeichen der Art sind: Er ist weiß, gelblich, aschgrau, schwarz und rostfarben gefleckt und gemischt. Dieser Vogel gleicht an Größe einer Feldlerche, ist sechs und einen halben Zoll, wovon der Schwanz drey und einen halben Zoll mißt. Der Schnabel ist gerade, spizig, drey Viertel Zoll lang, im Sommer bleifarben, im Herbst olivengrün, der Augenfleck braungelb; die Füße sind kurz, stark, bleifarben, mit zwey Zehen vor- und zwey rückwärts. Der Kopf ist aschfarben, mit feinen schwarzen und rostfarbenen Flecken und einzelnen weißen Punkten; den Scheitel und halben Rücken theilet ein schwarzer mit Rostfarbe überlaufener breiter Streifen der Länge nach; der übrige Oberleib ist schön grau, schwarz, weiß und rostfarbig gestrichelt und gepunktet; an den hintern Augenwin-

keln läuft bis zur Hälfte des Halses herab ein kastanienbrauner Streifen; Backen, Kehle, Hals, Brust und After sind rothgelb mit feinen schwarzen Wellenlinien; der Bauch gelblichweiß mit einzelnen schwarzbraunen dreieckigen Punkten; die Deckfedern der Flügel und die hintersten Schwungfedern sind brann, grau und schwärzlich fein gestrichelt, und mit einzelnen weiß und schwarzen Flecken bestreut; die übrigen Schwungfedern sind schwarz, auf der außersern Fahne rostfarben und schwarz gewellt; der Schwanz hat zehn große und zwey kleine Nebenseitenfedern, ist blaßgrau, schwarz gesprenkelt, und mit vier breiten schwarzen Querstreifen besetzt. Das Weibchen ist am Unterleibe blässer. Varietät: Der weiße **Wendehals**. Er ist überall weiß. Den Namen **Wendehals** hat er von der wunderbaren Art, den Hals zu verlängern, und den Kopf zu drehen, daß der Schnabel gegen die Mitte des Rückens zugekehrt ist. Dieß kann man besonders bemerken, wenn man ihn in der Hand hält, aus der er sich, durch dieß langsame Drehen und Wenden, in Freyheit zu setzen sucht. Er sitzt gewöhnlich aufgerichtet, macht häufig langsame Verbeugungen, woben er den Schwanz wie einen Fächer ausbreitet, und die Kopffedern, wie beym Holzheher, in die Höhe richtet. Wenn sich ihm sein Weibchen nähert, oder wenn man ihn im Zimmer böse macht, so schiebt er den Körper langsam vorwärts, hebt die Kopf-

federn

federn in die Höhe, verdreht die Augen, beugt sich, breitet den Schwanz weit aus, und kullert hohl in der Kehle. Ueberhaupt ist sein Betragen langsam und melancholisch, und wenn er noch nicht in Gefahr gewesen, wenig scheu. Seine Stimme, welche das Männchen im Frühjahr gar oft hören läßt, um sein Weibchen herbei zu locken, drückt sich in etlichen hurtig aufeinander folgenden, heisern, lauten Tönen: Gi, Gi, Gi, Gi! aus, welche er mit großer Anstrengung ausstößt. Er setzt sich, damit sie desto weiter erschallen, dazu auf einen dürrn freyen Ast eines hohen Baumes. Wenn ihn der Landmann zum erstenmale schreyen hört, so sagt er: der Specht ruft seinem Weibchen — es wird nun schönes Wetter. Er ist so wenig scheu, daß man ihn zuweilen mit der Hand in den Hefen fangen kann. Der Wendehals wird allenthalben nicht häufig angetroffen. Er gehört unter die Zugvögel, die uns im September verlassen, und zu Anfange des Mayes, oder auch zu Ende des Aprils, wieder ankommen. Europa und Asien ist sein Vaterland. Im August sieht man ihn häufig in den Krautfeldern. Sonst ist er in Laubhölzern und in Gärten anzutreffen. Seine Hauptnahrung besteht in Insektenlarven und in Ameisen. Er holt sie mit seiner langen Zunge unter den Schuppen der Bäume, und unter dem Moose hervor. Die Ameisen liebt er theils von Bäumen, theils von dem Haufen ab, und steckt die Zunge

auch in denselben, um zu den Eiern zu gelangen. Die Jungen füttert er ausser den grünen Raupen auch mit fliegenden Insekten. Im August kommt er in die Krautfelder und sucht die Raupen, Puppen und Insekten von den Krautarten ab. Er ist dann in Thüringen zuweilen so häufig anzutreffen, als der Hänfling, nur daß er nicht in Gesellschaft, sondern einzeln fliegt. Wenn es ihm an Insekten gebricht, so frist er auch Ameiseneyer. Er pflanzt sich des Jahres nur einmal fort, daher auch in Verbindung mit seinen Feinden, die der Brut so leicht bekommen können, ohngeachtet er kleine Gehecke macht, seine Vermehrung immer nicht sonderlich bemerklich wird, und wenn er auch fast gar keinen Nachstellungen ausgesetzt ist. Sein Nest findet man in Gärten und Wäldern in hohlen Bäumen. Es besteht aus einer bloßen Unterlage von klaren Moos, Grasshalmen, Haaren und Wolle, und enthält acht bis neun glänzend weiße Eyer, die in vierzehn Tagen ausgebrütet sind. Sie legen alle Jahre wieder in dieselbe Höhle, und wenn sie auch ihrer Jungen darin wären beraubt worden. Diese sehen vor dem ersten Mausern am Unterleibe schmutzig weiß aus, und die schöne rostbraune Farbe an den Flügeln ist nur röthlich. Baumarder, Miesel, Haselmäuse und Ragen zerstören ihre Brut oft. Sperber und Baumfalken verfolgen die Alten. Sie sind im Herbst in den Krautfel-

feldern sehr leicht zu schießen. Man fängt sie auch, manchmal einzeln im Herbst in Sprengeln, vor welchen Hollunderbeeren hängen. Das Fleisch ist wohlschmeckend und im August und September sehr fett. Sie vertilgen viele schädliche Insekten in Wäldern und Obstgärten.

Wenden ist bey'm Gange des Hirsches ein Zeichen, das ihn vom Thiere unterscheidet, s. Gewende.

Werfen heißt 1) die Fortpflanzung mancher Thiere, daher Werwerfen, wenn solches vor der Zeit geschieht. 2) Bey der Falknerey so viel, als den Vogel von der Hand fliegen lassen. 3) Bey Wölfen, wenn sie von den Hunden gepackt und nieder gewürgt werden.

Weyhen — Circi — machen in der Ordnung der Raubvögel, und zwar in der Gattung Falke, die vierte Familie aus, welche sich von den übrigen durch einen kleinen Schnabel, der einen seicht ausgeschweiften Zahn hat, und durch lange dünne Füße oder Fußwurzeln unterscheidet. Es gehören bey uns unter die Familie fünf Arten: 1) Rostweyhe — *Falco aeruginosus* — heißt auch Busfard, Sumpfbusfard, Moos-Hühner- und rostige Weyhe, Hühner-Brand-Enten-Rohr- und brauner Geyer, Rohr- Wasser- rostiger und braunrostiger Falke, brauner Fischgeyer und Fischaar mit grünlichgelber Wachshaut, gelben Füßen,

chokoladebrauner Hauptfarbe und rostgelben Scheitel, Kehle und Achsel. Er ist ein bekannter schlanker Raubvogel, der sich durch seine dunkle Farbe vor allen andern auszeichnet. Er ist ein und zwanzig Zoll lang, und drey und einen halben Fuß breit; der Schwanz hält etwas über sieben Zoll und der Schnabel ein und einen Viertel Zoll; die Flügel bedecken den Schwanz fast gänzlich. Der Schnabel ist etwas gerade, ohne merklichen Zahn, mit einem scharfen Haaken, schwarz und mit grünlichgelber Wachshaut; der Augenstern rothgelb; die langen dünnen Füße gelb; die geschilderte Fußwurzel drey Zoll hoch; die scharfen krummen Nägel glänzend schwarz. Der Scheitel ist schön röthlichgelb; fein braun gestrichelt; die Kehle röthlichgelb; der ganze Oberleib chokoladebraun mit rostfarbenen Flecken oder Gewölck auf manchen Stellen; auf jeder Schulter ein röthlichgelber Fleck, der aber vielmal fehlt; der Unterleib dunkelkastanienbraun, also heller als der Oberleib; die Schwungfedern dunkelbraun mit den äußern Ranten, wieder Rücken; der Schwanz wie der Rücken, die drey äußern Federn röthlich gefleckt. Das Weibchen ist nur etwas größer als das Männchen, ist ihm aber in der Farbe gleich, doch scheint die Farbe etwas heller zu seyn, besonders auf dem Kopfe; auch habe ich mehrere Male einige weiße gelbe Flecken auf den Flügeln bemerkt. Der röthlichgelbe Schulterfleck ist, wie ich schon

schon angegeben habe, kein Haupt-
 e n z i g e i c h e n an diesem Vogel,
 denn er fehlt an vielen Exem-
 plaren, und es scheint mir, als
 wenn ihn bloß sehr alte Vögel
 hätten. Ja man trifft sogar
 Exemplare an, denen auf dem
 Kopfe der röthlichgelbe Scheitel
 und Kehle mangelt, obgleich dieß
 elten ist; und die am ganzen
 Leibe chokoladebraun aussehen.
 Es ist ein sehr geschickter, lusti-
 ger und scheuer Raubvogel. Man
 sieht ihn fast beständig auf der
 Erde sitzen. Sein Flug ist schön,
 anst, schwimmend und fast im-
 mer in horizontaler Lage. Mehr-
 ere minder muthige und starke
 Raubvögel, als die Bussarde,
 Baum- und Thurmfalken, flie-
 hen ihn, weil er gleich mit ih-
 ren anbindet, und ihnen wenig-
 tens ihren Raub abzugagen sucht.
 Ob man gleich mit Falken auf
 ihn jagt, so ist doch einer allein
 nicht im Stande, seinen Muth
 und seine Stärke auszuhalten,
 und es müssen mehrere auf ihn
 gelassen werden. Die Heymath
 dieses Raubvogels ist Europa
 und das südliche Rußland.
 Er hält sich in Ber- und Feld-
 hölzern, in Gebüsch und He-
 cken, die nahe bey Seen, Teichen,
 Flüssen und Sümpfen liegen,
 auf. Wenn nicht der Winter
 gar zu heftig und der Schnee zu
 hoch ist, so bleibt er das ganze
 Jahr hindurch in Deutschland,
 und zieht nicht weg, sonst ist er
 ein Strichvogel. Im Winter
 sieht man ihn auf einzelnen Feld-
 bäumen, Weg- und Grenzstei-
 nen sitzen. Da ihm sein Auf-
 enthalt am Wasser angewiesen

ist, so besteht auch sein Raub
 vorzüglich aus Wassergeflügel,
 als Enten, Wasserhühnern, Meer-
 hühnern, Tauchern, Meyen u.
 s. w. er stößt auch wie der
 Fischeaar, auf Fische. Unter dem
 jungen Wasservögeln, besonders
 den Meer- und Wasserhühnern,
 richtet er, da er außerordentlich
 gefräßig ist, große Niederlagen an.
 Er stößt auch auf Kaninchen,
 junge Haasen, Rebhühner u. s.
 w., muß aber auch mit Erd-
 schen, Schlangen und Mäusen
 oft vorlieb nehmen. Er bejagt
 ein großes Revier. Der Horst
 steht in sumpfigen und wägrigen
 Gegenden, nicht hoch über der
 Erde in einem Gebüsch, oder
 auch auf einem bloßen mit Gras
 bewachsenen Hügel. Er besteht
 aus Reifern, Schilf- und Ried-
 gras, und ist inwendig mit Laub
 und Federn ausgelegt. Er ent-
 hält drey bis vier blaulichweiße
 Eyer, die in drey Wochen aus-
 gebrütet werden. Zuweilen macht
 ein alter Vogel des Jahres zwey
 Gehefte. Die Jungen sind an-
 fangs wollig und weißgelb, wer-
 den dann ganz rostbraun, und
 nach dem ersten Mausern wer-
 den sie dunkelrostbraun mit dun-
 kelgelben Scheitel und derglei-
 chen Flecken an Schultern und
 Brust. Der Fischeaar verfolgt
 diese Vögel, wenn sie sich ein-
 ander auf einerley Wege, näm-
 lich Fische zu fangen, beegnen.
 Man findet eine sehr große Laus
 auf ihm. Man muß sie mit der
 Flinte erschleichen, wenn man
 sie bekommen will, sonst muß
 man das Ohngefähr abwarten,
 wenn sie neben oder über einem
 weg-

wegstreichen. Man baizt sie mit Falten. Daß sie unter die mehr schädlichen als nützlichen Vögel gehören, ergibt sich aus der Nahrung. Man will sie auf die Kaninchen- Rebhühner- und Wachteljagd abrichten können. 2) Korn- oder Gallweyhe — *F. cyanus et Pygargus* — das Männchen heißt auch St. Martin, Blesfalke, blaue, weiße und Getraide-Weyhe, blauer Habicht, Blauvogel, Kornvogel, Schwarzwänchen, weiße Weyhe, weißer Falke, blauer Falke, Schwarzflügel, weißer Geyer, grauweißer Geyer, Hühnerdieb, Hühnerfalk, Hühnerweyhe, Hühnerhabicht, kleiner Spitzgeyer, blaues Geyerle, böhmischer Mäusehabicht, das Weibchen: Ringelfalke, Ringelgeyer, Ringschwanz, Falke mit einem Ringel um den Schwanz, weißschwänziger Falke, Lerchengeyer, aschfarbener Falk oder Blesfalke mit weißen schwarzgewürfeltem Schwanze, Blesfalke mit gewürfeltem Schwanze, Taubenfalke und kleiner Rohrgeyer, Milane, kleine Weyhe, Steingeyer, Weißkopf und Gelbschnabel. Die Kennzeichen der Art sind: Wachshaut und Füße sind gelb, erstere mit steifen Borsten fast bedeckt; der Kopf mit einem eulenartigen Schleier von steifern Federn umgeben;

der Steiß weiß; das Männchen am Oberleibe aschgrau, das Weibchen dunkelbraun mit rostfarbigen Federrändern, auch weißlichen Flecken. Da Männchen und Weibchen bey diesem Vogel eine so sehr abweichende Farbenzeichnung haben, so hat man sie sonst gewöhnlich als zwey verschiedene Vögel getrennt. Es sind schlanke Raubvögel. Das Weibchen ist einen Fuß und acht Zoll lang, wovon der Schwanz neun Zoll, und der Schnabel einen Zoll wegnimmt. Das Männchen ist fast um ein Dritttheil kleiner. Die Flügel legen sich einen Zoll unter der Schwanzspitze zusammen. Der Schnabel ist kurz, von der Wurzel an gleich stark überkrümmt, dunkelbraun, die Wachshaut gelb, oben mit steifen Borsten, die sich wie bey den Eulen über die rundlichen Nasenlöcher in die Höhe sträuben, und bis zu den Augen laufen, fast ganz bedeckt; der Augenstern rothgelb; die langen dünnen Füße gelb; die Nägel dunkelbraun; die geschälberte Fußwurzel zwey und ein halben Zoll hoch. Dieser Raubvogel unterscheidet sich schon von weiten von andern durch seine helle graue Farbe; wenn man ihn aber in der Nähe betrachtet, so hat er einen eulenähnlichen Kopf, (besonders das Weibchen), und die Farben des Männchens sind folgende: Der Kopf, Hals, Rücken, die Deckfedern der Flügel, die Kehle und der obere Theil der Brust sind dunkel aschgrau, doch fällt der Scheitel und Rücken allzeit ins

ins Braune, und bey sehr alten ist er ganz hellbraun. Der Hinterkopf, so wie der Schleyer, ist weiß und hellbraun gefleckt; bey sehr alten grau. Die Augen liegen in einem weißen Kreise, welche Farbe sich über die Augen weg bis an die Kehle zieht, und an der Wurzel des Unterschnabels steht ein kleiner Bart von schwarzen steifen Borsten. Der untere Theil der Brust, der Bauch, After, die Schenkelfedern sind weiß, bey den jüngern mit kleinen rostfarbenen oder röthlichen Flecken bestreut, bey alten nur der Bauch mit bräunlichen Querbändern, und bey sehr alten ist der ganze Unterleib weiß. Der Steiß ist allzeit weiß. Der Rand des vordern Flügelgelenkes und die untern Deckfedern der Flügel sind weiß; die sechs ersten Schwungfedern schwarz, die übrigen aschgrau, mit hellbraunen Spitzen und weißen Rändern; die drey äußersten Schwangfedern weiß mit aschgrauen Querbändern, die vierte und fünfte aschgrau mit schwarzen Querbändern, und die zwey mittelften aschgrau. Das Weibchen zeichnet sich gar sehr aus. Der Kopf erhält durch die steifen Barthare, die den kurzen Schnabel bedecken, durch seine Farbe, und besonders den den deutlichen Schleyer, das natürliche Ansehen eines kleinen Eulenkopfs. Der Kopf, Hals, Schleyer, die Brust und der After sind gelblich mit häufigen dunkelbraunen Flecken, die auf dem Kopfe am dichtesten und auf dem After sehr einzeln stehen. Die

Schenkelfedern sind rostgelb mit langen, schmalen, dunkelbraunen, der Länge nach laufenden Strichen; die Deckfedern der Flügel dunkelbraun mit weißlichen Rändern und Flecken; die Rückenfedern dunkelbraun mit rostfarbenen Rändern; die sechs ersten Schwungfedern braun mit dunkelbraunen Querbändern, die übrigen dunkelbraun mit weißlichen Rändern. Auf der untersten Seite sind die sechs ersten Schwungfedern weiß mit schwarzen Querbändern, die übrigen braun mit dunkelbraunen Querbändern, die Spitzen aller rostgelb. Alles übrige verhält sich wie bey dem Männchen. Dieser Falke ändert bis ins vierte Jahr seine Farbe sehr merklich, und wenn man also Männchen findet, bey welchen das Aschgrau mehr ins Graue oder Braune fällt, oder Weibchen, die fast ganz braun, oder braun und weiß gefleckt sind, so haben sie noch nicht vier Jahre erlangt. Im ersten Jahre ist der männliche Vogel röthlichgrau gewässert, und hat am Unterleibe auf schmutzigweißen Grunde bräunlich verloschene Streifen. Er heißt in dieser Kleidung bey den Jägern Tersch. Im zweyten Jahre wird der Grund am Unterleibe lichter und die Streifen werden bräuner. Er heißt alsdann Martin. Im dritten Jahre bekommt er erst seine blaugraue Farbe, und am Unterleibe seine Querbänder, und ist der blaue Habicht. Nach der Zeit ist und bleibt Farbe und Größe ausgebildet und fast ganz

wegstreichen. Man baizt sie mit Falken. Daß sie unter die mehr schädlichen als nützlichen Vögel gehören, ergibt sich aus der Nahrung. Man will sie auf die Kaninchen- Rebhühner- und Wachteljagd abrichten können. 2) Korn- oder Gallwenhe — *F. cyanus et Pygargus* — das Männchen heißt auch St. Martin, Bleyfalke, blaue, weiße und Getraide-Wenhe, blauer Habicht, Blauvogel, Kornvogel, Schwarzwächter, weiße Wenhe, weißer Falke, blauer Falke, Schwarzflügel, weißer Geyer, grauweißer Geyer, Hühnerdieb, Hühnerfalk, Hühnerwenhe, Hühnerhabicht, kleiner Spitzgeyer, blaues Geverle, böhmischer Mäusehabicht, das Weibchen: Ringelfalke, Ringelgeyer, Ringschwanz, Falke mit einem Ringel um den Schwanz, weißschwänziger Falke, Lerchengeyer, aschfarbener Falk oder Bleyfalke mit weißen schwarzgewürfeltem Schwanz, Bleyfalke mit gewürfeltem Schwanz, Taubenfalke und kleiner Rohrgeyer, Milane, kleine Wenhe, Steingeyer, Weißkopf und Gelbschnabel. Die Kennzeichen der Art sind: Wachshaut und Füße sind gelb, erstere mit steifen Borsten fast bedeckt; der Kopf mit einem eulenartigen Schleier von steifern Federn umgeben;

der Steiß weiß; das Männchen am Oberleibe aschgrau, das Weibchen dunkelbraun mit rostfarbigen Federrändern, auch weißlichen Flecken. Da Männchen und Weibchen bey diesem Vogel eine so sehr abweichende Farbenzeichnung haben, so hat man sie sonst gewöhnlich als zwey verschiedene Vögel getrennt. Es sind schlanke Raubvögel. Das Weibchen ist einen Fuß und acht Zoll lang, wovon der Schwanz neun Zoll, und der Schnabel einen Zoll wegnimmt. Das Männchen ist fast um ein Dritttheil kleiner. Die Flügel legen sich einen Zoll unter der Schwanzspitze zusammen. Der Schnabel ist kurz, von der Wurzel an gleich stark überkrümmt, dunkelbraun, die Wachshaut gelb, oben mit steifen Borsten, die sich wie bey den Eulen über die rundlichen Nasenlöcher in die Höhe sträuben, und bis zu den Augen laufen, fast ganz bedeckt; der Augenstern rothgelb; die langen dünnen Füße gelb; die Nägel dunkelbraun; die geschilderte Fußwurzel zwey und ein halben Zoll hoch. Dieser Raubvogel unterscheidet sich schon von weiten von andern durch seine helle graue Farbe; wenn man ihn aber in der Nähe betrachtet, so hat er einen eulenähnlichen Kopf, (besonders das Weibchen), und die Farben des Männchens sind folgende: Der Kopf, Hals, Rücken, die Deckfedern der Flügel, die Kehle und der obere Theil der Brust sind dunkelaschgrau, doch fällt der Scheitel und Rücken allzeit ins

ins Braune, und bey sehr alten ist er ganz hellbraun. Der Hinterkopf, so wie der Schleyer, ist weiß und hellbraun gefleckt; bey sehr alten grau. Die Augen liegen in einem weißen Kreise, welche Farbe sich über die Augen weg bis an die Kehle zieht, und an der Wurzel des Unterschnabels steht ein kleiner Bart von schwarzen steifen Borsten. Der untere Theil der Brust, der Bauch, After, die Schenkelfedern sind weiß, bey den jüngern mit kleinen rostfarbenen oder röthlichen Flecken bestreut, bey alten nur der Bauch mit bräunlichen Querbändern, und bey sehr alten ist der ganze Unterleib weiß. Der Rand des vordern Flügelgelenkes und die untern Deckfedern der Flügel sind weiß; die sechs ersten Schwungfedern schwarz, die übrigen aschgrau, mit hellbraunen Spizen und weißen Rändern; die drey äußersten Schwanzfedern weiß mit aschgrauen Querbändern, die vierte und fünfte aschgrau mit schwarzen Querbändern, und die zwey mittelsten aschgrau. Das Weibchen zeichnet sich gar sehr aus. Der Kopf erhält durch die steifen Barthaare, die den kurzen Schnabel bedecken, durch seine Farbe, und besonders den den deutlichen Schleyer, das natürliche Ansehen eines kleinen Eulenkopfs. Der Kopf, Hals, Schleyer, die Brust und der After sind gelblich mit häufigen dunkelbraunen Flecken, die auf dem Kopfe am dichtesten und auf dem After sehr einzeln stehen. Die

Schenkelfedern sind rostgelb mit langen, schmalen, dunkelbraunen, der Länge nach laufenden Strichen; die Deckfedern der Flügel dunkelbraun mit weißlichen Rändern und Flecken; die Rückenfedern dunkelbraun mit rostfarbenen Rändern; die sechs ersten Schwungfedern braun mit dunkelbraunen Querbändern, die übrigen dunkelbraun mit weißlichen Rändern. Auf der untersten Seite sind die sechs ersten Schwungfedern weiß mit schwarzen Querbändern, die übrigen braun mit dunkelbraunen Querbändern, die Spizen aller rostgelb. Alles übrige verhält sich wie beym Männchen. Dieser Falke ändert bis ins vierte Jahr seine Farbe sehr merklich, und wenn man also Männchen findet, bey welchen das Aschgrau mehr ins Graue oder Braune fällt, oder Weibchen, die fast ganz braun, oder braun und weiß gefleckt sind, so haben sie noch nicht vier Jahre erlangt. Im ersten Jahre ist der männliche Vogel röthlichgrau gewässert, und hat am Unterleibe auf schmutzigweißen Grunde bräunlich verloschene Streifen. Er heißt in dieser Kleidung bey den Jägern Tersch. Im zweyten Jahre wird der Grund am Unterleibe lichter und die Streifen werden bräuner. Er heißt alsdann Martin. Im dritten Jahre bekommt er erst seine blaugraue Farbe, und am Unterleibe seine Querbänder, und ist der blaue Habicht. Nach der Zeit ist und bleibt Farbe und Größe ausgebildet und fast ganz

ganz unbedeutend; doch variiren auch die alten Männchen noch etwas in der Farbe. Er lebt von weitem ganz weiß und trägt mit schwarzen Schwanzfedern. Wenn man sie aber in der Nähe betrachtet, so sind sie doch schwarz, und am Rande und am Ende der Schwanzfedern nur rein weiß. Anders ist es am Oberleibe und unter dem Flügel. Die Schwanzspitze ist blau, und die Schwanzfedern sind schwarzlich aschgrau. Andere haben einen ganz weißen Schwanz. Bey noch andern sind nur die zwey mittleren Schwanzfedern röthlich überlaufen. Wie den Eulen hat die Kornvögel nicht nur den Federzug gemein, sondern auch die Gewohnheit des Abends bey Sonnenuntergang, ehe die Dämmerung eintritt, auf dem Felde über den Aedern dicht herum zu fliegen, und ihrer Nahrung nachzugehen. Es ist ein schönemüthiger und dreuster Vögel, der geschickt raubt und geschickt fliegt. Wenn er Junge hat, so ist er so beherzt, daß er über den Vorübergehenden, wie ein Kiebitz herumschwebt und unaussprechlich, besonders das Weibchen, wie ein Grünspecht Gählgäh! schreyt. Man sieht ihn beständig nahe an der Erde flirschweben, selten steigt er in die Höhe, nur da, wo Bäume sind, oder wenn er sich in der Gegend seines Nestes umsieht. Man trifft diesen Vogel in Europa, in dem südlichen Rußland, in Amerika und auch in Asien an. Er ist einer der häufigsten Raubvögel in

ebenen Gegenden, geht nicht in die tiefen Wälder, bloß in die Feld- und Vorhölder. Am liebsten wohnt er da, wo Seeen, Sümpfe und Teiche in der Nähe sind. Wenn wir in Deutschland gelinde Winter haben, so ist er das ganze Jahr hindurch zu sehen, wenn aber der Schnee zu hoch wird, so muß er aus Mangel an Nahrung südlichere Gegenden besuchen. Seine Nahrung machen Frösche, Maulwürfe, Feldmäuse, Erdchsen, junge Wasser- und Meerhühner, Heerschnecken und Strandläufer aus, doch fängt er auch Rebhühner, Wachteln, Lerchen und Tauben, und nimmt die Vögel aus der Schneef. In der Luft kann er nichts schlagen, und ergreift daher alles sitzend auf dem Erdboden. Die Rebhühner haben große Furcht vor ihm; denn er jagt sie, bis sie müde sind, und von ihm von der Erde aufgehoben werden können. Man sagt auch, daß er Fische fange, die auf der Oberfläche der Teiche schwimmen. Wo es Sümpfe giebt, fliegt er im Herbst und im Frühjahr, wenn die Beccassinen streichen, immer drüber hin; diese drücken sich nieder, so wie sie ihn gewahrt werden, und werden ihn dadurch allezeit zur Beute. Dieser Vogel baut nie auf einen Baum, sondern allezeit auf die Erde in die Winterfrucht (daher der Name Kornvogel bey den Jägern), in sumpfigen Gegenden ins große Niedgras, auf niedrige Weidenbüsche, ins Rohr an den Ufern der Teiche, Seen und .

und Flüße, in Feld- und Vorhölgern auf entblößte Plätze, oder in junge Schläge und in alte unbenutzte Steinbrüche. Auf großen sumpfigen Nieden trifft man die Nester in Thüringen in Menge an, und ein Paar baut mehrere derselben, ehe das Weibchen seine Eyer in eins legt. Das Nest, worin die Eyer liegen, ist groß, und hat nach der Gegend bald eine Unterlage von Reifern, oder von Stroh und Mist, alten Kartoffelstengeln, und ist inwendig mit Borsten oder weichen Rohrkhalmen, oder auch mit Federn ausgelegt. Das Weibchen brütet in drey Wochen fünf bis sechs Eyer aus, die mehr oder weniger bläulichweiß, ohne merkliche Flecken, oder mit sehr blassen bald größern, bald kleinern, hellern oder dunklern schmutziggroßgelben Flecken bezeichnet sind. Die ausgekrochenen Jungen sehen weißwollig aus, und haben schwarze Augenlieder und Schnabel; sie kriechen, wie die jungen Hühner, welches zur Fortpflanzungszeit die Alten auch thun. Mit den Kolkkraben und Rabenkrahen leben sie immer im Streite. Man sucht sich an sie zu schleichen, um sie mit Schießgewehr zu erlegen, und schießt sie in der Nähe des Nestes im Fluge, wenn sie einem über den Kopfe herum fliegt. Sie hat auch die Sonderbarkeit an sich, daß sie des Morgens und Abends wenigstens etliche Tage hinter einander eben denselben Flug macht, da man sich dann anstellen und sie erlegen kann.

Wenn man eine Tellerfalle mit einem ausgestopften Kaninchen oder jungen Hasenfelle beködet, und diese auf ihren gewöhnlichen Weg stellt, so fängt sie sich ebenfalls, die Falle muß aber entweder mit Gras oder auf den Aeckern mit Sand belegt seyn. Mit einer Taube fängt man sie im Stof. Wie sich aus der Nahrung ergiebt, so gehören diese Vögel unter die mehr nützlichen als schädlichen. Man muß daher ihrer allzugroßen Vermehrung nur steuern. Herr Bechstein hat auch einmal bey einem Falkonier ein Weibchen von diesem Vogel zur Baizge auf Rebhühner abrichten gesehen. 3) Rohrweyhe — *F. arundinaceus*, Bechst. — Wachshaut und Füße gelb; der Leib kastanienbraun; der Scheitel weiß, Weibchen 2 Fuß lang. Er hat seinen Wohnort in Schlesien, Franken, Thüringen, und Nahrung und Nahmen mit dem vorhergehenden gemein. Die Jäger nennen ihn Weißköpf. Dieser Vogel hat im Aeußern viel Aehnlichkeit mit der Rostweyhe, ist aber größer und stärker. Die Jäger wollen ihn nicht mit jener für einerley gelten lassen, und sagen, er sey weit träger. Die Länge ist 2 Fuß, wovon der zugerundete Schwanz 10 Zoll wegnimmt; das Gewicht ein Pfund 26 Loth. Der Schnabel mißt 1 Zoll 8 Linien, hat einen seichten Zahn und eine scharfe krumme Spitze, ist schwarz mit gelber Wachshaut; die gelben Füße sind hoch und schlank, die Fußwurzel so wie die Mittelzehe

2½ Zoll lang; die schwarzen Nägel sehr gekrümmet und scharf. Das ganze Gefieder ist prächtig kastanienbraun, an den Schwung- und Schwanzfedern nach der Wurzel zu ins lichte übergehend; der Unterschwanz erscheint weißlich und dunkelbraun gebändert; der Scheitel und zuweilen auch die Kehle sind schön weiß. 4)

Brandweyhe — *F. rufus*, Linn.: Mit einem deutlichen Schleyer (wie die Eulen) um den Kopf, rostbrauner Hauptfarbe, weißen Unterdeckfedern der Flügel und aschgrauem Schwanz. Weibchen 20 Zoll lang. Hr. G. Becker beschreibt eine Varietät, die ihm hierher zu gehören scheint. Die Wangen sind rein weiß; der Schleyer schwarz (welches dem Vogel ein prächtiges Ansehen giebt); Kehle, Brust und der ganze Unterleib schön rostfarben ohne alle Neben- und Zwischenzeichnung; der Oberleib dunkelbraun mit einzelnen rostfarbigen Querstreifen auf den Federn; der Schwanz nur schwach grau, und zwar auf der Innenseite, die Aussen Seite ist rostfarben und gegen das Ende haardbreit schwarz eingefaßt. Herr Becker sagt, er habe die Vergleichung mit den Zungen und Weibchen der Kornweyhe genau angestellt, und er gehöre zu diesen nicht. Dieß ist fast wörtlich die Beschreibung von der Abbildung des Falken im Wirsingischen Vögelwerk. Taf. 68, und Herr Bechstein hält diesen hier abgebildeten Vogel für ein Weibchen der Kornweyhe. Seinen Wohnort, seine Nahrung

und Fortpflanzung hat er mit der Rostweyhe gemein, und hat auch die Namen: Brandfalk, Brandgeyer, Fischgeyer und Grauschwanz. 5) Braune Weyhe — *F. fuscus* — heißt auch Brauner Falk, braunfahler Geyer. Mit ungezähntem Schnabel, stärkeren Beinen, kurzen Behen, kastanienbrauner Hauptfarbe und zugrundetem Schwanz; macht den Uebergang von den Weyhen zu den Habichten. Herr G. Becker bemerkt bey diesem Vogel, daß er ihn sonst für eine Varietät des Mäuse-Busards gehalten habe; allein die regelmäßigen herzförmigen Flecken auf der Brust seyen zu auszeichnend; und der ganze Vogel überhaupt schlanker. Er ist 22 Zoll lang. Er sucht sich zu seinem Wohnorte Wälder — im Winter an Gewässern; und seine Nahrung sind alle Arten kleinster Vögel.

Wichel, Wichelpfeife, ist ein Lockpfeifen, womit der Ruf der Eule nachgemacht wird, und das aus zwey viereckigen, etwa eines halben kleinen Fingers breiten, auf einander gepropften Hölzchen, mit einer feinen birkenen oder firschkäulen Rinde bestehet. Man braucht es bey den Feld- und Plattbäumen zum Fange von allerley Vögeln. s. Feldbaum.

Widersinniges Gehörn; Widersinnsgehörn, ist ein Firschgeweih, das neben den großen

zen Stangen einige kleinere oder einige Enden, die man Widerstehenden nennet, hat.

Wiedehopf — *Upupa* — macht unter den spechtartigen Vögeln eine besondere Gattung mit folgenden Kennzeichen aus: der Schnabel ist schwächig, lang, schwach bogenförmig, etwas zusammengebrückt und an der Spitze stumpf; die Nasenlöcher sind sehr klein und die Zunge ist stumpf, drekantig, ganz und sehr kurz. Bey uns kommt nur der gemeine Wiedehopf — *Up. Epops* — vor, welcher auch schlechtweg Wiedehopf, Widhopf, Wiedhoff, Europäischer Wiedehopf, Wiedehoppe, Kuckukstücker, Kuckuklaquai, Rothhahn, Dreckhahn, Dreckkrämer, Stinkhahn, Baumschneppse, Heervogel und Gänsehirt genannt wird. Die Kennzeichen der Art sind: Der Kopf ist mit einer fächerförmigen Haube geziert, die schwarz und orangegelb ist. Er ist ohngefähr einen Fuß lang und ein und einen halben Fuß breit; der Schnabel mißt ein und drey Viertel Zoll und der Schwanz vier Zoll; die Flügel legen sich etwas über der Hälfte des Schwanzes zusammen. Das Gewicht nur drey Unzen. Der Schnabel ist dünn, gekrümmt, etwas klaffend, schwärzlichblau, an der Wurzel blaß fleischfarben; die Zunge drekantig, nicht größer als eine halbe Linse und tief im Munde sitzend; der Augenstern rußbraun; die Füße

wie der Schnabel gefärbt; die geschilderte Fußwurzel fast einen Zoll hoch. Der Federbusch ist drey Zoll hoch, und besteht aus zwey Reihen Federn, die von der Stirn bis zum Hinterkopf in zunehmender Größe stehen, und wie ein Fächer vor- und rückwärts bewegt werden können; er ist blasorangelgelb (isabelfarben) mit schwarzen Spitzen. Der Kopf, Nacken, Hals, die Brust und die Deckfedern der Unterflügel sind fleischfarbenbraun; der Ober Rücken und die kleinsten Deckfedern der Flügel rothgrau; der Unterrücken schwarz und gelblichweiß bandirt; die obern Deckfedern des Schwanzes oben weiß und unten schwarz; der Bauch und die Aftersfeder weiß; die Seitenfedern weiß mit schwarzgrauen einzelnen Streifen. Unter den Schwungfedern ist die vierte die längste und die erste sehr klein, daher die geöffneten Flügel sich ausrunden; die erste Ordnung ist schwarz, jede Feder mit einem weißen Bande; die zweyte Ordnung schwärzlich und hat fünf weiße Bänder, und die beyden letzten Schwungfedern sind schwarz und weiß und gelb gezeichnet; Die Deckfedern der ersten Ordnung sind schwarz, und die der zweyten schwarz und weißgelb bandirt; die weißen und gelblichen Bänder des Rückens und der Flügel laufen wellenförmig in einem fort; der Schwanz hat zehn Federn, ist gerade, und schwarz, in der Mitte mit einem weißen aufwärts stumpfwinklich gebogenen breiten Querbande. Das Weibchen ist etwas blässer, an der Brust weißlich mit ein-

einigen schwärzlichen Streifen. Der Wiebehopf ist ein schwerer, munterer und lustiger Vogel. Er läuft sehr hurtig, läßt dabei die Flügel fast auf die Erde sinken, macht häufige Verbeugungen, wo er jederzeit mit seinem Schnabel den Boden berührt, und wenn er im Affekt ist, so schlägt er den Federbusch auf- und nieder. Sein Flug ist sanft, ohne alles Geräusch, und wegen seiner runden, der Elster ähnlichen, Flügel muß er auch, wie diese, dieselben oft und schnell bewegen. Sein Geschrey ist im Herbst und Frühjahr Huphuphup, jo jo, to, to! das er auch, wenn ihn im Zimmer hält, und in Affekt bringt, mit stäten Verbeugungen hören läßt. Wenn man ihn zähmen will, so verlangt er anfangs Regenwürmer, alsdann nimmt er mit Brod und gekochtem Fleisch vorlieb. Er wohnt in Europa, Asien und Afrika, ist aber alsenthalben kein gemeiner Vogel. Als Zugvogel kommt er spät im April oder zu Anfang des May mit oder kurz vor dem Kuckuck an, und heißt deshalb in manchen Gegenden Kuckucks-Laquay. Er lebt des Sommers in Wäldern, die an Viehtriften und Wiesen gränzen, auch in waldigen Gegenden um die Dörfer herum in den Weidenbäumen. Im August, wenn die Wiesen gemäht sind, zieht er einzeln oder in Gesellschaft von vier bis achten auf die Ebenen, und verläßt uns, alsdann unvermerkt. Er hält sich mehr auf der Erde als auf den Bäumen auf. Seine Nahrung besteht vorzüglich in

Käfern, die er unter dem Mist der zahmen und wilden Thier unter dem abgefallenen Laube und Nas aussucht. Es sind daher gewöhnliche Nas- und Mistkäfer und ihre Larven. Sie wendet daher mit ihrem Schnabel alle jene Dinge um. Auch die Ameisen und Eyer verfolgt er. Wenn er ein Insekt verschlucken will, so löst er ihn erst die harten Flügeldecken ab, wirft es wegen der unbeweglichen Zunge in die Höhe und fängt es mit dem Schnabel. Es muß aber allezeit der Länge nach in den Schlund fallen, sonst muß er den Wurf so lange wiederholen. Er badet sich im feuchten Sande. Er baut in hohle Bäume, am liebsten auf alte, faule, geköppte Baumstämme, selten in Mauern- und Gelsentrümmern oder auf die bloße Erde. Das Nest hat wenig Unterlage von Genist und Federn; wenn es aber offen steht, eine Ueberbede von Kuhmist und zarten Wurzeln. Das Weibchen legt des Jahres einmal zwey bis vier längliche aschgraue Eyer, und brütet sie in 14 Tagen allein aus. Die Jungen sehen bis zum ersten Mausern, welches in wärmern Ländern geschieht, blässer als die Alten aus; haben ein weißliches Kinn, weißgelbe Schnabeleden; die weißen Bänder der Deckfedern sine röthlichweiß, und die schwarzen schwarzbraun; haben aber den Federbusch und gleichen übrigens den Alten. An den Jungen die man aufzieht, bemerkt man vorzüglich das frostige Wesen, das sie antreibt, sich immer unter oder auf den Ofen zu setzen,

so daß ihnen gewöhnlich der Schnabel vertrocknet, und sie dann elendiglich sterben müssen. Die Iltisse, Marder und Wiesel zerstören ihre Brut und viele Raubvögel verfolgen die Alten, daher sie auch, sobald sie einen erblicken, eine ganz eigene Stellung machen, die Flügel ausbreiten und den Kopf auf dem Rücken mit dem Schnabel in die Höhe stellen, so daß sie einen hingeworfenen bunten Lappen ähnlich sehen, und so oft unentdeckt bleiben. Sie sind außerordentlich furchtsam, und verlassen diese Stellung nicht eher, als bis der Raubvogel außer ihrem Gesichtskreise ist. Zum Schusse muß man sie wegen ihrer Scheuheit hinterzuschleichen, wenn man sie nicht von ohngefähr aufstöbert. Am leichtesten fängt man sie, wenn man auf Maulwurfs- haufen eine Leimruthe, an welche ein Mehlwurm gebunden ist, so locker steckt, daß die Leimruthe über sie herfällt, wenn sie den Mehlwurm loszupfen wollen. Alte und Junge riechen nicht angenehm, ohngefähr so, wie ein Ameisenhaufen, und sie werden daher bey uns nicht gegessen, wohl aber in Italien, wo man ihnen die Köpfe abreißt, daß sie ausbluten. Zur Heckezeit riechen sie am stärksten. Wegen ihrer Nahrungsmittel sind sie äußerst nützliche Vögel.

Wiederfährte ist unter Fährte erklärt.

Wiedergang, oder Kirchgang thut der Haase oder der Hirsch wenn er auf seiner Fährte wieder zurück gehet.

Wiederstrich, Wiederzug, heißt, wenn die Zugvögel im Frühjahr aus wärmern Gegenden zu uns zurückkehren. Die Zeit dazu ist bey der Beschreibung jedes Vogels angezeigt.

Wiesel — *Mustela* — macht in der Ordnung der Raubthiere eine besondere Gattung aus, wozu bey uns auch der Stein- und Baummarder, nebst dem Iltis und die beyden folgenden Wieselarten gehören, als: 1) Das große Wiesel — *Mustela Erminea* — Es heißt auch: rothes, braunes, graues Feld- und Waldwiesel, Wiesel mit schwarzer Schwanzspitze; in der weißen Winterfarbe; Hermelin. Die Kennzeichen der Art sind: Die Farbe ist braunroth, in kalten Gegenden im Winter weiß, die Schwanzspitze aber allezeit schwarz. Die Länge des Körpers ist etwas über ein Fuß, und der Schwanz hat fünf Zoll. Der Bau ist schlank und geschmeidig; Schade, daß der Kopf zu dick und der Hals zu lang ist, sonst würde es eine der niedrigsten Thierformen haben; die Schnauze läuft kurz vor dem Munde spitzig zu; die Nase ist stumpf und gefurcht; der Mund öffnet sich weit und ist mit einem abwärts stehenden Knebelbarte besetzt; das Gebiß sehr scharf; die Zunge glatt und gefurcht; die Augen klein, schwarz, funkelnd, weit vorn im Gesicht stehend, und mit langen Bartborsten versehen; die fast glatten

Dhr.

Ohrklappen kurz, breit, abgerundet und fest am Kopfe angelegt; der Hals kaum dünner als der Leib, vorn etwas in die Höhe gehoben; der Leib cylindrisch, an den Hinterschenkeln etwas erhabener; der Schwanz buschig und abgestumpft, in Ruhe gehend gerade ausgestreckt, in der Flucht aber auswärts gewölbt; die Beine kurz, scharfklaugig; der Daumen an den Hinterschenkeln kurz und versteckt; am After zwei niedrig nach Wisam stehende Drüsen. Die Farbe im Winter dunkel gelbbraun; im Sommer gelbroth oder schmutzig rothgelb; die Oberanten und Hinterfüße weiß (aber nicht immer); die Schnauze schwärzlich; der Bart gelb, weiß und schwarz; die Kopffarbe immer dunkler, als die Rückenfarbe; das Kinn und die Vorderzehen allezeit weiß; der übrige Unterleib weiß oder weißgelb; fast die ganze letzte Hälfte des Schwanzes schwarz. Im Norden ändert sich die Rückenfarbe in weiß; bey uns in Deutschland nicht immer; und die weißen Wiesel oder Hermeline bey uns, sind gewöhnlich Varietäten, wie die bey andern Thieren, und behalten diese Farbe Sommer und Winter. Auch wenn sich alsdann weiße und rothe Wiesel zusammen paaren, so giebt es geschädte. Man hat auch eine aschgraue Varietät entdeckt. Ueberhaupt ist auch die braune oder rothe Farbe verschieden, so daß man rothbraune, graubraune, rothgelbe und braunrothe große Wiesel antrifft. Das

Weibchen scheint einen etwas schlankern Körperbau, einen dünnern spitzigern Kopf zu haben, und auf jeder Seite des Bauches stehen fünf Säugwarzen. Es ist ein außerordentlich munteres, flüchtiges, gewandtes, aber auch ein grausames und für seine Größe sehr starkes Thier. Wie Eichhörnner, so geschwind kann es Bäume ersteigen, ungemein hurtig springen, und mit der größten Fertigkeit über Bäche und Flüsse schwimmen. Durch alle Rigen, wodurch der Kopf geht, schlüpfen sie. Ihre Stimme ist fast ein Quacksen wie das der Spitzmause. Sie machen immer Männchen, wie die Hasen, um sich umzusehen. Ihr Vaterland ist der Norden von Europa, Asien und Amerika, wo sie in großer Menge leben. In Europa sind sie fast allgemein bekannt. Man trifft sie im Felde und Walde an. Im Felde wohnen sie gern an Ufern der Flüsse, in Hecken, Strichhausen, in Maulwurfs-Häusern und Mäusehöhlen und in hohlen Obst-Weiden- und andern Bäumen. Eine Wohnung unter der Erde hat wenigstens vier Eingänge, und so richten sie sich auch die vorgefundenen ein. Im Walde wohnen sie ebenfalls in Erdhöhlen, Stein- und Felsenklüften und in hohlen Bäumen. Im Winter gehen sie auch in die Wohnungen der Menschen, vorzüglich in die einzeln im Felde liegenden, und halten sich in Scheunen, Ställen und Kellern auf. Sie werfen auch zuweilen in Hühner und andern Ställe.

Ställen, auch in Kellern Hausen auf, (wo sie dann Haus- u. g. heißen); dann gehen sie aber gewöhnlich nach Hühnern, Eiern u. d. gl. Ihre Hauptnahrung machen Hamster, Mäuse, Wasserratten und andere große und kleine Feldmäuse aus. Außerdem suchen sie die jungen und alten kleinen Vögel zu erschleichen, und nehmen den großen die Eier aus. Sie überfallen vorzüglich im Schlafe auch junge und alte Hasen und Kaninchen, ja sogar junge Rehe. Am Ufer des Wassers rauben sie Fische. Von Vegetabilien fressen sie bloß einige Pilzarten. Gewöhnlich gehen sie des Nachts, nur selten am Tage, nach ihrem Raube. Wenn nicht die Seltenheit des Thiers die Ursache ist, so sieht man sie immer paarweise beisammen, und es scheint daher, wie wenn sie gegen die Gewohnheit der Raubthiere in Monogamie lebten. Das Laufen oder Kriechen geschieht im März. Die Mutter bringt nach fünf Wochen drey bis acht Jungen zur Welt. Das Nest, das in einer Erdhöhle, unter, oder in einem hohlen Baume angelegt wird, ist mit Moos, Wolle, Federn und Gras weich gemacht. Die Jungen saugen lange und die Mutter trägt ihnen vier Monate lang lebendige Nahrung, Mäuse und Vögel zu, und lehrt sie so auf eine grausame Art ihren Raub fangen und tödten. Sie lassen sich zähmen, man muß ihnen aber zur Vorsicht die Zähne ausbrechen. Raken und unter den Hunden vorzüglich der

Spitz sind ihre Feinde. Von Vögeln weiß man keinen, der sie angiehe, als der Storch. Von Jägerbeobachtungen sind bekannt: 1) Ihr buschiger Schwanz trägt sehr viel dazu bey, daß sie nicht bloß von einem Busche, sondern auch von einem Baume zum andern springen können; und mit desto geringerer Mühe die Vogelnester und die schlafenden Vögel auszuspiiren. 2) Wenn man ein Nest findet, so trifft man gewöhnlich etliche lebendige Mäuse darinnen an, die den Jungen zum Spielen dienen und ihre Raubsucht üben sollen. 3) Wo sie in hohlen Bäumen sicher liegen, da lassen sie sich die Pflege der Mutter so lange gefallen, bis sie erwachsen, fast so groß wie die Alten sind. In hohlen Nesten der Feldobstbäume hat man sie mehrmalen so gefunden. 4) Den jungen Raken heißen sie sich im Genicke ein; das Thier läuft alsdenn wie wüthend mit ihnen fort, unterdessen suchen sie ihm die Halsflecken abzufressen, und es auf diese Art zu tödten. 5) Dem aufgezogenen Hasen folgen sie, wie die Hunde, auf der Spur nach, und wenn sie ihm nahe kommen, springen sie ihm auf den Rücken, beißen sich ein, und saugen ihm das Blut aus, bis er hinstürzt. Eben so schleichen sie sich in die Kaninchen-Baue, springen diesen Thieren auf den Rücken, diese rennen dann mit ihnen heraus und davon, bis sie hinstürzen müssen. 6) Die Eier der Hühner und anderer Vögel tragen sie nicht im Munde, sondern un-

Uebrigens hat er auch noch die
 Namen: Sabelschnäbler,
 Sabelschnabel, Avocette,
 Kreiner, weißschwarzer
 Krummschnabel, Schab-
 belschnabel, Avosetten,
 Avosetschnepfe, Verkehrt-
 schnabel, Stachelschnabel,
 Wassersäbel.

**Wasserschwäger — Cin-
 clus** — macht unter den Sing-
 vögeln eine besondere Gattung
 mit folgenden Kennzeichen
 aus: Der Schnabel ist spizig;
 hochkantig, an den Seiten ge-
 drückt und eingezogen. Die Na-
 senlöcher sind mit einer flachen
 Haut und mit Haaren fast ganz
 bedeckt, und rifenförmig. Der
 Kopf ist klein, spizig, oben schmäl-
 ler als unten; der Leib ist stark
 und die Augen sind hochliegend.
 Der Gestalt nach unter die Sing-
 vogel gehörig, der Nahrung und
 Lebensart nach aber sich den
 Sumpfvögeln und zwar den
 Strandläufern nähernd. Näh-
 ren sich von Wasserinsekten und
 nisten in Uferlöchern. Es giebt
 bey uns nur den gemeinen
 Wasserschwäger — *C. aqua-
 ticus*, Bechst. — auch Wasser-
 staar, Wasser- Bach- und
 Stromamsel, Wasserdroß-
 sel, Wassermerle, Bach-
 spreche und Wassersänger
 oder *Sturnus Cinclus*, Linn.
 genannt. Er ist schwärzlich mit
 weißer Brust und Vorderhals.
 Auch dieser Vogel variirt in
 der Jugend, so daß vor dem er-
 sten Mausern die Farbe des Ober-
 leibes aschblau und schwarz ge-
 schuppt, und des Unterleibes

weiß, rostgelb überlaufen und
 schwärzlich kantirt ist. 7 Zoll be-
 trägt die Länge. Er nimmt sei-
 nen Wohnort an Flüssen, doch
 lieber an kalten Bächen in ber-
 gigen Gegenden, wandert nicht.
 Seine Nahrung sind Wasser-
 insekten, auch, wie man sagt,
 Fischbrut. Man findet sein Nest
 in Uferlöchern, Mühlbetten u.
 mit 4 — 6 weißen Eiern.

**Wassertreter — Phalaro-
 pus** — macht unter den Sumpf-
 vögeln eine besondere Gattung
 mit folgenden Kennzeichen
 aus: Der Schnabel ist gerade,
 rundlich, an der Spitze etwas ge-
 bogen; die Nasenlöcher sind
 schmal und klein; der Körper und
 die Füße, wie bey den Strand-
 läufern; doch sind die Beine
 mit breiten, gewöhnlich gelapp-
 ten Häuten besetzt; daher diese
 Vogel nicht nur beständig mit
 ausgebreiteten Flügeln, statt zu
 fliegen, übers Wasser laufen, son-
 dern auch gut schwimmen, und
 so meist ihre Nahrung suchen.
 Wir haben bey uns nur den Ge-
 meinen Wassertreter — *Ph.
 vulgaris*, Bechst. — auch: Ro-
 thes Bastartwasserhuhn,
 Wasserdrössel, rothe Was-
 serdrössel, Eiskiebig,
 braunes Rohrhuhn, Nor-
 discher Strandläufer,
 Wasserhuhnähnlicher
 Strandläufer, und *Tringa
 hyperborea* oder *Fulicaria* bey
 Linné genannt. Dieser Vogel
 hat einen pfriemenförmigen zu-
 gespizten Schnabel, aschgrau
 Brust; dunkle Augenstreifen und
 rostfarbene Ränder der Schulter-
 federn

federn und 8 Zoll Länge. Er variiert in der Farbe; denn das Männchen hat an den Seiten des Halses einen rostrothen Flecken, der den Weibchen und Jungen fehlt. Sein Wohnort ist der Norden von Europa, Asien und Amerika, auch einzeln in Schlessien und Oesterreich — zieht einzeln weg. Er hat sein Nest am trockenen Ufer, mit 4 Eiern und seine Nahrung sind Insekten, die vorzüglich schwimmend aufgefischt werden.

W e c h s e l heißt ein Ort, wo ein Wild gewöhnlich zu Felde oder zu Holze zu ziehen pflegt. Denn Wechseln heißt beym Wildpret, von einem Orte zum andern ziehen.

W e h r h a f t i g m a c h e n ist die Ceremonie der Jäger; wenn sie nach geendigten Lehrjahren dem bisherigen Lehrlinge beym Frensprechen den Hirschfänger zum Seitengewehr überreichen und ihn dadurch zum Hirsch- und Holzgerechten Jägerburschen erklären.

W e i d e l o c h heißt beym Wildpret die äußere Oeffnung des Mastdarms; wo der Koth herausfällt.

W e i d e m a n n oder W e y d e m a n n, war sonst der allgemeine Name der Jäger, von ihrem Geschnitzte, dem Weidwerke oder Jagen abgeleitet.

W e i d e m a n n m a c h e n oder f e g e n, heißt bey abergläubischen Jägern; einem andern einen Poffen

spielen; damit er im Schießen nicht glücklich seyn soll.

W e i d e m a n n s H e i l war bey alten Jägern ihr gewöhnlicher Gruß und galt eben so viel als das Glück auf! bey den Bergleuten.

W e i d e m e s s e r ist ein großes Messer, das bey großen Jägen zum Zerlegen des Wildprets und zur Bestrafung derjenigen gebraucht wird, welche wider die Jagdgesetze gehandelt oder unweidmännisch gesprochen haben.

W e i d e n s ä n g e r oder W e i d e n z e i ß i g — *Sylvia rufa* Lath. und *Motacilla rufa*, Linn. — macht unter den Singvögeln in der Gattung Sängereine besondere Art aus und heißt auch noch kleiner Weidenzeißig; grüner König, kleinste Grasmücke, Weidenzeißlein, kleine gelbrothe und eigentliche Grasmücke; kleinstes Laubvögelchen, brauner Kitis, Goldhähnchen, Mitwaldlein, Tyrannchen und Läufer. Die Kennzeichen dieser Art sind: Der Oberleib ist rothgrau; über die Augen ein schmutzig gelber Streifen; die untern Deckfedern der Flügel strohgelb; der Unterleib einzeln mit rostgelben Flecken bespritzt; die Füße schwarzbraun. Nächst dem Goldhähnchen, oder gekrönten Sängereine ist dieß das kleinste deutsche Vögelchen. Es ist vier Zoll lang; sechs und drey

z

Wietz

Viertel Zoll breit; der Schwanz mißt ein und drey Viertel Zoll; der Schnabel fast vier Linien; und die Flügel reichen bis zur Mitte des Schwanzes. Der Schnabel ist schwarzbraun, inwendig gelb; der Augenfleck dunkelbraun; die Füße schwarzbraun; die geschilderten Schienbeine acht Linien hoch. Der Oberleib ist rothgrau, etwas olivengrün überlaufen; über die Augen geht ein schmutzig strohgelber Streifen; die Backen sind bräunlich; der Unterleib schmutzig weiß, einzeln mit rostgelben Flecken bespritzt; die Kniee grünlich grau; die Schwung- und Schwanzfedern schwarzgrau silbergrau eingefast; die Deckfedern der Unterflügel röthlichgelb. Das Weibchen ist fast gar nicht vom Männchen unterschieden; außer daß der Oberleib röthlichgrau und der Unterleib noch sparsamer gelb bespritzt ist. Dieses Vögelchen, welches mit dem vorhergehenden die größte Ähnlichkeit hat, und mehrentheils auch mit demselben für einerley gehalten wird, ist noch munterer und kecker, als jenes. Es ist auch zänkisch und neckt große Vögel. Es lockt Hoid, hoid, und singt abgebrochen Zip zapp, zip zap zap! Es kriegt eben so, wie jenes, und noch mehr durch alle Büsche und Winkel. Dieser Vogel bewohnt ganz Europa, und in Deutschland trifft man ihn in allen Laub- und vorzüglich in den Nadelholzern der Vornälder an. Im August begiebt er sich aus den Wäldern in die Gärten und Weidenbäume, und im October zieht er in die warmen Ge-

genden. In der Mitte des März ist er in unsern Hecken und Gärten wieder. Er frisst kleine Insecten und Insecteneyer; im Herbst auch Hollunderbeeren. Das Nest steht an der Erde unter Laub und Gebüsch, und ist wie ein Backofen zugebaut. Es enthält 4 bis 6 kleine weiße, am stumpfen Ende dicht, übrigens aber nur einzeln, purpurroth punktirte Eyer. Dieser Vogel macht gewöhnlich des Jahres zwey Gehecke. Seine Feinde und die Fangarten sind wie bey dem Fitis. Das Fleisch schmeckt gut; aber es ist schädlich, diesen Vogel zu tödten, da er im Walde und in den Gärten großen Nutzen durch Ablebung der Insecteneyer stiftet.

Weidewerk bedeutet alles, was sowohl zur hohen als niedern Jagd gehört und darunter verstanden wird.

Weidewerken ist soviel, als auf dem Reviere hirschen gehen, um Wildpret zu suchen, und zu schießen.

Weidewund heißt, wenn ein Thier, von welcher Gattung es sey, durch das kleine Geschweide oder den Wanst geschossen wird, so daß ihm das Gefäße, oder die Weide, davon ausgeht.

Weisprüche waren vormals gewisse Fragen und Antworten, mit welchen die Jäger einander bey ihren Zusammenkünften zu examiniren pflegten, besonders die fremden und reisenden

den Jäger; allein jetzt sind dergleichen Sprüche aus dem Gebrauche gekommen.

Weidtasche oder Jagdtasche ist der bekannte lederne Sack der Jäger mit glattem oder rauhen Deckel, und dient dem Jäger theils zu seinen Bedürfnissen, theils zum Tragen des erlegten kleinen Weidwerks.

Weißäugige Ente — *Anas Leucophthalmus*, Borkh. — heißt auch **Weißäugige rothköpfige Ente**, **Brandente**, **Braunkopf**, **Moorente** und **braunköpfige Ente**. Das Männchen hat einen geschopften und sehr zusammengebrückten Kopf, einen kastanienbraunen Hals und Brust, einen schwarzbraunen Rücken und Ring um den Hals; einen weißen Augenfleck am Kinn, so wie auch gelappte Hinterfüße; den Weibchen aber fehlt der schwarzbraune Halsring, und Kopf, Hals und Brust sind schmutzig rothfarben. Die Länge beträgt 16 Zoll. Das eigentliche Vaterland ist Rußland, auch die trocknen Seen und Teiche des nördlichen Deutschlands; im Herbst und Winter familienweis auf deutschen Teichen, Seen und Flüssen, am Rhein, in Hinterhessen und Franken. Die Nahrung besteht in Vegetabilien, Insekten, selten Fische. Man findet das Nest in einer Höhle an einer Anhöhe mit 6 bis 8 weißlichen Eiern. Herr Naumann sagt, es stehe auf Schilfkufen, kleinen Inseln und im Rohr mit

9 bis 10 Eiern, die denen der wilden Ente ähnlich sind. Hierher gehört wahrscheinlich, nach Herrn Borkhausens Bemerkung, auch Herrn Becksteins Brandente, die er für eine Varietät der Tafelente ausgegeben hat. Kopf, Nacken, und ein Ring um den Hals sind dunkelbraun; Brust kastanienbraun; Bauch weiß, einzeln braungefleckt; die obern Deckfedern der Flügel schwarz; die Schwungfedern schwarz, und der Schwanz dunkelbraun.

Weißbackente oder Weißköpfige Ente, auch **Ruderente**, **blauschnäblige Ente** genannt — *Anas Leucocephala* — hat einen großen und breiten Schnabel, über dem Nasentöcher aufgeschwollen und in der Mitte durch eine Hohlkehle getheilt; die Füße sind lang und außer dem Gleichgewichte; die Flügel ohne Spiegel, am Männchen der Schnabel blau; der Kopf und ein Theil des Halses weiß, auf dem Scheitel ein Fleck und die Mitte des Halses schwarz, am Weibchen der Schnabel und Kopf braun, und die Kehle weiß. (Größe zwischen der gemeinen wilden Ente und der Kriechente). Sie variiert dem Alter nach in der Farbe; denn die jungen Männchen sehen wie die Weibchen aus, und hat zum Wohnort die Sibirischen Seen; im Winter zieht sie zuweilen nach Deutschland, nach Krayn und Thüringen. Hierher gehört wahrscheinlich Herr Naumanns **Weißbackente** (S. 374. Taf. 92. Männchen.
K 2
91.

vi. Weibchen) an welcher, das im Herbst geschossen, die Farben nicht rein ausgezeichnet sind. Kehle, ein Theil des Halses und die Wangen sind schmutzig weiß; Scheitel, Nacken und Augengegend dunkelbraun; Brust und Bauch braungrau; der Schwanz mit starkfleckigen zugespitzten Federn, die etwas pfeilförmig ausgebreitet liegen. Das Weibchen ist schwächer gefärbt.

Weisses Waldhuhn —

T. alba, Linn — mit Weinen und roten die dicke und lange Halsfedern haben, und einem schwarzen voran die mittlern Federn und die übrigen dunkel mit weißen Spitzen sind. Es ist lang. Es variiert in der Farbe; denn die Sommerfärbung ist tief orangengelb mit dunkelbraunen Querstreifen und großen weißen Flecken; die Winterfarbe aber außer den dunkeln oben angegebenen Kennzeichen weiß. Es ist größer als das Schneehuhn, ihm, wie die Beschreibung weist, sehr ähnlich, und es ist noch nicht ganz entschieden, ob es eine wirklich verschiedene Art, oder nur ein altes Schneehuhn im Winterkleide sey. Eben so ungewiß ist, ob die in Pommern zuweilen im Winter sich versiegenden von dieser Art und wirklich verschieden sind.

Weißspecht — *Picus medius* — gehört mit dem Schwarzspecht in eine Ordnung und Gattung, wo er eine besondere Art ausmacht; Er führt auch

die Namen: Mittler Buntspecht, Mittelspecht, Mittler Rothspecht, kleinerer kleiner bunter- und gesprenkelter Specht, Elster- und Aegerst-Specht, kleiner schwarz und weißbunter und haariger Baumhacker, und kleines Baumhacker. Als Kennzeichen dieser Art gelten folgende: Er ist weiß und schwarz bunt, und der After rosenroth; der Schnabel dünn und zugespitzt; am Männchen der Oberkopf karmoisinroth. Sonst hielt Hr. Bechstein diesen Specht selbst für eine bloße Varietät des Buntspechts, wie mehrere Naturforscher, allein bey gehäuerter Beobachtung ist es eine wirkliche verschiedene Art. Er ist kleiner als der Buntspecht; die Länge acht und ein halben Zoll, wovon der Schnabel zehn Linien und der Schwanz vier Zoll einnimmt; die Breite dreizehn und ein halber Zoll, und die Flügel reichen bis auf die Mitte des Schwanzes. Der Schnabel ist weit dünner und weit spiziger zulaufend, als am Buntspechte, und dunkelbleifarben; der Augenstein ist braun mit weißgräuem Ringe; die Füße schmutzig bleifarben; die geschilderte Fußwurzel elf Linien hoch. Der Scheitel ist karmoisinroth; die Stirne schmutzig rostfarben; der Nacken schwarz; die Backen weiß, an den Seiten des Halses ein weißer Fleck, beides mit einem schwarzem Bande, das oben unter den Augen und unten am Schnabelwinkel anfängt und weit stark in die Brust herein geht, ein

ingefast; der Oberleib schwarz; der Unterleib bis zum After schmutzig grauweiß, die Schäfte der Federn an der Brust und an den Seiten schwarz; der After laß rosenroth; die weißen Schultern und hintern Deckfedern der Flügel bilden ein eprundes Schild, das einen schwarzen Fleck hat; die übrigen Deckfedern schwarz; die Schwungfedern schwärzlich, weißgestreift (wie beim großen Buntspecht), und die vordern haben weiße Spitzen, die Schwanzfedern sind schwarz, die beyden äußern von der Hälfte an nach der Spitze zu weiß, schwarz in die Quere gestreift, die dritte nur mit vier gelblichen Spitzen, die vierte und fünfte ganz schwarz. Das Weibchen ist gewöhnlich weniger roth auf dem Scheitel, denn es aber jung ist, hat es nur rothgesprenkelte Federn. Bemerkenswerth ist noch, daß die Jungen unter dem Schwanz kaum einen Anstrich von rosenroth haben. Bey dem ersten Mausern verliert sich am Weibchen die schwärzlich gesprenkelte Scheitelfarbe, und die rosenrothe Farbe am After erweitert und verschönert sich von Jahr zu Jahr. In seiner Lebensart kommt er mit dem Buntspechte fast gänzlich überein; außer daß er geschickter fliegt, da er weit leichter ist. Man trifft ihn in ganz Europa an. In Deutschland findet er sich auch, allein seltner als der Buntspecht. Es scheint, als wenn er sich mehr und lieber in Feldhölzern und Gärten, als in großen Laubwaldungen aufhielt. Im Herbst

und Winter trifft man ihn vorzüglich in Gärten an. Seine Nahrung besteht aus Insekten und ihren Larven und in Nüssen und Bucheckern. Er trägt sich dabei, wie der bunte Specht. Er nistet hoch in die Höhlen der Eichbäume, und legt seine drey bis vier glänzendweißen Eyer auf faules Holz. Sie sind weniger scheu, als die großen Buntspechte, und daher noch leichter zu schießen. Sonst wie bey diesem, mit welchen er auch die Feinde gemein hat. Ihr Fleisch hat einen guten Geschmack. Sie sind ganz unschädlich und nützen den Gärten durch ihren Fraß gar sehr.

Weißstirnige Ente —

Anas albicans — ist wahrscheinlich eine Bastartart mit einem Schnabel, wie die Wisamente; mit einer weißen Stirne, und einem braunrothen Kopfe und Halse. Sie ist so groß, als ein Haushahn.

Weißwangige Gans —

Anas leucopsis Bechst. — auch Bernakelgans, Schottische Gans, Rothfußgans, Nordgans, weißköpfige kleine Gans genannt, wohnt im Norden der Erde, kommt aber auf dem Zuge häufig nach Deutschland. Die Hauptfarbe ist aschgrau; der Hals schwarz; Stirn, Kehle und Wangen sind weiß, und über die Augen geht ein schwarzer Streif; der Schnabel und die Füße sind schwarz. Die Länge beträgt etwas über zwey Fuß.

Ben.

Wendehals — **Yunx** — macht in der Ordnung der spechtartigen Vögel eine eigene Gattung aus, mit einem ziemlich geraden, kegelförmig zugespitzten Schnabel, mit unbedeckten und ausgehöhlten Nasenlöchern, und mit einer wurmförmigen, langen Zunge, die mit einer scharfen Spitze versehen ist. Wir haben bey uns nur den gemeinen **Wendehals** — **Yunx Torquilla** — heißt auch schlechtweg **Wendehals**, **Drehhals**, **Drehvogel**, **Otterwindel**, **Ratterwendel**, **Windhals**, **Halsdreher**, **Halswinder**, **Treyhals**, **Ratterzwang**, **Grasspecht** und **Ratterhals**. Die Kennzeichen der Art sind: Er ist weiß, gelblich, aschgrau, schwarz und rostfarben gefleckt und gemischt. Dieser Vogel gleicht an Größe einer Feldlerche, ist sechs und einen halben Zoll, wovon der Schwanz drey und einen halben Zoll mißt. Der Schnabel ist gerade, spizig, drey Viertel Zoll lang, im Sommer bleifarben, im Herbst olivengrün, der Augenstern braungelb; die Füße sind kurz, stark, bleifarben, mit zwey Zehen vor- und zwey rückwärts. Der Kopf ist aschfarben, mit feinen schwarzen und rostfarbenen Flecken und einzelnen weißen Punkten; den Scheitel und halben Rücken theilet ein schwarzer mit Rostfarbe überlauer breiter Streifen der Länge nach; der übrige Oberleib ist schön grau, schwarz, weiß und rostfarbig gestrichelt und getüpfelt; an den hintern Augenwin-

keln läuft bis zur Hälfte des Halses herab ein kastanienbrauner Streifen; Backen, Kehle, Hals, Brust und After sind rothgelb mit feinen schwarzen Wellenlinien; der Bauch gelblichweiß mit einzelnen schwarzbraunen dreieckigen Punkten; die Deckfedern der Flügel und die hintersten Schwungfedern sind brann, grau und schwärzlich fein gestrichelt, und mit einzelnen weiß und schwarzen Flecken bestreut; die übrigen Schwungfedern sind schwarz, auf der äußern Fahne rostfarben und schwarz gewellt; der Schwanz hat zehn große und zwey kleine Nebenseiden, ist blaßgrau, schwarz gesprenkelt, und mit vier breiten schwarzen Querstreichen besetzt. Das Weibchen ist am Unterleibe blässer. Varietät: Der weiße **Wendehals**. Er ist überall weiß. Den Namen **Wendehals** hat er von der wunderbaren Art, den Hals zu verlängern, und den Kopf zu drehen, daß der Schnabel gegen die Mitte des Rückens zugekehrt ist. Dieß kann man besonders bemerken, wenn man ihn in der Hand hält, aus der er sich, durch dieß langsame Drehen und Wenden, in Freiheit zu setzen sucht. Er sitzt gewöhnlich aufgerichtet, macht häufig langsame Verbeugungen, wobei er den Schwanz wie einen Fächer ausbreitet, und die Kopffedern, wie beim Holzheher, in die Höhe richtet. Wenn sich ihm sein Weibchen nähert, oder wenn man ihn im Zimmer hält, so schiebt er den Kopf langsam vorwärts, hebt die Kopf-

federn

federn in die Höhe, verdreht die Augen, beugt sich, breitet den Schwanz weit aus, und kullert hohl in der Kehle. Ueberhaupt ist sein Betragen langsam und melancholisch, und wenn er noch nicht in Gefahr gewesen, wenig scheu. Seine Stimme, welche das Männchen im Frühjahr gar oft hören läßt, um sein Weibchen herbey zu locken, drückt sich in etlichen hurtig aufeinander folgenden, heisern, lauten Tönen: Gi, Gi, Gi, Gi! aus, welche er mit großer Anstrengung ausstößt. Er setzt sich, damit sie desto weiter erschallen, dazu auf einen dürrn freyen Ast eines hohen Baumes. Wenn ihn der Landmann zum erstenmale schreyen hört, so sagt er: der Specht ruft seinem Weibchen — es wird nun schönes Wetter. Er ist so wenig scheu, daß man ihn zuweilen mit der Hand in den Hefken fangen kann. Der Wendehals wird allenthalben nicht häufig angetroffen. Er gehört unter die Zugvögel, die uns im September verlassen, und zu Anfange des Mayes, oder auch zu Ende des Aprils, wieder ankommen. Europa- und Asien ist sein Vaterland. Im August sieht man ihn häufig in den Krautfeldern. Sonst ist er in Laubhölzern und in Gärten anzutreffen. Seine Hauptnahrung besteht in Insektenlarven und in Ameisen. Er holt sie mit seiner langen Zunge unter den Schuppen der Bäume, und unter dem Moose hervor. Die Ameisen ließt er theils von Bäumen, theils von dem Haufen ab, und steckt die Zunge

auch in denselben, um zu den Eiern zu gelangen. Die Jungen füttert er außer den grünen Raupen auch mit fliegenden Insekten. Im August kommt er in die Krautfelder und sucht die Raupen, Puppen und Insekten von den Krautarten ab. Er ist dann in Thüringen zuweilen so häufig anzutreffen, als der Hänfling, nur daß er nicht in Gesellschaft, sondern einzeln fliegt. Wenn es ihm an Insekten gebricht, so frist er auch Ameiseneier. Er pflanzt sich des Jahres nur einmal fort, daher auch in Verbindung mit seinen Feinden, die der Brut so leicht beyskommen können, ohngeachtet er kleine Gehecke macht, seine Vermehrung immer nicht sonderlich bemerklich wird, und wenn er auch fast gar keinen Nachstellungen ausgesetzt ist. Sein Nest findet man in Gärten und Wäldern in hohlen Bäumen. Es besteht aus einer bloßen Unterlage von klaren Moos, Grashalmen, Haaren und Wolle, und enthält acht bis neun glänzend weiße Eier, die in vierzehn Tagen ausgebrütet sind. Sie legen alle Jahre wieder in dieselbe Höhle, und wenn sie auch ihrer Jungen darin wären beraubt worden. Diese sehen vor dem ersten Mausern am Unterleibe schmutzig weiß aus, und die schöne rostbraune Farbe an den Flügeln ist nur röthlich. Baumarder, Wiesel, Haselmäuse und Ragen zerstöhren ihre Brut oft. Sperber und Baumfalken verfolgen die Alten. Sie sind im Herbst in den Krautfeld-

feldern sehr leicht zu schießen. Man fängt sie auch, manchmal einzeln im Herbst in Sprengeln, vor welchen Hollunderbeeren hängen. Das Fleisch ist wohlschmeckend und im August und September sehr fett. Sie vertilgen viele schädliche Insekten in Wäldern und Obstgärten.

Wenden ist beym Gange des Hirsches ein Zeichen, das ihn vom Thiere unterscheidet, s. Gewende.

Werfen heißt 1) die Fortpflanzung mancher Thiere, daher Verwerfen, wenn solches vor der Zeit geschieht. 2) Bey der Falknerey so viel, als den Vogel von der Hand fliegen lassen. 3) Bey Wölfen, wenn sie von den Hunden gepackt und nieder gewürgt werden.

Weyhen — Circi — machen in der Ordnung der Raubvögel, und zwar in der Gattung Falke, die vierte Familie aus, welche sich von den übrigen durch einen kleinen Schnabel, der einen seicht ausgeschweiften Zahn hat, und durch lange dünne Füße oder Fußwurzeln unterscheidet. Es gehören bey uns unter die Familie fünf Arten: 1) Kestweyhe — *Falco aeruginosus* — heißt auch Busfard, Sumpfbusfard, Moos-Hühner- und rostige Weyhe, Hühner-Brand-Enten-Rohr- und brauner Geyer, Rohr-Wasser-rostiger und braunrostiger Falke, brauner Fischgeyer und Fischaar mit grünlichgelber Wachshaut, gelben Füßen,

chokoladebrauner Hauptfarbe und rostgelben Scheitel, Kehle und Achsel. Er ist ein bekannter schlanker Raubvogel, der sich durch seine dunkle Farbe vor allen andern auszeichnet. Er ist ein und zwanzig Zoll lang, und drey und einen halben Fuß breit; der Schwanz hält etwas über sieben Zoll und der Schnabel ein und einen Viertel Zoll; die Flügel bedecken den Schwanz fast gänzlich. Der Schnabel ist etwas gerade, ohne merklichen Zahn, mit einem scharfen Haaken, schwarz und mit grünlichgelber Wachshaut; der Augenstern rothgelb; die langen dünnen Füße gelb; die geschilderte Fußwurzel drey Zoll hoch; die scharfen krummen Nägel glänzend schwarz. Der Scheitel ist schön röthlichgelb; fein braun gestrichelt; die Kehle röthlichgelb; der ganze Oberleib chokoladebraun mit rostfarbenen Flecken oder Gemölk auf manchen Stellen; auf jeder Schulter ein röthlichgelber Fleck, der aber vielmal fehlt; der Unterleib dunkelkastanienbraun, also heller als der Oberleib; die Schwungfedern dunkelbraun mit den äußern Ranten, wieder Rücken; der Schwanz wie der Rücken, die drey äußern Federn röthlich gefleckt. Das Weibchen ist nur etwas größer als das Männchen, ist ihm aber in der Farbe gleich, doch scheint die Farbe etwas heller zu seyn, besonders auf dem Kopfe; auch habe ich mehrere Male einige weiße gelbe Flecken auf den Flügeln bemerkt. Der röthlichgelbe Schulterfleck ist, wie ich schon

schon angegeben habe, kein Hauptkennzeichen an diesem Vogel, denn er fehlt an vielen Exemplaren, und es scheint mir, als wenn ihn bloß sehr alte Vögel hätten. Ja man trifft sogar Exemplare an, denen auf dem Kopfe der röthlichgelbe Scheitel und Kehle mangelt, obgleich dieß selten ist, und die am ganzen Leibe chokoladebraun aussehen. Es ist ein sehr geschickter, lustiger und scheuer Raubvogel. Man sieht ihn fast beständig auf der Erde sitzen. Sein Flug ist schön, sanft, schwimmend und fast immer in horizontaler Lage. Mehrere minder muthige und starke Raubvögel, als die Buffarde, Baum- und Thurms Falken, fliehen ihn, weil er gleich mit ihnen anbindet, und ihnen wenigstens ihren Raub abzufragen sucht. Ob man gleich mit Falken auf ihn jagt, so ist doch einer allein nicht im Stande, seinen Muth und seine Stärke auszuhalten, und es müssen mehrere auf ihn gelassen werden. Die Heymath dieses Raubvogels ist Europa und das südliche Rußland. Er hält sich in Vor- und Feldhölzern, in Gebüsch und Hecken, die nahe bey Seen, Teichen, Flüssen und Sümpfen liegen, auf. Wenn nicht der Winter gar zu heftig und der Schnee zu hoch ist, so bleibt er das ganze Jahr hindurch in Deutschland, und zieht nicht weg, sonst ist er ein Strichvogel. Im Winter sieht man ihn auf einzelnen Feldbäumen, Weg- und Grenzsteinen sitzen. Da ihm sein Aufenthalt am Wasser angewiesen

ist, so besteht auch sein Raub vorzüglich aus Wassergeflügel, als Enten, Wasserhühnern, Meerhühnern, Tauchern, Meyen u. s. w. er stößt auch wie der Fischeaar, auf Fische. Unter dem jungen Wasservögeln, besonders den Meer- und Wasserhühnern, richtet er, da er außerordentlich gefräßig ist, große Niederlagen an. Er stößt auch auf Kaninchen, junge Haasen, Rebhühner u. s. w., muß aber auch mit Fröschen, Schlangen und Mäusen oft vorlieb nehmen. Er besagt ein großes Revier. Der Horst steht in sumpfigen und wäßrigen Gegenden, nicht hoch über der Erde in einem Gebüsch, oder auch auf einem bloßen mit Gras bewachsenen Hügel. Er besteht aus Reifern, Schilf- und Riedgras, und ist inwendig mit Laub und Federn ausgelegt. Er enthält drey bis vier blaulichweiße Eyer, die in drey Wochen ausgebrütet werden. Zuweilen macht ein alter Vogel des Jahrs zwey Gehech. Die Jungen sind anfangs wollig und weißgelb, werden dann ganz rostbraun, und nach dem ersten Mausern werden sie dunkelrostbraun mit dunkelgelben Scheitel und dergleichen Flecken an Schultern und Brust. Der Fischeaar verfolgt diese Vögel, wenn sie sich einander auf einerley Wege, nämlich Fische zu fangen, begegnen. Man findet eine sehr große Laus auf ihm. Man muß sie mit der Flinte erschleichen, wenn man sie bekommen will, sonst muß man das Ohngefähr abwarten, wenn sie neben oder über einem weg-

wegstreichen. Man baizt sie mit Falken. Daß sie unter die mehr schädlichen als nützlichen Vögel gehören, ergibt sich aus der Nahrung. Man will sie auf die Kaninchen- Rebhühner- und Wachteljagd abrichten können. 2) Korn- oder Gallwenhe — *F. cyanus et Pygargus* — das Männchen heißt auch St. Martin, Bleyfalk, blaue, weiße und Getraide-Wenhe, blauer Habicht, Blauvogel, Kornvogel, Schwarzwächter, weiße Wenhe, weißer Falk, blauer Falke, Schwarzflügel, weißer Geyer, grauweißer Geyer, Hühnerdieb, Hühnerfalk, Hühnerwenhe, Hühnerhabicht, kleiner Spitzgeyer, blaues Geyerk, böhmischer Mäusehabicht, das Weibchen: Ringelfalk, Ringelgeyer, Ringschwanz, Falke mit einem Ringel um den Schwanz, weißschwänziger Falk, Lerchengeyer, aschfarbener Falk oder Bleyfalk mit weißen schwarzgewürfeltem Schwanz, Bleyfalk mit gewürfeltem Schwanz, Taubenfalk und kleiner Rohrgeyer, Milane, kleine Wenhe, Steingeyer, Weißkopf und Gelbschnabel. Die Kennzeichen der Art sind: Wachshaut und Füße sind gelb, erstere mit steifen Borsten fast bedeckt; der Kopf mit einem eulenartigen Schleier von steifern Federn umgeben;

der Steiß weiß; das Männchen am Oberleibe aschgrau, das Weibchen dunkelbraun mit rostfarbigen Federrändern, auch weißlichen Flecken. Da Männchen und Weibchen bey diesem Vogel eine so sehr abweichende Farbenzeichnung haben, so hat man sie sonst gewöhnlich als zwey verschiedene Vögel getrennt. Es sind schlanke Raubvögel. Das Weibchen ist einen Fuß und acht Zoll lang, wovon der Schwanz neun Zoll, und der Schnabel einen Zoll wegnimmt. Das Männchen ist fast um ein Dritttheil kleiner. Die Flügel legen sich einen Zoll unter der Schwanzspitze zusammen. Der Schnabel ist kurz, von der Wurzel an gleich stark überkrümmt, dunkelbraun, die Wachshaut gelb, oben mit steifen Borsten, die sich wie bey den Eulen über die rundlichen Nasenlöcher in die Höhe sträuben, und bis zu den Augen laufen, fast ganz bedeckt; der Augenstern rothgelb; die langen dünnen Füße gelb; die Nägel dunkelbraun; die geschilderte Fußwurzel zwey und ein halben Zoll hoch. Dieser Raubvogel unterscheidet sich schon von weiten von andern durch seine helle graue Farbe; wenn man ihn aber in der Nähe betrachtet, so hat er einen eulenähnlichen Kopf, (besonders das Weibchen), und die Farben des Männchens sind folgende: Der Kopf, Hals, Rücken, die Deckfedern der Flügel, die Kehle und der obere Theil der Brust sind dunkel aschgrau, doch fällt der Scheitel und Rücken allzeit ins

ins Braune, und bey sehr alten ist er ganz hellbraun. Der Hinterkopf, so wie der Schleher, ist weiß und hellbraun gefleckt; bey sehr alten grau. Die Augen liegen in einem weißen Kreise, welche Farbe sich über die Augen weg bis an die Kehle zieht, und an der Wurzel des Unterschnabels steht ein kleiner Bart von schwarzen steifen Vorsten. Der untere Theil der Brust, der Bauch, After, die Schenkelfedern sind weiß, bey den jüngern mit kleinen rostfarbenen oder röthlichen Flecken bestreut, bey alten nur der Bauch mit bräunlichen Querbändern, und bey sehr alten ist der ganze Unterleib weiß. Der Steiß ist allzeit weiß. Der Rand des vordern Flügelgelenkes und die untern Deckfedern der Flügel sind weiß; die sechs ersten Schwungfedern schwarz, die übrigen aschgrau, mit hellbraunen Spitzen und weißen Rändern; die drey äußersten Schwanzfedern weiß mit aschgrauen Querbändern, die vierte und fünfte aschgrau mit schwarzen Querbändern, und die zwey mittelsten aschgrau. Das Weibchen zeichnet sich gar sehr aus. Der Kopf erhält durch die steifen Barthaare, die den kurzen Schnabel bedecken, durch seine Farbe, und besonders den den deutlichen Schleher, das natürliche Ansehen eines kleinen Eulenkopfs. Der Kopf, Hals, Schleher, die Brust und der After sind gelblich mit häufigen dunkelbraunen Flecken, die auf dem Kopfe am dichtesten und auf dem After sehr einzeln stehen. Die

Schenkelfedern sind rostgelb mit langen, schmalen, dunkelbraunen, der Länge nach laufenden Strichen; die Deckfedern der Flügel dunkelbraun mit weißlichen Rändern und Flecken; die Rückenfedern dunkelbraun mit rostfarbenen Rändern; die sechs ersten Schwungfedern braun mit dunkelbraunen Querbändern, die übrigen dunkelbraun mit weißlichen Rändern. Auf der untersten Seite sind die sechs ersten Schwungfedern weiß mit schwarzen Querbändern, die übrigen braun mit dunkelbraunen Querbändern, die Spitzen aller rostgelb. Alles übrige verhält sich wie beym Männchen. Dieser Falke ändert bis ins vierte Jahr seine Farbe sehr merklich, und wenn man also Männchen findet, bey welchen das Aschgrau mehr ins Graue oder Braune fällt, oder Weibchen, die fast ganz braun, oder braun und weiß gefleckt sind, so haben sie noch nicht vier Jahre erlangt. Im ersten Jahre ist der männliche Vogel röthlichgrau gewässert, und hat am Unterleibe auf schmutzigweißen Grunde bräunlich verloschene Streifen. Er heißt in dieser Kleidung bey den Jägern Terssch. Im zweyten Jahre wird der Grund am Unterleibe lichter und die Streifen werden bräuner. Er heißt alsdann Martin. Im dritten Jahre bekommt er erst seine blaugraue Farbe, und am Unterleibe seine Querbänder, und ist der blaue Habicht. Nach der Zeit ist und bleibt Farbe und Größe ausgebildet und fast ganz

ganz unveränderlich; doch variiren auch die alten Männchen noch etwas in der Farbe. Einige sehen von weitem ganz weiß und bloß mit schwarzen Schwingen, wenn man sie aber in der Nähe besteht, so sind sie doch silbergrau, und am Bauche und Schwanz nur rein weiß. Andere sind am Oberleibe und unten bis zur Brust schmutzig hellblau, und die Schwanzspitze ist zwey Zoll breit schwärzlich aschgrau. Andere haben einen ganz weißen Schwanz. Bey noch andern sind nur die zwey mittlern Schwanzfedern röthlich überlaufen. Mit den Eulen hat die Kornweyhe nicht nur den Federkranz gemein, sondern auch die Gewohnheit des Abends bey Sonnenuntergang, ehe die Dämmerung eintritt, auf dem Felde über den Aeckern dicht herum zu fliegen, und ihrer Nahrung nachzugehen. Es ist ein schöner, munterer und dreuster Vogel, der geschickt raubt und geschickt fliegt. Wenn er Junge hat, so ist er so beherzt, daß er oft über den Vorübergehenden, wie ein Kiebitz herumschwebt und unaufhörlich, besonders das Weibchen, wie ein Grünspecht Gägärgärgä! schreyt. Man sieht ihn beständig nahe an der Erde hinschweben, selten steigt er in die Höhe, nur da, wo Bäume sind, oder wenn er sich in der Gegend seines Nestes umsieht. Man trifft diesen Vogel in Europa, in dem südlichen Rußland, in Amerika und auch in Afrika an. Er ist einer der gewöhnlichsten Raubvögel in

ebenen Gegenden, geht nicht in die tiefen Wälder, bloß in die Feld- und Vorhölder. Am liebsten wohnt er da, wo Seeen, Sümpfe und Teiche in der Nähe sind. Wenn wir in Deutschland gelinde Winter haben, so ist er das ganze Jahr hindurch zu sehen, wenn aber der Schnee zu hoch wird, so muß er aus Mangel an Nahrung süßlichere Gegenden besuchen. Seine Nahrung machen Frösche, Maulwürfe, Feldmäuse, Eidechsen, junge Wasser- und Meerhühner, Heerschnepfen und Strandläufer aus, doch fängt er auch Rebhühner, Wacheln, Lerchen und Tauben, und nimmt die Vögel aus der Schneuß. In der Lust kann er nichts schlagen, und ergreift daher alles sitzend auf dem Erdboden. Die Rebhühner haben große Furcht vor ihm; denn er jagt sie, bis sie müde sind, und von ihm von der Erde aufgehoben werden können. Man sagt auch, daß er Fische fange, die auf der Oberfläche der Teiche schwimmen. Wo es Sümpfe giebt, fliegt er im Herbst und im Frühjahr, wenn die Beccassinen streichen, immer drüber hin; diese drücken sich nieder, so wie sie ihn gewahr werden, und werden ihn dadurch allezeit zur Beute. Dieser Vogel baut nie auf einen Baum, sondern allezeit auf die Erde in die Winterfrucht (daher der Name Kornvogel bey den Jägern), in sumpfigen Gegenden ins große Niedgras, auf niedrige Weidenbüsche, ins Rohr an den Ufern der Teiche, Seen und

und Flüße, in Feld- und Wödhölzern auf entblößte Plätze, oder in junge Schläge und in alte unbenutzte Steinbrüche. Auf großen sumpfigen Nieden trifft man die Nester in Thüringen in Menge an, und ein Paar baut mehrere derselben, ehe das Weibchen seine Eyer in eins legt. Das Nest, worin die Eyer liegen, ist groß, und hat nach nach der Gegend bald eine Unterlage von Reifern, oder von Stroh und Mist, alten Kartoffelstengeln, und ist inwendig mit Borsten oder weichen Rohrhalmen, oder auch mit Federn ausgelegt. Das Weibchen brütet in drey Wochen fünf bis sechs Eyer aus, die mehr oder weniger bläulichweiß, ohne merkliche Flecken, oder mit sehr blassen bald größern, bald kleinern, hellern oder dunklern schmutziggelben Flecken bezeichnet sind. Die ausgekrochenen Jungen sehen weißwollig aus, und haben schwarze Augenlieder und Schnabel; sie pfeifen, wie die jungen Hühner, welches zur Fortpflanzungszeit die Alten auch thun. Mit den Kollkraben und Rabenkrähen leben sie immer im Streite. Man sucht sich an sie zu schleichen, um sie mit Schießgewehr zu erlegen, und schießt sie in der Nähe des Nestes im Fluge, wenn sie einem über den Kopfe herum fliegt. Sie hat auch die Sonderbarkeit an sich, daß sie des Morgens und Abends wenigstens etliche Tage hinter einander eben denselben Flug macht, da man sich dann anstellen und sie erlegen kann.

Wenn man eine Fellerfalle mit einem ausgestopften Kaninchen oder jungen Hasenfelle beködert, und diese auf ihren gewöhnlichen Weg stellt, so fängt sie sich ebenfalls, die Falle muß aber entweder mit Gras oder auf den Aeckern mit Sand belegt seyn. Mit einer Taube fängt man sie im Stoß. Wie sich aus der Nahrung ergibt, so gehören diese Vögel unter die mehr nützlichen als schädlichen. Man muß daher ihrer allzugroßen Vermehrung nur steuern. Herr Bechstein hat auch einmal bey einem Falkonier ein Weibchen von diesem Vogel zur Baizge auf Rebhühner abrichten sehen. 3) Rohrweyhe — *F. arundinaceus*, Bechst. — Wachshaut und Füße gelb; der Leib kastanienbraun; der Scheitel weiß, Weibchen 2 Fuß lang. Er hat seinen Wohnort in Schlesien, Franken, Thüringen, und Nahrung und Nahmen mit dem vorhergehenden gemein. Die Jäger nennen ihn Weisköpf. Dieser Vogel hat im Außern viel Aehnlichkeit mit der Rostweyhe, ist aber größer und stärker. Die Jäger wollen ihn nicht mit jenem für einerley gelten lassen, und sagen, er sey weit träger. Die Länge ist 2 Fuß, wovon der zugerundete Schwanz 10 Zoll wegnimmt; das Gewicht ein Pfund 26 Loth. Der Schnabel mißt 1 Zoll 8 Linien, hat einen leichten Zahn und eine scharfe krumme Spitze, ist schwarz mit gelber Wachshaut; die gelben Füße sind hoch und schlank, die Fußwurzel so wie die Mittelzehe

2½ Zoll lang; die schwarzen Nägel sehr gekrümmt und scharf. Das ganze Gefieder ist prächtig kastanienbraun, an den Schwung- und Schwanzfedern nach der Wurzel zu ins lichte übergehend; der Unterschwanz erscheint weißlich und dunkelbraun gebändert; der Scheitel und zuweilen auch die Kehle sind schön weiß. 4) Brandweyhe — *F. rufus*, Linn.: Mit einem deutlichen Schleyer (wie die Eulen) um den Kopf, rostbrauner Hauptfarbe, weißen Unterdeckfedern der Flügel und aschgrauem Schwanz. Weibchen 20 Zoll lang. Hr. G. Becker beschreibt eine Varietät, die ihm hierher zu gehören scheint. Die Wangen sind rein weiß; der Schleyer schwarz (welches dem Vogel ein prächtiges Ansehen giebt); Kehle, Brust und der ganze Unterleib schön rostfarben ohne alle Neben- und Zwischenzeichnung; der Oberleib dunkelbraun mit einzelnen rostfarbigen Querstreifen auf den Federn; der Schwanz nur schwach grau, und zwar auf der Innenseite, die Aussenfläche ist rostfarben und gegen das Ende häubbreit schwarz eingefaßt. Herr Becker sagt, er habe die Vergleichung mit den Jungen und Weibchen der Kornweyhe genau angestellt, und er gehöre zu diesen nicht. Dieß ist fast wörtlich die Beschreibung von der Abbildung des Falken im Wirsingischen Vogelwerk. Taf. 68, und Herr Beckstein hält diesen hier abgebildeten Vogel für ein Weibchen der Kornweyhe. Seinen Wohnort, seine Nahrung

und Fortpflanzung hat er mit der Krostweyhe gemein, und hat auch die Namen: Brandfalk, Brandgeyer, Fischgeyer und Grauschwanz. 5) Braune Weyhe — *F. fuscus* — heißt auch Bräuner Falk, braunfahler Geyer. Mit ungezähntem Schnabel, stärkeren Beinen, kurzen Zehen, kastanienbrauner Hauptfarbe und zugrundetem Schwanz; macht den Uebergang von den Weyhen zu den Habichten. Herr G. Becker bemerkt bey diesem Vogel, daß er ihn sonst für eine Varietät des Mäuse-Bussards gehalten habe; allein die regelmäßigen herzförmigen Flecken auf der Brust seyen zu auszeichnend; und der ganze Vogel überhaupt schlanker. Er ist 22 Zoll lang. Er sucht sich zu seinem Wohnorte Wälder — im Winter an Gewässern; und seine Nahrung sind alle Arten kleinster Vögel.

Wichel, Wichtelpfeife, ist ein Lockpfeifen, womit der Ruf der Eule nachgemacht wird, und das aus zwey viereckigen, etwa eines halben kleinen Fingers breiten, auf einander gepropften Hölzchen, mit einer feinen birkenen oder kirschbäumen dazwischen hineingesteckten Rinde bestehet. Man braucht es bey den Feld- und Marktäumen zum Fange von allerley Vögeln. s. Feldbaum.

Widersinniges Gehörn; Widersinnsgehörn, ist ein Hirschgeweih, das neben den großen

fen Stangen einige kleinere oder einige Enden, die man Widerstehenden nennet, hat.

Wiedehopf — *Upupa* — macht unter den spechtartigen Vögeln eine besondere Gattung mit folgenden Kennzeichen aus: der Schnabel ist schwächig, lang, schwach bogenförmig, etwas zusammengebrückt und an der Spitze stumpf; die Nasenlöcher sind sehr klein und die Zunge ist stumpf, drekantig, ganz und sehr kurz. Bey uns kommt nur der gemeine Wiedehopf — *Up. Epops* — vor, welcher auch schlechtweg Wiedehopf, Widhopf, Wiedhoff, Europäischer Wiedehopf, Wiedehoppe, Kuckucksküster, Kuckuckslaquai, Rothhahn, Dreckhahn, Dreckträger, Stinkhahn, Baumschneypfe, Heervogel und Gänsehirt genannt wird. Die Kennzeichen der Art sind: Der Kopf ist mit einer fächerförmigen Haube geziert, die schwarz und orange gelb ist. Er ist ohngefähr einen Fuß lang und ein und einen halben Fuß breit; der Schnabel mißt ein und drey Viertel Zoll und der Schwanz vier Zoll; die Flügel legen sich etwas über der Hälfte des Schwanzes zusammen. Das Gewicht nur drey Unzen. Der Schnabel ist dünn, gekrümmt, etwas klaffend, schwärzlichblau, an der Wurzel blaß fleischfarben; die Zunge dreieckig, nicht größer als eine halbe Linse und tief im Munde sitzend; der Augenstern rußbraun; die Füße

wie der Schnabel gefärbt; die geschilderte Fußwurzel fast einen Zoll hoch. Der Federbusch ist drey Zoll hoch, und besteht aus zwey Reihen Federn, die von der Stirn bis zum Hinterkopf in zunehmender Größe stehen, und wie ein Fächer vor- und rückwärts bewegt werden können; er ist blasorangengelb (isabelfarben) mit schwarzen Spitzen. Der Kopf, Nacken, Hals, die Brust und die Deckfedern der Unterflügel sind fleischfarbenbraun; der Ober Rücken und die kleinsten Deckfedern der Flügel rothgrau; der Unterrücken schwarz und gelblichweiß bandirt; die obern Deckfedern des Schwanzes oben weiß und unten schwarz; der Bauch und die Afterfedern weiß; die Seitenfedern weiß mit schwärzgrauen einzelnen Streifen. Unter den Schwungfedern ist die vierte die längste und die erste sehr klein, daher die geöffneten Flügel sich ausrunden; die erste Ordnung ist schwarz, jede Feder mit einem weißen Bande; die zweyte Ordnung schwärzlich und hat fünf weiße Bänder, und die beyden letzten Schwungfedern sind schwarz und weiß und gelb gezeichnet; Die Deckfedern der ersten Ordnung sind schwarz, und die der zweyten schwarz und weißgelb bandirt; die weißen und gelblichen Bänder des Rückens und der Flügel laufen wellenförmig in einem fort; der Schwanz hat zehn Federn, ist gerade, und schwarz, in der Mitte mit einem weißen aufwärts stumpfwinklich gebogenen breiten Querbande. Das Weibchen ist etwas blässer, an der Brust weißlich mit einz-

einigen schwärzlichen Streifen. Der Wiebehopf ist ein scheuer, munterer und lustiger Vogel. Er läuft sehr hurtig, läßt dabei die Flügel fast auf die Erde sinken, macht häufige Verbeugungen, wo er jederzeit mit seinem Schnabel den Boden berührt, und wenn er im Affekt ist, so schlägt er den Federbusch auf- und nieder. Sein Flug ist sanft, ohne alles Geräusch, und wegen seiner runden, der Elster ähnlichen, Flügel muß er auch, wie diese, dieselben oft und schnell bewegen. Sein Geschrey ist im Herbst und Frühjahr Huphuphup, jo jo, to, to! das er auch, wenn ihn im Zimmer hält, und in Affekt bringt, mit stäten Verbeugungen hören läßt. Wenn man ihn zähmen will, so verlangt er anfangs Regenwürmer, alsdann nimmt er mit Brod und gekochtem Fleisch vorlieb. Er wohnt in Europa, Asien und Afrika, ist aber allenthalben kein gemeiner Vogel. Als Zugvogel kommt er spät im April oder zu Anfang des May mit oder kurz vor dem Kuckuck an, und heißt deshalb in manchen Gegenden Kuckucks-Laquay. Er lebt des Sommers in Wäldern, die an Viehtriften und Wiesen gränzen, auch in waldigen Gegenden um die Dörfer herum in den Weidenbäumen. Im August, wenn die Wiesen gemäht sind, zieht er einzeln oder in Gesellschaft von vier bis achten auf die Ebenen, und verläßt uns, alsdann unvermerkt. Er hält sich mehr auf der Erde als auf den Bäumen auf. Seine Nahrung besteht vorzüglich in

Käfern, die er unter dem Mist der zahmen und wilden Thiere unter dem abgefallenen Laube und Aas aussucht. Es sind daher gewöhnliche Aas- und Mistkäfer und ihre Larven. Sie wenden daher mit ihrem Schnabel alle jene Dinge um. Auch die Ameisen und Eyer verfolgt er. Wenn er ein Insekt verschlucken will, so löst er ihn erst die harten Flügelscheiden ab, wirft es wegen der unbeweglichen Zunge in die Höhe und fängt es mit dem Schnabel. Es muß aber allezeit der Länge nach in den Schlund fallen, sonst muß er den Wurf so lange wiederholen. Er badet sich im feuchten Sande. Er baut in hohle Bäume, am liebsten auf alte, faule, geköpfte Baumstünke, selten in Mauern- und Felsenrisen oder auf die bloße Erde. Das Nest hat wenig Unterlage von Genist und Federn; wenn es aber offen steht, eine Ueberdecke von Kuhmist und zarten Wurzeln. Das Weibchen legt des Jahres einmal zwey bis vier längliche aschgraue Eyer; und brütet sie in 14 Tagen allein aus. Die Jungen sehen bis zum ersten Mausern, welches in wärmeren Ländern geschieht, blässer als die Alten aus; haben ein weißliches Kinn, weißgelbe Schnabeldecken, die weißen Bänder der Deckfedern sine röthlichweiß, und die schwarzen schwarzbraun, haben aber den Federbusch und gleichen übrigens den Alten. An den Jungen die man aufzieht, bemerkt man vorzüglich das frostige Wesen, das sie antreibt, sich immer unter oder auf den Ofen zu setzen, so

so daß ihnen gewöhnlich der Schnabel vertrocknet, und sie dann elendiglich sterben müssen. Die Eltisse, Marder und Wiesel zersthören ihre Brut und viele Raubvögel verfolgen die Alten, daher sie auch, sobald sie einen erblicken, eine ganz eigene Stellung machen, die Flügel ausbreiten und den Kopf auf dem Rücken mit dem Schnabel in die Höhe stellen, so daß sie einen hingeworfenen bunten Lappen ähnlich sehen, und so oft unentdeckt bleiben. Sie sind außerordentlich furchtsam, und verlassen diese Stellung nicht eher, als bis der Raubvogel außer ihrem Gesichtskreise ist. Zum Schusse muß man sie wegen ihrer Scheuheit hintererschleichen, wenn man sie nicht von ohngefähr aufstöbert. Am leichtesten fängt man sie, wenn man auf Maulwurfs- haufen eine Leimruthe, an welche ein Mehlwurm gebunden ist, so locker steckt, daß die Leimruthe über sie herfällt, wenn sie den Mehlwurm loszupfen wollen. Alte und Junge riechen nicht angenehm, ohngefähr so, wie ein Ameisenhaufen, und sie werden daher bey uns nicht gegessen, wohl aber in Italien, wo man ihnen die Köpfe abreißt, daß sie ausbluten. Zur Heckezeit riechen sie am stärksten. Wegen ihrer Nahrungsmittel sind sie äußerst nützliche Vögel.

Wiederfährte ist unter Fährte erklärt.

Wiedergang, oder Kirchgang thut der Haase oder der Hirsch wenn er auf seiner Fährte wieder zurück gehet.

Wiederstrich, Wiederzug, heißt, wenn die Zugvögel im Frühjahr aus wärmern Gegenden zu uns zurückkehren. Die Zeit dazu ist bey der Beschreibung jedes Vogels angezeigt.

Wiesel — *Mustela* — macht in der Ordnung der Raubthiere eine besondere Gattung aus, wozu bey uns auch der Stein- und Baummarder, nebst dem Eltis und die beyden folgenden Wieselarten gehören, als: 1) Das große Wiesel — *Mustela Erminea* — Es heißt auch: rothes, braunes, graues Feld- und Waldwiesel, Wiesel mit schwarzer Schwanzspitze; in der weißen Winterfarbe; Hermelin. Die Kennzeichen der Art sind: Die Farbe ist braunroth, in kalten Gegenden im Winter weiß, die Schwanzspitze aber allezeit schwarz. Die Länge des Körpers ist etwas über ein Fuß, und der Schwanz hat fünf Zoll. Der Bau ist schlank und geschmeidig; Schade, daß der Kopf zu dick und der Hals zu lang ist, sonst würde es eine der niedrigsten Thierformen haben; die Schnauze läuft kurz vor dem Munde spitzig zu; die Nase ist stumpf und gefurcht; der Mund öffnet sich weit und ist mit einem abwärts stehenden Knebelbarte besetzt; das Gebiß sehr scharf; die Zunge glatt und gefurcht; die Augen klein, schwarz, funkelnd, weit vorn im Gesicht stehend, und mit langen Hartborsten versehen; die fast glatten

D

Dhr.

Ohrlappen kurz, breit, abgerundet und fest am Kopfe angelegt; der Hals kaum dünner als der Leib, vorn etwas in die Höhe gehoben; der Leib cylindrisch, an den Hinterschenkeln etwas erhabener; der Schwanz buschig und abgestumpft, in Ruhe gehend gerade ausgestreckt, in der Flucht aber auswärts gewölbt; die Beine kurz, scharfklaugig; der Daumen an den Hinterschenkeln kurz und versteckt; am After zwey niedrig nach Wisam riechende Drüsen. Die Farbe im Winter dunkel gelbbraun; im Sommer gelbroth oder schmutzig rothgelb; die Oberanten und Hinterschläfe weiß (aber nicht immer); die Schnauze schwärzlich; der Bart gelb, weiß und schwarz; die Kopffarbe immer dunkler, als die Rückenfarbe; das Kinn und die Vorderzehen allezeit weiß; der übrige Unterleib weiß oder weißgelb; fast die ganze letzte Hälfte des Schwanzes schwarz. Im Norden ändert sich die Rückenfarbe in weiß; bey uns in Deutschland nicht immer; und die weißen Wiesel oder Hermeline bey uns, sind gewöhnlich Varietäten, wie die bey andern Thieren, und behalten diese Farbe Sommer und Winter. Auch wenn sich alsdann weiße und rothe Wiesel zusammen paaren, so giebt es geschächte. Man hat auch eine aschgraue Varietät entdeckt. Ueberhaupt ist auch die braune oder rothe Farbe verschieden, so daß man rothbraune, graubraune, rothgelbe und braunrothe große Wiesel antrifft. Das

Weibchen scheint einen etwas schlankern Körperbau, einen dünnern spitzigern Kopf zu haben, und auf jeder Seite des Bauches stehen fünf Säugwarzen. Es ist ein außerordentlich munteres, flüchtiges, gewandtes, aber auch ein grausames und für seine Größe sehr starkes Thier. Wie Eichhörnner, so geschwind kann es Bäume ersteigen, ungemein hurtig springen, und mit der größten Fertigkeit über Bäche und Flüsse schwimmen. Durch alle Ritzen, wodurch der Kopf geht, schlüpfen sie. Ihre Stimme ist fast ein Quäkeln wie das der Epishause. Sie machen immer Männchen, wie die Hasen, um sich umzusehen. Ihr Vaterland ist der Norden von Europa, Asien und Amerika, wo sie in großer Menge leben. In Europa sind sie fast allgemein bekannt. Man trifft sie im Felde und Walde an. Im Felde wohnen sie gern an Ufern der Flüsse, in Hecken, Steinhäusen, in Maulwurfs-Häusern und Mäusehöhlen und in hohlen Obst-Weiden- und andern Bäumen. Eine Wohnung unter der Erde hat wenigstens vier Eingänge, und so richten sie sich auch die vorgesundenen ein. Im Walde wohnen sie ebenfalls in Erdhöhlen, Stein- und Felsenklüften und in hohlen Bäumen. Im Winter gehen sie auch in die Wohnungen der Menschen, vorzüglich in die einzeln im Felde liegenden, und halten sich in Scheunen, Ställen und Kellern auf. Sie werfen auch zuweilen in Hühner und andern Ställe.

Ställen, auch in Kellern Hausen auf, (wo sie dann Haus- u. g. heißen); dann gehen sie aber gewöhnlich nach Hühnern, Eiern u. d. gl. Ihre Hauptnahrung machen Hamster, Mäuse, Wasserratten und andere große und kleine Feldmäuse aus. Ausserdem suchen sie die jungen und alten kleinen Vögel zu erschleichen, und nehmen den großen die Eier aus. Sie überfallen vorzüglich im Schlafe auch junge und alte Hasen und Kaninchen, ja sogar junge Rehe. Am Ufer des Wassers rauben sie Fische. Von Vegetabilien fressen sie bloß einige Pflanzarten. Gewöhnlich gehen sie des Nachts, nur selten am Tage, nach ihrem Raube. Wenn nicht die Seltenheit des Thiers die Ursache ist, so sieht man sie immer paarweise beisammen, und es scheint daher, wie wenn sie gegen die Gewohnheit der Raubthiere in Monogamie lebten. Das Laufen oder Kriechen geschieht im März. Die Mutter bringt nach fünf Wochen drey bis acht Jungen zur Welt. Das Nest, das in einer Erdhöhle, unter, oder in einem hohlen Baume angelegt wird, ist mit Moos, Wolle, Federn und Gras weich gemacht. Die Jungen saugen lange und die Mutter trägt ihnen vier Monate lang lebendige Nahrung, Mäuse und Vögel zu, und lehrt sie so auf eine grausame Art ihren Raub fangen und tödten. Sie lassen sich zähmen, man muß ihnen aber zur Vorsicht die Zähne ausbrechen. Rassen und unter den Hundten vorzüglich der

Spitz sind ihre Feinde. Von Vögeln weiß man keinen, der sie angienge, als der Storch. Von Jägerbeobachtungen sind bekannt: 1) Ihr buschiger Schwanz trägt sehr viel dazu bey, daß sie nicht bloß von einem Busche, sondern auch von einem Baume zum andern springen können; und mit desto geringerer Mühe die Vogelnester und die schlafenden Vögel auszuspiiren. 2) Wenn man ein Nest findet, so trifft man gewöhnlich etliche lebendige Mäuse darinnen an, die den Jungen zum Spielen dienen und ihre Raubsucht üben sollen. 3) Wo sie in hohlen Bäumen sicher liegen, da lassen sie sich die Pflege der Mutter so lange gefallen, bis sie erwachsen, fast so groß wie die Alten sind. In hohlen Nesten der Feldobstbäume hat man sie mehrmalen so gefunden. 4) Den jungen Rehen beißen sie sich im Genicke ein; das Thier läuft alsdenn wie wüthend mit ihnen fort, unterdessen suchen sie ihm die Halsflecken abzufressen, und es auf diese Art zu tödten. 5) Dem aufgesagten Hasen folgen sie, wie die Hunde, auf der Spur nach, und wenn sie ihm nahe kommen, springen sie ihm auf den Rücken, beißen sich ein, und saugen ihm das Blut aus, bis er hinstürzt. Eben so schleichen sie sich in die Kaninchen-Baue, springen diesen Thieren auf den Rücken, diese rennen dann mit ihnen heraus und davon, bis sie hinstürzen müssen. 6) Die Eier der Hühner und anderer Vögel tragen sie nicht im Munde, sondern un-

ter dem Rinne weg, und können dabei sehr geschwind flitzen und laufen. Die *Fährte* ist, die Größe abgerechnet, wie beim *Harber*, gewöhnlich zwei und zwei Spuren neben einander, doch auch zuweilen im Dreieck, wie beim *Hafen*. Die Hunde spüren ihren Aufenthalt wegen der stinkenden Exkremente leicht aus. Man hegt sie ihnen dann an; allein alle gehen sie nicht an, wegen ihres scharfen Gebisses, mit dem sie ihnen nach den Gesichte fahren und sie schwer verwunden. Vor ihren Aufenthalt legt man ihnen Fallen und Schlingen, die man gut abwittern, oder mit in Honig getauchtem Weiskobst, oder mit einem *Ey* ankören muß. Wenn man ihren Aufenthalt weiß, so darf man nur vor der Höhle wie eine Maus pfeifen, so kommen sie gleich heraus und man kann sie todt-schießen. Will man in Häusern ihre Vertilgung bloß des Schadens halber, den sie thun; so darf man nur ein *Ey* mit Quecksilbersublimat füllen, und an den Ort legen, wo man sie gespürt hat, so werden sie bald verschwinden. In Gärten, wo sie in Maulwurfsbäuen wohnen, gießt man sie mit Wasser aus, hegt, wenn sie herauskommen, Hunde an, oder fängt sie in kleinen Gärtnchen. Im Freyen sollte man sie, wo man Schaden von Feldmäusen zu befürchten hat, nicht tödten, weil sie mehrentheils von diesen Thieren leben. Dem Bären sollen sie sogar in die Ohren kriechen, denselben da-

durch todt machen, daß er nicht eher zu laufen aufhört, als bis er einsürgt und stirbt. Der rotzbraune *Polg* wird kaum zu Unterfütter benutzt; der weiß (oder das *Hermelinsfell*), der aus Norden kommt, ist ein sehr kostbares Pelzwerk. Die Holländer und Engländer treiben einen sehr starken Handel damit. Die Hermelinschwänze gaben sonst die kostbarsten Pelze und Aufschüde. Die weiße Felle, die man von unsern Wiesel bekommen, braucht der Landmann bloß zu Vertreibung des Schmutzes an den Cutern der Kühe. 2) Das kleine Wiesel — *Must. vulgaris* — hat auch die Namen: *Gemeines Wiesel*, *Heermännchen*, *Haus- und Speichermiesel*, *lichtbraunes*, *röthliches Wiesel*; im Norden, wo es weiß wird, *Schneewiesel*, *kleines weißes Wiesel*, *Härmlin*, *Hermelinschen*. Die Kennzeichen der Art sind: Der Schwanz ist mit dem gelbröthlich-braunen Oberleibe einfarbig und ohne Haarbüschel. Es ist oft mit dem vorhergehenden verwechselt worden; es unterscheidet sich aber in Ansehung der Größe, der Form und Kürze des Schwanzes gar merklich. Der Leib ist etwas über sechs Zoll lang; der Schwanz anderthalb Zoll, und die Höhe fast anderthalb Zoll. Der Kopf ist breit gedrückt; und mit dem Halse und Leibe fast einerley Dicke; der Mund enthält das scharfe Gebiß der vorhergehenden Art; die Ohren sind kurz, breite abge-

abgerundet, stehen tief, in der Mitte des Kopfes und weit entfernt von den kleinen schließenden schwarzbraunen glänzenden Augen; der Hals ist lang und Dick, mehr in die Höhe gestellt, als bey dem großen Wiesel; der Leib gerade auslaufend; der Schwanz kurz, zunehmend spitzig ohne merklichen Haarbüschel, die Beine sehr kurz, dünn; die Füße zart und mit scharfen weißen Nägeln bewaffnet; unter dem After zwey Drüsen mit einer sehr stark bisamartig riechenden Feuchtigkeit. Der Oberleib ist gelbrothbraun, manchmal etwas dunkler, also ins graue sich ziehend, manchmal heller; im Sommer schmutzig fuchsth, zuweilen rothgelb; vom Rande des Oberkiefers an ist die Farbe schneeweiß; hinter jedem Mundwinkel ein weißer kleiner Fleck von der Rückenfarbe; dergleichen Punkte befinden sich auch oft am Bauche; die Barthaare und Brusthaare vor und über den Augen sind weiß und rothbraun. Das Weibchen unterscheidet sich blos durch die acht Säugwarzen vom Männchen. Im Norden wird es im Winter schneeweiß, daher der Name Schneewiesel. In Deutschland aber hat man noch keine Farbenveränderung nach den Jahreszeiten bemerkt; und wenn es weiß gesehen wird, so ist es eine Varietät, die Sommer und Winter so bleibt. In seinem Naturell ist es dem vorigen gleich, nur daß es noch munterer und flinker ist; es läuft außerordentlich schnell und bewegt dabey den Kopf unaufhör-

lich nach allen Seiten. Es klettert so gut, als ein Eichhorn, schwimmt vortrefflich, und durchkriecht und durchsucht alles, alle Winkel und Löcher, die ihm aufstoßen. Ob es gleich kleiner ist als jenes, so ist es doch eben so beherzt, fast noch beherzter und grausamer. In der Angst läßt es einen heisern quiekenden Ton von sich hören. Es bewohnt die meisten Theile von Europa, in Asien geht es bis nach Kamtschatka hinauf und bis nach Persien hinab, und in Nordamerika trifft man es bis zur Hudsonsbay an. Auch in der Barbarey ist es zu Hause. Man trifft es mehr in Gebäuden an, als das große. Es ist da in den Klüften alter Mauern, auf den Böden, in Scheunen und Ställen, zwischen den Wänden, in Abzügen, Holzstöcken u. s. w. zu finden. Im Sommer sieht man sie nahe bey Städten und Dörfern in Hecken, Steinhäusen, Steinbrüchen, unter hohlen Ufern, Baumwurzeln, Bäumen und in Maulwurfshügeln. Dieses Wiesels Hauptnahrung sind Hamster, Maulwürfe, große und kleine Mäuse, zu deren Verminderung es eigentlich bestimmt zu seyn scheint. Man findet in einer Wieselhöhle oft eine Menge Mäuse beisammen. Die große Wanderratte, die gegen andere Thiere, ja selbst gegen Menschen oft dreiste ist, ist in ein Paar Augenblicken von diesem kleinen Raubthiere überwältigt. Es geht aber auch die jungen Tauben und Hühner an, und trägt sie weg,

heißt die alten in den Hals und saugt ihnen das Blut aus. Nur selten frist es von diesen großen Vögeln etwas anders als den Kopf. Junge Hasen und Kaninchen werden auch von ihm angegriffen; alte Vögel von ihm im Schlafe erschlichen, und die Eier und Jungen aus den Nestern geblünder. Maulwürfen und Mäusen ist es um deswillen so sehr gefährlich, weil es dieselben bis in ihre Höhlen verfolgen kann. Es geht auch den Blindschleichen, Fröschen und dem Honige nach. Man sieht es nur selten am Tage in den Feldern und bey Steinhäufen herumlaufen. Die Razzeit fällt in den März. Nach fünf Wochen bringt das Weibchen vier bis acht Junge in einem von Moos, Federn und Gras weichgemachten Neste. Diese sind vierzehn Tage blind, bleiben lange liegen, und lassen sich von der Mutter säugen und ernähren. Wenn diese Gefahr für sie bemerkt, trägt sie dieselben auch am Halse davon. Sie sehen braunroth mit rothgrau überlaufen aus, lassen sich wie jene zähmen, haben aber einen unangenehmen Geruch. Seine Feinde sind Hunde und Katzen, welche letztere aber dreist seyn müssen, wenn sie sich nicht vor ihnen fürchten sollen. Auch den Storch hat man lange vor ihren Löchern sitzen und ihnen auf lauern gesehen. Das Thier ist zu unbedeutend, als daß man so aufmerksam auf dasselbe gewesen wäre, um besondere Eigenheiten zu bemerken. Merkwür-

dig ist indessen seine außerordentliche Raubbegierde. Man fängt es nämlich oft in Fallen mit der gefangenen Maus im Munde, und es läßt sie auch nicht eher los, als bis es getödtet ist. Die Spur ist der vorhergehenden vollkommen gleich, nur kleiner. Man fängt sie in eisernen Mäusefallen mit Bißgeln, an welche man ein Bogenley oder eine aufgekochte Weizpflaume befestet. Wenn man ihren Wohnort weiß, so darf man nur mit der Klinte sich hinstellen und wie eine Maus quacksen, um sie aus der Höhle zum Schuß zu locken. Der Nutzen, den diese Thiere im Haushalte der Natur stiften, überwiegt den Schaden, den sie anrichten, weit. Als Erbfeinde aller Mäusearten tödten sie dieselben nicht bloß zur Speise, sondern aus bloßer Mordsucht. In Sibirien wird der Balg auch benützt und an die Christen als Pelzwerk verkauft. Die Mexikaner sollen das Fleisch essen. Der Schaden, den sie an dem jungen Federvieh und an den Eiern in Häusern thun, ist oft beträchtlich, und hier sollte also bloß ihre Vertilgung statt finden; im Freyen aber sollten sie so lange geschont werden, bis wir selbst wirksamere Mittel gegen die verheerenden Feldmäuse ausgefunden haben.

Wiesenlerche — *Alanda Pratensis* — Gartenlerche, heißt auch Pieplerche, Hüster, Hister, Wispertling, Tspertling, Tsserling, Pi-per,

per, Guckerein, Greinerlein, Greinvögelchen, Krautvögelchen, kleine und kleinste Lerche und Grilzenlerche, macht in der Gattung Lerche eine besondere Art aus. Sie hat einen schwachen und dünnen Schnabel; schwärzliche Schwanzfedern, wovon die äußerste mit dem Schafte fast ganz weiß, die zweyte aber mit einem großen keilförmigen weißen Flecke versehen ist; auf den Deckfedern der Flügel sind zwei weißliche Streifen; an den Seiten der Brust fällt die Farbe ins gelblichgrüne, so wie überhaupt das ganze Gefieder etwas grün überlaufen ist; die schwärzlichen Längsflecken an den Seiten der Kehle, auf der Brust und an den Seiten des Bauches sind klein und fließen sanft in einander, der Unterkiefer ist dunkelgrau, die Füße sind dunkel fleischfarben und der Nagel der Hinterzehe ist sehr lang und gerade. Die Länge beträgt nur $5\frac{3}{4}$ Zoll. Sie hält sich am liebsten auf, auf großen feuchten Wiesen und Sümpfen, welche mit Gebüsch umgeben sind; im Herbst aber auf dem Striche auf den Haferfeldern, auch auf Kohl- und Kartoffelfeldern, und zieht in kleinen Gesellschaften weg, kommt aber in größern wieder. Die Nahrung dieser Lerche besteht in Insekten und klarem Gesäme. Das Nest findet man immer zwischen einem Binsen-Strauche oder im kurzen Grase in einer Vertiefung, welche das Vieh getreten hat, mit 4 bis 6 röthlichweißlichen blutbraungefleckten

Eiern. Man fängt sie wie die Feldlerche zc. und speist ihr Fleisch wegen seines Wohlgeschmacks.

Wild, Wildpret, nennet man 1) überhaupt alle vierfüßige wilde Thiere und Vögel, nemlich alle Thiere und Vögel, die im Walde, Felde und Gewässern leben. In Rücksicht der letztern s. wildes Geflügel, die ersten theilet man in edles Wild und Raubthier, s. d. Wort. 2) Insbesondere das weibliche Geschlecht des Rothwildprets, s. d. Wort und Thier.

Wildacker nennet man ein Stück Feld in einem Holze oder Thiergarten, das man mit allerley Getraide zur Nahrung für das Wildpret besät. Es muß von aller Hutung frey bleiben.

Wildbahn, Wildfuhr, ist ein mit richtigen Grenzen umschlossenes Revier. Eine solche in gutem Stande zu erhalten, gehören folgende Stücke dazu: 1) Man muß suchen, das nöthige Wildpret zu erhalten, welches besonders dadurch geschieht, wenn man in der verbotenen Zeit nichts schießt, kein altes Thier oder Standricke umbringt, die Hasen weder zu Ende noch zu Anfange der Schießzeit in Menge tödtet, auch überhaupt alles das beobachtet, was bey jeder Art von Wildpret zu dessen Erhaltung empfohlen worden. 2) Man muß die Raubthiere und Raubvögel möglichst zu vertilgen suchen. Nach dem Thursächf. Gesezen soll die Thursfürst,

fürstl. Wildbahn niemand engern oder verhindern, und dieselbe mit Jagen, Hezen und Weidwerk treiben, gänzlich verschonet werden. Die in der Wildfuhr gesetzten Schäfer sollen ihre Hunde kloppeln, auch Niemand darinnen Firsch- oder selbstzündende Büchsen tragen. S. Landordn. v. 1. Okt. 1555. S. vom Jagen, und T. das Keiner 10. C. A. I. S. 60 f. Gen. Bef. v. 20. May 1775. C. A. II. S. 519. Hutungen, Triften, Gräsereden, Mast, Holzstreifeln, Eichelnlesen, Laub sammeln und andere Nutzungen sollen darinnen Niemand gestattet, und, wer darinnen betroffen wird, als Dieb gestraft werden. Gen. Bef. v. J. 1575. ebend. Mand. v. 25. Jul. 1670. ebend. S. 567. Insonderheit sollen sich auch Officiere daran nicht vergreifen. Ordn. v. 29. Nov. 1677. §. 12 und vom 28. Jan. 1682. §. 13. ebend. I. S. 2015 und 2037.

Wildbann, Wildbannesgerechtigkeit heißt das Recht, in Jagdsachen Verfügungen zu treffen, Gesetze zu geben, und die Verbrecher zu strafen, damit der rechte Gebrauch der Jagd dem Herkommen gemäß, erhalten, und die Wildfuhr und Jagdgerechtigkeiten des Landesherrn erhalten werden. Es begreift also mehr als die bloße Ausübung der Jagd, und gehört unter die landesherrlichen Regalien. Ein mehreres hierüber findet man in Stiflers Historie des Forst- und Jagdwesens, s. auch Jagdbregal.

Wildbäume sind theils Aspen, die man in harten Wintern umschlägt, damit die Rehe sich von den Räschen derselben kümmerlich nähren, theils junge Kiefern, die man in gleicher Absicht fället, weil deren Rinde von dem Rothwildpret und Rehen gern gefressen wird.

Wildbieb, Wilderer, f. Wildschüze.

Wilbe Ente, f. gemeine wilde Ente.

Wilbe Gans, f. gemeine wilde Gans.

Wildfahre, Wildfuhr ist ein gegrabener oder gepflügter Strich, entweder an der Grenze vor dem Walde, wo das Wild aus und ein wechselt, oder im Walde um ein Dickigt, Morast oder Behältniß herum gezogen, und mit der Egge oder dem Harken eben gemacht, damit das darüber ziehende Wild darauf gespürt werden könne.

Wildfuhr ist in manchen Gegenden eben so viel, als Wildbahne, und in Niedersachsen bedeutet es die Jagdfrohnfuhr.

Wildgarn ist eine Art von Jagdnetzen, die man an die Stelle der Jagdtücher und hohen Zeuge gebrauchen kann. Man hat zweyerley Wildgarne, nemlich schwere und leichte, die erstern müssen 100 Schritt stellen, mit Maschen 6 Zoll ins □ von

von neunfäßigen hansenen Garne 18 Maschen hoch gestrickt seyn. Die Leinen werden 20 Faden stark geschlagen, die leichten f. Kuppelnetz.

Wildgruben, sind so viel als Rirungen oder Salzlecken, s. d. Wörter. In der Churfürstl. Sächs. Wildbahn soll Niemand, das Wildpret durch keinerley Fütterung und Getraide, noch andere Weise über die Reizungen können und leiten, auch keine neuen Wildgruben machen. S. Mand. v. 2. May 1695. u. v. 8. oder 18 Septbr. 1697. C. A. I. S. 583 und 595.

Wildhafer ist eine gewisse Menge Hafer, welche an manchen Orten diejenigen, die ihre Felder zur Vermeidung des Wildschadens umzäunet, entweder außerhalb der Berzäunung säen, oder an Garben oder Körnern an den Herrn der Jagd entrichten müssen. In Chursachsen soll denen Unterthanen nicht aufgedrungen werden, daß sie bey Vermachung ihrer Felder, vor das Wildpret außer den Hecken, Wildhafer säen, oder denselben an Garben oder Körnern einantworten müssen. Rescr. v. 12. März 1603. No. 5. C. A. I. S. 164.

Wildkalb heißt ein Junges vom Rothwildpret weiblichen Geschlechts im ersten Jahre seines Alters.

Wildmeister ist ein angesehener Jagdbeamter, der in

Rücksicht der Wildpretslieferung mehrere Jagdbedienten unter sich, und die Aufsicht über sie hat, welche auch alles erlegte Wild an ihn einliefern müssen. Bey jeder Wildmeisterei ist auch ein Wildpretsgewölbe. Die Oberforstmeister in Chursachsen sind sämmtlich auch Wildmeister, und haben in Rücksicht dieser Stelle die Aufsicht über die Jagd, so wie als Oberforstmeister die Aufsicht über das Forstwesen ihres Bezirks. Man hat aber auch Wildmeister, die nicht Oberforstmeister sind, und also auch bloß mit der Jagd, aber nichts mit dem Forstwesen zu thun haben.

Wildpret, darunter versteht man 1) alle wilde Thiere und Vögel, die ein Gegenstand der Jagd sind. Und dieses wird getheilt in Rothwildpret, dazu gehörig: Hirsche, Dammhirsche und Rehe, Schwarzwildpret, worunter das ganze Geschlecht der wilden Schweine, kleines Wildpret, als Hasen, Kaninchen ic., Federwildpret, s. wildes Geflügel und Raubthiere. Grenzwechsel- oder Naschwildpret nennet man solches Wildpret; das keinen ordentlichen Stand hat, sondern immer hin- und wieder zieht. Nach den Churfürstl. Gesetzen wird die Abscheuung des Wildprets vom Getraide denen, innerhalb und an der Churfürstl. Wildbahn gesessenen Leuten mit kleinen Hunden, die nicht Jagdhunde sind, ingleichen durch Wildwächter und Schen-

einigen schwärzlichen Streifen. Der Wiebehopf ist ein scheuer, munterer und lustiger Vogel. Er läuft sehr hurtig, läßt dabei die Flügel fast auf die Erde sinken, macht häufige Verbeugungen, wo er jederzeit mit seinem Schnabel den Boden berührt, und wenn er im Affekt ist, so schlägt er den Federbusch auf- und nieder. Sein Flug ist sanft, ohne alles Geräusch, und wegen seiner runden, der Elster ähnlichen, Flügel muß er auch, wie diese, dieselben oft und schnell bewegen. Sein Geschrey ist im Herbst und Frühjahr huphuphup, jo jo, to, to! das er auch, wenn ihn im Zimmer hält, und in Affekt bringt, mit stäten Verbeugungen hören läßt. Wenn man ihn zähmen will, so verlangt er anfangs Regenwürmer, alsdann nimmt er mit Brod und gekochtem Fleisch vorlieb. Er wohnt in Europa, Asien und Afrika, ist aber allenthalben kein gemeiner Vogel. Als Zugvogel kommt er spät im April oder zu Anfang des May mit oder kurz vor dem Kuckuck an, und heißt deshalb in manchen Gegenden Kuckucks-Laquay. Er lebt des Sommers in Wäldern, die an Viehtristen und Wiesen gränzen, auch in waldigen Gegenden um die Dörfer herum in den Weidenbäumen. Im August, wenn die Wiesen gemäht sind, zieht er einzeln oder in Gesellschaft von vier bis achten auf die Ebenen, und verläßt uns, alsdann unvermerkt. Er hält sich mehr auf der Erde als auf den Bäumen auf. Seine Nahrung besteht vorzüglich in

Käfern, die er unter dem Mist der zahmen und wilden Thiere, unter dem abgefallenen Laube und Ras aussucht. Es sind daher gewöhnliche Ras- und Mistkäfer und ihre Larven. Sie wenden daher mit ihrem Schnabel alle jene Dinge um. Auch die Ameisen und Eyer verfolgt er. Wenn er ein Insekt verschlucken will, so löst er ihn erst die harten Flügeldecken ab, wirft es wegen der unbeweglichen Zunge in die Höhe und fängt es mit dem Schnabel. Es muß aber allezeit der Länge nach in den Schlund fallen, sonst muß er den Wurf so lange wiederholen. Er badet sich im feuchten Sande. Er baut in hohle Bäume, am liebsten auf alte, faule, geköppte Baumstümpfe, selten in Mauern- und Felsenritzen oder auf die bloße Erde. Das Nest hat wenig Unterlage von Genist und Federn; wenn es aber offen steht, eine Ueberdecke von Kuhmist und zarten Wurzeln. Das Weibchen legt des Jahrs einmal zwey bis vier längliche aschgraue Eyer; und brütet sie in 14 Tagen allein aus. Die Jungen sehen bis zum ersten Mausern, welches in wärmern Ländern geschieht, blässer als die Alten aus, haben ein weißliches Rinn, weißgelbe Schnabeleden; die weißen Bänder der Deckfedern sine röthlichweiß, und die schwarzen schwarzbraun, haben aber den Federbusch und gleichen übrigens den Alten. An den Jungen die man aufzieht, bemerkt man vorzüglich das frostige Wesen, das sie antreibt, sich immer unter oder auf den Ofen zu setzen, so

so daß ihnen gewöhnlich der Schnabel vertrocknet, und sie dann elendiglich sterben müssen. Die Störche, Marder und Wiesel zerstreuen ihre Brut und viele Raubvögel verfolgen die Alten, daher sie auch, sobald sie einen erblicken, eine ganz eigene Stellung machen, die Flügel ausbreiten und den Kopf auf dem Rücken mit dem Schnabel in die Höhe stellen, so daß sie einen hingeworfenen bunten Lappen ähnlich sehen, und so oft unentdeckt bleiben. Sie sind außerordentlich furchtsam, und verlassen diese Stellung nicht eher, als bis der Raubvogel außer ihrem Gesichtskreise ist. Zum Schusse muß man sie wegen ihrer Scheuheit hinterschleichen, wenn man sie nicht von ohngefähr aufstöbert. Am leichtesten fängt man sie, wenn man auf Maulwurfs- haufen eine Leimruthe, an welche ein Mehlwurm gebunden ist, so locker steckt, daß die Leimruthe über sie herfällt, wenn sie den Mehlwurm loszupfen wollen. Alte und Junge riechen nicht angenehm, ohngefähr so, wie ein Ameisenhaufen, und sie werden daher bey uns nicht gegessen, wohl aber in Italien, wo man ihnen die Köpfe abreißt, daß sie ausbluten. Zur Heckezeit riechen sie am stärksten. Wegen ihrer Nahrungsmittel sind sie äußerst nützliche Vögel.

Wiederfährte ist unter Fährte erklärt.

Wiedergang, oder Kirchgang thut der Haase oder der Hirsch wenn er auf seiner Fährte wieder zurück gehet.

Wiederstrich, Wiederzug, heißt, wenn die Zugvögel im Frühjahr aus wärmern Gegenden zu uns zurückkehren. Die Zeit dazu ist bey der Beschreibung jedes Vogels angezeigt.

Wiesel — *Mustela* — macht in der Ordnung der Raubthiere eine besondere Gattung aus, wozu bey uns auch der Stein- und Baum- marder, nebst dem Fitis und die beyden folgenden Wieselarten gehören, als: 1) Das große Wiesel — *Mustela Erminea* — Es heißt auch: rothes, braunes, graues Feld- und Waldwiesel, Wiesel mit schwarzer Schwanzspitze; in der weißen Winterfarbe; Hermelin. Die Kennzeichen der Art sind: Die Farbe ist braunroth, in kalten Gegenden im Winter weiß, die Schwanzspitze aber allezeit schwarz. Die Länge des Körpers ist etwas über ein Fuß, und der Schwanz hat fünf Zoll. Der Bau ist schlank und geschmeidig; Schade, daß der Kopf zu dick und der Hals zu lang ist, sonst würde es eine der niedrigsten Thierformen haben; die Schnauze läuft kurz vor dem Munde spizig zu; die Nase ist stumpf und gefurcht; der Mund öffnet sich weit und ist mit einem abwärts stehenden Knebelbarte besetzt; das Gebiß sehr scharf; die Zunge glatt und gefurcht; die Augen klein, schwarz, funkelnd, weit vorn im Gesicht stehend, und mit langen Bartborsten versehen; die fast glatten

2

Ohr-

Ohrklappen kurz, breit, abgerundet und fest am Kopfe angelegt; der Hals kaum dünner als der Leib, vorn etwas in die Höhe gehoben; der Leib cylindrisch, an den Hinterschenkeln etwas erhabener; der Schwanz buschig und abgestumpft, in Ruhe gehend gerade ausgestreckt, in der Flucht aber auswärts gewölbt; die Beine kurz, scharfklauiig; der Daumen an den Hinterfüßen kurz und versteckt; am After zwey niedrig nach Wisam stehende Drüsen. Die Farbe im Winter dunkel gelbbraun; im Sommer gelbroth oder schmutzig rothgelb; die Ohrklanten und Hinterfüße weiß (aber nicht immer); die Schnauze schwärzlich; der Bart gelb, weiß und schwarz; die Kopffarbe immer dunkler, als die Rückenfarbe; das Kinn und die Vorderzehen allezeit weiß; der übrige Unterleib weiß oder weißgelb; fast die ganze letzte Hälfte des Schwanzes schwarz. Im Norden ändert sich die Rückenfarbe in weiß; bey uns in Deutschland nicht immer; und die weißen Wiesel oder Hermeline bey uns, sind gewöhnlich Varietäten, wie die bey andern Thieren, und behalten diese Farbe Sommer und Winter. Auch wenn sich alsdann weiße und rothe Wiesel zusammen paaren, so giebt es geschäkte. Man hat auch eine aschgraue Varietät entdeckt. Ueberhaupt ist auch die braune oder rothe Farbe verschieden, so daß man rothbraune, graubraune, rothgelbe und braunrothe große Wiesel antrifft. Das

Weibchen scheint einen etwas schlankern Körperbau, einen dünnern spizigern Kopf zu haben, und auf jeder Seite des Bauches stehen fünf Säugwarzen. Es ist ein außerordentlich munteres, flüchtiges, gewandtes, aber auch ein grausames und für seine Größe sehr starkes Thier. Wie Eichhörner, so geschwind kann es Bäume ersteigen, ungemein hurtig springen, und mit der größten Fertigkeit über Bäche und Flüsse schwimmen. Durch alle Rigen, wodurch der Kopf geht, schlüpfen sie. Ihre Stimme ist fast ein Quicken wie das der Epigamuse. Sie machen immer Männchen, wie die Hasen, um sich umzusehen. Ihr Vaterland ist der Norden von Europa, Asien und Amerika, wo sie in großer Menge leben. In Europa sind sie fast allgemein bekannt. Man trifft sie im Felde und Walde an. Im Felde wohnen sie gern an Ufern der Flüsse, in Hecken, Steinhäufen, in Maulwurfs-Hamster- und Mäusehöhlen und in hohlen Obst-Weiden- und andern Bäumen. Eine Wohnung unter der Erde hat wenigstens vier Eingänge, und so richten sie sich auch die vorgefundnen ein. Im Walde wohnen sie ebenfalls in Erdhöhlen, Stein- und Felsenklüften und in hohlen Bäumen. Im Winter gehen sie auch in die Wohnungen der Menschen, vorzüglich in die einzeln im Felde liegenden, und halten sich in Scheunen, Ställen und Kellern auf. Sie werfen auch zuweilen in Hühner und andern Stal.

Ställen, auch in Kellern Hausen auf, (wo sie dann Haus- u. qk heißen); dann gehen sie aber gewöhnlich nach Hühnern, Ethern u. d. gl. Ihre Hauptnahrung machen Hamster, Mäuse, Wasserratten und andere große und kleine Feldmäuse aus. Außerdem suchen sie die jungen und alten kleinen Vögel zu erschleichen, und nehmen den großen die Eier aus. Sie überfallen vorzüglich im Schläfe auch junge und alte Hasen und Kaninchen, ja sogar junge Rehe. Am Ufer des Wassers rauben sie Fische: Von Vegetabilien fressen sie bloß einige Pflanzarten. Gewöhnlich gehen sie des Nachts, nur selten am Tage, nach ihrem Raube. Wenn nicht die Seltenheit des Thiers die Ursache ist, so sieht man sie immer paarweise beisammen, und es scheint daher, wie wenn sie gegen die Gewohnheit der Raubthiere in Monogamie lebten. Das Laufen oder Kriechen geschieht im März. Die Mutter bringt nach fünf Wochen drey bis acht Jungen zur Welt. Das Nest, das in einer Erdhöhle, unter, oder in einem hohlen Baume angelegt wird, ist mit Moos, Wolle, Federn und Gras weich gemacht. Die Jungen saugen lange und die Mutter trägt ihnen vier Monate lang lebendige Nahrung, Mäuse und Vögel zu, und lehrt sie so auf eine grausame Art ihren Raub fangen und tödten. Sie lassen sich zähmen, man muß ihnen aber zur Vorsicht die Zähne ausbrechen. Ragen und unter den Hunden vorzüglich der

Spitz sind ihre Feinde. Von Vögeln weiß man keinen, der sie angiehe, als der Storch. Von Jägerbeobachtungen sind bekannt: 1) Ihr buschiger Schwanz trägt sehr viel dazu bey, daß sie nicht bloß von einem Busche, sondern auch von einem Baume zum andern springen können; und mit desto geringerer Mühe die Vogelnester und die schlafenden Vögel auszuspiiren. 2) Wenn man ein Nest findet, so trifft man gewöhnlich etliche lebendige Mäuse darinnen an, die den Jungen zum Spielen dienen und ihre Raubsucht üben sollen. 3) Wo sie in hohlen Bäumen sicher liegen, da lassen sie sich die Pflege der Mutter so lange gefallen, bis sie erwachsen, fast so groß wie die Alten sind. In hohlen Nesten der Feldobstbäume hat man sie mehrmals so gefunden. 4) Den jungen Rehen beißen sie sich im Genicke ein; das Thier läuft alsdenn wie wüthend mit ihnen fort, unterdessen suchen sie ihm die Halsflecken abzufressen, und es auf diese Art zu tödten. 5) Dem aufgesetzten Hasen folgen sie, wie die Hunde, auf der Spur nach, und wenn sie ihm nahe kommen, springen sie ihm auf den Rücken, beißen sich ein, und saugen ihm das Blut aus, bis er hinstürzt. Eben so schleichen sie sich in die Kaninchen-Baue, springen diesen Thieren auf den Rücken, diese rennen dann mit ihnen heraus und davon, bis sie hinstürzen müssen. 6) Die Eier der Hühner und anderer Vögel tragen sie nicht im Munde, sondern unter

ter dem Rinne weg, und können dabei sehr geschwind flattern und laufen. Die *Fährt* ist, die Größe abgerechnet, wie beim Marber, gewöhnlich zwei und zwei Spuren neben einander, doch auch zuweilen im Dreieck, wie beim Hasen. Die Hunde spüren ihren Aufenthalt wegen der stinkenden Exkremente leicht aus. Man hegt sie ihnen dann an; allein alle gehen sie nicht an, wegen ihres scharfen Gebisses, mit dem sie ihnen nach den Gesichtern fahren und sie schwer verwunden. Vor ihren Aufenthalt legt man ihnen Fallen und Schlingen, die man gut abwürtern, oder mit in Honig getauchtem Wellkorn, oder mit einem Ey ankören muß. Wenn man ihren Aufenthalt weiß, so darf man nur vor der Höhle wie eine Maus pfeifen, so kommen sie gleich heraus und man kann sie todt-schießen. Will man in Häusern ihre Vertilgung bloß des Schadens halber, den sie thun, so darf man nur ein Ey mit Quecksilbersublimat füllen, und an den Ort legen, wo man sie gespürt hat, so werden sie bald verschwinden. In Gärten, wo sie in Maulwurfsbäuen wohnen, gießt man sie mit Wasser aus, hegt, wenn sie herauskommen, Hunde an, oder fängt sie in kleinen Gärtnchen. Im Freyen sollte man sie, wo man Schaden von Feldmäusen zu befürchten hat, nicht tödten, weil sie mehrentheils von diesen Thieren leben. Dem Bären sollen sie sogar in die Ohren kriechen, denselben da-

durch rasend machen, daß er nicht eher zu laufen aufhört, als bis er hinfällt und stirbt. Der rothbraune Wasg wird kaum zu Untersutter benutzt; der weiße (oder das Hermelinsfell), der aus Norden kommt, ist ein sehr kostbares Pelzwerk. Die Holländer und Engländer treiben einen sehr starken Handel damit. Die Hermelinschwänze gaben sonst die kostbarsten Pelze und Aufschläge. Die weißen Felle, die man von unsern Wiesen bekommt, braucht der Landmann bloß zu Vertreibung des Schwulstes an den Cutern der Kühe. 2) Das kleine Wiesel — *Must. vulgaris* — hat auch die Namen: Gemeines Wiesel, Heermännchen, Haus- und Speichermiesel, lichtbraunes, röthliches Wiesel; im Norden, wo es weiß wird, Echermiesel, kleines weißes Wiesel, Härmlein, Hermelinschen. Die Kennzeichen der Art sind: Der Schwanz ist mit dem gelbrothlich-braunen Oberleibe einfarbig und ohne Haarbüschel. Es ist oft mit dem vorhergehenden verwechselt worden; es unterscheidet sich aber in Ansehung der Größe, der Form und Kürze des Schwanzes gar merklich. Der Leib ist etwas über sechs Zoll lang; der Schwanz anderthalb Zoll, und die Höhe fast anderthalb Zoll. Der Kopf ist breit gedrückt, und mit dem Halse und Leibe fast einerley Dicke; der Mund enthält das scharfe Gebiß der vorhergehenden Art; die Ohren sind kurz, breite abge-

abgerundet, stehen tief, in der Mitte des Kopfes und weit entfernt von den kleinen schließenden schwarzbraunen glänzenden Augen; der Hals ist lang und Dick, mehr in die Höhe gestellt, als bey dem großen Wiesel; der Leib gerade auslaufend; der Schwanz kurz, zunehmend pigig ohne merklichen Haarbüschel, die Beine sehr kurz, dünn; die Füße zart und mit scharfen weißen Nägeln bewaffnet; unter dem After zwey Drüsen mit einer sehr stark bisamartig riechenden Feuchtigkeit. Der Oberleib ist gelbrothbraun, manchmal etwas dunkler, also ins graulich ziehend, manchmal heller; im Sommer schmutzig fuchsth, zuweilen rothgelb; vom Rande des Oberkiefers an ist die Farbe schneeweiß; hinter jedem Mundwinkel ein weißer kleiner Fleck von der Rückenfarbe; dergleichen Punkte befinden sich auch oft am Bauche; die Barthhaare und Brusthaare vor und über den Augen sind weiß und rothbraun. Das Weibchen unterscheidet sich blos durch die acht Säugwarzen vom Männchen. Im Norden wird es im Winter schneeweiß, daher der Name Schneewiesel. In Deutschland aber hat man noch keine Farbenveränderung nach den Jahreszeiten bemerkt; und wenn es weiß gesehen wird, so ist es eine Varietät, die Sommer und Winter so bleibt. In seinem Naturell ist es dem vorigen gleich, nur daß es noch munterer und flinker ist; es läuft außerordentlich schnell und bewegt dabey den Kopf unaufhör-

lich nach allen Seiten. Es klettert so gut, als ein Eichhorn, schwimmt vortreflich, und durchkriecht und durchsucht alles, alle Winkel und Löcher, die ihm aufstoßen. Ob es gleich kleiner ist als jenes, so ist es doch eben so beherzt, fast noch beherzter und grausamer. In der Angst läßt es einen heisern quiekenden Ton von sich hören. Es bewohnt die meisten Theile von Europa, in Asien geht es bis nach Kamtschatka hinauf und bis nach Persien hinab, und in Nordamerika trifft man es bis zur Hudsonsbay an. Auch in der Barbarey ist es zu Hause. Man trifft es mehr in Gebäuden an, als das große. Es ist da in den Klüften alter Mauern, auf den Böden, in Scheunen und Ställen, zwischen den Wänden, in Abgängen, Holzstöcken u. s. w. zu finden. Im Sommer sieht man sie nahe bey Städten und Dörfern in Hecken, Steinhäufen, Steinbrüchen, unter hohlen Ufern, Baumwurzeln, Bäumen und in Maulwurfshügeln. Dieses Wiesels Hauptnahrung sind Hamster, Maulwürfe, große und kleine Mäuse, zu deren Verminderung es eigentlich bestimmt zu seyn scheint. Man findet in einer Wieselhöhle oft eine Menge Mäuse beisammen. Die große Wanderratte, die gegen andere Thiere, ja selbst gegen Menschen oft dreiste ist, ist in ein Paar Augenblicken von diesem kleinen Raubthiere überwältigt. Es geht aber auch die jungen Tauben und Hühner an, und trägt sie weg,

beißt die alten in den Hals und saugt ihnen das Blut aus. Nur selten frißt es von diesen großen Vögeln etwas anders als den Kopf. Junge Hasen und Kaninchen werden auch von ihm angegriffen; alte Vögel von ihm im Schlafe erschlichen, und die Eier und Jungen aus den Nestern geblüddert. Maulwürfen und Mäusen ist es um deswillen so sehr gefährlich, weil es dieselben bis in ihre Höhlen verfolgen kann. Es geht auch den Blindschleichen, Fröschen und dem Honige nach. Man sieht es nur selten am Tage in den Hecken und bey Steinhaufen herumlaufen. Die Kanzeit fällt in den März. Nach fünf Wochen bringt das Weibchen vier bis acht Junge in einem von Moos, Federn und Gras weichgemachten Neste. Diese sind vierzehn Tage blind, bleiben lange liegen, und lassen sich von der Mutter säugen und ernähren. Wenn diese Gefahr für sie bemerkt, trägt sie dieselben auch am Halse davon. Sie sehen braunroth mit röthgrau überlaufen aus, lassen sich wie jene zählen, haben aber einen unangenehmen Geruch. Seine Feinde sind Hunde und Katzen, welche letztere aber dreist seyn müssen, wenn sie sich nicht vor ihnen fürchten sollen. Auch den Storch hat man lange vor ihren Löchern sitzen und ihnen aufschauern gesehen. Das Thier ist zu unbedeutend, als daß man so aufmerksam auf dasselbe gewesen wäre, um besondere Eigenheiten zu bemerken. Merkwür-

dig ist indessen seine außerordentliche Raubbegierde. Man fängt es nämlich oft in Fallen mit der gefangenen Maus im Munde, und es läßt sie auch nicht eher los, als bis es getödtet ist. Die Spur ist der vorhergehenden vollkommen gleich, nur kleiner. Man fängt sie in eisernen Mäusefallen mit Biegeln, an welche man ein Bogen oder eine aufgekochte Weizpflaume befestet. Wenn man ihren Wohnort weiß, so darf man nur mit der Flinte sich hinstellen und wie eine Maus quacksen, um sie aus der Höhle zum Schuß zu locken. Der Nutzen, den diese Thiere im Haushalte der Natur stiften, überwiegt den Schaden, den sie anrichten, weit. Als Erbfeinde aller Mäusearten tödten sie dieselben nicht bloß zur Speise, sondern aus bloßer Mordsucht. In Sibirien wird der Balg auch benutzt und an die Christen als Pelzwerk verkauft. Die Merikaner sollen das Fleisch essen. Der Schaden, den sie an dem jungen Federvieh und an den Eiern in Häusern thun, ist oft beträchtlich, und hier sollte also bloß ihre Vertilgung statt finden; im Freyen aber sollten sie so lange geschont werden, bis wir selbst wirksamere Mittel gegen die verheerenden Feldmäuse ausgefun-

Wiesenlerche — *Alauda Pratensis* — Gartenlerche, heißt auch Pieplerche, Hüster, Hister, Pispertling, Isperling, Isserling, Pispert,

er, Guderlein, Greiner-
ein, Greinvögelchen,
Trautvögelchen, kleine und
feinste Lerche und Gril-
enlerche, macht in der Gat-
ung LERCHE eine besondere Art
aus. Sie hat einen schwachen
und dünnen Schnabel; schwärz-
liche Schwanzfedern, wovon die
äußerste mit dem Schafte fast
ganz weiß, die zweyte aber mit
einem großen keilförmigen wei-
ßen Flecke versehen ist; auf den
Deckfedern der Flügel sind zwei
weißliche Streifen; an den Sei-
ten der Brust fällt die Farbe ins
gelblichgrüne, so wie überhaupt
das ganze Gefieder etwas grün
überlaufen ist; die schwärzlichen
Längsflecken an den Seiten der
Kehle, auf der Brust und an
den Seiten des Bauches sind
klein und fließen sanft in einan-
der, der Unterkiefer ist dunkel-
grau, die Füße sind dunkel fleisch-
farben und der Nagel der Hin-
terzehe ist sehr lang und gerade.
Die Länge beträgt nur $5\frac{1}{4}$ Zoll.
Sie hält sich am liebsten auf,
auf großen feuchten Wiesen und
Sümpfen, welche mit Gebüsch
umgeben sind; im Herbst aber
auf dem Striche auf den Ha-
ferfeldern, auch auf Kohl- und
Kartoffelfeldern, und zieht in klei-
nen Gesellschaften weg, kommt
aber in größern wieder. Die
Nahrung dieser LERCHE besteht in
Insekten und klarem Gesäme.
Das Nest findet man immer
zwischen einem Binsen-Strauche
oder im kurzen Grase in einer
Vertiefung, welche das Vieh ge-
treten hat, mit 4 bis 6 röth-
lichweißlichen blutbraungeflechten

Eyern. Man fängt sie wie die
Feldlerche 2c. und speist ihr Fleisch
wegen seines Wohlgeschmacks.

Wild, Wildpret, nennet
man 1) überhaupt alle vierfüßi-
ge wilde Thiere und Vögel, nem-
lich alle Thiere und Vögel, die
im Walde, Felde und Gewässern
leben. In Rücksicht der letztern
s. wildes Geflügel, die ersten
theilet man in edles Wild
und Raubthier, s. d. Wort.
2) Insbesondere das weibliche
Geschlecht des Rothwildprets, s.
d. Wort und Thier.

Wildacker nennet man ein
Stück Feld in einem Holze oder
Thiergarten, das man mit aller-
ley Getraide zur Nahrung für das
Wildpret besät. Es muß von
aller Hutung frey bleiben.

Wildbahn, Wildfuhr,
ist ein mit richtigen Grenzen
umschlossenes Revier. Eine sol-
che in gutem Stande zu erhal-
ten, gehören folgende Stücke da-
zu: 1) Man muß suchen, das
nöthige Wildpret zu erhalten,
welches besonders dadurch ge-
schiehet, wenn man in der ver-
botenen Zeit nichts schießt, kein
altes Thier oder Standricke um-
bringet, die Haasen weder zu
Ende noch zu Anfange der Schieß-
zeit in Menge tödtet, auch über-
haupt alles das beobachtet, was
bey jeder Art von Wildpret zu
dessen Erhaltung empfohlen wor-
den. 2) Man muß die Raub-
thiere und Raubvögel möglichst
zu vertilgen suchen. Nach den
Chursächs. Gesetzen soll die Chur-
fürstl.

flucht. Wildbann niemand en-
gern oder verhindern, und die-
selbe mit Jagen, Hetzen und
Wildwerk treiben, gänzlich ver-
schonet werden. Die in der
Wildfuhr gesetzten Schäfer sol-
len ihre Hunde klopfeln, auch
Niemand darinnen Fährsch- oder
selbstständigende Blüthen tragen.
S. Landordn. v. 1. Litt. 1555.
S. vom Jagen, und T. das kri-
ner u. C. A. I. S. 60 f. Gen.
Bes. v. 20. May 1775. C. A.
II. S. 519. Hutungen, Trif-
ten, Gräsereden, Mast, Holz-
streifeln, Eichelnlesen, Laub-
sammeln und andere Nützun-
gen sollen darinnen Niemand ge-
stattet, und, wer darinnen be-
troffen wird, als Dieb gestraft
werden. Gen. Bes. v. J. 1575.
ebend. Mand. v. 25. Jul. 1670.
ebend. S. 567. Insonderheit
sollen sich auch Officiere daran
nicht vergreifen. Ordn. v. 29.
Nov. 1677. §. 12 und vom 28.
Jan. 1682. §. 13. ebend. I. S.
2015 und 2037.

Wildbann, Wildbanns-
gerechtigkeit heißt das Recht,
in Jagdsachen Verfügungen zu
treffen, Gesetze zu geben, und
die Verbrecher zu strafen, da-
mit der rechte Gebrauch der Jagd
dem Herkommen gemäß, erhal-
ten, und die Wildfuhr und
Jagdgerechtigkeiten des Landes-
herrs erhalten werden. Es be-
greift also mehr als die bloße
Ausübung der Jagd, und gehört
unter die landesherrlichen Re-
galien. Ein mehreres hierüber
findet man in Stifiers Historie
des Forst- und Jagdwesens, s.
auch Jagdregal.

Wildbäume sind stiel-
lose, die man in harten Ein-
tern umschlößt, damit die Ab-
sch von den Ästen derblich
kümmerlich werden, theils jun-
ge Kiefern, die man in gleiche
Abicht säßt, weil deren Kern
von dem Rothwildpret und He-
hen gern gestressen wird.

Wildbieb, Wilderer
s. Wildschäpe.

Wilde Ente, s. gemein
wilde Ente.

Wilde Gans, s. gemein
wilde Gans.

Wildfähr, Wildfuhr
ist ein gegrabener oder gepflüg-
ter Strich, entweder an der Gren-
ze vor dem Walde, wo das Wild
aus und ein wechselt, oder im
Walde um ein Dickigt, Morast
oder Behältniß herum gezogen,
und mit der Egge oder dem Harken
eben gemacht, damit das dar-
über ziehende Wild darauf ge-
spürt werden könne.

Wildfuhr ist in manchen
Gegenden eben so viel, als
Wildbahne, und in Niedersach-
sen bedeutet es die Jagdsfrohn-
fuhr.

Wildgarn ist eine Art von
Jagdnetzen, die man an die
Stelle der Jagdtücher und ho-
hen Zeuge gebrauchen kann. Man
hat zweyerley Wildgarne, nem-
lich schwere und leichte, die
erstern müssen 100 Schritt stel-
len, mit Maschen 6 Zoll ins □
von

von neunfäßigen hansenen Gar-
ne 18 Maschen hoch gestrickt seyn.
Die Leinen werden 20 Faden
stark geschlagen, die leichten f.
Kuppelnetz.

Wildgruben, sind so viel
als Kurrungen oder Salzlecken,
s. d. Wörter. In der Chur-
fürstl. Sächf. Wildbahn soll Nie-
mand, das Wildpret durch kei-
nerley Fütterung und Getraide,
noch andere Weise über die Rei-
nungen kornen und leiten, auch
keine neuen Wildgruben ma-
chen. S. Mand. v. 2. May
1695. u. v. 8. oder 18 Septbr.
1697. C. A. I. S. 583 und 595.

Wildhafer ist eine gewisse
Menge Hafer, welche an man-
chen Orten diejenigen, die ihre
Felder zur Vermeidung des Wild-
schadens umzäunet, entweder aus-
serhalb der Berzäunung säen,
oder an Garben oder Körnern
an den Herrn der Jagd entrich-
ten müssen. In Chursachsen
soll denen Unterthanen nicht auf-
gebrungen werden, daß sie bey
Vermachung ihrer Felder, vor
das Wildpret außer den Hecken,
Wildhafer säen, oder denselben
an Garben oder Körnern einant-
worten müssen. Rescr. v. 12.
März 1603. No. 5. C. A. I.
S. 164.

Wildkalb heist ein Jun-
ges vom Rothwildpret weiblichen
Geschlechts im ersten Jahre sei-
nes Alters.

Wildmeister ist ein an-
gesehener Jagdbeamter, der in

Rücksicht der Wildpretslieferung
mehrere Jagdbedienten unter sich,
und die Aufsicht über sie hat,
welche auch alles erlegte Wild
an ihn einliefern müssen. Bey
jeder Wildmeisterey ist auch ein
Wildpretsgewölbe. Die Ober-
forstmeister in Chursachsen sind
sämmlich auch Wildmeister, und
haben in Rücksicht dieser Stelle
die Aufsicht über die Jagd, so
wie als Oberforstmeister die Auf-
sicht über das Forstwesen ihres
Bezirks. Man hat aber auch
Wildmeister, die nicht Ober-
forstmeister sind, und also auch
bloß mit der Jagd, aber nichts
mit dem Forstwesen zu thun
haben.

Wildpret, darunter ver-
stehet man 1) alle wilde Thiere
und Vögel, die ein Gegenstand
der Jagd sind. Und dieses wird
getheilt in Rothwildpret,
dazu gehörig: Hirsche, Damm-
hirsche und Rehe, Schwarz-
wildpret, worunter das ganze
Geschlecht der wilden Schweine,
kleines Wildpret, als Haa-
sen, Kaninchen u., Feder-
wildpret, s. wildes Geflügel
und Raubthiere. Grenz-
Wechsel- oder Naschwild-
pret nennet man solches Wild-
pret; das keinen ordentlichen
Stand hat, sondern immer hin-
und wieder zieht. Nach den
Chursächf. Gesetzen wird die Ab-
scheudung des Wildprets vom
Getraide denen, innerhalb und
an der Churfürstl. Wildbahn ge-
seßen Leuten mit kleinen Hun-
den, die nicht Jagdhunde sind,
ungleichen durch Wildwächter und
Schau-

Scheufele, nachgelassen. S. Land-
ordn. v. 1. Okt. 1555. T. Ab-
schreibung. Rescr. v. 23. April
1612. T. Reratsachen, f. 31.
Resol. v. 18. April 1718. Gen.
Bes. v. 20. May 1575. und
deren Erläuter. vom 7. May
1659. C. A. I. S. 61. 191 u.
195. f. und II. S. 519. u. 561.
Extr. aus der Praelim. Schrift
v. 12. April 1728. No. 12. S.
C. A. I. S. 48. Das auf der
Unterthanen Gütern angeschos-
sene, und in Churfürstl. Wild-
bahn und Reviere überlaufende
Wildpret, soll den Jagd- und
Forstbedienten angezeigt werden,
damit es nicht den Raubthieren
und Raben zu Theil werde.
Mand. v. 5. Jul. 1728. S. C.
A. II. S. 603. Was den Wild-
preteschaden anbetrifft, so soll
denselben nach Möglichkeit ab-
geholfen werden. Die Klagen
dieserhalb sind aber bey den Krei-
shauptleuten anzubringen, welche
mit den Oberforst- und Wild-
meistern communiciren, und ge-
meinschaftlich, letztere auch be-
sonders, an den Oberjägermeis-
ter berichten sollen. S. Gen.
Bes. v. 2. Dec. 1766. S. C. A.
I. S. 1506 f. durch einen Be-
fehl v. 29. Juny 1773. ist an-
befohlen, daß, wenn Klagen über
Wildschäden geführt werden, die
Forstbedienten sofort, mit Zu-
ziehung der Beamten, eine Be-
sichtigung in loco anstellen sol-
len. Zugleich wurde den Forst-
bedienten eine Verordnung vom
24. Dec. 1772. zugesertigt, ver-
möge deren das Wildpret aller
Orten, wo es den Untertha-
nen zu Schaden gereicht, auf

deren Innehalten und Erbiethen,
es gegen Bezahlung nach einer
bestimmten Laxe nemlich zu
zeiten, da das Wildpret gerin-
ger, das Rothwildpret 1 Thlr., das
Schwarzwildpret 2 Thlr. wohl-
feiler, als die Laxe beträgt, an-
zunehmen, zu allen Zeiten ab-
geschossen werden soll. Welche
Verordnung auch den Kreishaupt-
leuten zugesertigt worden. Auf
Anregung Königl. Preussl. Seits
ist zur Verhütung der vorkom-
menden mehreren Wildbictereien,
unter Versicherung des Reci-
proci, die Einrichtung getrof-
fen worden, daß künftig über
das, aus Sächs. Landen in die
Brandenburgischen gehende Wild-
pret von den Wildmeistern aus
deren unterhabenden Wildmei-
stereien zur Versendung es hie-
zu erkaufet worden, jedesmal
besondere Attestate nach den fol-
genden Schema sub A. worin:
ne die Anzahl Stücken, von den
verschiedenen Sorten einzeln an-
gegeben, auch bey dem Verkauf
der Wildhäute ähnliche Attestate
ausgestellt werden sollen. Fer-
ner sollen auf diese Attestate über
das in die Städte einbringende
Wildpret in so ferne dasselbe,
außerhalb Landes eingebracht seyn
soll, in den Thoren anders nicht,
als wenn zugleich vom Grenz-
zollamte ein Passirzeddel vorge-
zeigt, oder auf dem Attestate
selbst das Nöthige deshalb be-
merkt worden, für gültig ange-
nommen, übrigens aber sothane
Attestate und Passirzeddel bey
der Einbringung des Wildprets
von den Thorbedienten dadurch,
daß selbige zu durchstreichen, und
der

der Tag, auf welchen das Wildpret eingebracht worden, angesetzt werde, zu anderweitigen Gebrauch untauglich gemacht werden. C. Gen. vom 24. März 1784.

A.

Daß Vorzeiger dieses N. N. aus N. unten gesetzten Dato in der gnädigst mir anvertrauten Wildmeisterei nach specificirtes Roth- } Wildpret, als:
Schwarz- }

St. Hirsche, von 6, 8, 10
Enden,

- Spießhirsche,
- Kolbenhirsche,
- Stücken-Wild,
- Schmalthiere,
- Wildkälber,
- Tannenhirsche,
- Tannenhiere,
- Tannenkälber,
- Rehböcke,
- Rehe,
- Schmalrehe,
- Rehkälber,
- Hasen,
- Rebhühner u.

— hauende } Schweine,
— angehende }

- Bächen,
- Keiler,

— jährige } Frischlinge,
— heurige }

wirklich erkaufte hat, solches wird demselben zu seiner Legitimation, unter Vordruckung des Churfürstl. Wildmeisterei-Siegels, und meiner eigenhändigen Unterschrift hiermit attestiret. Sign. Wildmeisterei N. den 10.

N. N.

(L.S.)

2) heißt auch Wildpret, das Fleisch alles eßbaren Wildprets, sowohl roh als zugerichtet.

Wildpretstaxe ist eine gewisse Bestimmung des Preises, nach welchem jede Art von Wildpret aus den landesherrlichen Wildmeistereyen verkauft werden soll.

Wildrudreher ist eine Handwerkskunst in Nürnberg, deren Geschäfte darinnen bestehen, daß sie Wildrudhörner, d. h. allerley Hörner und Pfeifen, die als Lockpfeifen und sonst zur Jagd gebraucht werden, aus Horn drehen.

Wildschüße, s. Raubschüße,

Wildtrage ist ein Werkzeug, womit bey Jagden das Wildpret vor den Schirm getragen wird. Sie bestehet aus einem, 3 Ellen langen und 4 Ellen breiten, an beyden Seiten mit Armesbüchsen Stangen versehenen Rege.

Wildwage ist eine starke Schnellwage zum Abwiegen des Wildprets.

Wildwächter ist ein zum Abschrecken des Wildprets von Getreidefeldern, oder wo es sonst Schaden thun könnte, bestimmter Aufseher.

Wind, s. Windhund.

Windbüchse ist ein, wie eine Flinte gestaltetes, Gewehr, wor-

woraus der eingeladene Schuß, nicht durch Pulver, sondern durch die Gewalt der durch Pumpen eingepreßten Luft, welche mittelst der Bewegung einer Feder beim Abdruck schnell zum Theil herausgelassen wird, getrieben wird. Die Luft wird vermittelt einer besonders dazu passenden Pumpe entweder in den Lauf, oder in den Kolben, oder in eine eigends dazu gemachte kupferne Kugel, die man an- und abschrauben kann, gepumpt, und treibt dann 10, 20, und noch mehr Schüsse, ehe man wieder zu pumpen nöthig hat. Auch hat man Windbüchsen, die an der Seite des Laufes eine Röhre haben, worin man eben so viel Kugeln thut, als die Büchse Luftschüsse hält; da denn durch einen vor jedem Schusse vermittelst des Hahnaufziehens bewirkten Federdruck, eine Kugel in den Lauf fährt, die übrigen aber in der Röhre zurückbleiben.

Windhund, **Wind**, **Windspiel** ist eine Art von Hunden, die man zum Verfolgen, Fangen und Todbeissen auf gejagter Haasen brauchet. Ein guter Windhund ist lang und schlank, hat ein spitziges, mit guten Fängen besetztes Maul, hohe Schenkel und einen langen Schwanz. Dabey ist er geschwind und fangisch, daß er die Haasen nicht nur einholen, sondern auch fangen kann. Gewöhnlich nimmt man 3 Windhunde zur Hehe, und diese heißen zusammen ein **Strick Windhunde**, bisweilen nimmt

man auch nur 2, oder auch 1 Windhunde. Hat man einen einzelnen, der im Stande ist, Haasen allein zu fangen, wird er ein **Solofänger** genannt. Bisweilen ist einer darunter, der die andern Hunde von dem gefangenen Hasen abtreibt, nach Befinden auch den Hasen apportirt, und dieser heißt ein **Retter**. Bey Erziehung der Windhunde muß man ihnen nicht dicke Suppe, Milch oder Geschlapper, auch keine Knochen, sondern nur trocknen Brod und Wasser zu fressen geben. Sie müssen entweder auf dem freyen Hofe, oder, welches noch besser ist, damit sie kein Federvieh todbeissen, oder allein hinauslaufen, in einem geräumigen, mit hohen Mauern versehenen Zwinger, herumlaufen. Wenn sie ein Jahr alt sind, werden sie eingeheget. Man läßt nemlich im zeitigen Herbst, wenn es viel junge, noch nicht zu listige Haasen giebt, zwey alte, und einen jungen Windhund mit einander laufen, in der Folge, wenn dieser junge Hund etwas eingeheget ist, läßt man einen alten Hund weg, und nimmt statt dessen noch einen jungen, endlich wird auch der dritte junge, und mit Weglassung des zweyten Alten genommen. Besser ist es, die zusammengehörenden Windhunde zusammen an einem Heziemen oder einer Leine zu führen, als sie frey laufen zu lassen. Sehr gut ist es, wenn bey jedem Strick ein Retter mit befindlich ist. Wenn ein Windhund sich zum Fressen der Haasen gewöhnen will:

muß man es ihn durch Schläge abzugewöhnen suchen. Man hat noch eine Zwitterart von Windhunden, die ebenfalls sehr schnell, und dabey stark, auch scharf beißig sind; man raucht sie besonders auf Füchse. Nach den Churfürstlichen Gesezen sollen die, in den landeserzlichen Beheegen, oder nahe an solchen angesessenen Vasallen, keine Windhunde halten; andere müssen die, von ihnen auf die Beheege verfolgten und daselbst gefangenen Haasen an den Oberforst- und Wildmeister abliefern. S. Rescr. v. 7. May 1741. S. C. A. I. C. 1492. f.

Windleine ist 1) eine, etwa 12 Ellen lange Leine, die man oben an einer Forkel der Hauptleine anmachet, und an die Erde pflöcket, um die Fücher fest zu halten, daß sie der Wind nicht umreiße. 2) f. Dohnen.

Winterente — A. glacialis, Linn. — macht in der zweyten Familie der Entengattung eine besondere Art aus: Der Schwanz sehr lang und zugespitzt; die Farbe schwarz und weiß; kein Spiegel — des Männchens Schnabel schwarz mit einem breiten orangegelben Bande in der Mitte; des Weibchens Schnabel schwärzlich; der Schwanz kurz und nur zugespitzt, 23 Zoll lang. Sie variirt in der Farbe; denn die jungen Männchen sind an den Seiten des Kopfs weiß, A. hyemalis, Linn. Auch giebt es alte Männchen, welche an

Stirn, Wangen und Kehle statt aschgrau blaßbraun, oft ganz weiß sind. Bey den Jungen sind die schwarzen Theile mehr oder minder braun, oder chokoladefarben, und jemehr braunfledig eine solche Ente ist, desto jünger ist sie. Ihr Wohnort ist der Norden der alten Welt, und in Deutschland sind sie im Spätherbst und Winter auf dem Striche einzeln. Die Nahrung sind Schaalthiere. Man findet das Nest im Gras mit 5 blaulichweißen Eiern. Diese Ente hat auch noch die Nahmen: Eiseute, Weißbacken mit langem Schwanz, Spißschwanz, Langschwanz von Newfoundland und Island, Hanick, Klashanick, Isländische Spieseute, Gabelbusch, Isländerente, Angeltasche und Kirne.

Witternung nennt man 1) die Ausdünstungen der Thiere, durch welche die Hunde ihr Daseyn riechen und ihre Spur finden. 2) Gewisse stark riechende Dinge, womit man die Eiseu bestreicht, worinnen man Raubthiere fangen will, in der Absicht sie dahin zu locken, man vertreibt sie aber gewöhnlich eher davon, als daß man sie herbey lockt. S. Fischotter fangen No. 2. Fuchsfang No. 1. und Marderfang.

Wölfe heißt bey den Wölfen, Füchsen und Hunden, Junge gebären oder werfen.

Wolf — Canis lupus — heißt auch gemeiner Wolf und Wolfshund, welcher letztere **Nah-**

Nahme aber eigentlich dem im Noramonta gezüchteten Wolfe zukommt, wozu man sich wie bey uns des Hundes bedient, nur daß er nicht so gelehrt und so gestickt ist. Das Weibchen heißt Wölfin. Auch: Linné gehört der Wolf in die dritte Ordnung unter die Raubthiere, nach Blumenbach in die siebente Ordnung unter die größern reißenden Thiere und nach einer verbesserten Pennant'schen Eintheilung in die zweyte Ordnung und den zweyten Abschnitt unter die Raubthiere; aber bey allen unter die Gattung Hund als besondere Art mit folgenden Kennzeichen: Der Kopf ist dick; die Schnauze gestreckt, und spizig; die Oefnung der Augenlieder schiefer als beym Hunde; die Ohren sind kurz; die Beine lang; der Schwanz langhaarig und zwischen die Hinterbeine gezogen. Die Länge des Körpers ist drey und einen halben Fuß bis vier Fuß; die Höhe zwey und ein halb bis drey Fuß und der Schwanz oder die Ruthe anderthalb Fuß auch etwas drüber lang; das Gewicht 70 — 90 Pfd*)

*) Von letzterer Größe und Schwere war der im Winter 1798 im Thüringerwalde erlegte.

Der Körperbau ist fast wie beym Schäferhunde; der Hinterkopf aber sehr dick, und besonders an den Seiten mit sehr starken Fleischmuskeln besetzt; von den Augen an läuft die Schnauze wie beym Fuchs auf einmal spizig zu; die

Zehen sind schief liegend, klein und dra. n. und faucheln im Dorsalen; die Ohren kurz, zugestrichen und aufrechtstehend; der Kopf bis fast an die Ohren gestreckt; die Zungenlang und rund; in den Seiten sehen wir drey stark sechsgelappte Vorderzähne, ein einziger große Eckzähne, und auf jeder Seite sechs zackige Backenzähne: der Hals ist mittelmäßig lang und sehr stark, der Schwanz wie beym Fuchs, nur nach Verhältnis über der Mitte etwas dicker, überhaupt nicht so gezüht; sondern mehr dicht behaart, er trägt ihn entweder gerade herabhängend oder mit der Spitze zwischen die Hinterbeine eingezogen; die Beine oder Läufe sind lang und stark, besonders die Füße sehr stark und mit geraden stumpfen Klauen besetzt. Die Farbe ist im Ganzen wolfsgrau, d. h. fuchsgelb und an den obern Theilen schwarz überlaufen, welches die Farbe macht. Manche haben einen zottigen Balg, gewöhnlich aber sind sie nur am Untertritt und an den Hinterkeulen vorzüglich langhaarig. An allen aber sind die Halshaare lang und in die Höhe stehend, besonders an den Seiten. Die Kürschner machen einen Unterschied unter den langhaarigen und kurzhaarigen Völgen und sagen, jensey Polnische und dieses Böhmische Wölfe. Genauer sind die Farben so: die Einfassung des Rachens gelblichweiß; die Bartborsten auf jeder Seite der obern Kinnlade schwarz; die Schnauze bis zu den Augen fuchstroth; von da der Kopf bis hinter die Ohren

grün

ries, d. h. weißlich, schwarz und grau gemischt; die Backen gelblich; die Ohren auswendig fuchsroth mit einzelnen schwarzen Haarspitzen, inwendig gelblich weiß; die Grundwolle am ganzen Leibe aschgrau; am Oberleibe die Mitte der Haare fuchsgelb, die Spitzen schwarz, daher diese Theile das wolfsgraue Ansehen bekommen; die Seiten fuchsroth mit weißgemischt; der Unterleib fuchsgelb; die auswendige Seite der Hinter- und Vorderbeine fuchsroth, letztere vorn schwarz überlaufen, die inwendige Seite der Beine gelblichweiß. Er wechselt im Sommer und Winter seine Farbe, so daß er statt seiner vorhin angegebenen schwarzgrauen Winterfarbe am Oberleibe im Sommer rothgrau, und nicht so dicht und lang behaart ist. Die Wölfin hat einen spizigern Kopf und dünnern Schwanz, ist niedriger und schwächer. Beyde haben einen allen Thieren unaussprechlichen Geruch, der dem Fuchseruch ähnlich, nur weit stärker ist. Man kann ihn lange nicht von den Händen bekommen, wenn man einen Wolf gestreift hat. Geruch, Gehör und Gesicht sind fast schärfer als beym Hunde. Der letztere, welcher in Thüringen gefangen wurde, witterte etliche hundert Schritte weit das Bescheide, das auf einem Zellerfisen lag, gieng gerade von seinem Wege ab und darauf los, ließ sich, und wurde nachher, da er mit dem Eisen durchgieng, todt geschossen. Seine größte Stärke erzeigt er in den Vordertheilen des Körpers, im Halse und in den

Kinnbackenmuskeln, wodurch er im Stande ist, mit einem Haimel im Rachen, ohne anzustoßen, ziemlich schnell davon zu laufen. Von Natur ist er ungeschickt und furchtsam, und nur die Noth macht ihn verschlagen und beherzt. Er flieht die Gesellschaft seines Gleichen, und Wolf und Wölfin haben bloß zur Begattungszeit Umgang mit einander. Nur die Noth verbindet sie zuweilen im Winter in Gesellschaft auf Raub auszugehen. Wellen können sie nicht, aber desto gräßlicher, wie die Hunde, heulen. Ihre Gefräßigkeit zeichnet sie vor allen andern Thieren aus, so daß man vorgiebt, Einer könne ein Reh, Hirschkalb und zwey Schafe auf einmal verzehren, hernach aber auch wieder lange Zeit Hunger leiden. Der Wolf ist über die ganze Erde verbreitet. In der alten Welt fängt er am Polarkreis an, wo er wenigstens im Winter weiß ist, geht durch ganz Europa und Sibirien fort nach China und Persien. In Afrika findet man ihn in Aegypten, Kongo, Abyssinien, und eine sehr große Rasse am Senegal und Vorgebirge der guten Hoffnung. In Nordamerika sind sie häufig. In Deutschland hat man diese grimmigen Raubthiere fast gänzlich ausgerottet; doch giebt es in den Gegenden nach der Schweiz zu, im Oesterreichischen, in Böhmen, Schlesien noch einzelne, von wo aus sie auch zuweilen ins mittlere Deutschland sich verlieren. Seit 1780 wurden in Thüringen 4 geschossen, meh-

er sorgfältig verwahrt. Sie trägt auch, wie die Füchsin, wenn sie in ihrer Abwesenheit die Witterung von Menschen bey ihnen merkt; am Halse von einem Orte zum andern. Sie sind von reißrothlicher Farbe, bleiben bey der Mutter, bis sie sich wieder begattet, und sind nach zwey Jahren ausgewachsen und zur Selbstnahrung tüchtig. Bekommt man junge Wölfe noch blind, so kann man sie an Hündinnen lassen und säugen lassen; diese werden dann ziemlich zahm, doch eigen sie immer Lücke und Mißtrauen. Alte lassen sich fast gar nicht so zähmen, daß man sie herum laufen lassen könnte. So feindselig Hunde und Wölfe sonst gegen einander sind, so hat man doch mehrere Beispiele, daß sie nicht bloß gezähmt sich mit einander belausen, sondern auch im Freyen sich aufgesucht haben. Man weiß sogar, daß die Wastarten davon fruchtbar sind. Man setzt die Lebensdauer eines Wolfes auf 15 bis 20 Jahre. Die Wölfe werden auch in der Freyheit mit der Räube und Tollheit befallen. Der Biß eines wüthen den Wolfes soll ohne Rettung tödlich seyn. Der Jäger erkennt einen solchen an der hin und herwankenden unregelmäßigen Fahrte. Sie fressen sich einander selbst auf. Außerdem geht sie vorzüglich der sogenannte Wolffänger oder große französische Schafhund an. Kleinere Hunde schaukeln vor ihnen und laufen davon. Die Rattern, welche man in ihnen gefunden haben will, sind Spulwürmer. Diese trifft

man auch zuweilen in den Nieren, wie bey dem Steinmarder an, wo eben der abergläubische Sitz jener vorgeblichen Rattern war. Außerdem sollen sie die gelben Hundeslöthe zuweilen in solcher Menge heimsuchen, daß sie die Räube davon bekommen. Von Jägerbeobachtungen mögen folgende hier Platz finden: 1) Wenn der Wolf zur Zeit des Hungers genöthigt ist, in Gesellschaft seines Weibchens zu jagen, so suchen sie die Wechsel auf, und ein Gatte jagt dem andern den Raub zu. Sind ihrer eine ganze Rote, so ziehen sie ebenfalls auf die Wechsel der Thiere, vertheilen sich und treiben sie sich einander zu. 2) Der Wolf soll das Thier, daß er gefangen hat, nicht auf der Stelle verzehren, sondern alle Zeit an einen andern Platz schleppen und so legen, daß der Kopf gegen Morgen und der Schwanz gegen Abend steht. Man behauptet für gewiß, daß man fast alle Skelette so liegend finde. 3) In wolfsreichen Gegenden ist der Wolf da zu suchen, wo die Krähen schreyen, die ihn immer verfolgen. 4) Wenn ein Stück Wild zerissen ist, und es hat es ein Wolf gethan, so liegt gewöhnlich seine Losung dabey. Er frist sich nämlich so satt, daß er den Leib auf der Stelle mehr als einmal leeren muß. 5) Der Wolf fängt, wie die Packthunde, gewöhnlich an der Kehle, wodurch dem Thiere sogleich der Athem benommen wird, und es dann mit leichter Mühe gewürgt werden kann. Die Fahrte ist so groß, als sie eine englische Dogge macht, mehr lang als

als bereit, die zum mittlern Zeihen sehen besonders weit hervor und enger zusammen, und der Hals ist größer, breiter, weiter von den Beinen absteigend, gleichfalls wie ein Herz gestaltet oder länglicher. Der Wolf schauert, und wankt trabend nie in seinem Gange; wenn er gallopirt, so drückt er die Spuren wie ein Hund aus. Wenn er eingekreist ist, so umstellt man ihn entweder mit Netzen, oder läßt ihn durch Treiber an die umstellten Schützen, die ihre Gewehre mit Kugeln geladen haben (Schroten fahren nicht durch), scheuchen. Bei einem solchen Treibjagen muß es aber sehr stille zugehen, und man giebt sich lieber, um allen Tumult zu vermeiden, durch einen Schuß auf den rechten und linken Flügel und in der Mitte den Anfang desselben zu erkennen, weil er sogleich aufsteht, wenn er Geräusch hinter sich merkt. Weiter fängt man ihn in Wolfsfalten, welches große Schwanenhäuse sind, die mit einer in Gänsefett gebratenen Rehleber bedeckt und mit einem Ameisenhaufen überschüttet werden; in Wolfsgruben, in welche man ein junges Schwein steckt, das schreyt, und ihn dadurch zu seinem Untergange herbeylockt; auch mit anderer Kirrung. Sie wird mit Baumästen und Stroh bedeckt, und man trifft auf dem Thüringerwalde solche verfallene Wolfsgruben noch in Menge an. In Wildnissen ist er wohl von der Natur bestimmt das Gleichgewicht unter den nützlichen Thierarten zu erhalten. Der Balg ist ein gutes

Felzwerk, das besonders die Jassen nicht leicht angehen. Man macht Wildschuren, Mäße, Hühnerdecken, Fußböden u. dergleichen; sie zu Verkleidungen schenken. Die weißen sind vorzüglich beliebt. Aus Polen, Rußland, Frankreich, Virginien u. dergleichen men sie in die Kürschmachers. Das weißgahne Leder giebt die erhabene Pauken- und Trommelfelle, Handschuhe und andere Sachen. Die großen Eßigkürsch braucht der Kahlter, Goldschmied, Kupferstecher, Vergolder u. Buchbinder zum Glätten und Polieren. Man soßt sie auch den Kindern mit überneuten Stielen ein, und läßt sie zum leichten Durchbrechen der Zähne davon beißen, welches aber andere Zähne und Steine auch bewirkt. In der Medicin benutzte man nichts mehr von ihnen. Das Fleisch, das sogar die Hunde verabscheuen, essen nur die Kalmücken, Tungusen und die ärmsten Lappländer. Woffit über seinen Roth geschüttet und die Schafe damit betröpfelt, soll sie vor seinen Anfällen sichern. Da es, nach der Nahrung zu theilen, eines der schädlichsten Raubthiere ist, so verdient es auch in kultivirten Gegenden keine Schonung, es ist daher in mittlern Deutschland ein allgemeines Aufgebot der Jagdleute gewöhnlich, wenn es sich spüren läßt. In Gegenden, wo es noch Wölfe giebt, muß sich der Mensch durch Feuerausschlagen, helles Klirren oder Pfeifen oder Instrumenten, und der Reute und Fuhrmann durch Rasseln mit Ketten

etten vor ihm zu sichern suchen. in nachgeschlepptes Strohseil soll n schon von dem Reuter ver- zeuchen. Er scheut auch aufge- annte Seile, die über Hecken zogen sind. In der Jägerspra- e braucht man die gewöhnlichen usdrücke. Außerdem hat er an n Läufen keine Nägel, son- n Klauen. Die Eckzähne eissen — Fänge. Das Fell — a l g, auch Decke. Der schwan — Ruthe oder Stan- arte; die Spitze desselben — lume. Er trabet — geht icht. Geht flüchtig — läuft icht. Ist auf dem Raube ge- esen. Reißt oder wirft das hier. Frißt den Raub. Hat nen Bau oder Lager; liegt nd hat keinen Stand. Er wird estärkt durch die Neuen p. h. neuen Schnee). Sie be- atten sich nicht — sondern ran- en oder rollen, streichen der belaufen sich. Die Wöl- n setzt sich nicht — sondern ölst. Er wird todt geschla- en. Nicht abgezogen, sondern — gestreift. Er hat sich durch- geschnitten (wie der Luchs, Dachs oder Biber) wenn er sich durchs Reh gebissen hat. Mehr- ere Wölfe zusammen — eine Kotte Wölfe. Der Wolf wird war zur Mitteljagd gerechnet; nach den Chursächß. Gesehen aber mögen sie doch von einem jedwe- den, auch der nur die Niederjagd hat, nicht allein gefällt werden, sondern es sollen auch dem, so den Wolfsbalg in die Wildmei- sterei, worunter die Reviere ein- bezirkt, einliefert, jederzeit all- da 2½ Thlr. zur Ergölichkeit ge-

reichet werden. s. Mand. vom 8. Nov. 1717 C. A. II. S. 611 und nach dem Mand. v. 11 Octbr. 1693. ebend. S. 583 werden die Wolfsjagden aufgehoben, und den Forstbedienten und andern frey gegeben, Wölfe zu schießen, dafür sie aus dem nächsten Am- te für jedes Stück 10 Fl. bekom- men.

Wolfsart ist die Gattung von Schweißhunden, die als Bastarte von einem zahmen Wölfe und einem Hunde fallen, und auch solche Hunde nennt man so, die geizig im Fressen und beißig sind.

Wolfsseisen oder Wolfs- falle ist weiter nichts, als ein Schwanenhals, der aber noch ein- mal so stark seyn muß, als zum Fuchse; übrigens wird mit dem Wolfsfange dabey ebenso verfahren, als beym Fuchsfange gezeigt worden. Man kann auch Wölfe in rechten starken Stangenei- sen und Schlagbäumen, auch junge Wölfe in starken Zeller- eisen fangen. Die beste Schlep- pe dazu ist Wildpret oder Reh- gescheide, und der beste Brocken an den Abzug ein Stückchen Rehwildpret in Gänsefett ge- braten.

Wolfs garn, Wolfeneze sind Reze zur Wolfsjagd. Ein solches Reh muß 40 doppelte Waldschritte stellen, und wird von sechsfadenigen hängenen Gar- ne, 20 Maschen hoch, wovon jede 5 Zoll ins Gevierte hält, gestrickt. Die Leinen sind von glei-

gleichem Barne, Daumens stark. Die Ober- und Unterleinen gehen an jedem Ende 6 Ellen vor, und werden an Haken und Hefstein fest angeschlungen. Diese Hefstel und Haken sind von Weißdorn- oder weißbüchenem Holze.

Wolfsgarten ist ein stark verdünnter Platz in einem Walde zum Fange der Wölfe angelegt. Man wählet dazu in einem Walde, wo es viel Wölfe giebt, nach Fig. II. einen runden Platz, der 10 bis 12 Klaftern im Umfange hält, macht rings herum einen Zaun von starken eichenen Pfosten, daß kein Wolf oder Fuchs heraus kann, und läßt an einem Orte eine Oeffnung mit einer starken Thüre versehen. In der Mitten bauet man einen Stall, etwa auf vier Schaaf, so hoch, daß ein Schaaf ohne Anstoß hineingehen kann. Um die Schaaf den Wölfen sichtbar zu machen, darf dieser Stall von unten her nicht verschlagen seyn, muß aber, um die Schaaf vor der Kälte zu verwahren, mit viel Wierstroh und hinlänglichem Futter versehen seyn. Eine Elle von dem ersten Zaune macht man einen zweiten, so daß ein Pfahl den andern gegen über zu stehen kommt. In den äußersten Zaun wird gegen der innern versperrten Thüre über, von B bis A auch eine Thüre, eine Elle weit gemacht, und bey A eingehangen, auch wird eine Thüre von leichten Brettern von B bis C eingehangen, und nebst der vorigen in

B. a, mit Kloben, Leinchen und Gewichten so zugerichtet, daß wenn ein Wolf nur ein wenig an die Thür B. C. stößt, sich diese öffnet, und die äußere schließet, und wenn er bis an die Thür G gehet, so öffnet sich diese, und die Thür F schließt sich dagegen. So kann man viel Wölfe und Füchse schießen, wenn man sich anstellt.

Wolfsgrube ist eine in die Erde gemachte tiefe Grube, welche mit allerley Reißig und Tangeln bedeckt ist, in deren Mitte eine glatt gehobelte Stange steht, auf welcher oben ein kleines Rad und auf dasselbe ein Lamm gebunden wird. Um die Grube herum wird ein lebendiger Zaun gemacht, damit der Wolf nicht vorbeys kann. Dieser wird durch Schleppen in die Gegend gelockt, wenn er nun kommt und das Lamm schreyen höret, und in der Folge siehet, so springet er darnach, kann es aber nicht erreichen, sondern fällt herunter auf das Reißig und mit demselben in die Grube. Hier wird er entweder getödtet, oder lebendig heraus genommen; letzteres geschieht, indem man ihn in eine starke Kette beißen läßt, und diese im Genick fest zu macht, daß man ihn daran führen kann. Oder man läßt ihn in einen, wie eine Krücke gestalteten Knebel beißen, läßt den Wolfelasten hinunter, drückt ihn mit einer Gabel im Genick nieder, öffnet sodann die Thür des Kastens, schiebt ihn zuerst mit dem Hintertheile hinein, läßt ihn

ihn von der Gabel loß, brückt ihn mit der Thür auf den Hals, und ein anderer schiebt ihn mit der Krücke hinein; da man die Thür zumacht und den Kasten heraus zieht.

Wolfsjagd ist unter Wolf befindlich.

Würgen sagt man, wenn Wölfe, Füchse oder Hunde sich untereinander, letztere auch andere Thiere beißen.

Würger oder Neuntöchter ist in der Ordnung der krähenartigen Vögel eine besondere Gattung, aus welcher bey uns der gemeine, graue, rothköpfige, und rothrückige Würger oder Neuntöchter vorkommen.

Wuth ist wegen ihrer üblen Folgen, auch in Rücksicht der Menschen, die schlimmste aller Hundekrankheiten, deren Kennzeichen unter dem Worte Hund nachzulesen sind. Wegen der von einem tollen Hunde gebissenen Menschen, sagen die Chursächs. Gesetze in dem Mandate wegen dem Herumlaufen und der Wuth der Hunde v. 7. Sept. 1782. folgendes: Wenn einer von einem tollen Hunde gebissen worden ist, so soll er ohne alle Zeitverhängniß an einen Medicum oder Chirurgen sich verwenden. Folgende Mittel sind dawider zu gebrauchen: 1) Die Wirkung des Bisses dieser rasenden Thiere ist gar sehr verschieden, indem sich selbige bey einigen geschwind, bey

einigen ungleich später, ja sogar erst nach etlichen Monaten oder Jahren, zu äußern pfleget, nachdem die Wuth bey dem beißenden Thiere im stärkeren oder schwächeren Grade, und der Körper des Gebissenen zu Aufnahme und Verbreitung des Giftes mehr oder weniger geneigt gewesen ist. Man hat daher auch die geringste Beschädigung von einem tollen Hunde nicht für unbedeutend anzusehen, sondern zu Abwendung aller daher zu besorgenden traurigen Folgen, alle möglichste Vorsicht anzuwenden, und schleunigst Hülfe zu leisten. 2) Die Kennzeichen, aus welchen, daß ein Mensch von einem tollen Hunde gebissen, das Gift des wüthenden Thieres dem Körper des Menschen wirklich hergebracht, und mit dessen Säften in Bewegung gesetzt werden, zu urtheilen ist, sind folgende: Der Ort, welchem der Hund das Gift hergebracht hat, fängt an zu schmerzen; dieser Schmerz wird nach und nach stärker, er verbreitet sich in die benachbarten Theile, die Wunde, welche sich sehr oft in den ersten Tagen sogleich von selbst schließet, und daher den Verdacht eines mitgetheilten Giftes benimmt, fängt an aufzuschwellen, die Lippen derselben werden roth, sperren sich auseinander, und es fließet eine scharfe, fleischfarbige Sauche aus der Wunde, der Kranke empfindet große Müdigkeit und Schwere durch den ganzen Körper, er ist zu aller Arbeit verdrossen, beständig unruhig, traurig, auf-

setzt.

get und suchet die Einsamkeit. In diesem Zustande befinden sich viele Kranke eine geraume Zeit, ohne daß die Zufälle schlimmer werden. Wenn aber in der Folge der Zeit das Gift wirksamer wird, bekommen selbige große Herzensangst; sie holen tief und sehr schwer Athem, thun schüchtern, bekommen, obschon nicht alle, doch die meisten fieberhafte Bewegungen, vielen Durst, können nicht schlafen, verlieren den Appetit zum Essen, verabscheuen bey allem Durste das Wasser, und alles andere Getränke, ja alle Feuchtigkeit. Unter solchen Umständen nähern sich solche unglückliche Kranke dem schauervollsten Zeitpunkt; da sie anfangen, gleich wie der rasende Hund, die trockene, ganz bleifarbig gewordene Zunge aus dem brandigen Halse heraus zu stecken, zu geifern, den schaumigten Speichel, der eben so ansteckend, als das Gift des toten Hundes selbst, und dessen Einhauchung oder Befleckung daher sorgfältigst zu vermeiden ist, um sich herum zu sprudeln, eine galligte Schärfe durch Erbrechen von sich zu geben, mit den Zähnen zu knirschen, nach den Umstehenden, die sie doch vorher selbst wohlbedächtig warnen, zu beißen, oftmals wie ein Hund zu bellen, und da sie jetzt den höchsten Grad der Wasserseuche erreicht, so bekommen sie blos von Erblickung des Wassers, noch mehr aber, wenn sich Jemand ihnen mit etwas Flüssigen nähern will, Bittern über den ganzen Körper und die heftig-

sten Zuckungen, in welchem traurigen und schrecklichen Zustande sie dann elendiglich ihren Geist aufgeben. 3) Bey der Cur eines durch den Biß eines tollen Hundes beschädigten Menschen ist Nachstehendes zu beobachten: 1) Vor allen Dingen muß die Wunde mit einem glühenden Eisen gebrennet, oder auf dem Orte, wo die Verletzung geschehen ist, so tief als es möglich ist, geschröpft werden, worauf man die Wunde mit scharfen Weinessig, in welchem etwas Küchensalz aufgelöst worden, recht rein auswäscht, sie mit warmen Essig bäheth, sodann ein Digestiv, oder andere Reiz und Ecyter machende Mittel, welche man um die Eiterung zu befördern, mit spanischen Fliegenpulver vermischt, anwendet. Diese Ecyterung muß wenigstens 14 Tage bis 3 Wochen, auch nach Erkenntniß des Arztes oder Chirurgi, noch länger unterhalten werden, damit der Verbreitung des Gifts sowohl Einhalt gethan, als dessen Auswurf durch diese eiternde Wunde ungemein befördert werde. Das Ueberlassen wird den vorwaltenden Umständen und den Grade des Fiebers gemäß veranstaltet und wiederholet. 2) Ausser dieser unumgänglich nöthigen Behandlung der Wunde, sind dem Patienten täglich etliche reizende Klistiere zu setzen, wodurch theils die Reinigung des Darmkanals, theils die so nöthige Ableitung der Säfte, von den obern nach den untern Theilen erhalten wird. Ein Wundarzt kann sich hier zu nach-

nachstehender Formel, in Erman-
gelung eines anordnenden Medici
bedienenen.

R. Tartari Emetici gr. vi.
Salis Amari Sedlic. Zij.
Oxym. Simplic. Zij.
Aqu. Fontan. 3x.

M. D. S. Zum Klystire, wel-
ches lau zu appliciren.

3) Ferner ist erforderlich, den
Kranken sogleich von Anfang der
Krankheit und ehe sich die Was-
serseuche einfindet, Baden zu
lassen, welches täglich eine Stun-
de hindurch geschehen kann. Man
hat dabey die Vorsicht zu ge-
brauchen, daß das Bad anfangs
milchlau sey. So bald der Pa-
tient einige Zeit in diesem lauen
Wasser gesessen, schöpft man da-
von aus, und gießet nach und
nach so lange kaltes zu, bis das
Wasser zuletzt ganz kalt wird,
und der Patient zu zittern an-
fängt, da er sodann noch 6 bis
8 Minuten in demselben zu ver-
bleiben hat. 4) Hiernächst sind
alle wärme Stuben schlechter-
dings zu vermeiden, und ist der
Kranke lieber in eine der Son-
nenhitze so wenig als möglich
ausgesetzte Kammer zu bringen,
deren Fußboden öfters mit Eßig
zu sprengen, oder wenigstens
frische Aeste von Birken, Eßern
und dergl. zur Kühlung in sol-
cher aufzustellen. 5) Auch ist,
wie in allen Krankheiten, so auch
bey dieser sehr nöthig, die Wa-
sche des Kranken auch öfters zu
verwechseln, und ihm ein durch-
schwitztes Hemde oder Bettüber-
zug, ob man es schon getrocknet,
nie wieder an- oder überzugie-

hen, bevor es nicht wieder rein-
gewaschen ist. Endlich muß man
sich 6) wohl in Acht nehmen,
daß man den ohnedieß schon
furchtsamen, betrübten und nie-
geschlagenen Patienten durch un-
überlegte Vorstellung der Ge-
fahr, in der er sich befinde, und
derer ihm vielleicht bevorstehen-
den annoch ungleich traurigen
Auftritte, nicht noch mehr nie-
derschlage. Vielmehr muß man
sich bemühen, selbigen nach allen
Kräften zu trösten, ihm einen
Muth zu machen, und durch
wiederholte Versicherungen der
balbigst zu hoffenden Besserung
aufzurichten. Was die inner-
liche Behandlung solcher Patien-
ten anbetrifft, so giebt man den
Kranken a) sofort in den ersten
48 Stunden eine Dosis der auf
Verordnung des Sanitäts-Col-
legii, in den Apotheken einge-
führten, bey vielen dergleichen
Vorfällen bereits wirksam befun-
denen Lattwerge von Maywür-
mern. Die Dosis dieses Mit-
tels ist nach dem Alter und son-
stigen Beschaffenheit des Kör-
pers abzumessen, und ungefäh-
r nachstehendermaassen zu reichen,
als: einem Patienten

von 1-2 Jahren bis 20 Gran.

— 2-5 — — 20 Gran bis
½ Quent.

— 5-10 — — 2 Scrup.

— 10-20 — — 1 Quent.

— 20-30 — — 1½ —

— 30-80 — — 2 —

Wenn ein annoch säugendes Kind
von einem tollen Hunde sollte
gebissen werden, nimmt bloß die
Mutter eine ihrem Alter ange-
messene Dosis von dieser Latt-
werge.

werge. Diese Gabe des Medicaments muß der Chirurgus jedoch den Kranken auf dem Lande, die mit diesem Gewichte nicht bekannt sind, deutlich bestimmen. Je mehr die Erfahrung gelehret, daß diese Lattwerge theils durch den Schweiß, theils und vorzüglich durch die Uringänge wirke, und von allzu reichlichen Gaben derselben großes Brennen bey dem Uriniren verursacht werden, auch wohl gar der Harn mit Blut vermengt abgegangen sey, desto mehrere Vorsicht will in Bestimmung der Gabe überhaupt, noch mehr aber deren Wiederholung nöthig seyn, wie denn solche nur eine höchstens zweymal, und dieses gleich im ersten Anfang der Krankheit gegeben wird. Auch ist hierbey annoch zu erinnern, daß der Kranke nach Nehrung dieser Lattwerge, sich 24 Stunden alles Essens enthalten müsse. Sey sich ereignendem Durste wird ordentlich, oder Hollunderblüthen-Thee zu trinken gegeben. Hierbey muß er sich die ersten 12 Stunden im Bette halten, den Schweiß wohl abwarten, und sich nach 24 Stunden ein reines Hemde anziehen, auch das ganze Bette ändern, überhaupt oder die ganze Kurzeit über, die äußere kalte Luft vermeiden, und an einem temperirten Orte bleiben. Wie aber b) bey dieser Krankheit, die der Entzündung wechende Kurart allen andern um deswillen vorzuziehen, weil sich in der Folge der Krankheit ein wirklich faules Entzündungsfeber dabey einfindet, auch bey

sich einstellender Wasserscheu des Halses, wie in der brandigten Bräune, ingleichen die Hirnhäute im höchsten Grade entzündet sind, so giebt man zu dem Ende die folgenden Tage, nachdem die Maywürmer Lattwerge gebraucht worden, ganz gelinde laxirende, dabey doch kühlende, mit Brechweinstein versetzte Mittel, um die ersten Wege in der Zeit von der scharfen Galle und faulenden Unreinigkeiten zu entleeren, deren Dosis zu vermehren, oder zu vermindern ist, nachdem solches die darauf erfolgende Wirkung erheischet. Erfahrene Aerzte werden dergl. auf mancherley Art anzuordnen wissen. Den Wundärzten aber kann nachstehende Formel dießfalls zur Vorschrift dienen:

R. Tartari Emetic gr. viii.
Nitri depurat. Zij.

Salis Mirabil. Glaub.

Roob. Sambuci

Oxym. Scillit. aa. Zij.

— Simplic. ℥vi.

M. D. S. Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu geben, bis hinlängliche Wirkung erfolgt. Der Kranke kann hierauf jedesmal ein paar Tassen Thee, oder ganz dünne Hasergrütze trinken. Wenn diese Dosis sowohl von oben, als unten 2 bis 3 mal täglich wirket, kann man dabey stehen bleiben, wo aber nicht, muß man selbige verstärken, oder, so sie stark wirket, vermindern. Mit diesem Mittel hat man die ersten 8 bis 9 Tage fortzufahren. c) In Ansehung der hieby zu beobachtenden Diät, hat sich der Kranke aller Fleisch-

Fleischspeisen, grober, schwer zu verdauender, oder viele Blähungen machender Gemüse zu enthalten, und sich vielmehr säuerlicher Früchte und Gewächse, als des gekochten, frischen, oder gebackenen Obstes, Pflaumen, rother Rüben, saurer Kirschen, und wenn es die Jahreszeit mit sich bringt, alles frischen Obstes und der Weinbeeren zu bedienen, alles hitzige Getränke, als Brandwein, Wein und Bier bey Seite zu setzen, und lauter säuerliche Getränke, als die Brühe von Holzapfeln, Mollen, Wasser mit Weinsteinrahm, und am besten Wasser mit Eßig, der doch aller Orten zu haben ist, zu trinken, wie denn auch zum Thee, Citronensaft, oder etwas Weineßig kann gethan werden. d) Je größer der Abscheu für dem Wasser und Getränke bey den Patienten wird, desto mehr muß man sich, jedoch mit möglichster Behutsamkeit, daß man nicht von ihnen gebissen werde, bemühen, ihnen solches auch mit Gewalt bezubringen, die oben No. 2. anbefohlenen Klystiere wiederholen, und weil hier die Entzündung der Hirnhäute und des Schlundes auf höchste gestiegen, so muß man auch solche zu vermindern, dem Kranken zu wiederholten Malen, und selbst bis zur Ohnmacht, Aderlassen, auch zur Arteriotomie, welche in dergleichen verzweifeltten Fällen von dem wesentlichsten Nutzen ist, schreiten, den Kopf abschneiden, solchen öfters mit kaltem Wasser begießen, auch ganz kalte Bäder anwenden, ein Haarseil setzen oder schöpfen, und auf

die geschöpfsten Orte, Basiliken- salbe, die mit spanischen Fliegenpulver geschäft ist, legen, um eine starke Eiterung, die viele Tage zu unterhalten ist, zu befördern, überhaupt dem größten Uebel die wirksamsten Mittel entgegenzusetzen, und eine vielleicht vielen befreundliche Kurart, dem gewissen Tode des Kranken vorziehen. Daher man auch den Kranken die oben sub b) angezeigte Lattwerge nebst Getränke in diesem gefährlichsten Zeitpunkte der Krankheit mit Gewalt bezubringen suchen, und damit anhalten muß, bis sich eine wirkliche Besserung zeigt. Der darinnen enthaltene Brechweinstein, thut in diesem Falle die herrlichsten Dienste, da er nicht nur die in der Gallenblase zurückgehaltene, faulicht gewordene Galle, als die nächste Ursache des Brandes ausführet, sondern auch durch das verursachte Erbrechen, die im Munde, Halse und Unterleibe befindliche, mit faulem und zähem Schleime angefüllte Drüsen ausleeret, in seiner flüssigen Gestalt mit den Säften des menschlichen Körpers in die feinsten Gefäße bringet, und die Nerven, welche die Fäulniß unempfindlich gemacht hatte, durch seinen Reiz erschüttert, sie wieder empfindlich macht, und dadurch die stockenden Feuchtigkeiten, als den Zunder der Fäulniß, in Bewegung bringt, und sie zum Ausgange geschickt macht. Man vermindert den Gebrauch dieses Mittels, sobald der Kranke selbst wieder trinket, setzt es doch nie ganz bey Seite, bis man überzeugt ist, daß sich der Kranke aufer

ser Gefahr befindet. 4) Wenn sich nun der Patient bessert, und theils durch die Krankheit selbst, theils durch die mit selbigem vorgenommene ausführende Kurart, sehr matt und kraftlos worden, muß man ihn durch nahrhafte und erquickende Mittel wieder zu stärken suchen. Man reicht ihm zu dem Ende Fleischbrühen, in welcher allerhand Sattengewächse, oder mehlichte Zugemüse, als Reis, Gerstgrün, Grieß, Hafergrübe und dergleichen, gekocht werden, und läßt ihn täglich eine mäßige Portion Wein trinken, doch muß man ihm vom Anfange der Genesung allzeit wenig auf einmal, und lieber öfters zu oft reichen. 5) Da aber die bei daher beschriebene Heilungsmethode, wie ein jeder von selbst einsehen wird, ohne Beyhülfe eines Medici oder wenigstens eines Chirurgi, dergleichen höchst doch immer in der Nähe zu haben, nicht betrieben werden kann, so wohl bey solchem traurigen Misfalle, wegen der öfters sehr schnellen Wirkung des Giftes vom hiesigen Hundesbiß, nicht die geringste Zeit zu verabsäumen

ist, dem Kranken zu Hülfe zu kommen, so können Leute auf dem Lande bis zu Erlangung eines Chirurgi und der vorgeschriebenen Mittel, indeß folgendes mit dem Patienten vernehmen: Es sey eine offene Wunde da, oder nicht, so reibe man selbige, oder den Ort, wo man die Spuren des Hundesbisses findet, recht stark mit Salz- und Weinessig, oder auch, in dessen Ermangelung, mit scharfem Bieressig, schlage in warmen Essig getauchte Tücher fleißig um, und lege sodann einen der Länge lang geschnittenen Hering, mit der innern Seite auf den Ort. Man lasse den Kranken nicht in die kalte Luft gehen, sondern lieber zu Bette legen, in etlichen Stunden nicht essen, aber häufig Thee mit Essig, oder Essig und Wasser trinken, gebe ihm öfters einen Eßlöffel voll Hollunder- saft mit Essig vermischt, lasse ihm den erfolgenden Schweiß gut abwarten, und nach solchem ein trockenes Hemde anziehen, indeß der Chirurgus wohl zu erlangen seyn, und das fernere Nöthige nach dieser Anweisung besorgen wird.

3.

Baunammer ist eine besondere Art der Gattung **Ammer**, woselbst sie beschrieben ist.

Baunkönig oder **Baunsänger** — *Sylvia s. Motacilla Troglodytes* — ist in der Gattung **Sänger**, und zwar in

der dritten Familie eine besondere Art, die auch noch folgende Namen hat. **Schnee- Winter- Nessel- Schupp-** und **Schlupfkönig**, **Winter- baunkönig**, **Baunschlupfer**, **Baunschliefen**, **Baunschnur**, **Nettelkönig**, **Baunkönig**,

ning, Meisenkönig. Die Kennzeichen der Art sind: Er ist schmutzig, rostbraun, undeutlich dunkelbraun in die Quere gestreift; der Schwanz etwas keilförmig und wie die Flügel schwarz bandirt. Der Zaunkönig ist einer der kleinsten Europäischen Vögel. Er ist drittheil Zoll lang, wovon der Schwanz ein und einen Viertel Zoll wegnimmt. Der Schnabel ist fünf Linien lang, vorn etwas niedergebogen, oben schwarzbraun, unten gelblichweiß, inwendig gelb; der Augenstern nussbraun; die Füße sind graubraun; die Beine sieben Linien hoch. Der Oberleib ist schmutzig rostbraun, undeutlich dunkelbraun in die Quere gestreift; über die Augen läuft ein röthlichweißer Streifen; die dunkelbraunen Flügel und der rostfarbene Schwanz sind schön schwarz gestreift; der Unterleib ist röthlichgrau, am Bauche weiß, an den Seiten und am After schwärzlich in die Quere gestreift. Das Weibchen ist kleiner, rothbrauner, oben und unten mit undeutlichen Querstreifen besetzt und hat gelbliche Füße. Es ist ein munteres keckes Vögelchen, das nicht viel fliegt, aber alle Winkel und Ritzen durchschlüpft. Der Schwanz steht immer etwas in die Höhe, und es macht stets Verbeugungen. So klein es ist, so stark ist seine Stimme. Man hört es im härtesten Winter singen, wenn nur die Sonne scheint. Die Locktöne sind Zrr! Zrr! Zegererr! Es läßt sich, wiewohl mit vieler Mühe zäh-

men. Es bewohnt die Vögelchen das nördliche Europa und Amerika. Allenthalben, wo bergige und waldige Gegenden sind, da ist es auch anzutreffen. Man sieht es sowohl in den tiefsten Gebirgen, als in der Nähe der Häuser. Ob es gleich im Herbst und Winter bis zum April umherstreift, so ist es doch ein Standvogel, der die härtesten Winter bei uns aushält, und immer lustig und munter ist. Seine Nahrung sind Insekten, die sich in Hecken, Ritzen und Klüften verbergen. Im Herbst genießt es auch rothe und schwarze Hollunderbeeren. Im Winter verfolgt es die in Winkeln verborgenen und schlafenden Insekten, Fliegen, Spinnen u. dergl. und fliegt deshalb auf die Böden, in die Ställe, Scheunen, Keller, Holzstöcke u. s. w. Sie nisten des Jahres zweymal. Jeder Schlupfwinkel und verborgene Ort ist ihnen zu ihrem Neste bequem. Man findet es daher in Erdklüften, unter und in hohlen Wurzeln, in Baumhöhlen, in dichten Hütten, unter den Dachsparren, in dichtgewachsenen Gehägen u. dgl. Es ist groß, oval, ganz zugebaut mit einer Oeffnung zur Seite oder oben, und besteht äußerlich aus Erdmoos und ist inwendig mit Federn, Haaren und Wolle ausgefüttert. Das Weibchen legt 6 bis 8 kleine weiße, verloren rothpunktirte Eier, und brütet sie mit dem Männchen gemeinschaftlich in 13 bis 14 Tagen aus. Die Jungen sehen rostfarben, schwarz und weiß.

weißgesprenkelt aus. Sie müssen oft einen jungen Kuckuck Platz machen, welches große Thier die kleinen Alten mit der größten Sorgfalt pflegen. Füchse, Wiesel und Iltisse zerstören die Brut; auch das Kuckuckswelchen das sein Ey einschleibt, und die übrigen herauswirft. Man fängt sie im Herbst in Spreuten und im Winter im Reisfentkasten, worein man als Lockspeise ein Paar Mehlwürmer thut. Obgleich ihr Fleisch sehr wohlschmeckend ist, so sind sie doch zu klein, als daß man einen großen Nutzen davon ziehen könnte. Nützlicher werden sie durch Verfolgung schädlicher Insekten, besonders des weißen und schwarzen Kornwurms auf den Fruchtböden.

Zeichnen heißt heym Leithunde, wenn er die Fährte genau mit der Nase zeigt, wo sie ist.

Zeißig, Erlensinke, f. unter Fink.

Zerwirken, Zerlegen, heißt einem aufgebrochenen Stücke Roth- Schwarz- oder Rehwildpret die Haut abzuziehen, und das Wildpret in Stücke theilen. Beym Hirsche wird zuerst das Geweihe ausgeschlagen, sodann bey dem rechten Vorderlaufe angefangen, die Haut bis an den Brustkern aufzuschärfen, dann diese allmählich abzustossen, und so fährt man mit den übrigen Läufen fort, doch läßt man die Blume am Bimmel und die Haut am Kopfe bis an die Augen, Ohren und das Maul. Nun werden die beyden

Bügel abgelöst, dann das dünne Wildpret von den Reulen bis an die Rippen entzweygeschnitten, alsdann mit der Hand hinein gegriffen, die zum Jägerrechte gehörenden drey Rippen abgezählt, mit dem Messer von außen durchgestochen und dieselben hinunter bis zum Rückgrate und herauf bis zum Brustkerne von beyden Seiten abgeschnitten, hierauf schlägt der Jäger mit dem Weidmesser zuerst den Brustkern und darauf das Rückgrat durch, und legt das Jägerrecht bey Seite. Dann schneidet man auf den Rippen im Mittel weg zu beyden Seiten vorwärts das Wildpret entzwey, und löst den Brustknochen ab. Hierauf schneidet man dem Eisknochen etwa 1 Finger breit hinunter, sticht die Augen aus, schneidet die Keule vom Zimmel ab, und schneidet den Rückgrat vom Zimmel, so ist das Wild zerwirkt.

Zerwirkknicht ist bey hohen Höfen derjenige Jäger, dem das Zerwirken des Wildprets obliegt, und der dafür das Jägerrecht und die Haut bekommt, auch die Anwartschaft auf einen Forstdienst im Lande hat.

Zeugdupliren heißt bey der Saujagd, die Prellnase im Laufe inwendig an den Luchern herum stecken und scharf anziehen, damit sie die Sauen von den Luchern abhalten, daß sie sich nicht durchschlagen können.

Zeughauß ist dasjenige Gebäude auf einem Jägerhofe, worinnen alle Lucher, Zeuge, Wa-

gen

gen und andere zu den Jagden nöthigen Geräthschaften aufbewahrt werden.

Zeugjagen heißt ein Jagen, wenn Hirsche und Wildpret mit Tuchen eingestellet und Herrschaft zum Erlegen vorgejagt werden.

Zeugknecht ist ein dem Wagenmeister untergeordneter Jagdbedienter, der ihm beym Stellen und Abnehmen des Zeuges behülflich seyn, wenn es gestellt, darauf Acht haben, und wenn etwas daran einfällt oder zu schlapp wird, solches wieder in Stand setzen muß.

Zeugwagen ist ein starker Wagen, warauf man bey Jagden das Zeug aus dem Zeughause an den Ort der Jagd und von da wieder zurück in das Zeughaus fährt. Er besteht aus einem großen Kasten, worein die Zeuge gelegt werden, der zu beyden Seiten kleinere Kästen zum Fortbringen der Forkeln und Hesteln hat. Das Ganze ist mit einer Plane überzogen.

Ziehen sagt man vom Hirsche, wenn er langsam geht; aber auch wenn die Vögel streichen.

Ziehmer, Ziemer, Krametsvogel, ist eine Art aus der Gattung Drossel, und daher dort aufgeführt.

Zimmel, Zimmer, Zämer, Zämer, Zämel, Zeimer ist das Hintertheil am Rücken des Roth- und Schwarzwildprets, vom Schwanze bis an die Lende, wo der Rückgradskno-

chen anfängt. Zimmel heiße auch das männliche Glied des Hirschens.

Sirzente — **Anas Circia** — oder **Sommerhalbente**, kleine Kriechente, Schächchen, Biekelchen, Wachtelentchen, Birkelchen, und das Weibchen besonders Grauentchen, gehört mit der wilden Ente zu einerley Ordnung und Gattung als eigne Art, die sich durch folgende Kennzeichen unterscheidet: Der Spiegel auf den Flügeln ist schwarzgrün; über den Augen geht ein weißer Streifen weg; der Schnabel und die Füße sind aschgrau. Sie ist kleiner als die Kriechente, dreyzehn und einen halben Zoll lang, ein und einen Viertel Fuß breit; die Flügel reichen zusammengelegt bis an die Spitze des Schwanzes, welcher zwey und ein Viertel Zoll lang ist. Das Gewicht ist drey Viertel Pfund. Der Schnabel ist anderthalb Zoll lang, gerade, aschgrau, der Nagel schwarz; der Augenfleck rothgelb; die Füße aschgrau; die Schienbeine ein und ein Viertel Zoll hoch. Die oberen Theile von der Stirn bis zum Steiß sind graulichbraun, am Rücken weiß gerändert; über jedem Auge ein weißer Streifen; Wangen und Kehle kastanienbraun; der Vorderhals gelbroth mit dunkelbraunen Rändern; der untere Theil des Körpers gelbrothlichweiß, am Bauche schwarz gefleckt; die Schulterfedern wie der Rücken, die großen längs der Mitte herab weiß und zugespitzt; die

die Deckfedern der Flügel aschgrau; über die Flügel läuft durch die Spitzen der großen Deckfedern ein weißer Streifen; die Schwungfedern sind dunkelbraun; der Spiegel ist schwarzgrün mit schwarzen Rändern und unten weiß eingefast, und wird durch die mittlern Schwungfedern gebildet; der Schwanz dunkelbraun, die äußern Federn weißlich gerändert. Das Weibchen ist etwas kleiner und hat eine Wachelfarbe. Oben ist es aschgraubraun mit rothfarbenem Rande, unten röthlichweiß, am Unterbauche dunkelbraun gefleckt; eine weiße Linie geht über jedes Auge; die Wangen und Kehle sind hellrothfarben und weißgefleckt; der Spiegel ist grün, unten mit einem weißen Bande begrenzt; die Schwungfedern graubraun. In manchen naturhistorischen Schriften wird diese Halbenente als eine Varietät der vorhergehenden Kriekente angesehen; allein dieß kann sie nicht seyn; mehr Aehnlichkeit im äußern hat sie noch mit der Knäckente. Sie ist aber ohnstreitig eine besondere Entenart, und gehört nicht unter die seltenen Vögel. Sie ist nicht sehr scheu, fliegt außerordentlich schnell, taucht sehr geschickt, nicht immer mit dem Kopfe, und schreyt im Aufstiegen Görr! Dieser Vogel besucht die nördlichen Länder nicht, wie die meisten andern Schwimmvögel; er kann daher die Kälte nicht so sehr vertragen. Man trifft ihn in den gemäßigten Theile von Europa und in Asien am Caspischen Meere an. Ob man

ihn gleich an Küsten des mittelländischen Meeres sieht, so scheint er doch mehr das süß Wasser zu lieben und daher Seen, Flüsse und Teiche aufzusuchen. Sie lieben keine große Gesellschaften; man sieht daher in Thüringen vom November bis im März nur Heerden von 4 bis 10 Stück. Sie suchen immer offene Gewässer auf, und lieben daher die Wald- und Bergteiche, in welche warme Quellen fließen, ganz sehr. Im März begeben sie sich wieder an ihre Brutplätze. In Deutschland findet man daher Strichvögel. Ihre Nahrung besteht aus kleinen Fischen, Insekten und Insektenlarven, Sumpf- und Wasserkräutern. Sie gehen auch in die Wiesen auf die Insektenjagd. Sie pflanzen sich auch in Deutschland an den Seen fort. Ihr Nest machen sie gern in einer Höhle, flechten es aus Gras und Schilfhalm zusammen, und füttern es mit Federn aus. Das Weibchen legt 10 bis 14 schmutzig röthlichweiße Eyer, die es in drey Wochen ausbrütet. Ihre Feinde und die verschiedenen Arten des Fanges und der Erlegung sind, wie bey der wilden Ente. Sie sind unter allen Entenarten am leichtesten zu schießen. Ihr Wildpret wird sehr hoch geschätzt.

Zu Baue kriechen heißt, wenn der Dachs und der Fuchs sich unter die Erde verbergen.

Zu Baume fallen sagt man von Birken und Haselhühnern aber steigen oder treten vom

vom Muerhahn, wenn er auf den Baum fliegt.

Zu Felde gehen heißt, wenn das Wildpret des Abends aus dem Holze ins Feld zieht.

Zugleine, heißt bey der Falknerey eine lange dünne Leine, die man dem Vogel an einen Fuß bindet, um ihn damit an sich zu halten, oder zu ziehen, wenn man ihn ruft, bis er völlig abgerichtet ist.

Zugvögel nennet man alle diejenigen Vögel, die den Winter über nicht hier bleiben, sondern im Herbst fortziehen, und im Frühjahr wieder kommen. Wenige Gattungen ziehen auch im Frühjahr fort, kommen im Herbst wieder, und bleiben im Winter, nicht aber im Sommer, hier.

Zu Holze gehen heißt, wenn das Wildpret des Morgens vom Felde ins Holz zieht.

Zu Holze richten heißt, einen Hirsch mit dem Leithunde im Holze auffuchen.

Zu Holze schießen heißt ein Wild anschieszen, das man nicht bekümmert, sondern das im Holze verendet, und von Raubthieren und Vögeln gefressen wird.

Zurückbleiben des Hirschens. s. Erfüllung.

Zustellen heißt, einen Ort, den man durchtrieben hat, dergestalt mit Rehen umstellen, daß das Wildpret nicht wieder hinein kann.

Zwang ist ein Unterscheidungszeichen in der Fährte des Hirschens, da er im Fortschreiten die Schaalen vorne zusammen zwinget, und damit Erde heraushebet, welches das Thier nicht thut.

Zwangtreiben heißt, wenn bey einem Hauptjagen das Wildpret nach dem ersten Treiben enger, und in den Abjagensflügel, eingestellt wird.

Zwinger, s. Fasanenzwinger und Hundezwinger.

Jagd-Kalender oder Verzeichniß

der

jeden Monath bey der Jägerey vorkommenden Geschä

Januar.

Man kann, weil die Wölfe zu Anfange dieses Monats zu Rangen anfangen, Wolfsjagden anstellen, und die Wolfsgruben, besonders bey kaltem Wetter, in guten Stand setzen und erhalten; alle Raubthiere, als Fischotter, Füchse, Marder, wilde Katzen, Iltisse u. deren Bälge jetzt gut sind, bey frischem Schnee ausspüren, und ihre Vertilgung, ehe ihre Fortpflanzungszeit mit dem Frühlinge herbey kömmt, möglichst betreiben. Auch kann man in diesem Monate sich noch mit der Haasenjagd beschäftigen, welches aber der letzte Monat dieser Jagd seyn muß, weil sie im folgenden Monate schon zu sammeln anfangen. Das große Wildpret muß man an solchen Orten im Walde, wo die Sonne hinscheinet, mit Heu füttern, wo nicht viel Heu übrig ist, für die Rohe Aspen fällen, und für die Haasen Birkenreis

zu ihrer Nahrung abhauen, an bequeme Orte Fütterung, die wilden Schweine füttern. Auch muß man jetzt die Ferkel in ihren Gehegen füttern, sie außerdem wenig finden. Man stellet nun auch die Heerde Krammetsvögel und Leimruthen für die Meisen, nicht wenige Schlagwände für Finken, die die Miststätten fallen, welche in jetzige Zeit gefangen, bessere Schläger werden, als die, so man im Frühjahre, Sommer und Herbst fängt. Die Rebhühner fängt man jetzt mit der Schneehaube auf der Saat, wo sie am meisten liegen, und den Schnee davon wegzuscharren suchen. Man muß die Hundeställe durch häufig eingestreuetes und vorgelegtes Stroh warm erhalten, auch die Hunde bey gutem Wetter um die Mittagszeit heraus in den Zwinger lassen. Endlich aber das zu hölzernen Jagdgeräthe nöthige Holz

lz in diesem Monat in Vor-
h anschaffen.

Februar.

In diesem Monate fährt man
t, bey anhaltender Kälte das
thwildpret mit Heu, die
hweine mit Eickeln und wilden
ste, und die Rehe mit Hafer-
oh zu füttern. Den Wölfen
an man bey frischem Schnee
f der Spur nachgehen, auch
t Vertilgung der übrigen Raub-
iere fleißig fortfahren, weil
in ihre Ranz- und Kollzeit ein-
itt; die Haasenjagd hingegen
lle man ein, weil ihre Ram-
elzeit anfängt. Auch fange man
e Raubvögel so viel möglich
eg, ehe sie sich zu begatten an-
ngen. Auf dem Schnee kann
man noch, so lange die Rebhüh-
er sich nicht paaren, mit dem Fan-
te in der Schneehaube fortfahren,
auch kleine Vögel, bis zu ihrer
Begattungszeit, noch ferner fan-
gen, dann aber muß man allen
Fang nutzbarer Vögel einstellen.
Endlich aber alle im Januar an-
gefangene und noch nöthige Ge-
schäfte fortsetzen. In diesem Mo-
nate kann man auch, bey ein-
gefallenen Schnee, Finken, Gim-
pel und Kernbeißer, deren Wi-
derstrich bey gutem Wetter bereits
anfängt, auf den Finkenheerden
in Menge fangen.

März.

In diesem Monate sammeln
die Haasen schon völlig und wer-
den, da auch die Jagdzeit auf-
gehört, nicht mehr geschossen.

Und ob schon Oster-Haasen zu
schießen erlaubt ist; so wird doch
kein auf sein Revier haltender
Jäger Gebrauch von dieser Er-
laubnis machen, denn mit jeder
geschossenen Häsinn bringet er sich
um 12 bis 15 Junge, die sie in
diesem Jahre außerdem noch sehen
würde, und die Kammeler sind um
diese Zeit ein elendes Gericht. In
diesem Monat gehet die Falzzeit
der Auer- Birk- und Haselhüh-
ner an, von der ein fleißiger Jäger
den gehörigen Gebrauch macht. Jetzt
kann man auch wilde Enten, je-
doch der anfangenden Begattungs-
zeithalber, bloß Entvögel schießen;
desto fleißiger aber auf die wilden
Gänse, Trappen, Kraniche,
Störche, Mohrdommeln ic. wel-
che jetzt ihren Wiederzug halten,
Jagd machen. Vorzüglich kann
man jetzt die Schnepfenjagd bey
deren Wiederstriche betreiben, so
wie man auch die wilden Tau-
ben in diesem Monate häufig
findet. Auch kann man Lerchen
auf Lerchenheerden und mit dem
Spiegel, ingleichen andere kleine
Vögel auf ihrem Rückzuge fan-
gen. Jetzt ist es auch Zeit, das,
zu den Bastdornen nöthige, Lin-
denbast einzusammeln, wie nicht
weniger die abgeworfenen Hirsch-
stangen zu suchen.

April.

In diesem Monate muß man
das in den Thiergärten einge-
schlossene Wildpret annoch füttern,
wenn das Laub ausschlägt, die
Sulzen und Salzlecken wieder von
neuem anrichten. Auch fährt man
fort, die Falze der Auer- Birk-
Ka 2

und

und Haselhühner zu benutzen. Jetzt kann man auch Finken und Gereuthlerchen auf dem Striche fangen, auch allerley Lockvögel zum künftigen Herbst einfangen und in die Bauer setzen, und zu Ende dieses Monats junge Amseln und andere Sangvögel zu künftigen Lockvögeln aus dem Neste nehmen.

May.

In diesem Monate fängt man die Leithundsarbeit und die Behängen an, fährt auch fort, die Salzlecken zu erneuern. Man sucht die jungen Füchse und andere junge Raubthiere so wol, als die Nester der Raubvögel, so viel als möglich zu vertilgen, auch schießt man die zahmen Raken, die um diese Zeit in die Felber gehen. Vögel aller Art bleiben jetzt von Nachstellungen verschont, doch kann man die Wachtelhähne, deren ohnehin zu viel sind, wegfangen. Auch muß man anfangen die Raubvögel, die man auf bevorstehenden Herbst, zur Baize brauchen will, ausmausen zu lassen. Man kann auch junge Vögel, die man zur Locke, oder sonst in Käfigen halten will, ausnehmen. Auch kann man alte Vögel, die man zum Gefange haben will, in der Nähe ihrer Nester mit Leimspindeln und Schlagbauern fangen, worin man das Nest mit den Jungen setzt.

Junius.

In diesem Monate nimmt die hohe Jagd ihren Anfang.

Man fährt fort, Wachtelhähne zu fangen. Besonders muß man die Jagd der wilden Gänse und Enten zu betreiben anfangen, junge wilde Tauben ausnehmen, die Käuzchen zum Vogelfange ausnehmen, und den Alten nur ein einziges Junges im Neste lassen, so verändern sie es nicht. Auch nimmt man nun junge Drosfeln, Amseln u. zu Lockvögel auf dem Heerde aus den Nestern. Jetzt ist auch der Nachtigallenfang am meisten zu betreiben. Auch kann man den Staarenfang, den Fang der Meisen mit dem Kloben, und überhaupt den Vogelfang mit Leimruthen zu betreiben, anfangen; den zahmen und wilden Raken muß man fleißig nachstellen, und die Vogelheerde und Dohnerstiche in Stand zu setzen anfangen.

Julius.

In diesem Monate kann man weiter nichts vornehmen, als in den Arbeiten und Geschäften des vorigen Monats fortfahren, und vorzüglich die Nester der Raubvögel zu zerstören sich bemühen.

August.

In diesem Monate ist vorzüglich die Hirschseißzeit, und daher die Hirschjagd mit möglichstem Fleiße zu betreiben, auch nehmen die Parforcejagden ihren Anfang. Das Schweinwildpret ist jetzt noch nicht gut, so wenig als die Haasen und Rehe. Jetzt fängt man an, das wilde Obst zu den Kirrungen und Fütterungen einzusammeln. Der Strich der wil-

wilden Tauben, und mit ihm zugleich die Jagd derselben, fängt nunmehr an. Man fängt nun an, die Teiche fleißig zu untersuchen, und die Reiher, die sich um diese Zeit einfinden, zu schießen; Wachteln zu tyrasiren, und den Fang der Gereuthlerche und anderer kleiner Vögel, deren Strich jetzt angehet, auf dem Finkenheerde und in Sprenkeln zu betreiben.

September.

In diesem Monate zieht sich das Rothwildpret aus den Feldhölzern in die Wälder, und das Hirschbrunfischschießen gehet an. Jetzt werden die Dachse feist, und ihr Fang zu betreiben angefangen. Die Mittel- und Niederjagd fängt nunmehr an, doch thut man wohl, sie in diesem Monate nur mäßig zu betreiben. Um die Mitte dieses Monats fängt der Vogelfang in Dohnen und auf dem Heerde, und zu Ende des Monats der Lerchenstrich an.

Oktober.

Dieser Monat ist der Hauptmonat für das niedere Weidwerk, den Vogelfang und die Mitteljagd. Jetzt betreibt man die Schweins- Reh- und Haasenjagden mit dem größten Eifer, schießt und fängt

Schnepfen, die jetzt ihren Strich haben, schießt und fängt Rebhühner mit dem Treibezeuge, der Vogelfang in Dohnen und auf Heerden, so wie der Lerchenfang mit Tag- und Nachtnezen, ist auch jetzt in vollem Schwange.

November.

In diesem Monate fährt man mit den Geschäften des vorigen fort, so lange die Witterung solche erlaubt. Der Lerchenfang, ingleichen der Vogelfang in Dohnen, so wie aller Fang der kleinen Vögel, deren Strich nunmehr beendigt ist, höret auf.

December.

In diesem Monate wird zum Theil mit den Geschäften des Novembers fortgefahren, doch so, daß die Schweins- und Rehjagd nunmehr füglich unterlassen werden kann, weil die Brunft bey erstern nunmehr vollbracht ist, bey letztern aber ihren Anfang nimmt; theils fängt man bey eintretendem Schnee- und hartem Winterwetter an, die im Januar angezeigten Geschäfte zu betreiben. In allen Monaten und durch das ganze Jahr lasse sich jeder Weidmann die Ausrottung der Raubthiere nach allen seinen Kräften und Vermögen empfohlen seyn.

V e r z e i c h n i s s

aller in Jagdsachen ergangenen Chursächf. Gesetze und
Verordnungen in chronologischer Ordnung.

- 1) Herzog Ernsts und Herzog Albrechts zu Sachsen Landesordnung v. J. 1442. C. A. P. I. S. 12.
- 2) Herzog Morizens Ausschreiben v. J. 1543. C. A. P. I. S. 25.
- 3) Die Landesordn. gemein. Stände des Marggrasth. Oberlausitz, aufgerichtet und beschloßen, die Justiz, Policey, Lehns- u. andere Sachen betreff. v. 20. Nov. 1551. C. A. III. S. 81.
- 4) Churfürst Augusts Ausschreiben v. 1. Okt. 1555. C. A. I. S. 43.
- 5) Desselben Verordn. und Constitutiones v. 21. April 1572. C. A. I. S. 74.
- 6) Desselb. Patent, wegen des Jagens und Schießens allerley Federwildprets v. 26. May 1573. C. A. II. S. 515.
- 7) Desselben Mandat wegen des Federwildprets, solches außer der Zeit nicht zu fahen, noch mit täglichen Schießen dasselbe schein zu machen, v. 4. Febr. 1575. C. A. II. S. 517.
- 8) Desselben Befehl, wie es mit dem Vogelweydwert zu halten. v. 10. Oct. 1576. C. A. II. S. 7.
- 9) Desselben Verbot wider die Wildpretsbeschädiger und Räuber v. 6. July 1579. C. A. II. S. 523.
- 10) Desselben Mandat wider die Wildschügen und Landesbeschädiger v. 9. Januar 1582. C. A. II. S. 524.
- 11) Desselben geschärftes Mandat, daß die Wildpretsbeschädiger mit dem Galgen, und da sie auch dabey freveln und rauben, als Straßenräuber bestraft,

strafte werden, v. 10. Octbr. 1584. C. A. II. S. 526.

12) Christian I. Wiederhofung und Publication obigen Mandats v. 26. Jun. 1587. ebend. S. 529.

13) Desselben Befehl, daß die Bürger- und Bauerhunde zu lähmen, v. 15. Jan 1588. ebend. S. 531.

14) Die erneuerte Landesordnung des Marggrafthums Oberlausitz, v. 6. May 1597. C. A. III. S. 119.

15) Friedrich Wilhelms Mandat des Weidwerks mit der Gule und Leimstange sich zu enthalten, v. 22. März 1598. C. A. II. S. 535.

16) Desselben Mandat wider die Wildpretsdiebe, auch diejenigen, so sie haufen und herbergen, v. 15. Oct. 1599. ebend. S. 537.

17) Oberamts-Patent im Marggrafthum Oberlausitz, wider die Fisch- und Krebsdiebe, Raubschützen und auch diejenigen, so sich des Hezens und Jagens auf anderer Grund und Boden unterfangen, vom 27. März 1602. C. A. III. S. 513.

18) Christian II. Mandat, daß die Wildpretsdiebe mit dem Galgen zu bestrafen, vom 4. Febr. 1603. C. A. II. S. 539.

19) Desselben Mandat wegen des Hezens, Jagens, Hühnerfangens und andern Wild-

pret, vom 16. May 1603. ebend.

20) Desselben Mandat des Voggelfangens außer der Zeit sich zu enthalten, vom 9. April 1604. ebend. S. 541.

21) Desselben Mandat wider zusammenrottirende Wildpretsdiebe, v. 2. July 1605. ebend. S. 543.

22) Desselben Befehl, daß die Unterthanen und Schäfer ihre Hunde, und sonderlich die Schaafrüden im Felde nicht ledig laufen lassen, sondern an Ketten führen sollen, vom 27. May 1607. ebend.

23) Die Erörterung der Landesgebrechen unter demselben, v. Jahre 1609. C. A. I. S. 167.

24) Johann George I. Mandat, daß denen Verordnungen wegen des Hezens, Jagens, Hühnerfangens und Weidwerks, besser als bisher geschehen, nachgelebt werden soll, v. 9. Jun. 1613. C. A. II. S. 545.

25) Desselben Mandat, daß Niemand außer der öffentlichen Landstraße Büchsen tragen, vielweniger solche in Waldungen und Geheegen loschießen soll, v. 9. Jun. 1613. ebend. S. 547.

26) Desselben Rescript an den Wild- und Forstmeister zu Söllichau, das Verfahren wider diejenigen betreff. so ihre Hunde nicht klöppeln wollen, und dadurch Schaden veranlassen, v. 6. Jul. 1618. ebend.

27)

- 27) Desselben Mandat, daß die Untertanen die gefundenen Hirschstangen einliefern, und nicht entwenden sollen, v. 9. Febr. 1626. ebend. S. 549.
- 28) Desselben Mandat, die Ver-
scheuchung des Federwildprets
von Brut und Eiern, auch
die verbotene Zeit Vögel zu
fahen betreff., v. 26. Febr.
1626. ebend.
- 29) Desselben Mandat wegen
Büchsentragens, Jagens und
Hezens in Geheegen und
Wildbahnen, vom 18. März
1626. ebend. S. 551.
- 30) Desselben anderweites Man-
dat wegen des Büchsentragens,
Jagens und Hezens in Ge-
heegen und Wildbahnen, v. 8.
April 1629. f. ebend. S. 553.
- 31) Desselben ferneres Mandat,
wegen des Büchsentragens,
Jagens und Hezens in Ge-
heegen und Wildbahnen, vom
12. Decbr. 1630. ebend. S.
555.
- 32) Desselben wiederholtes Man-
dat wegen des Büchsenera-
gens, Jagens und Hezens in
Geheegen und Wildbahnen,
v. 22. Jan. 1650. ebend.
- 33) Desselben Befehl, die Hun-
de und Schaafrüden mit $\frac{3}{4}$
Ellen Klöppeln zu behängen,
damit sit der Wildbahn kei-
nen Schaden zufügen, v. 18.
July 1650. ebend. S. 557.
- 34) Erledigung der Landesge-
bühren v. J. 1653 und 1657.
C. A. I. S. 195.
- 35) Joh. George II. Mandat,
die Klöppelung der Hunde
und Schaafrüden, das Büch-
sentragen, die Wildpretsfuh-
ren, auch die Verbrennung
des Heidekrauts betreff. v. 15.
Febr. 1659. C. A. II. S.
559.
- 36) Erläuterung des vorstehen-
den Mandats v. 7. May 1659.
ebend. S. 561.
- 37) Desselben Declaration vor
Jacobi, außer einem schädli-
chen Thiere, kein Schwarz-
wildpret zu schießen, v. 14.
1666. ebend. S. 565.
- 38) Desselben Befehl an den
Amtmann zu Leipzig, ver-
möge dessen die vom 7. May
datirte Erläuterung und Note-
ration des Jagdmandats vom
15. Februar 1659. wieder
aufgehoben, und die Jagd-
und Forstbedienten lediglich
an die Beobachtung gedachten
Mandats gewiesen werden, v.
25. Febr. 1668.
- 39) Desselben Befehl, daß nie-
mand die gefundenen Hirsch-
stangen entwenden, sondern
jeder solche gehörigen Orts
einliefern solle, v. 15. März
1670. ebend. S. 567.
- 40) Desselben Befehl, die von
neuen zu bewerkstelligende Pu-
blicität, und Affigirung des
Jagd-Mandats vom 15. Febr.
1659. betreff. An den Ober-
amtmann zu Leipzig v. 25.
Jul. 1670.
- 41) Desselben Declaration, die
streitige Concurrenz der Lan-
des-

des Regierung und Cammer-Collegii betreffend, v. 13. Aug. 1670. C. A. I. S. II 47.

42) Das Oberamts-Mandat wider die Raubschützen und Fische, auch das Jagen und Hetzen auf eines andern Grund und Boden, v. 4. Aug. 1673, C. A. III. S. 399.

43) Joh. George III. Befehl, daß die Jagd- und Bergsachen durch die hohen Landesgerichte nicht decidiret, sondern solche an den Landesherrn remittiret werden sollen, v. 20. Aug. 1682. C. A. II. S. 363.

44) Desselben Mandat wider die Wildpretsdeuben, das Büchsentragen, Schießen, Klöppelung der Hunde, Fortschaffung des Wildprets, auch Verborgung der Neze und Hunde, v. 24. März 1686, ebend. S. 579.

45) Joh. George IV. Mandat wider die Wildpretsdeuben und andere, bey dem Jagdwesen eingeriffene Unordnungen, v. 24. März 1692, ebend. S. 581.

46) Desselben Befehl an das Oberhofgericht, wie es sich bey Inhibitionen der Amtssachen verhalten solle, vom 1. März 1693. C. A. I. S. 1329.

47) Desselben Befehl, daß die bisher gehaltenen Wolfsjagden aufgehoben seyn sollen, v. 11. Octobr. 1692. C. A. II. S. 583.

48) Friedrich Augusts Befehl an die Beamten, daß selbige die Amts-Regalia, Appertinentien und Nutzungen nach einem beygefügtten Schemate specificiren, und an die Kammer übersenden sollen, im Oct. 1694. ebend. S. 37.

49) Desselben Befehl an die Landjäger- Oberforst- und Wildmeister, daß selbige den Beamten die, zur Specification der Amts-Regalien, Appertinentien und Nutzungen begehrte Nachrichten communiciren sollen, v. 19. Decbr. 1694. f. ebend. S. 46.

50) Desselben Befehl deswegen an die Kreishauptleute, v. 19. Oct. 1694. ebend. S. 47.

51) Extr. resol. auf die Präliminarschrift vom 31. Decbr. 1694. C. A. I. S. 1329.

52) Desselben Mandat, die Wildbahn, Büchsentragen, Schießen, Klöppelung der Hunde, Fortschaffung des Wildprets, und Verborgung der Neze und Hunde betreffend, v. 2. May 1695. C. A. II. S. 583.

53) Desselben Mandat, die Vermehrung des Thiergartens bey Ostra betreff. v. 16. Decbr. 1696. ebend. S. 585.

54) Desselben anderweites Mandat, die Wildbahn, das Büchsentragen, Schießen, Klöppelung der Hunde, Fortschaffung des Wildprets und Ver-

- 27) Desselben Mandat, daß die Untertanen die gefundenen Hirschstangen einliefern, und nicht entwenden sollen, v. 9. Febr. 1626. ebend. S. 549.
- 28) Desselben Mandat, die Ver- scheuchung des Federwildprets von Brut und Eiern, auch die verbotene Zeit Vögel zu fahen betreff., v. 26. Febr. 1626. ebend.
- 29) Desselben Mandat wegen Büchsentragens, Jagens und Hezens in Geheegen und Wildbahnen, vom 18. März 1626. ebend. S. 551.
- 30) Desselben anderweites Man- dat wegen des Büchsentragens, Jagens und Hezens in Ge- heegen und Wildbahnen, v. 8. April 1629. s. ebend. S. 553.
- 31) Desselben ferneres Mandat, wegen des Büchsentragens, Jagens und Hezens in Ge- heegen und Wildbahnen, vom 12. Decbr. 1630. ebend. S. 555.
- 32) Desselben wiederholtes Man- dat wegen des Büchsenera- gens, Jagens und Hezens in Geheegen und Wildbahnen, v. 22. Jan. 1650. ebend.
- 33) Desselben Befehl, die Hun- de und Schaafrüden mit 7 Ellen Klöppeln zu behängen, damit sie der Wildbahn kei- nen Schaden zufügen, v. 18. Julij 1650. ebend. S. 557.
- 34) Erledigung der Landesger- brechen v. J. 1653 und 1657. C. A. I. S. 195.
- 35) Joh. George II. Ma die Klöppelung der H und Schaafrüden, das E sentragen, die Wildpre- ren, auch die Verdrren des Heidekrauts betreff. Febr. 1659. C. A. II. 559.
- 36) Erläuterung des vorst- den Mandats v. 7. May 1 ebend. S. 561.
- 37) Desselben Declaration Jacobi, außer einem st- chen Thiere, kein Sch- wildpret zu schießen, v. 1666. ebend. S. 565.
- 38) Desselben Befehl an Amtmann zu Leipzig, möge dessen die vom 7. datirte Erklärung und E- ration des Jagdmandats 15. Februar 1659. u- aufgehoben, und die- und Forstbedienten st- an die Beobachtung get- Mandats gewiesen werde- 25. Febr. 1668.
- 39) Desselben Befehl, daß mand die gefundenen H- stangen entwenden, für jeder solche gehörigen- einliefern solle, v. 15. 1670, ebend. S. 567.
- 40) Desselben Befehl, die neuen zu bewerkstelligende- blicke- und Affigirung- Jagd-Mandats vom 15. 1659. betreff. An den- amtmann zu Leipzig v. Jul. 1670.
- 41) Desselben Declaration, streitige Concurrenz der-

des Regierung und Cammer-Collegii betreffend, v. 13. Aug. 1670. C. A. I. S. 1147.

2) Das Oberamts-Mandat wider die Raubschützen und Fischer, auch das Jagen und Fischen auf einem andern Grund und Boden, v. 4. Aug. 1673, C. A. III. S. 399.

3) Joh. George III. Befehl, daß die Jagd- und Bergsachen durch die hohen Landesgerichte nicht decidiret, sondern solche an den Landesherrn remittiret werden sollen, v. 20. Aug. 1682. C. A. II. S. 363.

4) Desselben Mandat wider die Wildpretsdeuben, das Büchsentragen, Schießen, Klöppelung der Hunde, Fortschaffung des Wildprets, auch Verborgung der Rehe und Hunde, v. 24. März 1686, ebend. S. 579.

5) Joh. George IV. Mandat wider die Wildpretsdeuben und andere, bey dem Jagdwesen eingerissene Unordnungen, v. 24. März 1692. ebend. S. 581.

6) Desselben Befehl an das Oberhofgericht, wie es sich bey Inhibitionen der Amtssachen verhalten solle, vom 1. März 1693. C. A. I. S. 1329.

7) Desselben Befehl, daß die bisher gehaltenen Wolfsjagden aufgehoben seyn sollen, v. 11. Octobr. 1692. C. A. II. S. 583.

48) Friedrich Augusts Befehl an die Beamten, daß selbige die Amts-Regalia, Appertinentien und Nutzungen nach einem beigefügten Schemate specificiren, und an die Kammer übersenden sollen, im Oct. 1694. ebend. S. 37.

49) Desselben Befehl an die Landjäger, Oberforst- und Wildmeister, daß selbige den Beamten die, zur Specification der Amts-Regalien, Appertinentien und Nutzungen begehrte Nachrichten communiciren sollen, v. 19. Decbr. 1694. f. ebend. S. 46.

50) Desselben Befehl bezwegen an die Kreishauptleute, v. 19. Oct. 1694. ebend. S. 47.

51) Extr. resol. auf die Präliminarschrift vom 31. Decbr. 1694. C. A. I. S. 1329. 1

52) Desselben Mandat, die Wildbahn, Büchsentragen, Schießen, Klöppelung der Hunde, Fortschaffung des Wildprets und Verborgung der Rehe und Hunde betreffend, v. 2. May 1695. C. A. II. S. 583.

53) Desselben Mandat, die Vermehrung des Thiergartens bey Ostra betreff. v. 16. Decbr. 1696. ebend. S. 585.

54) Desselben anderweites Mandat, die Wildbahn, das Büchsentragen, Schießen, Klöppelung der Hunde, Fortschaffung des Wildprets, auch die

6 Verzeichniß der Jagdgesetze.

borgung der Rege und Hunde betreffend, v. 15. Septbr. 1697. ebend. S. 593.

) Desselben Befehl, daß das Jagd-Mandat vom 2. May 1695 von neuem publiciret, und die Unterthanen zu dessen genauer Befolgung angehalten werden sollen, v. 28. Sept. 1697. C. A. II. S. 597.

) Desselben Mandat, wider das unbefugte Schießen und Fangen der Fasanen, Haasen, Rebhühner und wilden Enten, v. 19. Aug. 1698. ebend. S. 595.

) Extr. resolut. auf die Präliminarschrift v. 8. Febr. 1700. C. A. I. S. 365.

) Mandat Friedrich Augusts, wider die Wildpretsdiebereyen, v. 8. März 1700. C. A. II. S. 597.

) Desselben Mandat, die nach dem neuen Kalender angeordneten Jagdzeiten und Jagdtermine betreff., v. 20. Sept. 1702. ebend. S. 59.

) Desselben Befehl, die Anhaltung derer mit Büchsen und Röhren herum vagirenden Jägerpursche und verdächtigen Gesindels betreff., an den Oberforst- und Wildmeister zu Niederschöna und den Kreiskammern zu Leipzig, v. 25. Jan. 1703. ebend.

) Oberamts-Patent im Marggrafthum Oberlausitz, wider

die Raub- und Wildschüßen, auch Fisch- und Krebsdiebe, ingl. daß denen Hunden Kloppe angehängt, und die Eier aus den Vogelnestern nicht genommen werden sollen, v. 24. März 1703. C. A. III. S. 405.

62) Friedrich Augusts Befehl, die Koppel- und Niederjagd dieses Jahres einzustellen, v. 17. April 1709. C. A. II. S. 601.

63) Die wiederholte Publication des sub No. 61. aufgeführten Oberamtspatents v. 24. Febr. 1710. C. A. III. S. 40.

64) Friedrich Augusts Mandat, die Wildpretsdiebereyen betreff. und wie gegen dergl. angetroffene Wildpretsdiebe zu verfahren, v. 26. Juny 1711. C. A. II. S. 601.

65) Extract aus dem Landtagsabschiede, v. 24. April 1711. C. A. I. S. 510.

66) Friedrich Augusts Befehl, den Anfang und die Endigung der Jagdzeiten betreff., v. 5. July 1712. C. A. II. S. 603.

67) Desselben Befehl, daß die Rügen in Jagd, und Forst-sachen wider die Forstbedienten an die Churfürstl. Kammer zur Entscheidung zu remittiren, v. 20. July 1712. ebend. S. 605.

- 68) Desselben Mandat, worinnen alles Jagen, Hetzen und Schießen in Dero und des Königl. und Churprinzen Geheerge um Dresden gänzlich abzustellen befohlen wird, v. 20. Nov. 1715. ebend. S. 609.
- 69) Desselben Befehl, wider die von einigen Lehnrichtern mißbrauchte Niederjagden, und unbefugte Verstärkung ihrer Schäferey, v. 9. Jun. 1716. ebend. S. 609.
- 70) Die Königl. Resolutiones in Jagdsachen, v. Jahre 1716. C. A. I. S. 392.
- 71) Friedr. Aug. Mandat, worinnen enthalten, was von Wildpret eigentlich zur Hohen-Mittel- und Niederjagd gerechnet wird, auch wer Wölfe zu fällen, befugt seyn solle, vom 8. Nov. 1717. C. A. II. S. 611.
- 72) Extr. resol. auf die Landtags-Gravamina, v. Jahre 1718. C. A. I. S. 396.
- 73) Extr. Resol. auf die Präliminair-Schrift von demselben Jahre. ebend. S. 402.
- 74) Resol. auf die übrigen Gravamina, von demselben Jahre. S. C. A. I. S. 25.
- 75) Friedrich Aug. Mandat, daß Niemand im großen Garten vor dem Pirnaischen Thore bey Dresden, in den Alleen und und Maillebahn im Grase, noch neu angelegten Remise, und auf der Saat herum zugehen, sich unterstehen, auch keine Hunde mit hinein bringen sollen, v. 9. May 1718. C. A. II. S. 611.
- 76) Oberamts-Patent, mittelst dessen die im Marggrasthum Oberlausitz Ao. 1662, 1675, 1703 und 1710 wider die Raub- und Wildschützen, auch Fische und Krebsdiebe publicirte Patente erneuert und eingeschränkt werden, vom 23. May 1722. C. A. III. S. 517.
- 77) Extr. aus dem Ausschustagsabschiede, v. 12. April 1726. S. C. A. I. S. 29.
- 78) Oberamts-Patent, die bessere Beobachtung der bereits zu unterschiedenen Malen wegen der, den Hunden bey 5 Rthlr. Strafe anzulegenden hölzernen Klöppeln publicirten Oberamtspatente betreff., v. 20. Septbr. 1727. S. C. A. II. S. 248.
- 79) Extrakt aus denen auf die Präliminarschrift 1728. ertheilten Resol., v. 12. April 1728. S. C. A. I. S. 45.
- 80) Friedrich Augusts Befehl, die Schonung der Koppel- und anderer Jagden auf ein Jahr betreffend, v. 19. Jul. 1731. ebend. S. 1487.
- 81) Desselben Mandat zu fernerer Schonung der Jagden noch auf ein Jahr, v. 26. Jul. 1732. ebend.
- 82) Desselben Mandat, die Klöppelung und Innenbehaltung der

- der Bauer = auch Klöppelung der Jagdhunde betreff., von demselben Dato ebend. S. 1489.
- 83) Desselben Mandat die Schonung derer ins Freigelassene Auerthiere betreff., vom 27. Jul. 1733. f. ebend.
- 84) Friedr. Aug. III. Rescript, die von den Unterthanen der Aemter Leisnig, Eilenburg, Grimma, Borna, Rochlitz, Colditz, Wurzen und Rossen, künftig unnachbleibende Leistung der Fuhren, Hand- und Jagddienste zu dem Schlosse Hubertsburg betreff., v. 27. Jun. 1735. f. ebend.
- 85) Desselben Generale, wegen Einlieferung der geworfenen Hirschgehörne und Stangen, v. 18. Okt. 1735. f. ebend. 1491.
- 86) Desselben Mandat, wider die Raubschützen und Führung Schießgewehres in Königl. Wäldungen, vom 9. Sept. 1738. f. ebend.
- 87) Desselben Rescript, daß denen Jagd- und Forstbedienten wider die Raubschützen und andere Wildpretsdiebe von der Miliz die erforderliche Assistance ohnweigerlich geleistet werden solle, vom 29. Decbr. 1739. f. ebend. 1493.
- 88) Desselben Rescript die heimlichen Wildpretsbeschädigungen und deren Ausföndigmachung, auch die Abstellung der Schreckschüsse betreffend, v. 20. May 1740. ebend.
- 89) Desselben Rescript die Schonung der Reiber zu den Königl. Plaisir betreff. v. 7. April 1740 S. C. A. II. S. 426.
- 90) Desselben Mand. wegen Ausschuss = Heg- und Schieß- auch Fangan der Fasanen, v. 7. März 1741. S. C. A. I. S. 1495.
- 91) Desselben Rescript an das Stift Merseburgische Kammer-Collegium, die Haltung und Abschaffung der Windhunde betreff. v. 4. May 1741. ebend. S. 1497.
- 92) Dessen erneuertes Mandat die Einlieferung der gefundenen Hirschstangen betreff. v. 29. Jun. 1742. ebend.
- 93) Extr. aus denen auf die Preliminairschrift ertheilten Resolutionen v. 9. Jul. 1742. S. C. A. I. S. 65.
- 94) Friedr. Aug. III. Generale die Gerichtsbarkeit in denen Aemtern über die Jagd- und Forstbedienten betreff. an die Oberamtsregierung zu Lübben v. 2. Oct. 1743 S. C. A. II. S. 428.
- 95) Desselben Generale das Forum Privilegiatum der Jagd- und Forstbedienten betreff. v. 5. Nov. 1743. S. C. A. I. S. 1499.

- 96) Desselben neue Decisionen Decbr. IV. v. 1746. ebend. S. 350. Zeit betreff. v. 30 Jul. 1763. ebend. S. 1503.
- 97) Dessen Generale wegen Verpflichtung der Jagd- und Amtsmäurer v. 11 Oct. 1747. ebend. S. 1311.
- 98) Dessen Generalbefehl, die auf denen Vorwergen, Mühlen, Schenken, Kuttelhöfen zu unterhaltenden Königl. Hunde betreff. v. 16 Febr. 1747. ebend. S. 1499.
- 99) Dessen Generale die schleunige Anzeige derer künftig vorfallenden Jagdverbrechen und deren Untersuchung betreff. v. 1 Febr. 1748. ebend. S. 1501.
- 100) Oberamts-Patent wegen derer Montirungs- und Equipage Bedürfnisse vor die Armee auch zu Livreen vor die Hofstaat und Hofjägerey, daß solche aus denen Sächß. Landen und von inländischer Fabrication zu nehmen v. 28 März 1748. S. C. A. II. S. 242.
- 101) Friedr. Aug. III. Generale die genaue Beobachtung des, wider das Betteln ergangenen Mandats im Fürstenth. Querfurth und die, von der Jägerey hierbey zu leistende Assistentz betreff. v. 3. Febr. 1749. S. C. A. I. S. 731.
- 102) Dessen Mandat die Schonung der Jagden auf gewisse
- 103) Friedr. Christians Mandat zu Erläuterung desselben. v. 14. Oct. 1763. f. ebend.
- 104) Decret an die Landstände die Erläuterung desselben betreff. v. 19. Sept. 1763. f. ebend. S. 79.
- 105) Resolutionen auf die bey dem Landtage 1763 angebrachten Beschwerden und Punkte, v. J. 1763. ebend. S. 97.
- 106) Dergl. auf die bey dem Landtage 1766 angebrachten Gravamina in Renth-Jagd-Forst- und Floßsachen v. J. 1766. f. ebend. S. 143.
- 107) Fr. Xaverii Generalbefehl die, wegen des erlittenen Wildschadens anzubringenden Beschwerden betreff. v. 2 Dec. 1766. f. ebend. S. 1505.
- 108) Desselben Generalbefehl die Unterhaltung derer, auf den Cavillereyen und andern Ortschaften einzulegenden Churfürstl. Hekunde betreff. v. 23 März. 1767. f. ebend. S. 1507.
- 109) Sr. jetzt regierenden Königl. Maj. zu Sachsen Mandat die, wider das Herumlauseh und die Wuth der Hunde vorzukehrenden Anstalten betreff. v. 7. Sept. 1782.
- 110) Dessen Generale wegen de aus dießseitigen in die Branden,

denburgischen Lande et vice
versa einbringenden Wildprets
zu nehmenden Praecautiones
betreff. v. 24. März 1784.

der Hunde im großen Garten
betreff. v. 5. Jun. 1784.

111) Patent das Herumlaufen

112) Generale die Ablieferung
des Wildpretsdeputats betreff.
v. 24. Jul. 1787.

V e r z e i c h n i s s

aller in Jagdsachen ergangenen Chursächf. Gesetze und
Verordnungen in chronologischer Ordnung.

- 1) Herzog Ernsts und Herzog Albrechts zu Sachsen Landesordnung v. J. 1442. C. A. P. I. S. 12.
- 2) Herzog Morizens Ausschreiben v. J. 1543. C. A. P. I. S. 25.
- 3) Die Landesordn. gemein. Stände des Marggrasth. Oberlandes, aufgerichtet und beschloßen, die Justiz, Policey, Lehns- u. andere Sachen betreff. v. 20. Nov. 1551. C. A. III. S. 81.
- 4) Churfürst Augusts Ausschreiben v. 1. Okt. 1555. C. A. I. S. 43.
- 5) Desselben Verordn. und Constitutiones v. 21. April 1572. C. A. I. S. 74.
- 6) Desselb. Patent, wegen des Jagens und Schießens allerley Federwildprets v. 26. May 1573. C. A. II. S. 515.
- 7) Desselben Mandat wegen des Federwildprets, solches außer der Zeit nicht zu fahen, noch mit täglichen Schießen dasselbe scheu zu machen, v. 4. Febr. 1575. C. A. II. S. 517.
- 8) Desselben Befehl, wie es mit dem Vogelweydwerk zu halten, v. 10. Oct. 1576. C. A. II. S. 7.
- 9) Desselben Verbot wider die Wildpretsbeschädiger und Räuber v. 6. July 1579. C. A. II. S. 523.
- 10) Desselben Mandat wider die Wildschützen und Landbeschädiger, v. 9. Januar 1582. C. A. II. S. 524.
- 11) Desselben geschärftes Mandat, daß die Wildpretsbeschädiger mit dem Galgen, und da sie auch dabey freveln und rauben, als Straßenräuber bestraft,

- strafte werden, v. 10. Octbr. 1584. C. A. II. S. 526.
- 12) Christian I. Wiederholung und Publication obigen Mandats v. 26. Jun. 1587. ebend. S. 529.
- 13) Desselben Befehl, daß die Bürger- und Bauerhunde zu lähmen, v. 15. Jan 1588. ebend. S. 531.
- 14) Die erneuerte Landesordnung des Marggrasthums Oberlausitz, v. 6. May 1597. C. A. III. S. 119.
- 15) Friedrich Wilhelms Mandat des Weidwerks mit der Gule und Leimstange sich zu enthalten, v. 22. März 1598. C. A. II. S. 535.
- 16) Desselben Mandat wider die Wildpretsdiebe, auch diejenigen, so sie haufen und herbergen, v. 15. Oct. 1599. ebend. S. 537.
- 17) Oberamts-Patent im Marggrasthum Oberlausitz, wider die Fisch- und Krebsdiebe, Raubschützen und auch diejenigen, so sich des Hagens und Jagens auf anderer Grund und Boden unterfangen, vom 27. März 1602. C. A. III. S. 513.
- 18) Christian II. Mandat, daß die Wildpretsdiebe mit dem Galgen zu bestrafen, vom 4. Febr. 1603. C. A. II. S. 539.
- 19) Desselben Mandat wegen des Hagens, Jagens, Hühnerfangens und andern Wild-
- pret, vom 16. May 1603. ebend.
- 20) Desselben Mandat des Voggelfangens ausser der Zeit sich zu enthalten, vom 9. April 1604. ebend. S. 541.
- 21) Desselben Mandat wider zusammenrottirende Wildpretsdiebe, v. 2. July 1605. ebend. S. 543.
- 22) Desselben Befehl, daß die Unterthanen und Schäfer ihre Hunde, und sonderlich die Schaafrüben im Felde nicht ledig laufen lassen, sondern an Ketten führen sollen, vom 27. May 1607. ebend.
- 23) Die Erörterung der Landesgebrechen unter demselben, v. Jahre 1609. C. A. I. S. 167.
- 24) Johann George I. Mandat, daß denen Verordnungen wegen des Hagens, Jagens, Hühnerfangens und Weidwerks, besser als bisher geschehen, nachgelebt werden soll, v. 9. Jun. 1613. C. A. II. S. 545.
- 25) Desselben Mandat, daß Niemand ausser der öffentlichen Landstraße Büchsen tragen, vielweniger solche in Waldungen und Geheegen losschießen soll, v. 9. Jun. 1613. ebend. S. 547.
- 26) Desselben Rescript an den Wild- und Forstmeister zu Söllichau, das Verfahren wider diejenigen betreff. so ihre Hunde nicht klöppeln wollen, und dadurch Schaden veranlassen, v. 6. Jul. 1618. ebend.

- 27) Desselben Mandat, daß die Unterthanen die gefundenen Hirschstangen einliefern, und nicht entwenden sollen, v. 9. Febr. 1626. ebend. S. 549.
- 28) Desselben Mandat, die Ver-
scheuchung des Federwildprets
von Brut und Eyern, auch
die verbotene Zeit Vögel zu
fahen betreff., v. 26. Febr.
1626. ebend.
- 29) Desselben Mandat wegen
Büchsentragens, Jagens und
Hezens in Geheegen und
Wildbahnen, vom 18. März
1626. ebend. S. 551.
- 30) Desselben anderweites Man-
dat wegen des Büchsentragens,
Jagens und Hezens in Ge-
heegen und Wildbahnen, v. 8.
April 1629. f. ebend. S. 553.
- 31) Desselben ferneres Mandat,
wegen des Büchsentragens,
Jagens und Hezens in Ge-
heegen und Wildbahnen, vom
12. Decbr. 1630. ebend. S.
555.
- 32) Desselben wiederholtes Man-
dat wegen des Büchsenera-
gens, Jagens und Hezens in
Geheegen und Wildbahnen,
v. 22. Jan. 1650. ebend.
- 33) Desselben Befehl, die Hun-
de und Schaafrüben mit $\frac{1}{4}$
Ellen Klöppeln zu behängen,
damit sit der Wildbahn kei-
nen Schaden zufügen, v. 18.
July 1650. ebend. S. 557.
- 34) Erledigung der Landesge-
brechen v. J. 1653 und 1657.
C. A. I. S. 195.
- 35) Joh. George II. Mandat,
die Klöppelung der Hunde
und Schaafrüben, das Büch-
sentragen, die Wildpretsfuh-
ren, auch die Verbrennung
des Heidekrauts betreff. v. 15.
Febr. 1659. C. A. II. S.
559.
- 36) Erläuterung des vorstehen-
den Mandats v. 7. May 1659.
ebend. S. 561.
- 37) Desselben Declaration vor
Jacobi, außer einem schädli-
chen Thiere, kein Schwarz-
wildpret zu schießen, v. 14.
1666. ebend. S. 565.
- 38) Desselben Befehl an den
Amtmann zu Leipzig, ver-
möge dessen die vom 7. May
datirte Erläuterung und Mode-
ration des Jagdmandats vom
15. Februar 1659. wieder
aufgehoben, und die Jagd-
und Forstbedienten lediglich
an die Beobachtung gedachten
Mandats gewiesen werden, v.
25. Febr. 1668.
- 39) Desselben Befehl, daß nie-
mand die gefundenen Hirsch-
stangen entwenden, sondern
jeder solche gehörigen Orts
einliefern solle, v. 15. März
1670. ebend. S. 567.
- 40) Desselben Befehl, die von
neuen zu bewerkstelligende Pu-
blicir- und Affigirung des
Jagd-Mandats vom 15. Febr.
1659. betreff. An den Ober-
amtman zu Leipzig v. 25.
Jul. 1670.
- 41) Desselben Declaration, die
streitige Concurrenz der Lan-
des-

besregierung und Cammer-Collegii betreffend, v. 13. Aug. 1670. C. A. I. S. 1147.

42) Das Oberamts-Mandat wider die Raubschützen und Fische, auch das Jagen und Fischen auf eines andern Grund und Boden, v. 4. Aug. 1673, C. A. III. S. 399.

43) Joh. George III. Befehl, daß die Jagd- und Bergsachen durch die hohen Landesgerichte nicht decidiret, sondern solche an den Landesherrn remittiret werden sollen, v. 20. Aug. 1682. C. A. II. S. 363.

44) Desselben Mandat wider die Wildpretsbeuben, das Büchsentragen, Schießen, Klöppelung der Hunde, Fortschaffung des Wildprets, auch Verborgung der Neze und Hunde, v. 24. März 1686, ebend. S. 579.

45) Joh. George IV. Mandat wider die Wildpretsbeuben und andere, bey dem Jagdwesen eingerissene Unordnungen, v. 24. März 1692, ebend. S. 581.

46) Desselben Befehl an das Oberhofgericht, wie es sich bey Inhibitionen der Amtssachen verhalten solle, vom 1. März 1693. C. A. I. S. 1329.

47) Desselben Befehl, daß die bisher gehaltenen Wolfsjagden aufgehoben seyn sollen, v. 11. Octobr. 1692. C. A. II. S. 583.

48) Friedrich Augusts Befehl an die Beamten, daß selbige die Amts-Regalia, Appertinentien und Nutzungen nach einem begefügten Schemate specificiren, und an die Kammer übersenden sollen, im Oct. 1694. ebend. S. 37.

49) Desselben Befehl an die Landjäger, Oberforst- und Wildmeister, daß selbige den Beamten die, zur Specification der Amts-Regalien, Appertinentien und Nutzungen begehrte Nachrichten communiciren sollen, v. 19. Decbr. 1694. f. ebend. S. 46.

50) Desselben Befehl deswegen an die Kreishauptleute, v. 19. Dec. 1694. ebend. S. 47.

51) Extr. resol. auf die Präliminarschrift vom 31. Decbr. 1694. C. A. I. S. 1329.

52) Desselben Mandat, die Wildbahn, Büchsentragen, Schießen, Klöppelung der Hunde, Fortschaffung des Wildprets und Verborgung der Neze und Hunde betreffend, v. 2. May 1695. C. A. II. S. 583.

53) Desselben Mandat, die Vermehrung des Thiergartens bey Ostra betreff. v. 16. Decbr. 1696. ebend. S. 585.

54) Desselben anderweites Mandat, die Wildbahne, das Büchsentragen, Schießen, Klöppelung der Hunde, Fortschaffung des Wildprets und Verbor-

- borgung der Rege und Hunde betreffend, v. 15. Septbr. 1697. ebend. S. 593.
- 55) Desselben Befehl, daß das Jagd-Mandat vom 2. May 1695 von neuem publiciret, und die Unterthanen zu dessen genauer Befolgung angehalten werden sollen, v. 28. Sept. 1697. C. A. II. S. 597.
- 56) Desselben Mandat, wider das unbefugte Schießen und Fangen der Fasanen, Haasen, Rebhühner und wilden Enten, v. 19. Aug. 1698. ebend. S. 595.
- 57) Extr. resolut. auf die Präliminarschrift v. 8. Febr. 1700. C. A. I. S. 365.
- 58) Mandat Friedrich Augusts, wider die Wildpretsdiebereyen, v. 8. März 1700. C. A. II. S. 597.
- 59) Desselben Mandat, die nach dem neuen Kalender angeordneten Jagdzeiten und Jagdtermine betreff., v. 20. Sept. 1702. ebend. S. 59.
- 60) Desselben Befehl, die Anhaltung derer mit Büchsen und Röhren herum vagirenden Jägerpursche und verdächtigen Gesindels betreff., an den Oberforst- und Wildmeister zu Niederschöna und den Kreisamtmann zu Leipzig, v. 25. Jan. 1703. ebend.
- 61) Oberamts-Patent im Marggrafthum Oberlausitz, wider die Raub- und Wildschüßen, auch Fisch- und Krebsdiebe, ingl. daß denen Hunden Kloppeel angehängt, und die Eier aus den Vogelnestern nicht genommen werden sollen, v. 24. März 1703. C. A. III. S. 405.
- 62) Friedrich Augusts Befehl, die Koppel- und Niederjagd dieses Jahres einzustellen, v. 17. April 1709. C. A. II. S. 601.
- 63) Die wiederholte Publication des sub No. 61. aufgeführten Oberamtspatents v. 24. Febr. 1710. C. A. III. S. 40.
- 64) Friedrich Augusts Mandat, die Wildpretsdiebereyen betreff., und wie gegen dergl. angetroffene Wildpretsdiebe zu verfahren, v. 26. Juny 1711. C. A. II. S. 601.
- 65) Extract aus dem Landtagsabschiede, v. 24. April 1711. C. A. I. S. 510.
- 66) Friedrich Augusts Befehl, den Anfang und die Endigung der Jagdzeiten betreff., v. 5. July 1712. C. A. II. S. 603.
- 67) Desselben Befehl, daß die Rügen in Jagd, und Forstfachen wider die Forstbedienten an die Churfürstl. Kammer zur Entscheidung zu remittiren, v. 20. July 1712. ebend. S. 605.

- 68) Desselben Mandat, worinnen alles Jagen, Hetzen und Schießen in Dero und des Königl. und Churprinzen Geheezge um Dresden gänzlich abzustellen befohlen wird, v. 20. Nov. 1715. ebend. S. 609.
- 69) Desselben Befehl, wider die von einigen Lehrrichtern mißbrauchte Niederjagden, und unbefugte Verstärkung ihrer Schützen, v. 9. Jun. 1716. ebend. S. 609.
- 70) Die Königl. Resolutiones in Jagdsachen, v. Jahre 1716. C. A. I. S. 392.
- 71) Friedr. Aug. Mandat, worinnen enthalten, was von Wildpret eigentlich zur Hohen-Mittel- und Niederjagd gerechnet wird, auch wer Wölfe zu fällen, befugt seyn solle, vom 8. Nov. 1717. C. A. II. S. 611.
- 72) Extr. resol. auf die Landtagß-Gravamina, v. Jahre 1718. C. A. I. S. 396.
- 73) Extr. Resol. auf die Präliminair-Schrift von demselben Jahre. ebend. S. 402.
- 74) Resol. auf die übrigen Gravamina, von demselben Jahre. S. C. A. I. S. 25.
- 75) Friedrich Aug. Mandat, daß Niemand im großen Garten vor dem Pirnaischen Thore bey Dresden, in den Alleen und und Maillebahn im Grase, noch neu angelegten Remise, und auf der Saat herum zu gehen, sich unterstehen, auch keine Hunde mit hinein bringen sollen, v. 9. May 1718. C. A. II. S. 611.
- 76) Oberamts-Patent, mittelst dessen die im Marggrathum Oberlausß Ao. 1662, 1675, 1703 und 1710 wider die Raub- und Wildschützen, auch Fische und Krebsdiebe publicirte Patente erneuert und eingeschränkt werden, vom 23. May 1722. C. A. III. S. 517.
- 77) Extr. aus dem Ausschustagsabschiede, v. 12. April 1726. S. C. A. I. S. 29.
- 78) Oberamts-Patent, die bessere Beobachtung der bereits zu unterschiedenen Malen wegen der, den Hunden bey 5 Rthlr. Strafe anzulegenden hölzernen Klöppeln publicirten Oberamtspatente betreff., v. 20. Septbr. 1727. S. C. A. II. S. 248.
- 79) Extrakt aus denen auf die Präliminarschrift 1728. ertheilten Resol., v. 12. April 1728. S. C. A. I. S. 45.
- 80) Friedrich Augusts Befehl, die Schonung der Koppel- und anderer Jagden auf ein Jahr betreffend, v. 19. Jul. 1731. ebend. S. 1487.
- 81) Desselben Mandat zu fernerweiter Schonung der Jagden noch auf ein Jahr, v. 26. Jul. 1732. ebend.
- 82) Desselben Mandat, die Klöppelung und Innenbehaltung der

- der Bauer, auch Kldoppelung der Jagdhunde betreff., von demselben Dato ebend. S. 1489.
- 83) Desselben Mandat die Schonung derer ins Freigelassene Auerthiere betreff., vom 27. Jul. 1733. f. ebend.
- 84) Friedr. Aug. III. Rescript, die von den Unterthanen der Aemter Leisnig, Eilenburg, Grimma, Borna, Rochlitz, Colditz, Wurzen und Rossen, künftig unnachbleibende Leistung der Fuhren, Hand- und Jagddienste zu dem Schlosse Hubertsburg betreff., v. 27. Jun. 1735. f. ebend.
- 85) Desselben Generale, wegen Einlieferung der geworfenen Hirschgehörne und Stangen, v. 18. Okt. 1735. f. ebend. 1491.
- 86) Desselben Mandat, wider die Raubschützen und Führung Schießgewehres in Königl. Waldungen, vom 9. Sept. 1738. f. ebend.
- 87) Desselben Rescript, daß denen Jagd- und Forstbedienten wider die Raubschützen und andere Wildpretsdiebe von der Miliz die erforderliche Assistenz ohnweigerlich geleistet werden solle, vom 29. Decbr. 1739. f. ebend. 1493.
- 88) Desselben Rescript die heimlichen Wildpretsbeschädigungen und deren Ausföndigmachung, auch die Abstellung der Schreckschüsse betreffend, v. 20. May 1740. ebend.
- 89) Desselben Rescript die Schonung der Reiher zu den Königl. Plaisir betreff. v. 7 April 1740 S. C. A. II. S. 426.
- 90) Desselben Mand. wegen Aufseß- Heg- und Schieß- auch Fangung der Ganssen, v. 7 März 1741. S. C. A. I. S. 1495.
- 91) Desselben Rescript an das Stift Merseburgische Kammer-Collegium, die Haltung und Abschaffung der Windhunde betreff. v. 4 May 1741. ebend. S. 1497.
- 92) Dessen erneuertes Mandat die Einlieferung der gesunden Hirschstangen betreff. v. 29 Jun. 1742. ebend.
- 93) Extr. aus denen auf die Präliminairschrift erteilten Resolutionen v. 9. Jul. 1742. S. C. A. I. S. 65.
- 94) Friedr. Aug. III. Generale die Gerichtsbarkeit in denen Aemtern über die Jagd- und Forstbedienten betreff. an die Oberamtsregierung zu Lubben v. 2 Oct. 1743 S. C. A. II. S. 428.
- 95) Desselben Generale das Forum Privilegium der Jagd- und Forstbedienten betreff. v. 5. Nov. 1743. S. C. A. I. S. 1499.

- 96) Desselben neue Decisionen
Dachr. IV. v. 1746. ebend.
S. 350. Zeit betreff. v. 30 Jul. 1763.
ebend. S. 1503.
- 97) Dessen Generale wegen Ver-
pflichtung der Jagd- und Amts-
mäurer v. 11 Oct. 1747. ebend.
S. 1311.
- 98) Dessen Generalbefehl, die
auf denen Vorwergen, Mühlen,
Schenken, Ruttelhöfen zu un-
terhaltenden Königl. Hunde be-
treff. v. 16 Febr. 1747. ebend.
S. 1499.
- 99) Dessen Generale die schleu-
nige Anzeige derer künftig vor-
fallenden Jagdverbrechen und
deren Untersuchung betreff. v.
1 Febr. 1748. ebend. S. 1501.
- 100) Oberamts-Patent wegen
derer Montirungs- und Equi-
page Bedürfnisse vor die Ar-
mee auch zu Livreen vor die
Hofstaat und Hofjägeret, daß
solche aus denen Sächß. Lan-
den und von innländischer Fa-
brikation zu nehmen v. 28
März 1748. S. C. A. II. S.
242.
- 101) Friedr. Aug. III. Genera-
le die genaue Beobachtung des,
wider das Betteln ergangen.
Mandats im Fürstenth. Quer-
furth und die, von der Jäge-
rey hierbey zu leistende Als-
sistenz betreff. v. 3. Febr. 1749.
S. C. A. I. S. 731.
- 102) Dessen Mandat die Scho-
nung der Jagden auf gewisse
- 103) Friedr. Christians Mandat
zu Erläuterung desselben. v. 14.
Oct. 1763. f. ebend.
- 104) Decret an die Landstände
die Erläuterung desselben be-
treff. v. 19. Sept. 1763. f.
ebend. S. 79.
- 105) Resolutionen auf die bey dem
Landtage 1763 angebrachten Be-
schwerden und Puntte, v. J.
1763. ebend. S. 97.
- 106) Dergl. auf die bey dem Landtage
1766 angebrachten Gravamina
in Renth- Jagd- Forst- und
Flosssachen v. J. 1766. f. ebend.
S. 143.
- 107) Fr. Xaverii Generalbefehl
die, wegen des erlittenen Wild-
schadens anzubringenden Be-
schwerde betreff. v. 2 Dec. 1766.
f. ebend. S. 1505.
- 108) Desselben Generalbefehl die
Unterhaltung derer, auf den
Cavillereyen und andern Orts-
schaften einzulegenden Chur-
fürstl. Hekhunde betreff. v. 23
März. 1767. f. ebend. S. 1507.
- 109) Sr. jetzt regierenden Königl.
Maj. zu Sachsen Mandat die,
wider das Herumlaufen und
die Wuth der Hunde vorzukeh-
renden Anstalten betreff. v. 7.
Sept. 1782.
- 110) Dessen Generale wegen be-
aus dießseitigen in die Bran-
den.

denburgischen Lande et vice
versa einbringenden Wildprets
zu nehmenden Praecautiones
betreff. v. 24. März 1784.

der Hunde im großen Garten
betreff. v. 5. Jun. 1784.

111) Patent das Herumlaufen

112) Generale die Ablieferung
des Wildpretsdeputats betreff.
v. 24. Jul. 1787.

